




C. 9.







Set 216
m 31

CARLOS LINNÆO.

TOMO VI.






PARTE PRÁCTICA DE BOTÁNICA
DEL CABALLERO
CÁRLOS LINNEO.
TOMO VI.



PARTE PRÁCTICA DE BOTÁNICA
DEL CABALLERO
CARLOS LINNEO.
TOMO VI



PARTE PRÁCTICA DE BOTÁNICA
DEL CABALLERO
CÁRLOS LINNEO,

QUE COMPREHENDE
LAS CLASES, ÓRDENES, GÉNEROS, ESPECIES
Y VARIEDADES DE LAS PLANTAS,
CON SUS

Caracteres genéricos y específicos, Sinónimos mas selectos,
Nombres triviales, Lugares donde nacen,
y Propiedades.

TRADUCIDA DEL LATIN EN CASTELLANO É ILUSTRADA

POR

DON ANTONIO PALÁU Y VERDÉRA,
*Segundo Catedrático de Botánica por S. M., Academico
de las Reales Academias Médica Matritense y de Ciencias
y Artes de Barcelona, Sócio honorario de las Reales Socie-
dades Médica de Sevilla, de Agricultura de Paris,
é Individuo de merito de la Real Económica
de los Amigos del pais en esta Corte.*

TOMO VI.

DE ORDEN SUPERIOR.

MADRID: EN LA IMPRENTA REAL.

MDCCCLXXXVII.



PARTES TRACTOS DE BOTANICA
DEL CABALLERO
CARLOS LINNEO

QUE COMPRENDE
LAS CLASES, ORDENES, GENEROS, ESPECIES
Y VARIETADES DE LAS PLANTAS
CON SUS

DESCRIPCIONES Y CARACTERES, Y CON SUS
NOMBRES EN LAS LENGUAS
FRANCESA, ITALIANA, ALEMANA, Y
LATINA, Y CON SUS
USOS Y VIRTUDES

DE DON ANTONIO PARRA Y FERRER
CATEDRATICO DE BOTANICA EN LA UNIVERSIDAD DE MADRID
Y ASESOR DE SU MAJESTAD EL REY EN MATERIA DE BOTANICA
Y ASESOR DE SU MAJESTAD EL REY EN MATERIA DE BOTANICA
Y ASESOR DE SU MAJESTAD EL REY EN MATERIA DE BOTANICA
Y ASESOR DE SU MAJESTAD EL REY EN MATERIA DE BOTANICA



VOLUMEN VI

EL ORDEN DE LAS PLANTAS

DE LA CLASE DE LAS PLANTAS
DE LA CLASE DE LAS PLANTAS

CLASE XIX.

SYNGENESIA. DE LAS FLORES QUE TIENEN LAS ANTERAS
UNIDAS EN CILINDRO.

ORDEN I.

POLYGAMIA ÆQUALIS. DE LAS MISMAS FLORES CON LOS
FLOSCULOS HERMAFRODITOS EN EL
DISCO Y EN EL RADIO.

FLORES SEMIFLOSCULOSAS DE TOURNEFORT, ó SEA
CON TODAS LAS COROLILLAS A MANERA
DE CINTILLAS.

Generos.

Caracteres sobresalientes.

- 1086 GEROPOGON. RECEPTACULO entre setáceo
y pajoso : *caliz* sencillo :
semillas del disco con el
vilano plumoso; y las del
radio con cinco aristas.
- 1087 TRAGOPOGON. RECEPTACULO desnudo : *ca-*
liz sencillo : y *vilano* plu-
moso.
- 1088 SCORZONERA. RECEPTACULO desnudo : *vi-*
lano plumoso : *caliz* apiña-
do con escamas escariosas
ó membranosas por su mar-
gen.
- 1089 PICRIS. RECEPTACULO desnudo : *ca-*
liz calzado : *vilano* plumo-
so : y *semillas* asurcadas
transversalmente.
- 1090 SONCHUS. RECEPTACULO desnudo : *ca-*
liz apiñado , ventricosos : y
vilano peloso.
- 1091 LACTUCA. RECEPTACULO desnudo : *ca-*
liz apiñado , cilindrico y
membranoso por su mar-
gen :
- TOM. VI. A

- gen : *vilano* sencillo, con
estipite : y *semillas* lisas.
- 1092 CHONDRILLA. RECEPTACULO desnudo : *caliz* calzado : *vilano* sencillo, con estipite : *flosculos* en muchas series : y *semillas* con puntitas rígidas.
- 1093 PRENANTHES. RECEPTACULO desnudo : *caliz* calzado : *vilano* sencillo, casi sentado : y *flosculos* en una serie.
- 1094 LEONTODON. RECEPTACULO desnudo : *caliz* apiñado con escamas algo laxas : y *vilano* plumoso.
- 1095 HIERACIUM. RECEPTACULO desnudo : *caliz* apiñado, aovado : *vilano* sencillo y sentado.
- 1096 CREPIS. RECEPTACULO desnudo : *caliz* calzado con escamas que se caen facilmente : *vilano* peloso y con estipite.
- 1097 ANDRYALA. RECEPTACULO vellosa : *caliz* dividido en muchas partes, casi igual, redondeado : *vilano* sencillo y sentado.
- 1098 HYOSERIS. RECEPTACULO desnudo : *caliz* casi igual : *vilano* peloso y coronado con un caliz ó calzado.
- 1099 SERIOLA. RECEPTACULO pajoso : *caliz* sencillo : y *vilano* algo plumoso.
- 1100 HYPOCHÆERIS. RECEPTACULO pajoso : *caliz* casi apiñado : y *vilano* plumoso.
- 1101 LAPSANA. RECEPTACULO desnudo : *caliz* calzado con escamas y cada una de las interiores acanalada.
- 1102 CATANANCHE. RECEPTACULO pajoso : *caliz* api-

- apiñado: y *vilano* con aristas ó con cinco cerdas.
- 1103 CICHORIUM. RECEPTACULO algo pajoso : caliz calzado : *vilano* casi de cinco dientes y con pelos poco manifestos.
- 1104 SCOLYMUS. RECEPTACULO pajoso : caliz apiñado , espinoso : y *vilano* ninguno.

GENEROS CON FLORES EN CABEZUELA.

- 1105 ARCTIUM. CALIZ globoso , con escamas con anzuelos por su ápice y doblados ácia adentro.
- 1106 SERRATULA. CALIZ casi cilindrico , apiñado y sin espinas.
- 1107 CARDUUS. CALIZ aovado , apiñado con escamas espinosas : y *receptaculo* peloso.
- 1108 CNICUS. CALIZ aovado , apiñado con escamas ramosas y espinosas , y cercado de bracteas ; con las *corolillas* iguales.
- 1109 ONOPORDUM. RECEPTACULO en forma de panál : y las *escamas del caliz* terminadas en punta rígida.
- 1110 CYNARA. CALIZ ensanchado , apiñado con escamas carnosas , escotadas y con puntita.
- 1111 CARLINA. CALIZ radiado con las escamas de la margen , largas y de color.
- 1112 ATRACTYLIS. COROLA radiada ; y las *corolillas del radio* con cinco dientes.
- 1113 CARTHAMUS. CALIZ aovado , y apiñado con escamas en su remate , entre algo aovadas y foliosas.

4 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- 1114 BARNADESIA. *Suppl. p. 55.* COROLA radiada: *caliz* desnudo, apañado, y que punza: *vilano del radio* plumoso: *vilano del disco* setáceo y retrofracto ó como quebrado ácia atrás.

GENEROS CON LAS FLORES SIN SEMIFLOSCULOS Ó RADIOS;
Y CON EL DISCO SOLAMENTE.

- 1115 SPILANTHUS. RECEPTACULO pajoso (*desnudo. Syst. nat. tom. 2. p. 533.*): *vilano* con dos aristas y la una mas pequeña: y *caliz* casi igual.
- 1116 BIDENS. RECEPTACULO pajoso: *vilano* con aristas derechas y ásperas: *caliz* apañado: y la *corola* adornada, alguna vez, de uno ú otro semiflosculo que forma radio.
- 1117 CACALIA. RECEPTACULO desnudo: *vilano* peloso: *caliz* cilindrico, oblongo y algo calzado por su base.
- 1118 ETHULIA. RECEPTACULO desnudo: y *vilano* ninguno.
- 1119 EUPATORIUM. RECEPTACULO desnudo: *vilano* plumoso; *caliz* apañado y oblongo: *estilo* medio hendido en dos partes y largo.
- 1120 AGERATUM. RECEPTACULO desnudo: *vilano* con cinco aristas: *caliz* oblongo, casi igual: y *corolillas* hendidas en quatro partes.
- 1121 PTERONIA. RECEPTACULO con cerdas divididas en muchas partes: *vilano* casi plumoso: y *caliz* apañado.

STÆ.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 5

- 1122 STÆHELINA. RECEPTACULO con pajas muy cortas : *vilano* ramoso : y *anteras* con cola.
- 1123 CHRYSOCOMA. RECEPTACULO desnudo : *vilano* sencillo : *caliz* emisférico , apiñado : y *estilo* apenas mas largo que los flosculos.
- 1124 TARCHONANTHUS. RECEPTACULO vellosos : *vilano* peloso : *caliz* de una pieza , medio hendido en siete partes y cónico inverso.
- 1125 CALEA. RECEPTACULO pajoso : *vilano* peloso : y *caliz* apiñado.
- 1126 SANTOLINA. RECEPTACULO pajoso : *vilano* ninguno : *caliz* apiñado y emisférico.
- 1127 ATHANASIA. RECEPTACULO pajoso : *vilano* tambien pajoso , muy corto ; y *caliz* apiñado.

NOTA. El *Tanaceto* tiene á veces los caracteres de este Orden y pertenece al siguiente.

ORDEN II.

POLYGAMIA SUPERFLUA. DE LAS MISMAS FLORES QUE TIENEN LOS FLOSCULOS DEL DISCO HERMAFRODITOS, Y LOS DEL RADIO FEMENINOS.

GENEROS CON LAS FLORES SIN SEMIFLOSCULOS Ó RADIOS;
Y CON EL DISCO SOLAMENTE.

- 1128 TANACETUM. RECEPTACULO desnudo : *vilano* algo ribeteado : *caliz* apiñado , emisférico : *corollas* del ambito poco manifestas , hendidas en tres partes (las mas veces no se ha-

6 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

halla ninguna en el ambito y todos los flosculos son hermafroditos).

1129 ARTEMISIA. RECEPTACULO algo vellosa ó desnudito: *vilano* ninguno: *caliz* apinado con escamas redondeadas y arrimadas entre sí: y ninguna *corolilla* en el ambito.

1130 GNAPHALIUM. RECEPTACULO desnudo: *vilano* plumoso: *caliz* apinado con escamas de la margen redondeadas, escariosas y de color.

1131 CARPESIMUM. RECEPTACULO desnudo: *vilano* ninguno: *caliz* apinado, con las escamas exteriores redobladas.

1132 XERANTHEMUM. RECEPTACULO pajoso: *vilano* setáceo: *caliz* apinado y con su radio de color.

1133 BACCHARIS. RECEPTACULO desnudo: *vilano* peloso: *caliz* apinado, cilindrico: *flosculos* femeninos y hermafroditos entre mezclados.

1134 CONYZA. RECEPTACULO desnudo: *vilano* sencillo: *caliz* apinado, casi redondo: y las *corolillas del ambito* hendidas en tres partes.

1154 COTULA. RECEPTACULO casi desnudo: *vilano* ribeteado: *corolillas del centro* hendidas en quatro partes y casi sin alguna en el ambito.

1155 ANACYCLUS. RECEPTACULO pajoso: *vilano* escotado: y *semillas* membranosas por sus lados.

GENEROS CON SEMIFLOSCULOS CASI DE DOS LABIOS.

1144. PERCIDIUM. RECEPTACULO desnudo : *vilano* sencillo : y *corolillas* de dos labios.

GENEROS CON LAS FLORES RADIADAS.

- 1135 ERIGERON. RECEPTACULO desnudo : *vilano* peloso : *corolas* del *radio* lineares y muy *angostas*.
- 1136 TUSSILAGO. RECEPTACULO desnudo : *vilano* sencillo : *caliz* con *escamas* iguales , tan altas como el disco y algo *membranas*.
- 1137 SENEIO. RECEPTACULO desnudo : *vilano* sencillo : *caliz* *cilindrico* , *calzado* con *escamas* *esfaceladas* por su *ápice*.
- 1138 ASTER. RECEPTACULO desnudo : *vilano* sencillo : *corola* con *mas* de diez *radios* : y *caliz* *apiñado* con las *escamas* *inferiores* *extendidas*.
- 1139 SOLIDAGO. RECEPTACULO desnudo : *vilano* sencillo : *corolillas* del *radio* casi cinco : *caliz* con *escamas* *apiñadas* y *cerradas*.
- 1140 CINERARIA. RECEPTACULO desnudo : *vilano* sencillo : *caliz* *tambien* sencillo , de muchas *hojuelas* é *igual*.
- 1141 INULA. RECEPTACULO desnudo : *vilano* sencillo : y *anteras* que por su base *rematan* en dos *cerdas*.
- 1142 ARNICA. RECEPTACULO desnudo : *vilano*

8 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

lano sencillo : y las *corolillas del radio* con cinco filamentos sin anteras.

- 1143 DORONICUM. RECEPTACULO desnudo : *vilano* sencillo : *caliz* con las escamas en dos órdenes iguales , y mas largas que el disco : *semillas del radio* desnudas y destituidas de vilano.
- 1145 HELENIUM. RECEPTACULO desnudo , pajoso en el radio : *vilano* de cinco aristas : *caliz* sencilllo , dividido en muchas partes : y *corolillas del radio* medio hendidas en tres lacinias.
- 1146 BELLIS. RECEPTACULO desnudo , cónico : *vilano* ninguno : *caliz* emisférico , con escamas iguales : y *semillas* aovadas al revés.
- 1147 BELLIUM. RECEPTACULO desnudo : *semillas* cónicas , con una corona de ocho hojuelas pajosas : *vilano* con aristas : y *caliz* con hojuelas iguales.
- 1148 TAGETES. RECEPTACULO desnudo : *vilano* con cinco aristas derechas : *caliz* de una pieza con cinco dientes y tubuloso : cinco *flosculos* en el radio y persistentes.
- 1149 LEYSERA. RECEPTACULO algo pajoso : *vilano* pajoso ; y el de los *flosculos del disco* plumoso : con el *caliz* escarioso.
- 1150 ZINNIA. RECEPTACULO pajoso : *vilano* con dos aristas derechas : *caliz* entre aovado y cilindrico , apiñado : con cinco

co *flosculos* en el *radio*
persistentes y enteros.

- 1151 PECTIS. RECEPTACULO desnudo : *vilano* con *aristas* : *caliz* de cinco *hojuelas* , cilindrico ; y con cinco *flosculos* en el *radio*.
- 1152 CHRYSANTHEMUM. RECEPTACULO desnudo : *vilano* ninguno : *caliz* emisférico y apañado con *escamas* de la *margen* *membranosas*.
- 1153 MATRICARIA. RECEPTACULO desnudo : *vilano* ninguno ; *caliz* emisférico y apañado con *escamas* de la *margen* *sólidas* y algo *agudas*.
- 1156 ANTHEMIS. RECEPTACULO pajoso : *vilano* ninguno : *caliz* emisférico , y casi igual : con *mas* de cinco *flosculos* en el *radio*.
- 1157 ACHILLEA. RECEPTACULO pajoso : *vilano* ninguno : *caliz* aovado y apañado : con *quatro* *flosculos* , poco *mas* ó *menos* , en el *radio*.
- 1158 TRIDAX. RECEPTACULO pajoso : *vilano* sencillo y de muchos *radios* : *caliz* apañado y cilindrico ; con las *corolillas del ambito* divididas en tres *partes*.
- 1159 AMELLUS. RECEPTACULO pajoso : *vilano* sencillo : *caliz* apañado : con las *corolillas del radio* indivisas.
- 1160 ECLIPTICA. RECEPTACULO pajoso : *vilano* ninguno : y *corolillas del disco* hendidas en *quatro* *partes*.
- 1161 SIEGESBECKIA. . . . RECEPTACULO pajoso : *vilano* nin-

10 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

ninguno : *caliz exterior*
de cinco hojuelas : y el *radio*
demediado.

1162 VERBESINA. RECEPTACULO pajoso : *vilano*
con aristas : *caliz* en dos
órdenes de hojuelas : y con
cinco *semiflosculos* , poco
mas ó menos , en el radio.

1163 BUPHTHALMUM. . . RECEPTACULO pajoso : *vilano*
de un ribete desfigura-
do : *semillas* , señaladamen-
te las del radio , ribeteadas :
y el *stigma* de los floscu-
los hermafroditos indivi-
so.

1164 UNXIA. *Suppl. p. 56.* RECEPTACULO desnudo , pla-
no : *vilano* ninguno : *caliz*
de cinco hojuelas aovadas :
y con cinco *flosculos* en el
radio y en el disco.

1165 MUTISIA. *Suppl. p. 57.* RECEPTACULO desnudo :
vilano plumoso : *caliz* ci-
lindrico , apiñado : *coroli-*
llas del radio entre ovales
y oblongas : y *las del dis-*
co hendidas en tres partes.

ORDEN III.

POLYGAMIA FRUSTRANEA. DE LAS MISMAS FLORES QUE TIENEN
LOS FLOSCULOS HERMAFRODITOS
EN EL DISCO , Y NEUTROS Ó
ESTERILES EN EL RADIO.

1166 HELIANTHUS. RECEPTACULO pajoso y pla-
no : *vilano* de dos hojuelas :
y *caliz* apiñado con ho-
juelas algo desparramadas.

1167 RUDBECKIA. RECEPTACULO pajoso y có-
nico : *vilano* de un ribete
con quatro dientes : y *caliz*
con

con dos órdenes de escamas.

1168 COREOPSIS. RECEPTACULO pajoso : *vilano* de dos astitas : *caliz* derecho, de muchas hojuelas y ceñido por su base con otras hojuelas extendidas.

1169 OSMITES. RECEPTACULO pajoso : *vilano* desfigurado ó poco manifestado : *corola* con los radios en forma de cintilla : *caliz* apañado y escarioso.

1170 GORTERIA. RECEPTACULO desnudo : *vilano* lanudo : *corola* con los radios á manera de cintilla : y *caliz* apañado con escamas espinosas.

1171 ZOEGEA. RECEPTACULO setáceo : *vilano* tambien setáceo : *corola* con los radios á manera de cintilla : y *caliz* apañado.

1172 CENTAUREA. RECEPTACULO setáceo : *vilano* sencillo : *corola* con los radios en forma de embudo, mas largos é irregulares.

ORDEN IV.

POLYGAMIA NECESARIA. DE LAS MISMAS FLORES CON LOS FLOSCULOS DEL DISCO MASCULINOS, Y LOS DEL RADIO FEMENINOS.

1173 MILLERIA. RECEPTACULO desnudo : *vilano* ninguno : *caliz* de tres ventallas ú hojuelas : y el *radio* de la *corola* demediado.

BAL-

- 12 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.
- 1174 BALTIMORA. RECEPTACULO pajoso : *vilano* ninguno : *caliz* cilindrico, con muchas hojuelas : y el *radio de la corola* con cinco flosculos.
- 1175 SILPHIUM. RECEPTACULO pajoso : *vilano* con ribete de dos astitas : y *caliz* con hojuelas ó escamas desparramadas.
- 1176 POLYMNIA. RECEPTACULO pajoso : *vilano* ninguno : *caliz exterior* de quatro ó cinco hojuelas : el *interior* de diez , y cóncavas.
- 1177 CHRYSOGONUM. . . RECEPTACULO pajoso : *vilano* de una hojuela con tres dientes : *caliz* de cinco hojuelas : y *semillas* envueltas en un calicito de quatro hojuelas.
- 1178 MELAMPODIUM. . . RECEPTACULO pajoso y cónico : *vilano* de una hojuela en forma de vulva : y *caliz* de cinco hojuelas.
- 1179 CALENDULA. RECEPTACULO desnudo : *vilano* ninguno : *caliz* de muchas hojuelas iguales : y *semillas del disco* membranosas.
- 1180 ARCTOTIS. RECEPTACULO veloso ó pajoso : *vilano* con una corona de cinco hojuelas : y *caliz* apiñado con escamas escariosas por su ápice.
- 1181 OSTEOSPERMUM. . . RECEPTACULO desnudo : *vilano* ninguno : *caliz* de muchas hojuelas : *semillas* globosas , de color y oseas.
- 1182 OTHONNA. RECEPTACULO desnudo : *vilano* casi ninguno : *caliz* de una pieza , hendido en

mu-

muchas partes y casi cilíndrico.

- 1183 HIPPIA. RECEPTACULO desnudo : vilano ninguno : semillas con ribetes muy anchos y desnudas : caliz emisférico y algo apinado : y diez corolillas en el radio desfiguradas y casi hendidas en tres partes.
- 1184 ERIOCEPHALUS. . . RECEPTACULO algo vellososo : vilano ninguno : caliz de diez hojuelas , iguales : y cinco flosculos en el radio.
- 1185 FILAGO. RECEPTACULO desnudo : vilano ninguno : caliz apinado : y los flosculos femeninos colocados entre las escamas del caliz.
- 1183 MICROPUS. RECEPTACULO pajoso : vilano ninguno : caliz calzado : radio de la corola ninguno : y los flosculos femeninos envueltos con las escamas del caliz.

ORDEN V.

POLYGAMIA SEGREGATA. DE LAS MISMAS FLORES CON LOS FLOSCULOS QUE TIENEN SU CALIZ PROPIO.

- 1187 ELEPHANTOPUS. . . CALICITO de quatro flores : corolillas en forma de cintilla y hermafroditas : receptáculo desnudo : y vilano setáceo.
- 1188 OEDERA. CALICITO de muchas flores : corolillas tubulosas, hermafroditas , y una ú otra femenina en forma de cintilla :

14 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- lla : *receptaculo* pajoso : y vilano de muchas pajas.
- 1189 SPHÆRANTHUS. CALICITO de ocho flores : corollas tubulosas , hermafroditas , y otras femeninas desfiguradas : *receptaculo* escamoso : y vilano ninguno.
- 1190 ECHINOPS. CALICITOS de una flor : corollas tubulosas y hermafroditas : *receptaculo* setáceo : y vilano desfigurado.
- 1191 GUNDELIA. CALICITO ninguno : *receptaculo* parcial pajoso , con cinco flosculos tubulosos , masculinos y hermafroditos : y vilano ninguno.
- 1192 STOEBE. CALICITO con una flor : corolas tubulosas , hermafroditas : *receptaculo* desnudo : y vilano plumoso.
- 1193 JASIONE. CALIZ comun de diez hojuelas : corola de cinco petalos , regular : *capsula* baxo de la corola y de dos celdillas.
- 1194 JUNGIA. *Suppl. p. 58.* RECEPTACULO pajoso : *periantio* comun con tres flosculos , tubulosos y de dos labios: el labio exterior en forma de cintilla ; y el interior dividido en dos partes.

ORDEN VI.

MONOGAMIA. DE LAS FLORES SENCILLAS QUE TIENEN SUS
ANTERAS REUNIDAS EN FIGURA
DE CILINDRO.

- 1195 SERIPHIMUM. CALIZ apifñado: *corola* de un
petalo , regular : *semilla*
una , oblonga y puesta de-
baxo de la corola.
- 1196 STRUMPFIA. CALIZ de cinco dientes , en-
cima del germen : *corola*
de cinco petalos : y *baya*
con una semilla.
- 1197 CORYMBIUM. CALIZ de dos hojuelas , con
una flor, y prismático: *coro-*
la de un petalo , regular:
semilla una sola , lanuda
y puesta debaxo de la co-
rolilla.
- 1198 LOBELIA. CALIZ hendido en cinco par-
tes : *corola* de un petalo é
irregular : *capsula* debaxo
de la corola , y de dos ó
tres celdillas.
- 1199 VIOLA. CALIZ de cinco hojuelas : *co-*
rola de cinco petalos é ir-
regular, con un cuernecillo
por debaxo : *capsula* enci-
ma de la flor , de tres ven-
tallas y de una celdilla.
- 1200 IMPATIENS. CALIZ de dos hojuelas : *co-*
rola de cinco petalos é ir-
regular, con un nectario á
manera de cucurucho: *cap-*
sula encima de la flor y de
cinco ventallas.

CLASE XIX.

SYNGENESIA. DE LAS FLORES QUE TIENEN LAS ANTERAS
UNIDAS EN CILINDRO.

CARACTER NATURAL DEL FLOSCULO.

- CAL.** una *corona* de la semilla, sentada en el reñate del germen.
- COR.** de un *petalo*: *tubo* muy angosto, largo, sentado en el germen; y es ó
- Tubulosa* con el borde en forma de campana, hendido en cinco lacinias, entre dobladas y extendidas.
- Ligulada* ó sea á manera de cintilla, con el borde lineal, plano, vuelto ácia fuera, con tres, ó cinco dientes y truncado.
- Ninguna* ó que carece de borde.
- ESTAMB.** *Filamentos* cinco, capilares, cortísimos, é insertos en el cuello de la corola: con otras tantas *anteras* lineares, derechas, unidas por sus lados en forma de cilindro tubuloso, de cinco dientes; y las mas veces del largo del borde.
- PIST.** *Germen* oblongo, debaxo de la corolilla, y sobre el receptaculo comun: *estilo* filiforme, derecho, del largo de los estambres, y que horada el cilindro de las anteras: con el *estigma* partido en dos lacinias, entre revueltas y extendidas.
- PERIC.** ninguno que sea verdadero, aunque en algunos *flosculos* se halla una corteza correosa; como en el *Osteospermo*, y en la *Siumfia*.
- SEM.** una sola, oblonga, las mas veces de quatro lados, mas angosta por su base, y coronada con el
- Vilano* de muchos radios puestos en cerco, sencillos, radiados ó ramosos; y sentado, ó con estipite.
- Ó con su *Periantio propio* pequeño, las mas veces de cinco dientes y persistente.
- Ó sin *Corona*.

OBSERVACION.

El sexó se halla de diferentes modos en esta clase; y así los flosculos se distinguen en varias especies, y se llaman

Flosculo tubuloso. Hermafrodito si tiene estambres y pistilo.

————— *Masculino si posee estambres y no estigmas.*

————— *Femenino si se halla con pistilo y sin estambres.*

————— *Neutro si no goza de estambres, ni de estilo ó estigma.*

Flosculo ligulado. Hermafrodito, Masculino, Femenino y Neutro; los quales se conocen por lo mismo que arriba queda explicado.

CARACTER DE LA FLOR FLOSCULOSA.

La flor flosculosa es compuesta de muchos flosculos y tiene

El receptáculo comun de la frutificacion que abraza muchos flosculos sentados en el disco que es

Cóncavo, plano, convexó, piramidal ó globoso, cuya superficie se halla ó desnuda y desigual con puntitos ligeros ó superficiales: ó vellosa y cubierta de pelillos derechos: ó pajosa con pajillas ó escamas alesnadas, lineares, comprimidas, derechas, y que separan á los flosculos.

El caliz comun periantio que contiene el receptaculo y los flosculos; el qual concluida la florescencia se contrahe, y hallandose madura la semilla, se abre y dobla: y se divide

En sencillo quando no tiene mas que una serie de hojuelas.

En apiñado quando muchas hojuelas ó escamas exteriores gradualmente mas cortas están echadas sobre las interiores.

Y en calzado quando una serie de lacinias cñie la base solamente de las hojuelas interiores y mas grandes del caliz.

Las especies de flores compuestas son

1. Con flosculos tubulosos hermafroditos en el *disco*; y tubulosos hermafroditos en el *radio*.
2. Con flosculos tubulosos hermafroditos en el *disco*; y tubulosos femeninos en el *radio*.
3. Con flosculos tubulosos hermafroditos en el *disco*; y tubulosos hermafroditicos ó sin estigma en el *radio*.
4. Con flosculos tubulosos hermafroditos en el *disco*; y ligulados hermafroditos en el *radio*.
5. Con flosculos tubulosos hermafroditos en el *disco*; y ligulados femeninos en el *radio*.
6. Con flosculos tubulosos hermafroditos en el *disco*; y ligulados neutros en el *radio*.
7. Con flosculos tubulosos hermafroditos en el *disco*; y desnudos femeninos en el *radio*.
8. Con flosculos tubulosos masculinos en el *disco*; y desnudos femeninos en el *radio*.
9. Con flosculos ligulados hermafroditos en el *disco*; y ligulados hermafroditos en el *radio*.

De estas especies de flores compuestas tomó Linneo los órdenes siguientes de esta clase; denominandolos

Polygamia igual: sacado de las especies explicadas en los numeros anteceden-

tes.	9.	1.	4.
Polygámia superflua.	2.	5.	7.
Polygamia frutanea.	3.	6.	
Polygamia necesaria.		8.	

La Polygamia segregada contiene muchos cálices parciales ó propios de cada flosculo dentro del caliz comun.

La Monogamia es quando no tiene flosculos; y consta solamente de una flor sencilla.

Esta clase sería natural si en el ultimo orden no se ba-

CON LAS ANTERAS UNIDAS EN CILINDRO. 19

hallasen los generos Lobelia , Viola é Impaciente los quales debió colocar Linneo en el mismo orden , segun los principios de su sistema.

La esencia de la flor flosculosa consiste en las anteras unidas en cilindro , con una sola semilla debaxo de la flor ; aunque en el género Kuhnia se observan las anteras separadas.

El caliz comun falta en el Echînope , y se halla en la Escabiosa &c.

El receptáculo comun no se halla en la Milleria , y le tiene el Dipsaco: de todo lo qual se infiere, que la esencia del flosculo no puede consistir en el caliz , ni en el receptaculo : y que se pondrian malamente entre las flores compuestas la Escabiosa , el Dipsaco , la Gomphrena &c.

Exâminó Tournefort los generos muy naturales en las flores compuestas ; aunque careciese de las observaciones que han hecho los mas modernos : pero Vailant descubrió en las mismas flores mas notas que otro autor.

CLASE XIX.

SYNGENESIA. DE LAS FLORES QUE TIENEN LAS ANTERAS
UNIDAS EN CILINDRO.

ORDEN I.

POLYGAMIA ÆQUALIS. DE LAS MISMAS FLORES CON LOS
FLOSCULOS HERMAFRODITOS EN EL
DISCO Y EN EL RADIO.

1086. Género GEROPOGON.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* sencillo, de muchas hojuelas, entre lanceoladas y alesnadas, aquilladas, derechas y mas largas que la corola.

COR. *compuesta* casi apiñada y uniforme: con las *corolillas* hermafroditas; las *exteriores* tantas quantas son las hojuelas del caliz; y las *interiores* en menos número y mas cortas.

Propia de un petalo, ligulada, truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, cortísimos: con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. *Germen* oblongo: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con dos *stigmas* encorvados ácia atrás y filiformes.

PERIC. ninguno: el *caliz* oblongo, derecho y que se abre hace sus veces.

SEM. las del *radio* alesnadas y del largo del caliz: con el *vilano* de cinco aristas y extendidas.

Las del *disco* alesnadas y mas cortas: con el *vilano* plumoso.

RECEPT. con pajas setáceas.

OBS. *Se halla especie que tiene el caliz calzado.*

ESPECIES.

- Glabrum. 1. GEROPOGON *foliis glabris*. Jacq. hort. t. 33. Geropogon con hojas lampiñas.
Tragopogon Gramineo folio, glabrum, flore dilute incarnato. Rai. Suppl. p. 149. Tragopogon lampiño, con hoja como la de la Grama; y flor de color encarnado claro.
Tragopogon calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris, seminibus levibus, disci plumosis, radii setaceis. Hort. ups. 243. Tragopogon con los cálices mas largos que el radio de la corola; hojas enteras; semillas lisas, las del disco plumosas y las del radio setáceas.

Cast. Geropogon lampiño.

Habita en Italia. ☉

- Hirsutum. 2. GEROPOGON *foliis pilosis*. Geropogon con hojas pelosas.
Tragopogon Gramineis foliis, hirsutis. C. B. P. 275. Tragopogon de hojas como las de la Grama y con pelo áspero.
Tragopogon Gramineo folio, suave rubente flore. Col. ecphr. 1. p. 232. t. 231. Tragopogon con hoja como la de la Grama; y flor de color roxo delicado.

Cast. Geropogon con pelo áspero.

Habita en Italia. ☉

- Calyculatum. 3. GEROPOGON *calycibus calyculatis*. Jacq. hort. t. 106. Geropogon con los cálices calzados.

Cast. Geropogon calzado.

Habita.....

Tiene la raiz perenne: muchos tallos ramosos: las flores terminales é inclinadas antes de abrirse: el caliz calzado: y numerosos flosculos.

82 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

1087. Género TRAGOPOGON. * Vaill. A. G. 1721.

44. 13. 21. 14. Tourn. t. 270. Trogopogonoides.

Vaill. A. G. 1721. 43. 15. 14.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun sencillo , de ocho hojuelas , lanceoladas , iguales , alternadamente interiores y todas unidas en su base.

COR. compuesta apifñada y uniforme : con muchas corolillas hermafroditas ; y las exteriores poco mas largas.

Propia de un petalo , ligulada , truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. Filamentos cinco , capilares , cortísimos : con la antera cilíndrica y tubulosa.

PIST. Germen oblongo : estilo filiforme , del largo de los estambres : con dos estigmas revueltos.

PERIC. ninguno ; pero hace sus veces el caliz cerrado , puntiagudo , del largo de las semillas y algo ventricososo.

SEM. oblongas , adelgazadas en ambas partes , anguladas y ásperas : con el estipite alesnado , largo ; y su vilano plumoso , plano , y de treinta y dos radios , poco mas ó menos.

RECEPT. desnudo , plano y áspero.

OBS. El Tragopogon de Vaill. tiene las semillas rectas : y el caliz mas largo que la corola.

El Tragopogonoide del mismo autor posee las semillas encorvadas : y el caliz mas corto que la corola.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

TRAGOPOGON. p. 477.

La flor es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos , sentados en un embrión y comprendidos en el caliz hendido en muchas partes , y no escamoso (sencillo). El embrión pasa á semilla envuelta con una membrana , adornada de un vilano y prendida en el receptáculo.

ESPECIES QUE ARROJAN TALLOS.

Pra-
tense. 1. TRAGOPOGON *caly-* X Tragopogon con los cáli-
cibus corollæ radium æquan- X ces iguales al radio de la co-
tibus, foliis integris, stric- X rola; hojas enteras, apreta-
tis. Mat. med. 204. Knorr. X das y rígidas.
del. 2. t. T. 3.

Tragopogon foliis Gra- X Tragopogon con hojas co-
mineis, carinatis, ample- X mo las de la Grama, aqui-
xicaulibus, caudatis, sub- X lladas, amplexicaules, de-
crispis, calyce flori æquali. X caídas como una cola, algo
Hall. helv. n. 8. X rizadas; y caliz igual á la
flor.

Tragopogon pratense, lu- X Tragopogon pratense, ma-
teum, majus. C. B. P. 274. X yor, con la flor amarilla.
Tourn. p. 477.

Tragopogon. Fuchs. hist. X Tragopogon.
827. Dod. pempt. 256. X

Cast. Tragopogon pratense. vulgo: Barba cabruna.

Habita en los prados abrigados de Europa: en la Real
Casa de Campo, Castilla la vieja, Aragon, Cataluña
y en otras partes de España. ♂

La corola algunas veces se halla mas corta que el caliz.

PROPIED. Es lactescente y algo amarga: se usa en la tos
y en la estranguria.

Orien-
tale. 2. TRAGOPOGON *caly-* X Tragopogon con los cáli-
cibus corollæ radio brevioribus, X ces mas cortos que el radio
foliis integris sub- X de la corola; hojas enteras
undulatis. Hort. ups. 243. X y algo ondeadas.

Tragopogon Orientale, X Tragopogon Oriental, con
angustifolium, flore maxi- X hoja angosta; flor muy gran-
mo, luteo. Tourn. cor. 36. X de y amarilla.

Barba hirci. Cam. epit. X Barba cabruna.
312. fig. X

Cast. Tragopogon Oriental.

Habita en Oriente y en Astracan. Gmel. it. 2. p. 198. ♂

Posee la flor mas grande que la precedente: el caliz que
pa-

24 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

parece casi rompido por donde se dobla : el *radio de la corola* amarillo por debaxo : y las *anteras* amarillas.

Porri-
folium.

3. TRAGOPOGON *calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis*, Hort. ups. 234. Tragopogon con los cálices mas largos que el radio de la corola ; hojas enteras, apretadas y rígidas ; y pedunculos incrassados por arriba.

Tragopogon foliis Gramineis, amplexicaulibus ; calyce florem superante. Hall. helv. n. 9. Tragopogon con hojas como las de la Grama, que abrazan el tallo ; y caliz mas alto que la flor.

Tragopogon purpureo-cæruleum, Porri folio, quod Artifi vulgo. C. B. P. 274. Moris. hist. 3. p. 8. sect. 7. t. 9. f. 5. Tourn. p. 477. Tragopogon llamado vulgarmente Artifi ; con hoja como la del Puerro, y flor de color entre purpúreo y cerúleo.

Tragopogon seu Barba hirci, alter. Dalech. hist. 1079. Otro Tragopogon ó Barba cabruna.

Barba hirci altera. Cam. epit. 313. Otra Barba cabruna.

α *Tragopogon folio oblongo, sinuato*. C. B. P. 274. Prodr. 329. Tourn. p. 477. Tragopogon con hoja oblonga y sinuosa. α

Cast. Tragopogon con hoja de Puerro. *vulgo* : Salsifi. *Habita* en Suiza : en Castilla la vieja, Asturias y otras partes de España. ♂

Croci-
folium.

4. TRAGOPOGON *calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris, radicalibus pedunculisque basi villosis*. Gou. illustr. 52. Tragopogon con los cálices mas largos que el radio de la corola ; hojas enteras, las radicales y los pedunculos vellosos por su base.

Tragopogon purpureo-cæruleum, Crocifolium. C. B. P. 375. Tourn. p. 477. Tragopogon con hoja como la del Azafran ; y flor entre purpúrea y cerúlea.

Tragopogon Croci folio, *Tragopogon montano*, con
montanum, *flore nigro-pur-* hoja como la del Azafran; y
pureo. Col. ecphr. 1. p. 229. flor entre negra y purpúrea.
 t. 230.

Cast. *Tragopogon* con hoja de Azafran.

Habita en Italia y Mompeller; en Aragon, Cataluña y
 otras partes de España. ♂

Es semejante al precedente; pero mas baxo y mas tierno.
 Echa los cálices de cinco hojuelas: las *hojas* con vello
 por su base y que creciendo le pierden: la *flor* violada,
 algo amarilla en el disco y compuesta solamente de dos
 series de flosculos.

Villo-
 sum. 5. TRAGOPOGON *caly-* *Tragopogon* con los cáli-
cibus corollæ radio sesqui- ces vez y media mas largos
longioribus, *caule foliisque* que el radio de la corola;
villosis. Pall. it. 2. p. 332. tallo y hojas vellosas.

Tragopogon caule tomen- *Tragopogon* con el tallo
tosus. Hall. goett. 418. tomentoso.

Cast. *Tragopogon* vellosos.

Habita en España y Siberia. ♂

Su magnitud es como la del *Tragopogon con hoja de Puer-*
ro; pero toda la *planta* está llena de pelillos blancos;
 y las *hojas y tallos* con mas abundancia por debaxo.
 Arroja los *pedunculos* cilindricos: el *caliz* de nueve ho-
 juelas, casi vez y media mas largas que la corola y no
 apiñadas: la *corola* con diez y ocho radios de color ama-
 rillo palido: y las *anteras* algo obscuras. Echa de todas
 las axilas de las hojas algunas *ramas* floridas que pa-
 san á corimbosas; y la *flor* algo inclinada quando es-
 tá abierta.

Dale-
 cham-
 pii. 6. TRAGOPOGON *caly-* *Tragopogon* con los cáli-
cibus monophyllis corollæ ces de una pieza, mas cor-
brevioribus inermibus, *fo-* tos que la corola, inermes;
liis runcinatis. Hort. cliff. y hojas runcinadas.
 282.

Hieracium asperum, *flore* *Hieracio áspero*, con la
magno dentis Leonis. C. B. flor grande y parecida á la
 P. 127. del diente de Leon.

Hie-

26 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Hieracium magnum. Da-lech. hist. 569. Tourn. p. 470. Hieracio con la flor grande.

Hieracium sulphureum, incisiss foliis, montanum. Hieracio montano, con la flor de color de azufre; y Barr. rar. 1043. t. 209. hojas cortadas.

Hedypnois Monspessulana. Bauh. hist. 2. p. 1036. Hedypnoe de Mompeller.

Cast. Tragopogon de Dalechâmpio.

Habita en la Francia Narbonense: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña, Castilla la vieja y otras partes de España. 2f

Tiene el tallo corto: las hojas con tomento áspero, y sin dientecitos: la corola purpúrea por debaxo, con los flosculos amarillos en su ápice, ó con sus dientes de color que tira á purpúreo.

Las hojas de mas arriba se hallan comunmente enterisimas: los pedunculos increasados por arriba; y varía con todas las hojas lanceoladas. Gov. hort.

Picroides.

7. TRAGOPOGON *calycibus monophyllis corollae brevioribus aculeatis, foliis runcinatis denticulatis*. Hort. Tragopogon con los cállices de una pieza, mas cortos que la corola, con agujones; hojas runcinadas y con dientecitos.

Sonchus asper, lacinia-tus, Creticus. C. B. P. 124. Cerraja de Creta, áspera y laciniada.

Hieracium majus, folio Sonchi, semine incurvo. C. B. P. 127. Hieracio mayor, con hoja como la de la Cerraja; y semilla encorvada.

Chondrilla Cretica nomine missa, semine crispo. Bauh. hist. 2. p. 1022. Planta de Creta, remitida baxo el nombre de Chôndrilla, con la semilla rizada.

Cast. Tragopogon como Picris.

Habita en Creta y Mompeller: en Aragon, Cataluña y y otras partes de España. ☉

Es planta áspera con pelos rígidos; y sube á la altura de medio pie. Tiene los pedunculos mas gruesos por arriba; y los nervios de las hojas algunas veces con agujones. Gov. hort. 405.

TRA-

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 27

Aspe-
tum. 8. TRAGOPOGON *calycibus corolla brevioribus hispidis, foliis integris, caulinis oblongis.* Gov. hort. 405. illustr. 52. Tragopogon con los cálices erizados y mas cortos que la corola; hojas enteras; y las del tallo oblongas.

Sonchus asper, subrotundo folio, major & minor. C. B. P. 124. Prodr. 60. Cerraja mayor y menor, áspera, y con hoja casi redonda.

Sonchus asper, non lacinatus, Diprasi vel Lactuæ folio. Tourn. p. 474. Cerraja áspera, con hoja como la de la Cardencha ó de Lechuga, y sin lacinias.

Cast. Tragopogon áspero.

Habita en Mompeiler.

ESPECIES SIN TALLO; PERO CON ESCAPOS RADICALES.

Dan-
delion. 9. TRAGOPOGON *foliis ensiformibus integris levibus, scapis radicalibus.* Tragopogon con hojas en forma de espada, enteras, lisas; y escapos radicales.

Leontodon foliis ensiformibus, integris, calyce erecto simplici. Gron. virg. 114. Leontodon con hojas en forma de espada, enteras; caliz derecho y sencillo.

Cast. Tragopogon Dandelion.

Habita en la Virginia.

Tiene las hojas en forma de espada, largas, lampiñas y enterisimas: los escapos de una flor, sin hojuelas, vellosos por su extremo: y el vilano peloso.

Lana-
tum. 10. TRAGOPOGON *foliis ensiformibus undatis villosis, scapis radicalibus.* Tragopogon con hojas en forma de espada, ondeadas, vellosas; y escapos radicales.

Leontodon foliis ensiformibus integris hirsutis, calyce erecto simplici. Amœn. acad. 4. p. 287. Leontodon de hojas en forma de espada, enteras, con pelo áspero; caliz derecho y sencillo.

Cast. Tragopogon lanudo.

Habita en Oriente y en Palestina.

Los escapos tienen en medio una hojuela poco manifesta y llevan una sola flor. La figura que trae Rauw. it.

28 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

217. mas bien se parece á esta planta , que al *Erigeron tuberoso*.

Virgini-
nicum

11. TRAGOPOGON fo-
liis radicalibus lyratis ro-
tundatis, caulinis indivisis.
Gron. virg. 113.

Tragopogon con las hojas
radicales en forma de lira,
redondeadas ; y las del tallo
indivisas.

Tragopogon foliis lanceo-
latis, sessilibus, amplexi-
caulibus, dentatis, caule ra-
moso. Gron. virg. 1. p. 91.

Tragopogon con hojas
lanceoladas, sin peciolo, am-
plexicaules, dentadas ; y
tallo ramoso.

Cast. Tragopogon de Virginia.

Habita en la Virginia y en el Canadá. *Kalm*.

Echa muchas *hojas* radicales, lampiñas, en forma de lira, con sus lóbulos redondeados : los *tallos* casi desnudos, derechos, apretados y rígidos, con una ú otra hoja lanceolada, entera y que le abraza: pocas *ramas*, terminadas en tres pedunculos, en cuyo origen se hallan dos hojas lanceoladas, opuestas y la una de ellas mas pequeña : el *caliz* dividido hasta su base en doce hojuelas, iguales y mas cortas que la corola : y las *flores* de color amarillo subido. Su *traza* es como la de la *Arnica* *Gerberia* : tiene el *vilano* sencillo, y sin estipite : su *es-
tatura* como la del *Hyoseris* : el *caliz* semejante al del *Tragopogon* : y las *semillas* parecidas á las del *Hieracio*.

1088. Género SCORZONERA. * *Tourn. t. 169.*

Vaill. A. G. 1721. 53. 13. 16. 14. Scorzoneroides.

Vaill. A. G. 1721. figuris iisdem.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun apiñado, largo, casi cilindrico, con quince escamas ú hojuelas, poco mas ó menos, y escariosas por su margen.

COR. compuesta apiñada, uniforme ; con muchas corolillas hermafroditas ; y las exteriores algo mas largas.

Pro-

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 29

Propia de un petalo , ligulada , linear , truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. *Filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* oblongo : *estilo* filiforme , del largo de los estambres : con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno : el *caliz* entre aovado y oblongo , y cerrado hace sus veces.

SEM. oblongas , cilíndricas , estriadas y la mitad mas cortas que el caliz : con su *vilano* plumoso.

RECEPT. desnudo.

OBS. La Escorzonera de Vaill. *tiene las hojas enteras.*

La Escorzoneroide del mismo autor *posee las hojas divididas y laciniadas.*

T la Escorzonera como Picris echa el vilano peloso. R.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

SCORZONERA. p. 476.

La flor es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos sentados en un embrión , comprendidos en el caliz oblongo y escamoso. El embrión pasa á semilla cubierta de una corteza y adornada de vilano.

ESPECIES.

To-
mento-
sa. 1. SCORZONERA *foliis* X Escorzonera con hojas ao-
ovatis nervosis tomentosis X vadas , nerviosas , tomento-
integerrimis sessilibus. Pall. X sas , enterisimas y sentadas.
it. 3. p. 682.

Scorzonera Orientalis , X Escorzonera Oriental, con
latifolia , nervosa , candi- X hojas anchas , nerviosas , can-
dissima & *tomentosa.* Tourn. X didisimas y tomentosas.
cor. 36. X

Cast. Escorzonera tomentosa.

Habita en Oriente. Burman.

Arroja el tallo recto , sencillo y tomentoso : las *hojas* alternas , sentadas , algo agudas y que abrazan casi la mitad del tallo : las *ramas* con una ó dos flores , casi mas largas que la hoja , axilares y solitarias ; con una ú otra *bractea* lanceolada.

SCOR-

30 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Hu- 2. SCORZONERA caule Escorzonera con el tallo
milis. subnudo unifloro, foliis la- casi desnudo y de una flor;
10-lanceolatis nervosis pla- hojas entre anchas y lanceo-
nis. Hort. cliff. 382. Jacq. ladas, nerviosas y planas.
austr. t. 36.

Scorzonera caule nudo, Escorzonera de tallo des-
unifloro, foliis lanceolatis. nudo, con una flor; y hojas
Hall. helv. n. 10. lanceoladas.

Scorzonera humilis, la- Escorzonera baxa, con
tifolia, nervosa. C. B. P. hojas anchas y nerviosas.
275. Tourn. p. 476.

Scorzonera humilis, lati- Escorzonera baxa, de Pan-
folia, Pannonica. Clus. hist. nonia, con hojas anchas.
2. p. 138.

Cast. Escorzonera baxa.

Habita en los prados abrigados de la Europa septentrio-
nal. 26

Hispa- 3. SCORZONERA caule Escorzonera con el tallo
nica. ramoso, foliis amplexicaui- ramoso; hojas amplexicaui-
libus integris serrulatis. les, enteras y aserraditas.
Hort. cliff. 383. Blackw. t.
406.

Scorzonera latifolia, si- Escorzonera de hoja an-
nuata. C. B. P. 275. Tourn. cha y sinuosa.
p. 476.

Scorzonera major, His- Escorzonera mayor, de
panica I. Clus. hist. 2. p. España, primera.
137.

Cast. Escorzonera de España.

Habita en la Siberia: en^o Cataluña y Aragon: en la Al-
carria, Mancha, Andalucía y otras partes de Espa-
ña. 26

PROPIED. Toda la planta se tiene por muy util en las in-
flamaciones: promueve el sudor y la orina. Algunos
creen que resiste al veneno de la vivora, llamada en
Cataluña Escorzó, y que de aqui le vino el nombre.

- Grami-
nifolia. 4. *SCORZONERA foliis lineariformibus integris carinatis*. Jacq. obs. 4. p. 13. t. 100. Escorzonera con hojas entre lineares y en forma de espada, enteras y aquilladas.
- Scorzonera Lusitanica*, Gramineo folio, flore pallide luteo. Tourn. p. 477. Buxb. cent. 2. p. 26. t. 21. Escorzonera de Portugal, con hoja como la de la Grama; y flor de color amarillo palido.
- Scorzonera caule ramoso, foliis linearibus, acuminate, carinatis, calycibus acutis*. Gmel. sib. 2. p. 4. Escorzonera con el tallo ramoso; hojas lineares, puntiagudas, aquilladas; y cálices agudos.
- Cast. Escorzonera con hoja de Grama.
Habita en Portugal y Siberia.

- Pur-
purea. 5. *SCORZONERA foliis linearisubulatis integris canaliculato-triquetris, pedunculis cylindricis*. Jacq. austr. t. 35. scop. carn. ed. 2. n. 949. t. 46. Escorzonera con hojas entre lineares y alesnadas, enteras, entre acanaladas y de tres caras; y pedunculos cilindricos.
- Scorzonera caule ramoso, tereti, foliis linearibus, acuminate, calycibus obtusiusculis*. Gmel. sib. 2. p. 7. t. 2. Escorzonera con el tallo ramoso, rollizo; hojas lineares, puntiagudas; y cálices algo obtusos.
- Scorzonera angustifolia, subcærulea*. C. B. P. 275. Tourn. p. 476. Escorzonera con hoja angosta; y flor casi cerúlea.
- Scorzonera sylvestris, foliis angustis, flore cæruleo*. Menz. pug. t. 1. f. 1. Escorzonera silvestre, con hojas angostas; y flor cerúlea.
- Scorzonera angustifolia, elatior, Pannonica IV*. Clus. hist. 2. p. 139. Escorzonera quarta, de Pannonia, mas levantada y con hoja angosta.

Cast. Escorzonera purpúrea.
Habita en el Marquesado de Brandemburg: en Austria y Siberia.
Tiene la corola entre cerúlea y de color de carne; con las anteras blancas. *Mygind.*

An- gusti- folia. 6. SCORZONERA *foliis subulatis integris, pedunculo incrassato, caule basi villosa*. Jacq. vind. 140. Gou. hort. 406. Escorzonera con hojas alesnadas y enteras; pedunculos increasados; y tallo vellioso por su base.

Scorzonera caule simplici, uniflora, foliis linearilanceolatis. Gmel. sib. 2. p. 2. t. 1. Escorzonera con el tallo sencillo, de una flor; y hojas entre lineares y lanceoladas.

Scorzonera caule nudo, uniflora, foliis linearibus. Hall. helv. n. 11. Escorzonera de tallo desnudo, con una flor; y hojas lineares.

Scorzonera angustifolia I. C. B. P. p. 275. Tourn. p. 476. Escorzonera primera, de hoja angosta.

Scorzonera humilis, angustifolia, Pannonica III. Clus. hist. 2. p. 137. 138. Escorzonera tercera, de Pannonia, baxa y con hoja angosta.

Cast. Escorzonera de hoja angosta.

Habita en collados pedregosos de Mompeller y Austria: en Sierra-morena, Aragon, Valencia, Cataluña y en otras partes de España.

Produce el tallo del largo de un xeme, poco mas ó menos, ramoso por su base y vellioso: las hojas amontonadas, lineares, alesnadas, y casi del largo del tallo: los pedunculos terminales y ácia la flor mas crasos que el mismo tallo: la flor grande: la corola amarilla, por debaxo purpúrea y de la longitud del caliz.

Hir- sutu. 7. SCORZONERA *foliis linearibus cauleque uniflora hirsutis*. Escorzonera de hojas lineares, con pelo áspero; tallo de una flor y tambien con pelo áspero.

Tragopogon calycibus corola brevioribus, foliis integris, strictis, ciliatis, caule hirto, pedunculis superne incrassatis. Gerard. prov. 257. Tragopogon con los cálices mas cortos que la corola; hojas enteras, apretadas y rígidas, pestafiosas; tallo con pelo áspero; y pedunculos increasados por arriba.

Tragopogon hirsutum. C. B. P. 274. Tourn. p. 477. Tragopogon con pelo áspero.

Tragopogon alter, *luteus*. Col. ecphr. 1. p. 234. t. 233. Otro Tragopogon, con la flor amarilla.

Cast. Escorzonera con pelo áspero.

Habita en Pulla.

Tiene las *hojas* acanaladas: las *semillas* blancas y con pelusa.

Resedifolia 8. SCORZONERA *foliis obtuse dentatis, caule divaricato, calycum apicibus tomentosis*. Mill. dict. n. 7. Escorzonera de hojas con dientes obtusos; tallo desparramado; y ápices de los cálices tomentosos.

Scorzonera caule diffuso lanato, foliis hastato-pinnatifidis, caulinis linearibus integerrimis, calycibus tomentosis. Gov. illustr. 46. R. Escorzonera con el tallo difuso, lanudo; hojas entre de figura de alabarda y hendidas al través; las del tallo lineares, enterisimas; y cálices tomentosos.

Scorzonera laciniatis foliis, supina. Barr. rar. 1050. t. 800. Escorzonera echada, con hojas laciniadas.

Chondrilla Sicula, Tragopogonoides, maritima. Bocc. sic. 13. t. 7. f. A. Chôndrila de Sicilia, maritima, parecida al Tragopogon.

Cast. Escorzonera con hoja de Reseda.

Habita en Mompeller; y en los mismos lugares de España que la *Escorzonera de hoja ancha*. 24

Posee el tallo desparramado: las *hojas* como las de la *Reseda*, ó del *Coronopo*, y con dientes obtusos.

Laciniata. 9. SCORZONERA *foliis linearibus dentatis acutis, caule erecto, calycum squamis patulo-mucronatis*. Jacq. austr. t. 356. Escorzonera de hojas lineares con dientes, agudas; tallo derecho; y escamas ú hojuelas de los cálices terminadas en una punta rígida extendida.

34 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Scorzonera caule folioso, folioso, ramoso; hojas muy
ramoso, foliis angustissi- angostas, las de abaxo hen-
mis, imis rariter semipin- didas al través con sus laci-
natis, superioribus linea- nias claras ó distantes, y las
ribus lanceolatis. Hall. hely. superiores lineares y lanceo-
 n. 12. ladas.

Scorzonera foliis lacinia- Escorzonera con hojas la-
tis. Tourn. p. 477. ciniadas.

Tragopogon laciniatum, Tragopogon con hojas la-
luteum. C. B. P. 274. ciniadas, y flor amarilla.

Cast. Escorzonera laciniada. *vulgo:* Barbaja. Teta de Va-
 ca.

Habita en Alemania y Francia: en los circuitos de Ma-
 drid, en Aragon, Cataluña y en otras partes de Es-
 paña. ☉

Tiene el tallo derecho: y las *escamas del caliz* con una
 punta baxo de su ápice.

Orien- 10. SCORZONERA fo- Escorzonera de hojas si-
 talis. *liis sinuatis denticulatis* nuosas, con dientecitos,
acutis, caulibus subuniflo- agudas; y tallos con una ó
ris. dos flores.

Cast. Escorzonera Oriental.

Habita en Oriente. *Hasselquist.*

Echa las *hojas* profundamente dentadas, casi como las
 del *Leontodon*, lampiñas y con dientecitos por su mar-
 gen: los *tallos* cortos, foliosos, y con una ó dos flores:
 el *caliz* de escamas apiñadas, y las inferiores con mem-
 branas anchas por su margen: la *corola* de color ama-
 rillo y de la magnitud de la de la *Escorzonera baxa*.

Tingi- 11. SCORZONERA fo- Escorzonera con todas las
 tana. *liis omnibus runcinatis am-* hojas runcinadas y amplexi-
plexicaulibus. Forskøehl. caules.
ægypt. cent. 5. p. 143.

Sonchus Tingitanus, Pa- Cerraja de Tanger, con
paveris folio. Tourn. p. 475. hoja como la de la Adormi-
Rai. Suppl. p. 137. dera.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 35

Chondrilla Tingitana, \times Chôndrila de Tanger, con
floribus luteis, \times flores amarillas, y hoja co-
hortensis folio. Herm. lugdb. \times mo la de la Adormidera hor-
 657. t. 659. \times tense.

Cast. Escorzonera de Tanger.

Habita en Tanger. \odot

Tiene el vilano sentado y peloso; pero el caliz escarioso por su margen.

Picro-
 ides. 12. SCORZONERA fo- \times Escorzonera con las hojas
liis superioribus amplexi- \times superiores amplexicaules,
caulibus integerrimis, infe- \times enterisimas, las inferiores
rioribus runcinatis, pedun- \times runcinadas; y pedunculos
culis squamosis. Gou. hort. \times con escamas.
 406.

Crepis foliis radicalibus \times Crepis de hojas radicales
ovato-oblongis denticulatis, \times entre aovadas y oblongas,
caulinis lanceolatis ample- \times con dientecitos; las del ta-
xicaulibus, pedunculis uni- \times llo lanceoladas, amplexicau-
floris squamosis. Roy. lugdb. \times les; pedunculos de una flor
 127. \times y escamosos.

Sonchus subrotundo folio, \times Cerraja de nuestro pais
nostras. Pluk. phyt. t. 61. \times (Inglaterra), con hoja casi
 f. 5. \times redonda.

Sonchus laevis, angusti- \times Cerraja lisa, y de hoja
folius. C. B. P. 124. Tourn. \times angosta.
 P. 475.

Crepis Dalechampii. Da- \times Crepis de Dalechâmpio.
 lech. hist. 562. \times

Cast. Escorzonera como Picris.

Habita en Mompeller. \odot

Tiene las semillas encorvadas y recortaditas: el vilano sencillo y sin estipite.

1089. Género PICRIS. * Helminthotheca. Vaill.

A. G. 1721. 47. 25. 26.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun duplicado: el *exterior* muy grande, de cinco hojuelas de figura de corazon, planas, laxas y arimadas entre sí: el *interior* apañado y aovado.

COR. compuesta apañada y uniforme; con numerosas *corollas* hermafroditas.

Propia de un petalo, ligulada, linear, truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. Germen casi aovado: *estilo* del largo de los estambres: con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. ventricosas, asurcadas transversalmente y obtusas: con el *vilano* plumoso.

RECEPT. desnudo.

ESPECIES.

Echio-
ides.

1. PICRIS *perianthiis* X Picris con los periantios
exterioribus pentaphyllis X exteriores de cinco hojuelas,
interiore aristato majoribus X y mayores que el interior
De Neck. Gallob. p. 323. X con aristas.

Picris calycibus simplicibus perianthio maximo X Picris de cálices sencillos
obvallatis. Hort. cliff. 387. X y cercados con un periantio
muy grande.

Hieracium Echioides, capitulis Cardui Benedicti. C. X Hieracio como Echio, con
B. P. 128. Tourn. p. 470. X cabezuelas semejantes á las
del Cardo Santo.

Buglossum Echioides, luteum, X Buglosa como el Echio,
Hieracio cognatum. X con flor amarilla, y semejan-
te al Hieracio.

Hieracium capitulis Cardui Benedicti. Herm. par. X Hieracio con cabezuelas
185. t. 185. X como las del Cardo San-
to.

Cast.

Cast. Picris como Echîo.

Habita en Inglaterra , Francia é Italia : en el circuito de Madrid , en la Alcarria , Aragon , Cataluña y otras muchas partes de España. ☉

Produce las *hojas* indivisas y amplexicaules : el *caliz exterior* mas grande que el interior , de cinco hojuelas casi de figura de corazon y espinosas : el *interior* de ocho ángulos , con otras tantas hojuelas aquilladas , y una arista debaxo de su ápice , sobre de las quales se hallan echadas otras cinco menudas y lisas.

Hieracio-
ides. 2. PICRIS *perianthiis laxis, foliis integris, pedunculis squamatis in calycem.* X Picris con los periantios laxos ; hojas enteras ; y pedunculos escamosos hasta su caliz.
Gmel. sib. 2. p. 39.

Picris aspera, foliis oblongis dentatis, superioribus amplexicaulibus. Hall. helv. X Picris áspera , con hojas oblongas , dentadas , y las superiores que abrazan el tallo.
n. 24.

Hieracium asperum, majori flore, in limitibus agrorum. Bauh. hist. 2. p. 1029. X Hieracio áspero , que nace en los lindes de los campos, con la flor mas grande.
Tourn. p. 469.

Cichorium montanum, angustifolium, hirsutius asperum. C. B. P. 126. X Achicoria montana , de hoja angosta , y con pelo áspero.

Cast. Picris como Hieracio.

Habita en Alemania é Inglaterra : en los circuitos de Madrid , en la Alcarria , Castilla la vieja , Cataluña y otras partes de España. 24

Tiene las *hojas* lanceoladas : los *pedunculos* salpicados de escamas alesnadas hasta su caliz , tanto que le forman apinado : y el *vilano* casi plumoso.

Posee las *hojas* de arriba unas veces aovadas y enterisimas ; otras sinuosas ó entre pinnadas y hendidas al través. Gov.

Asplenio-
ides. 3. PICRIS *foliis pinnatifidis, lobis alternis rotundatis.* † X Picris de hojas hendidas al través , con sus lóbulos alternos y redondeados.
Hel-

38 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Helminthotheca hispido- ~~X~~ *Helminthotheca* llena de
sa, asplenoides, succo sul- ~~X~~ cerdas, semejante á la Dora-
phureo. Vaill. act. 1721. p. ~~X~~ dilla, con su xugo de color
 206. ~~X~~ de azufre.

Cast. Picris como Doradilla.

Habita en Egipto.

1090. Género SONCHUS. * *Tourn. r.* 268.

Vaill. A. G. 1721. 22. *Crepis. Vaill.*

A. G. 1721. 55. 22.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun apiñado, ventricoso, con muchas escamas lineares y desiguales.

COR. compuesta apiñada y uniforme; con numerosas corollillas hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, ligulada, linear, truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la antera cilíndrica y tubulosa.

PIST. Germen casi aovado: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado en globo, deprimido y puntiagudo hace sus veces.

SEM. algo oblongas: con su *vilano* peloso.

RECEPT. desnudo.

OBS. La Cerraja de Plumier tiene el vilano con *estipite*. R.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 474.

La flor es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos sentados en el embrión y comprendidos en un caliz craso, el qual madurandose se vuelve de figura cónica. El embrión pasa á semilla adornada de vilano y fixada en el receptáculo.

E S P E C I E S.

Mari-
timus. 1. *SONCHUS pedunculo-* Cerraja con el pedunculo
nudo, foliis lanceolatis am- desnudo; hojas lanceoladas,
plexicaulibus indivisis re- amplexicaules, indivisas y
trorsum argutè dentatis. con dientes agudos que mi-
ran ácia atrás.

Sonchus angustifolius, Cerraja marítima, de hoja
maritimus. C. B. P. 124. angosta.

Prodr. 61. Tourn. p. 475.

Pluk. alm. 354. t. 62. f. 5.

Chondrilla palustris, lon- Chòndrila palustre, de
gfolia, sinuata, læviter spi- hoja larga, sinuosa y con es-
nosa. Rai. Suppl. p. 137. pinas lisas.

Cast. Cerraja marítima.

Habita en la Europa austral: en Cataluña, Valencia y
en otras partes de la marina de España. 2

Pa-
lustris. 2. *SONCHUS pedunculis* Cerraja con pedunculos y
calycibusque hispidis sub- cálices erizados, casi en um-
umbellatis, foliis runcina- bela; hojas runcinadas y por
tis basi sagittatis. Pall. it. su base en forma de saeta.

1. p. 59.

Sonchus caule erecto, fo- Cerraja con el tallo dere-
liis pinnato-hastatis apice- cho; hojas entre pinnadas y
que hastatis, floribus con- de hechura de alabarda, y
gestis villosis. Hort. cliff. por su ápice tambien de he-
385. chura de alabarda; flores
amontonadas y vellosas.

Sonchus asper, arbores- Cerraja áspera y arbores-
cens. C. B. P. 124. Tourn. cente.

p. 474.

Sonchus lævior, Austria- Cerraja quinta, de Aus-
cus V. altissimus. Clus. tria, mas lisa y muy alta.
hist. 2. p. 147.

Cast. Cerraja palustre.

Habita en prados pantanosos de Flandes, Inglaterra,
Alemania, Francia y Hungria. 2

Su traza es muy diversa de la de la Cerraja arvense.

SON-

40 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Ar- 3. *SONCHUS pedunculis* Cerraja con pedunculos y
vensis *calycibusque hispidis sub-* cálices erizados, casi en um-
umbellatis, foliis runcina- bela; hojas runcinadas y por
tis basi cordatis. Flor. dan. su base de figura de cora-
t. 606. zon.

Sonchus foliis amplexi- Cerraja con hojas amplexi-
caulibus, semipinnatis, ser- cálices, medio pinnadas,
ratis, calycibus hispidis. aserradas; y cálices eriza-
Hall. helv. n. 23. dos.

Hieracium majus folio Hieracio mayor, con hoja
Sonchi, vel Hieracium Son- como la de la Cerraja, ó
chites. C. B. P. 126. Hieracio como Cerraja.

Sonchus repens, multis Cerraja rastrera, llamada
Hieracium majus. Bauh. por muchos autores Hieracio
hist. 2. 1017. Tourn. p. 474. mayor.

Hieracium majus. Fuchs. Hieracio mayor.
hist. 319.

Cast. Cerraja arvense.

Habita en campos arcillosos de Europa: en los circunitos
de Madrid entre los sembrados; y es frecuente en otras
muchas partes de España. 2f

Olera- 4. *SONCHUS pedunculis* Cerraja con pedunculos
ceus. *tomentosis, calycibus gla-* tomentosos; y cálices lampi-
bris. Flor. dan. t. 682. ños.

Sonchus annuus ramosus Cerraja annua, ramosa,
diffusus, foliis laciniatis. difusa, con hojas laciniadas.
Hort. cliff. 384.

Sonchus caule ramosissi- Cerraja con el tallo muy
mo, diffuso, foliis summis ramoso y difuso; hojas de
amplexicaulibus, pedunculis mas arriba amplexicaules; y
inequalibus. Roy. lugdb. pedunculos desiguales.
129.

α *Sonchus levis.*

Cerraja lisa. α

Sonchus foliis amplexi- Cerraja con hojas amplexi-
caulibus, dentatis, integris cálices, dentadas, enteras
& semipinnatis, calycibus y medio pinnadas; y cálices
levibus. Hall. helv. n. 21. lisos.
Blackw. t. 130.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 41

Sonchus lævis, *lacinia* X Cerraja lisa, con hoja an-
rus, *latifolius*. C. B. P. 124. cha y laciniada.

Tourn. p. 474.

Sonchus minor, *lacinio-* Cerraja menor, mas sua-
sus, *mitior*, *sive minus spi-* ve, ó menos espinosa, con
nosus. Bauh. hist. 2. p. 1014. hojas laciniadas.

Sonchus lævis. Cam. epit. Cerraja lisa.

279. Dod. pempt. 643.

β *Sonchus lævis*, *minor*, Cerraja lisa, menor, de
paucioribus laciniis. C. B. hojas con menos lacinias. β
P. 124. Tourn. p. 475.

Sonchus lævis, *latifolius*, Cerraja lisa, de hoja an-
vel angustifolius. Tabern. cha ó angosta.
ic. 190.

x *Sonchus asper*.

Cerraja áspera. x

Sonchus foliis amplexi- Cerraja de hojas amplexi-
caulibus, *rigidis*, *integris* caules, con dientes, rígidas,
& *semipinnatis*, *dentatis*, enteras, y medio pinnadas;
calycibus lævibus. Hall. helv. y cálices lisos.

n. 22.

Sonchus asper. Blackw. Cerraja áspera.

t. 30.

Sonchus asper, *lacinia-* Cerraja áspera, de hojas
tus, & *non laciniatus*. C. con lacinias y sin ellas.

B. P. 123. Tourn. p. 474.

Sonchus asper, *lacinia-* Cerraja áspera, de hoja an-
tus, *latifolius*, & *angusti-* cha y angosta, con lacinias.
folius. Loesel. prus. 157. t.

77. 78.

Sonchus asper. Fuchs. Cerraja áspera.
hist. 674. Dod. pempt. 643.

Cast. Cerraja de hortaliza.

Habita en lugares cultivados de Europa : en las huertas
y circuitos de Madrid ; y es comun en muchas partes de
España. ☉

Tiene las *hojas* comprimidas y amplexicaules : y los *pe-*
dunculos que con el tiempo se vuelven lampiños.

42 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Tener- 5. *SONCHUS pedunculis* Cerraja con pedunculos
rimus. *tomentosis, calycibus pilo-* tomentosos; y cálices pelo-
sis. Gou. hort. 407. sos.

Sonchus lævis, in pluri- Cerraja lisa, con hojas di-
mas & tenuissimas lacinias vididas en muchas y muy
divisus. C. B. P. 124. Prodr. delgadas lacinias.

61. Tourn. p. 475.

Chondrilla lutea. Bauh. Chôndrila con la flor ama-
hist. 2. p. 1020. rilla.

Cast. Cerraja muy tierna.

Habita en Mompeller y Florencia : en las huertas y con-
tornos de Madrid : en Cataluña y otras muchas partes
de España. ☉

Echa el tallo muy ramoso, con pelos esparcidos y glutino-
sos : los *piececitos* cubiertos de tomento blanco : los *cá-*
lices cilindricos y salpicados de pelos extendidos : las
hojas lampiñas, tiernas, hendidas al través y sin es-
pinas.

Plu- 6. *SONCHUS pedunculis* Cerraja con pedunculos
mieri. *nudis, floribus paniculatis,* desnudos; flores en panoja;
foliis runcinatis. y hojas runcinadas.

Sonchus caule glaberri- Cerraja con el tallo muy
mo, foliis runcinatis gla- lampiño; hojas runcinadas,
bris, racemo laxo glaberri- lampiñas; racimo laxo muy
mo, pedunculis nudis. Gov. lampiño; y pedunculos des-
illustr. p. 54. R. nudos.

Lactuca alpina, glabra, Lechuga de alpes, lam-
Acanthi folio, flore magno, piña, con hoja como la del
cæruleo. Vaill. act. 1721. p. Acanto; flor grande y de co-
200. Monn. obs. 157. lor cerúleo.

Cast. Cerraja de Plumier.

Habita en los Pirineos y en el monte Dorado cerca de la
gran Cartuxa. Monnier. ♀

Es muy semejante á la *Cerraja alpina*; pero tiene la *coro-*
la con un solo orden de flosculos y quatro veces mayo-
res : el *tallo* de la altura de un hombre : las *hojas* del
largo de dos pies, runcinadas, lisas por encima y áspe-
ras con venas por debaxo; y las *del tallo* mas angostas
y mas agudas : la *panoja* terminal, con los pedunculos
des-

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 43

desnudos: el caliz que suda gotitas resinosas: y el vilano con estipite.

- | | | |
|---------------|---|---|
| Alpi-
nus. | 7. <i>SONCHUS pedunculis squamosis, floribus racemosis, foliis runcinatis.</i> Flor. dan. t. 182. | Cerraja con pedunculos escamosos; flores racimosas; y hojas runcinadas. |
| | <i>Sonchus Lapponum, altissimus, floribus cæruleis.</i> Flor. lap. 290. | Cerraja altísima, de Lapponia, con flores cerúleas. |
| | <i>Sonchus lævis, lacinia- tus, cæruleus, seu Sonchus alpinus, cæruleus.</i> C. B. P. 124. | Cerraja lisa, con hojas laciniadas y flor cerúlea; ó Cerraja alpina, con la flor cerúlea. |
| | <i>Lactuca montana, latifolia, laciniata, flore cæruleo.</i> Tourn. p. 474. | Lechuga montana, con hoja ancha, laciniada; y flor cerúlea. |
| | <i>Sonchus cæruleus.</i> Cam. epit. 284. | Cerraja con la flor cerúlea. |

Cast. Cerraja alpina.

Habita en las laderas de los alpes de Lapponia, Suiza y Austria. ☉

- | | | |
|------------------|---|---|
| Flori-
danus. | 8. <i>SONCHUS pedunculis subsquamosis, foliis lyra- to-hastatis.</i> | Cerraja de pedunculos con alguna escama; y hojas entre liradas y de figura de alabarda. |
| | <i>Sonchus caule erecto, foliis pinnato-dentatis, radicalibus latissimis, obtusis, floribus racemosis.</i> Roy. lugdb. 129. | Cerraja con el tallo derecho; hojas entre pinnadas y dentadas, las radicales muy anchas y obtusas; y flores en racimos. |
| | <i>Sonchus annuus, Canadensis, altissimus, lacinia- tus, flore cærulescente.</i> Vaill. act. 1721. p. 198. | Cerraja annua, del Canadá, muy alta, con hojas laciniadas; y flor de color que tira á cerúleo. |
| | <i>Lactuca altissima, folio Sonchi laciniato, flore par- vo, cæruleo.</i> Boerh. lugdb. 1. p. p. 81. | Lechuga muy alta, con hoja como la de la Cerraja, laciniada; flor pequeña y de color cerúleo. |

Cast.

44 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Cerraja de la Florida.

Habita en la Virginia y en el Canadá.

Sibiri-
cus.

9. *SONCHUS pedunculis squamatis, foliis lanceolatis indivisis sessilibus.* Hort. ups. 244. Cerraja con pedunculos escamosos ; hojas lanceoladas , indivisas y sin peciolo.

Sonchus foliis lanceolatis, sessilibus, plerumque denticulatis, floribus corymbosis, caulibus glabris, Gmel. sib. 2. p. 11. t. 3. Cerraja de hojas lanceoladas , sin peciolo , y las mas veces con dientecitos ; flores en corimbo ; y tallos lampiños.

Lactuca Salicis folio, flore ceruleo. Amm. Ruth. 211. 212. Lechuga con hoja como la del Sauce ; y flor de color cerúleo.

Cast. Cerraja de Siberia.

Habita en la Siberia, Suecia septentrional y Finlandia. 24 Tiene el vilano sencillo y sentado : y varía con la flor blanca.

Tataricus.

10. *SONCHUS pedunculis nudis, foliis lanceolatis dentatis runcinatis.* Cerraja con pedunculos desnudos ; hojas lanceoladas con dientes , y runcinadas.

α *Sonchus foliis lanceolatis, sessilibus, dentatis, floribus corymbosis, caulibus glabris.* Gmel. sib. 2. p. 11. t. 3. f. 2. Cerraja con hojas lanceoladas , sin peciolo , y dentadas ; flores en corimbo ; y tallos lampiños. α

Cast. Cerraja de Tartaria.

Habita en la Tartaria y Siberia. 24

Es planta muy semejante á la *Cerraja de Siberia*. Echa la raíz rastrera : los tallos lisos y al doble mas altos que los de aquella : las mas hojas lanceoladas , entre hendidas al través y dentadas , ó casi runcinadas , lisas y con su lomo blanco : las flores de color cerúleo y del todo semejantes á las de la *Cerraja de Siberia*.

Tube-
rosus. 11. *SONCHUS peduncu- X* Cerraja con pedunculos
lis subsquamatis, foliis run- algo escamosos; hojas run-
cinatis, integrisque sagit- cinadas y enteras, de figura
tatis sessilibus. Syst. veg. de saeta y sin peciolo.

594.

Sonchus foliis inferiori- X Cerraja con las hojas in-
bus runcinatis, superiori- feriores runcinadas; y las su-
bus sagittatis. Suppl. p. 346. X periores en forma de saeta.

Cast. Cerraja tuberosa.

Habita en la Tartaria.

Es semejante á la *Cerraja de Tartaria*; aunque su *raiz* no es rastrera. Posee las *flores* cerúleas; y la *corola* derecha.

Echa la *raiz* carnosa y rastrera: el *tallo* del largo de dos pies, derecho, liso, ramoso, rollizo y de color pardo por arriba: las *hojas radicales* ó *inferiores* runcinadas y con dientes muy delgados: las *superiores* en forma de saeta, amplexicaules y enterisimas: pocas *flores* que salen de la sumidad del tallo y con pedunculo: los *pedunculos* apenas mas largos que el caliz, con escamas aovadas y apretadas: los *calices* oblongos, como los de la *Escorzonera*, y apiñados con escamas aovadas, algo obtusas y convexas: las *corolas* de color cerúleo pálido, con el borde casi al doble mas largo que el caliz: las *semillas* aovadas al revés: el *vilano* peloso, con estipite y cortisimo. *Suppl. loco citato.*

Canadensis. 12. *SONCHUS peduncu- X* Cerraja con pedunculos
lis hispidis, foliis runcina- erizados; hojas runcinadas;
tis, floribus racemosis. Gron. X y flores en racimo.
virg. 115.

Chondrilla foliis pinnato- X Chôndrila con hojas entre
hastatis, denticulatis. Gron. X pinnadas y de hechura de
virg. 1. p. 89? X alabarda, y con dientecitos.

Cast. Cerraja del Canadá.

Habita en el Canadá. *Kalm.*

Tiene las *hojas* como las de la *Cerraja de la Florida*, dentadas y de color garzo por debaxo: los *pedunculos* largos, terminales y salpicados de pelos glutinosos: los

46 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

racimos cortos : las flores cerúleas y de la magnitud de las de la *Cerraja palustre*.

Fruti- 13. SONCHUS *frutico-* X Cerraja fruticosa , muy
cosus. *sus* , *glaberrimus* , *foliis* X lampiña , con hojas alarga-
elongatis lanceolatis sinua- X das , lanceoladas , sinuosas
tis subpetiolatis , umbellis X y con peciolo corto ; umbe-
subtomentosis involuocratis , X las algo tomentosas , con in-
calycibus squarrosis glaber- X volucro ; cálices desparra-
rimis. Suppl. p. 346. X mados y muy lampiños.

Cast. Cerraja fruticosa.

Habita en las peñas altas de las selvas de la isla de la Madera. *Masson.* *h*

Es semejante á la *Cerraja palustre*. Produce el *tallo* craso y esponjoso : las *hojas* acercadas , del largo de un pie , lanceoladas , profundamente sinuosas , escurridas en peciolo con un ribete muy delgado , verdes por encima , de color garzo por debaxo y muy lampiñas en ambas partes : las *umbelas* terminales y las mas veces compuestas : los *involuucros* *universal* y *parcial* de muchas hojuelas aovadas y encorvadas ácia atrás : los *piececitos* tomentosos ácia la flor y escamosos con hojuelas : las *flores* amarillas ; y el *vilano* que no es plumoso : el *caliz* abierto y apiñado , con escamas ú hojuelas laxás y algo encorvadas por su ápice.

1091. Género LACTUCA. * *Tourn. t.* 267.

Vaill. A. G. 1721.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* cilindrico y apiñado ; con muchas *escamas* puntiagudas y membranosas por su margen.

COR. *compuesta* apiñada y uniforme ; con muchas *corolillas* hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo , ligulada , truncada y con quatro ó cinco dientes.

ESTAMB. *Filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* casi aovado : *estilo* filiforme , del largo de los

los estambres : con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno : el *caliz* cerrado , y entre aovado y cilindrico hace sus veces.

SEM. aovadas , puntiagudas , lisas y comprimidas : *vilano* peloso y sencillo , con el *estipite* largo y adelgazado por debaxo.

RECEPR. desnudo.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 473.

La *flor* es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos sentados en el embrión y comprendidos en el caliz escamoso, oblongo y delgado: y el embrión pasa á semilla adornada de vilano.

ESPECIES.

- | | | |
|----------------|--|---|
| Quer-
cina. | 1. LACTUCA foliis runcinatis denticulatis acutis, subtus lævibus, caule glabro. It. gotl. 289. | X Lechuga de hojas runcinadas, con dientecitos, agudas, y por debaxo lisas; con el tallo lampiño. |
| | Lactuca foliis Quernis. Rai. hist. 221. | X Lechuga con hojas como las del Roble. |
| | Lactuca sylvestris, angustolaciniato folio. Magn. monsp. app. Tourn. p. 474. | X Lechuga silvestre , con hoja angosta y laciniada. |
| | Cast. Lechuga con hoja de Roble. | |
| | Habita en la isla de la Carolina del Báltico y en Alemania. 24 | |
| Sativa. | 2. LACTUCA foliis rotundatis, caulinis cordatis, caule corymboso. Mat. med. 205. | X Lechuga con hojas redondeadas , las del tallo de figura de corazon; y tallo corymboso. |
| | Lactuca sativa. C. B. P. 122. Tourn. p. 473. | X Lechuga sativa. |
| α | Lactuca capitata. C. B. P. 123. Moris. hist. 3. p. 57. sect. 7. t. 2. f. 2. Tourn, p. 473. | X Lechuga en cabeza ó arrepollada. α |

Lac-

48 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

β *Lactuca crispa*. C. B. P. x Lechuga rizada. β
123. Dod. pempt. 644. To-
urn. p. 473. x

Cast. Lechuga sativa.

Habita..... ⊙

Proviene acaso de las especies siguientes , variada por el cultivo ?

PROPIED. *Es aguanosa y lactescente ; refrigerante , diluyente , paregorica y antivenerea.*

Sca- 3. LACTUCA foliis ver- x Lechuga de hojas vertica-
ciola. ticalibus carina aculeatis. les , con agujones en su
Amoen. acad. 4. p. 328. quilla ó lomo.

Lactuca foliis semipinna- Lechuga de hojas medio
tis , nervo spinoso . Hall. pinnadas , con su nervio es-
helv. n. 14. pinoso.

Lactuca sylvestris , costa Lechuga silvestre , con el
spinosa . C. B. P. 123. To- lomo espinoso.
urn. p. 473.

Lactuca sylvestris , laci- Lechuga silvestre , con
niata . Moris. hist. 3. p. 58. hojas laciniadas.
sect. 7. t. 2. f. 17.

Endivia major , lactuci- Endivia mayor, lechugui-
na , spinosa . Barr. ic. 135. R. na , y con espinas.

α *Lactuca sylvestris , Ita-* Lechuga silvestre , de Ita-
lica , costa spinosa , sangui- lia , con el lomo espinoso y
neis maculis adspersa . Herm. salpicada de manchas san-
parad. 191. t. 191. Tourn. guineas. α
p. 473.

β *Lactuca sylvestris , an-* Lechuga silvestre , an-
nua , costa spinosa folio nua , de hoja entera , con el
integro , colore caesio . Moris. lomo espinoso , y de color
hist. 3. p. 58. x entre verde y azul. β

Cast. Lechuga escarola.

Habita en la Europa austral : en los contornos de Ma-
drid : en Aragon y otras partes de España. ⊙

Echa las *hojas radicales* sinuosas. Rai.

En la variedad β las *hojas radicales* se hallan runcinadas,
obliquas ó verticales ; y las *superiores del tallo* ample-

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 49

xícaules , en forma de saeta , con su quilla ó lomo liso, y por su margen ásperas.

- Virosa** 4. *LACTUCA foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis.* Lechuga de hojas horizontales , con agujones en la quilla y dentadas.
Lactuca caule foliisque aculeatis. Hort. cliff. 384. Lechuga de tallo y hojas con agujones.
Lactuca foliis ovatis, pappi, nervo spinoso. Hall. helv. n. 15. Lechuga de hojas aovadas , extendidas y con el nervio espinoso.
Lactuca sylvestris, odore viroso. C. B. P. 123. Moris. olor hediondo y ponzoñoso.
 hist. 3. p. 58. sect. 7. t. 2. f. 16. Tourn. p. 473.

Cast. Lechuga hedionda y ponzoñosa.

Habita en la Europa austral : en los circuitos de Madrid: en Cataluña y otras muchísimas partes de España. ☉

Echa el tallo con agujones por debaxo : las *hojas* en forma de saeta , sentadas , y con agujones por su margen y quilla. *Haller* y *Gerardo* suponen que es variedad de la antecedente.

Sube á la altura de un hombre : su *tallo* es blanquecino y muy lampiño ; y las *hojas* se hallan con pestañas espinosas.

- Saligna.** 5. *LACTUCA foliis basitatis linearibus sessilibus carina aculeatis.* Amoen. acad. 1. p. 150. Jacq. austr. t. 250. Lechuga de hojas entre de figura de alabarda y lineares , sentadas y con agujones en su quilla.
Lactuca sylvestris, altera, angusto saligno folio, costa albicante. Hall. jen. 207. t. 4. optima. Otra Lechuga silvestre , con hoja como la del Sauce, angosta, y blanquecina en su lomo.
Lactuca sylvestris, angustato, laciniato folio. Magn. monsp. 298. Tourn. p. 474. Lechuga silvestre , con hoja angosta y laciniada.
Chondrilla viscosa, humilis. C. B. P. 130. prodr. 68. Taill. Chôndrila viscosa y baxa.

50 FLOR. HERM. CON AETER. UNID. EN CIL.

Endivia minor, *lactuca*-*na*, *spinosa*. Barr. ic. 156. *Endivia menor*, lechuguí-*na*, y con espinas.

Cast. Lechuga con hoja de Sauce.

Habita en Francia: en los circuitos de Madrid y en otras partes de España. ☉

Tiene las *hojas* planas y verticales, y casi como las de la *Lechuga escarola*.

Canadensis. 6. LACTUCA *foliis lanceolato-ensiformibus amplexicaulibus dentatis inermibus*. Lechuga de hojas entre lanceoladas y en forma de espada, amplexicaules, con dientes y sin aguijones.

Lactuca Canadensis, *altissima*, *angustifolia*, *flore pallide luteo*. Tourn. p. 474. Lechuga del Canadá, muy alta, con hoja angosta, y flor de color amarillo pálido.

Sonchus sylvestris, *folio laciniato*, *glauco*, *costa non spinosa*. Rai. suppl. p. 137. Cerraja silvestre, con hoja laciniada, de color garzo y su lomo sin espinas.

Cast. Lechuga del Canadá.

Habita en el Canadá. Kalm.

Se diferencia de la *Lechuga sativa* por el *tallo* mas alto; por las *hojas* quatro veces mas largas y mas angostas; por el *racimo terminal* largo, compuesto y no corimbo-
so; y por el *vilano* sentado como en la *Cerraja*.

Indica. 7. LACTUCA *foliis laciniato-ensiformibus sessilibus inaequaliter dentatis*. Lechuga con hojas lacinia-
das y en forma de espada, sentadas, y con dientes des-
iguales.


Cast. Lechuga de Indias.

Habita en Java. Osbeck.

Conviene mucho con la *Lechuga del Canadá* en su *estatura* angosta y alta; y en las *semillas* con el *estipite* muy corto.

La *Lechuga de Indias* tiene las *hojas* mas dentadas y los dientes desiguales: las *hojas* apenas pecioladas y que no abrazan el *tallo*: y la *panoja* mas ramosa y que lleva mas flores.

LAC-



- Perennis. 8. *LACTUCA foliis linearibus dentato-pinnatis, laciniis sursum dentatis.* Hort. cliff. 384. Mill. dict. t. 157. Lechuga de hojas lineares, entre dentadas y pinnadas, con las laciniás dentadas por arriba.
- Chondrilla cærulea, altera, Cichorii sylvestris folio.* C. B. P. 130. Otra Chondrila con la flor cerúlea; y hoja como la de la Achicoria silvestre.
- Chondrilla cærulea, latifolia, laciniata.* C. B. P. 130. Chondrila con la flor cerúlea; hoja ancha y laciniada.
- Chondrilla.* Dod. pempt. 637. *cærulea.* Tabern. 166. Chondrila..... con la flor cerúlea.
- Lactuca perennis, humilior, flore cæruleo.* Tourn. P. 473. Lechuga perenne, mas baxa, y con la flor cerúlea.
- Apate.* Dalech. hist. 561. Apate: llamada Engaño.

Cast. Lechuga perenne.

Habita en Alemania, Suiza y Francia: en la Alcarria, Sierra-nevada, Pirineos y en otras partes de España. Es de la altura de un palmo y medio, poco mas ó menos; y alguna vez tiene las *hojas de mas arriba* alesnadas y enterisimas.

1092. Género CHONDRILLA. * Tourn. t. 268.

Vaill. A. G. 1721. 12.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun calzado, cilindrico; con muchas *escamas* del cilindro paralelas, lineares é iguales; y las de la base pocas y cortisimas.

COR. compuesta apifñada y uniforme; con muchas *corolillas* hermafroditas, iguales y puestas en muchas series.

Propia de un petalo, ligulada, linear, truncada y con quatro ó cinco dientes.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortisimos: con la antera cilindrica y tubulosa.

PIST. Germen casi aovado: *estilo* filiforme, del largo de

52 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

los estambres : y con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno : el *caliz* cilindrico y oblongo hace sus veces.

SEM. aovadas , comprimidas y con puntitas : *vilano* peloso , con el estipite largo y adelgazado por arriba.

RECEPT. desnudo.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 475.

La *flor* es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos sentados en el embrión y comprendidos en el caliz , como tubuloso y cilindrico ; y el embrión pasa después á semilla adornada de vilano.

ESPECIES.

Jun- 1. CHONDRILLA *foliis* X Chôndrila con las hojas
cea. *radicalibus runcinatis, cau-* radicales runcinadas , y las
linis linearibus integris . del tallo lineares y enteras.
Hort. cliff. 383. Jacq. austr.
t. 427.

Chondrilla foliis radica- X Chôndrila con las hojas
libus eroso-pinnatifidis ly- radicales entre rozadas y
ratis , caule basi aculeato, hendidas al través, y en forma
floribus spicatis. Gov. illustr. de lira ; tallo con agujones
54. por su base ; y flores espigadas.

Chondrilla Juncea , vis- X Chôndrila como Junco ,
cosa , arvensis. C. B. P. 130. X viscosa y arvense.
Tourn. p. 475.

Chondrilla Juncea. Taber. X Chôndrila como Junco.
hist. 487.

Chondrilla viminea. Bauh. X Chôndrila como mimbre.
hist. 2. p. 1021. X

Cast. Chôndrila como Junco. *vulgo* : Achícoria dulce , ó Ajongera.

Habita en las márgenes de los sembrados de Alemania, Suiza y Francia : en los circuitos de Madrid : en Aragón , Cataluña y en otras muchas partes de España. ♂

CHON-

Crepoides 2. CHONDRILLA *foliis* X Chôndrila con hojas en
sagittatis amplexicaulibus, X forma de saeta, amplexicau-
caule simplici, floribus sub- X les; tallo sencillo; flores ca-
sessilibus lateralibus. Syst. X si sentadas y laterales.
 veg. 595. X

Cast. Chôndrila como Crepis.

Habita. ☉

Podría asociarse esta especie con las del género *Crepis*.

Echa el tallo sencillo y las mas veces sencillísimo, del largo de pie y medio, con estrias purpúreas por su base, y salpicado de cerdas blancas y claras: las *hojas* (como las de la *Turritide*) en forma de saeta, amplexicaules, indivisas, oblongas, ásperas por su margen, con pelos blancos, señaladamente en la quilla, y lisas por encima; y las de *abaxo* con dientecitos: las *flores* alternas; y el *pedunculo* casi del largo del caliz, con una ú otra bráctea: el *caliz* cilindrico, estriado, y salpicado de tuberculos negros que arrojan una cerda blanca: el *caliz inferior* ó sean las *hojuelas de mas abaxo* alesnadas y persistentes: la *corola* amarilla, pero por debaxo de color que tira á purpúreo, y de la longitud del caliz.

Nudi-caulis. 3. CHONDRILLA *scapo* X Chôndrila con el escapo
nudo, floribus paniculatis. X desnudo; y flores en panoja.
Lactuca nudicaulis. Mur X Lechuga con el tallo des-
 ray. in Nov. Comm. Goett. X nudo.
 tom. 3. p. 74. tab. 4. X

Cast. Chôndrila de tallo desnudo.

Habita en la America septentrional y cerca de las piramides de Egipto.

Produce las *hojas radicales* runcinadas, obtusas, lisas y con dientes pestafiosos: pocos *escapos*, del largo de un pie, en panoja, rectos, rollizos, lisos y con una ú otra hoja menuda: el *caliz* de ocho hojuelas, liso y apinado por debaxo con pocas hojuelas: la *corola* de color amarillo palido; con veinte y quatro *corolillas*, poco mas ó menos, que constituyen el radio, y de cinco dientes obtusos: todos los *estilos*, que forman el disco de la flor, de un mismo color: el *vilano* sentado y peloso: las

54 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.
semillas negras: y el receptáculo desnudo, El caliz inferior no es persistente. Murray.

1093. Género PRENANTHES. * *Vaill. A. G.*

1721. 2. 18.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun calzado, cilindrico y lampiño; con las escamas del cilindro del número de las corolillas; y las de la base pocas, desiguales y cortisimas.*

COR. *compuesta de un solo cerco que contiene cinco, ocho, ó mas corolillas hermafroditas, é iguales.*

Propia de un petalo, ligulada, truncada y con quatro dientes.

ESTAMB. *Filamentos cinco, capilares y cortisimos: con la antera cilindrica y tubulosa.*

PIST. *Germen casi aovado: estilo filiforme y mas largo que los estambres: con el estigma hendido en dos partes y redoblado.*

PERIC. *ninguno: el caliz cilindrico y ligeramente cerrado hace sus veces.*

SEM. *de figura de corazon; y con el vilano peloso.*

RECEPT. *desnudo.*

OBS. *Se halla especie que tiene el vilano con estipite.*

ESPECIES.

Tenui- 1. PRENANTHES *foliis* Prenanthes con hojas li-
 folia. *linearibus integerrimis, Le-* neares y enterisimas.
pech. it. 1. p. 264.

Prenanthes angustifo- Prenanthes con hoja an-
lius, flore purpureo. Vaill. gosta y flor purpúrea.
act. 1721. p. 193.

Chondrilla angustissimo Chôndrila con hoja muy
longisimo integroque folio, angosta, muy larga y ente-
Juss. act. 1709. ra.

Cast. Prenanthes con hoja delgada.

Habita en los alpes de la Europa austral.

PRE-

Vimi-
nea.

2. *PRENANTHES foliorum ramentis cauli adnatis*. Jacq. austr. t. 9. Prenanthes con pedazos de hojas pegados al tallo.

Prenanthes foliorum laciniis extrorsum dentatis, ramentis foliaceis caule ramisque adnatis. Roy. lugdb. 120. Prenanthes con las lacias de las hojas dentadas hacia fuera ; y pedazos foliosos pegados al tallo y ramas.

Chondrilla viminea, viscosa, Monspeliaca. C. B. P. 131. Prodr. 68. Chôndrila de Mompeller, como mimbre y viscosa.

Chondrilla viscosa, caule foliis obducto. C. B. P. 130. Chôndrila viscosa, con el tallo cubierto de hojas.

Chondrilla saxatilis, viscosa caule inermidophoro. Col. ecphr. 1. p. 238. t. 240. Chôndrila saxátil, viscosa, con el tallo cubierto ó envainado con hojas.

Lactuca viscosa, caule foliis obducto. Tourn. p. 473. Lechuga viscosa, con el tallo cubierto de hojas.

Cast. Prenanthes como mimbre.

Habita en Austria, Francia y Portugal: en Extremadura, Andalucía, Aragon, Cataluña y en otras partes de España.

Pur-
purea.

3. *PRENANTHES flosculis quinis, foliis lanceolatis denticulatis*. Hort. cliff. 383. Jacq. austr. t. 317. Prenanthes de flores con cinco flosculos; hojas lanceoladas y con dientecitos.

Prenanthes foliis amplexicaulibus, petiolatis, lanceolatis, serratis. Hall. helv. n. 19. Prenanthes de hojas amplexicaules, con peciolo, lanceoladas y aserradas.

Lactuca montana, purpureo-cærulea, minor. C. B. P. 123. Lechuga montana, menor, con la flor de color entre purpúreo y cerúleo.

Sonchus levior, Pannonicus IV, purpureo flore. Clus. hist. 3. p. 147. Cerraja mas lisa, quarta, de Pannonia, con la flor purpúrea.

56 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Lactuca montana, pur-
puro-cærulea, major. C. B. P. 123. A. Lechuga montana, ma-
yor, con la flor entre pur-
púrea y cerúlea.

Chondrilla Sonchi folio,
flore purpurascente, major. Tournef. p. 475. Chôndrila mayor, con ho-
ja como la de la Cerraja; y
flor de color que tira á pur-
púreo.

Sonchus montanus, pur-
pureus, tetrapetalos. Col. ephr. 1. p. 245. Cerraja montana, con
cuatro petalos y de color
purpúreo.

Cast. Prenanthes purpúrea.

Habita en bosques montuosos de Alemania, Suiza é Ita-
lia: en los montes de la Virgen de Monserrat, en Ara-
gon y otras partes de España.

Tiene las hojas inferiores que abrazan el tallo: y el vila-
no sin estipite.

Mu-
ralis.

4. PRENANTHES flos-
culis quinis, foliis runci-
natis. Hort. cliff. 383. Flor, cin-
cinadas. dan. t. 509.

*Prenanthes foliis serra-
tis, pinnatis, pinna supre-
ma triangulari, trilobata*.
Hall. helv. n. 18. Prenanthes de hojas aser-
radas, pinnadas, con la ho-
juela de mas arriba triangu-
lar y hendida en tres lóbulos.

*Sonchus lævis, lacinia-
tus, muralis, parvis flori-
bus*. C. B. P. 124. Cerraja que nace en los
muros, lisa, laciniada, y con
las flores pequeñas.

*Sonchus lævis, vulga-
rior* II. Clus. hist. 2. p. 136. Cerraja segunda, lisa y
mas vulgar.

Chondrilla Sonchi folio,
flore luteo-pallescente. To-
urn. p. 475. Chôndrila con hoja como
la de la Cerraja; y flor ama-
rilla palida.

Cast. Prenanthes de muros.

Habita en los montes sombríos de Europa: en los de Bur-
gos y de la Alcarria: en Aragon, Cataluña y otras
partes de España sobre los muros.

Tiene el vilano sencillo y con estipite.

Altis-
sima. 5. *PRENANTHES flos-* Prenanthes con flores de
culis quinis, foliis trilobis, cinco flosculos; hojas hendi-
caule erecto. das en tres lóbulos; y tallo
derecho.

Prenanthes Canadensis, Prenanthes del Canadá,
altissima, foliis variis, flo- muy alta, con hojas varias;
re luteo. Vaill. act. 1721. p. y flor amarilla.

194.

Sonchus elatus, seu den- Cerraja de Virginia, le-
droides, Virginianus, Ari- vantada, ó como arbol, muy
in modum auriculatis fo- ramosa, de hojas con oreji-
liis, ramosissimus, floribus llas al modo que las del Ya-
luteis, parvis, pentapeta- ro; flores amarillas, peque-
lis. Pluk. alm. 355. t. 317. ñas y de cinco petalos.
f. 2.

Cast. Prenanthes altissima.

Habita en la Virginia y en el Canadá.

Con-
drillo-
ides. 6. *PRENANTHES flos-* Prenanthes con flores de
culis denis, calycibus octo- diez flosculos; cálices hen-
filis, foliis lanceolatis, ra- didos en ocho partes; hojas
dicalibus indivisis subden- lanceoladas, y las radicales
tatis. Arduin. especim. 2. p. indivisas y con algun dien-
36. t. 17. te.

Cast. Prenanthes como Chôndrila.

Habita en la Europa austral. 24

Echa el tallo en panoja: las *hojas del tallo* lineares, me-
nudas, y solamente en las ramificaciones: las *radicales*
lanceoladas, pecioladas, desnudas y con dientes menu-
dos.

Japo-
nica. 7. *PRENANTHES flos-* Prenanthes con flores de
culis quindenis, foliis radi- quince flosculos; hojas radi-
calibus lyratis, caule sub- cales en forma de lira; y ta-
nudo. llo casi desnudo.

Cast. Prenanthes del Japon.

Habita en el Japon. Kleinhoff.

Lleva las *hojas radicales* en forma de lira (como las de
la *Lapsana comun*), algo obtusas, desnudas y con al-
gun

gun dientecito: el tallo en panoja, con hojas lanceoladas y casi desnudo por su base: las flores numerosísimas, muy pequeñas, amarillas y con pedunculos capilares: los cálices calzados: las flores con quince flosculos, poco mas ó menos: el vilano sencillo y mas largo que el caliz.

Alba. 8. PRENANTHES *flos-* Prenanthes con muchos
culis plurimis, floribus nu- flosculos; flores inclinadas,
tantibus subumbellatis, fo- casi en umbela; y hojas entre
liis hastato-angulatis. Hort. de figura de alabarda y an-
cliff. 383. Gron. virg. 113. guladas.

Prenanthes Anglicanus, Prenanthes de Inglaterra,
Chenopodii foliis, radice con hojas como las del Chén-
bulbosa, sanguineo caule, nopodio; raíz bulbosa; tallo
floribus racemosis candidis- sanguineo; flores en racimo
simis. Pluk. amalth. 195. y candidísimas.

■ *Prenanthes autumnalis,* Prenanthes de Otoño, con
flore dilute purpureo, deor- la flor de color purpúreo cla-
sum nutante, spicatum ad ro, inclinada ácia abaxo, y
caulem disposito, foliis sca- dispuesta por el tallo en es-
bris incisís, caule singula- piga; hojas ásperas, corta-
ri. Gron. virg. 1. p. 89. das; y con un solo tallo. α

Cast. Prenanthes blanca.

Habita en la Carolina, en Virginia y Pensilvania.

Re- 9. PRENANTHES *re-* Prenanthes rastrera, con
pens. *pens, foliis trilobis* Amoen. hojas hendidas en tres lóbu-
acad. 2. p. 360. f. 23. los.

Cast. Prenanthes rastrera.

Habita en la Siberia.

Pinna- 10. PRENANTHES *fru-* Prenanthes fruticosa, de
ta. *ricosa, foliis cum impari* hojas pinnadas en impar,
pinnatis multijugis, folio- con muchos pares de hojue-
lis linearibus integerrimis, las lineares, enterísimas; y
panícula composita. Suppl. panoja compuesta.
p. 347.

Cast. Prenanthes pinnada.

Ha-

Habita en las peñas de Tenerife. *Francisco Masson. h*
 Es *arbusto* con ramas algo rollizas y resinosas. Echa las *hojas* acercadas, con peciolo, del largo de un xeme, entre extendidas y encorvadas ácia atrás, pinnadas con diez hasta doce pares de hojuelas opuestas, lineares, muy delgadas, muy lampiñas y enterisimas: la *panoja* grande y compuesta: los *cálices* lampiños: las *flores* pequeñas y amarillas.

1094. Género LEONTODON. * Dens Leonis. Tourn.

†. 266. Vaill. A. G. 1721. 50. 12. Taraxáconoides.

Vaill. A. G. 1721. 21.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun oblongo y apiñado; con las *escamas interiores* lineares, paralelas é iguales; las *exteriores* en menos número y las mas veces redobladas ácia la base.

COR. compuesta apiñada y uniforme; con *corolillas* numerosas, hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, ligulada, linear, truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. Germen casi aovado: *estilo* filiforme y del largo de la corola; con dos *estigmas* revueltos.

PERIC. ninguno: el *caliz* oblongo y recto hace sus veces.

SEM. oblongas y ásperas; el *vilano* con estípites y plumoso.

RECEPT. desnudo y punteado.

Obs. El Diente de Leon de Vaill. tiene el vilano sencillo ó capilar; y las *escamas* exteriores del caliz redobladas.

El Traxáconoide del mismo autor posee el vilano plumoso ó radiado; y todas las *escamas* del caliz derechos.

El Leontodon dorado goza del receptaculo velloroso.

El Leontodon con pelo áspero echa las semillas exterior-

60 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

riores con un adorno folioso y corto; y las interiores con el vilano plumoso. Hall.

En las mas especies se halla el vilano sin estipite. R.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.

DENS LEONIS. p. 468.

La flor es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos sentados en el embrión y comprendidos en el caliz. El embrión pasa despues á semilla adornada de vilano, recogida en cabezuela globosa y fixada en el receptaculo. A estas notas se añade la de las flores que comunmente nacen en piececitos fistulosos y sin ramas.

E S P E C I E S.

Taraxacum	1. LEONTODON calyce inferne reflexo; foliis runcinatis denticulatis levis. Flor. dan. t. 374. Knorr. delin. 1. t. K. 3. Mat. med. 205.	Leontodon con el caliz redoblado por debaxo; hojas runcinadas, con dientecitos y lisas.
	Taraxacum calycibus glabris, squamis imis reflexis. Hall. helv. n. 56.	Taraxáco con los cálices lampiños; y las escamas ú hojuelas de abaxo redobladas.
	Dens Leonis latiore folio. C. B. P. 126. Tourn. p. 468.	Diente de Leon con hoja mas ancha.
	Hedypnois. Fuchs. hist. 680.	Hedypnoe.
	Dens Leonis. Dod. pempt. 636.	Diente de Leon.
α	Dens Leonis angustiore folio. C. B. P. 126. Tourn. p. 468.	Diente de Leon, con hoja mas angosta. α
β	Dens Leonis latiore & rotundiore folio. Tourn. p. 468.	Diente de Leon, con hoja mas ancha y mas redonda. β
γ	Dens Leonis folio tenuissimo. C. B. P. 126. Prodr. 62. Tourn. p. 468.	Diente de Leon, con hoja muy delgada. γ

Cast. Leontodon *Taraxáco. vulgo* : Amargon.

Habita en los pastos de Europa : en los circuitos de Madrid y es muy comun en las mas provincias de España. 24

Varia con el vilano sencillo: las *hojas* ovales, muy anchas y con dientecitos.

PROPIED. Toda la planta es *lactescence*, *saponacea*, *diluyente*, *humectante* y *excelente diuretica*: y produce admirables efectos en la *itericia* é *hipocondria*.

Bul-
bosum 2. LEONTODON *foliis* X Leontodon de hojas entre
oblongo-ovatis subdentatis X oblongas y aovadas, con al-
glabris, calyce lævi, scapo X gun diente, lampiñas; caliz
superne hirto. X liso; y escapo por arriba con
X pelo áspero.

Taraxacum calyce toto X Taraxáco con el caliz to-
erecto, subhirsuto, radice X do derecho, con algun pelo
bulbosa. Sauv. mons. 297. X áspero; y raiz bulbosa.

Chondrilla bulbosa. C. B. X Chôndrila bulbosa.

P. 130.

Dens Leonis tuberosa ra- X Diente de Leon con la
dice. Tourn. p. 468. X raiz tuberosa.

Chondrilla altera, Dios- X Otra Chôndrila de Dios-
coridis. Col. phyt. 11. t. 4. X corides.

Chondrilla pusilla, ma- X Chôndrila pequeñita, ma-
rina, lutea, bulbosa. Lob. X ritima, con flor amarilla y
ic. 230. X raiz bulbosa.

Cast. Leontodon bulboso.

Habita en Mompeller é Italia: en Asturias, montes de Burgos y en otras partes de España. 24

Au-
reum. 3. LEONTODON *foliis* X Leontodon con hojas run-
runcinatis, caule subunifo- X cinadas; tallo con una ó dos
lio, calyce hispido. Jacq. X hojuelas; y caliz erizado.
vind. 268. austr. t. 297.

Hieracium aureum. Scop. X Hieracio con la flor de
garn. ed. 2. n. 965. X color de oro.

62 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Taraxacum foliorum dentibus triangularibus fine subrotundo. Hall. helv. 740. t. 24. opusc. 266. Taraxáco con los dientes de las hojas triangulares y su remate casi redondo.

Hieracium alterum, minus, IV. Col. ecphr. 2. p. 31. t. 29. Otro Hieracio, menor, quarto.

Cast. Leontodon de color de oro.

Habita en los montes de Suiza, de Baldo é Italia. Seguier. 26

Echa las *hojas* como las del *Leontodon Taraxáco*; pero mas pequeñas y mas obtusas: el *escapo* estriado y con una hojuela linear en medio: el *caliz* de color pardo, derecho, con pelo áspero en su base y las quíllas de sus hojuelas pestañosas: la *corola* de color leonado y por debaxo de color roxo; con el *receptaculo* vellosa.

Has-
tile. 4. LEONTODON *scapo calyceque lævi, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris.* Jacq. austr. t. 164. Leontodon con el escapo y caliz lisos; hojas lanceoladas, con dientes, enterisimas y lampiñas.

Picris caule uniflora, foliis glabris, semipinnatis. Hall. helv. n. 26. Jacq. Picris con el tallo de una flor; hojas lampiñas y medio pinnadas.

Dens Leonis glaber, angustiore & longiore folio, flore minore. Moris. hist. 3. p. 75. Diente de Leon lampiño, con hoja mas angosta y mas larga; y flor mas pequeña.

Taraxaconoides Chondrilla glabra virenti folio. Vaill. act. 170. Planta parecida al Taraxáco, con hoja como la de la Chòndrila, lampiña y verdosa.

Cast. Leontodon de Hastil.

Habita en la Europa austral. ☉

Posee las *hojas* del largo de un pie, con dientes alternos, anchas, cortas, lampiñas y con algun pelo áspero en su lomo: el *escapo* sin dividirse, liso, desnudo y sin escamas: el *caliz* lampiño, asurcado, y con algunas es-

ca-

camas menudas , en su base solamente , é inclinado antes de abrirse.

Tuber-
osum.

5. LEONTODON *foliis runcinatis scabris , calyce acuto hirsuto.*

Leontodon de hojas runcinadas ; caliz agudo y con pelo áspero.

Taraxaconoides Chondrilla folio , hirsuto , Asphodeli radice. Vaill. act. 1721. p. 160.

Planta parecida al Taraxáco, de hoja semejante á la de la Chôndrila, con pelo áspero; y raíz como la del Asphodelo ó Gamon.

Dens Leonis Asphodeli bulbulis. C. B. P. 126. Tourn. p. 468.

Diente de Leon con raíces ó pequeños bulbos parecidos á los del Asphodelo.

Chondrilla altera Dioscoridis , Monspeliensium. Lob. ic. 232.

Otra Chôndrila de Dioscorides , llamada así por los de Mompeller.

Cast. Leontodon tuberoso.

Habita en los prados de Toscana , Provenza y Narbona : en el circuito del Real Sitio del Escorial y camino de San Ildefonso : en los montes de Burgos , de Asturias , Alcarria y otros de España. 2

Echa las hojas runcinadas y algo obtusas, con las lacinias laterales enteras , sin dientecitos , y encorvadas ácia su base : el escapo de una flor , con poco pelo áspero ; y el caliz mas peloso.

Au-
tu m-
ale.

6. LEONTODON *caule ramoso , pedunculis squamosis , foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris.* Gou. illustr. 56. Flor. dan. t. 501.

Leontodon con el tallo ramoso ; pedunculos escamosos ; hojas lanceoladas, dentadas, enterisimas y lampiñas.

Crepis foliis longis dentatis linearibus , caule declinato nudo. Hort. cliff. 386.

Crepis con hojas largas, dentadas , lineares ; tallo declinado y desnudo.

Picris caule nudo , brachiato , foliis glabris , semipinnatis. Hall. helv. n. 281.

Picris de tallo desnudo, con ramas opuestas en forma de aspa ; hojas lampiñas y medio pinnadas.

Hie-

64 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Hieracium foliis Coronop. C. B. P. 128. Tourn. p. 470. Hieracio con hojas como las del Coronopo ó Estrellamar.

Hieracium nigrum. Ta- bern. hist. 181. Hieracio negro.

Hieracium Chondrilla folio, glabro, radice succisa, majus & minus. C. B. P. 127. Tourn. p. 470. Hieracio mayor ó menor, con hoja como la de la Chondrilla, lampiña; y raíz des- puntada.

Hieracium minus. Fuchs. hist. 320. Hieracio menor.

Cast. Leontodon de otoño.

Habita en los prados y pastos de Europa: en Aragon, Cataluña y otras partes de España. ¶

Varía con el vilano sencillo; y los del centro con algun estipite.

Hispi- 7. LEONTODON calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hispidis, pilis furcatis. Hort. cliff. 386. Leontodon con el caliz todo derecho; hojas dentadas, enterisimas y erizadas; y pelos ahorquillados.

Picris caule nudo, uniflora, foliis asperis, dentatis. Hall. helv. n. 25. Picris de tallo desnudo, con una flor; hojas ásperas y dentadas.

“ *Hieracium foliis lanceolato-linearibus, integerrimis, villosis.* Ger. prov. 166. Hieracio con hojas entre lanceoladas y lineares, enterisimas y vellosas. α

Hieracium montanum, angustifolium, nonnihil incanum. C. B. P. 129. Hieracio montano, con hoja angosta y algo blanquecina.

Dens Leonis montanus, angustifolius. Rai. sinops. p. 76. Tourn. p. 469. Diente de Leon montano, con hoja angosta.

Hieracium VI. montanum. Clus. hist. 2. p. 141. Bauh. hist. 3. p. 1038. Hieracio montano, sexto.

β *Hieracium foliis oblongo-dentatis, pubescentibus, scapo unifloro.* Ger. prov. Hieracio con hojas oblongas y dentadas, vellosas; y escapo de una flor. β
166.

Hieracium foliis dentatis, viscidis, hirsutis, subasperis, scapo nudo, unifloro, calyce hirt. Sauv. mōnsp. Hieracio de hojas dentadas, viscosas, con pelo algo áspero; escapo desnudo, de una flor; y caliz con pelo rígido.
298.

Hieracium montanum, Dentis Leonis folio, seu laciniatum, lanuginoso folio. C. B. P. 128. Hieracio montano, con hoja como la del Diente de Leon; ó laciniado, con hoja lanuginosa.

Dens Leonis foliis canescentibus, villosis. Tourn. Diente de Leon con hojas blanquecinas y vellosas.
p. 468

Hieracium folio Hedynoidis. Clus. hist. 2. p. 142. Hieracio con hoja como la del Hedipnoe.

Cast. Leontodon erizado.

Habita en los prados de la Europa boreal: en los circuitos de Madrid: en la Alcarria, Aragon, Cataluña y en otras partes de España. 24

Sube á la altura de un palmo: y tiene una *bractea* linear debaxo de la flor, la que no se halla en el *Leontodon* con pelo áspero: y el vilano sentado y plumoso.

Ilir-
um.

8. LEONTODON *calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis, setis simplicissimis.* Scop. carn. ed. 2. n. 978. Leontodon con el caliz todo derecho; hojas dentadas, y erizadas con cerdas muy sencillas.

Leontodon foliis cauleque hispidis, pedunculo incrassato, striato. Ger. prov. Leontodon con las hojas y tallo erizados; pedunculo incrassado y con estrias.
165.

Rhagadiolus foliis semipinnatis, asperrimis. Hall. Rhagadiolo con hojas medio pinnadas y muy ásperas.
helv. n. 7.

Hieracium Dentis Leonis folio, hirsutiae asperum, magis laciniatum. C. B. P. 127. Hieracio de hoja como la del Diente de Leon, con pelo áspero y mas lacinado.

66 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Hieracium parvum, *hirtum*, *caule aphylo*, *crispum ubi siccatum*. Bauh. hist. 2. p. 1038. Hieracio pequeño, rizado quando seco, con pelo áspero; y tallo sin hojas.

Dens Leonis foliis minimis, *hirsutis*, *asperis*. Tournef. p. 469. Diente de Leon de hojas muy pequeñas y con pelo áspero.

Hieracium asperum, *folio magno Dentis Leonis*. C. B. P. 127. Hieracio áspero, con hoja grande y como la del Diente de Leon.

Hieracium pumilum, *saxatile*, *asperum*, *radice praemorsa*. C. B. Prodr. 66. Hieracio enano, saxátil y áspero; con la raíz despuñtada.

Cast. Leontodon con pelo áspero.

Habita en Alemania, Suiza y Francia: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. 2

Es muy semejante al *Leontodon erizado*. Tiene los *pedunculos* y *cálices* con menos pelo rígido y casi lampiños: las *hojas* con pelos indivisos por su ápice y muy hondedadas en su disco quando están secas: el *radio de la corola* amarillo por debaxo y no verdoso: el *caliz* antes de florecer inclinado; pero acanalado hallandose maduro el fruto: y el *vilano* plumoso.

Las *hojas* algo rígidas, casi áridas en el tacto, con sus *lacinias* torcidas: y las *hojuelas de afuera del caliz* ensanchadas en ambas partes de su base, mediante un pliegue. *Syst. veg.* 596.

Posee las *semillas del radio* adornadas de un calicito corto y de muchos dientes, en lugar de vilano: las *semillas interiores* con el vilano sentado: y las *del centro* coronadas con un vilano cuyo estipite es corto. *Leers. R.*

To- 9. LEONTODON *calyce oblongo*, *foliis lanceolatis*, *indivisis subtus tomentosis*, *pappo stipitato*. Suppl. p. 347. Leontodon con el caliz oblongo; hojas lanceoladas, indivisas, tomentosas por debaxo; y vilano con estipite.

Cast. Leontodon tomentoso.

Habita en la Jamaica.

Echa

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 67

Echa la *raiz* sencilla : las *hojas* radicales , lanceoladas , ó entre lanceoladas y aovadas , aserradas con dientes poco manifestos y vueltos ácia atrás , del largo de un dedo , con una telilla como de araña por encima y con tomento blanco por debaxo : el *escapo* mas largo que las hojas , y mas tomentoso por arriba : el *caliz* oblongo y apiñado , de escamas con alguna pelusa , lineares , agudas y casi membranosas por su margen : las *semillas* oblongas y estriadas : el *vilano* peloso , con estipite y de color que tira á rubio : y el *receptaculo* desnudo.

1095. Género HIERACIUM. * *Tourn. t. 267. Vaill.*

A. G. 1721. 3. 46. 49. 57. 58. 59. 60. Pilosella.

Vaill. A. G. 1721. 57.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* aovado y apiñado ; con muchas *escamas* lineares , muy desiguales , longitudinales y echadas unas encima de otras.

COR. *compuesta* apiñada y uniforme ; con numerosas *corolillas* hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo , ligulada , linear , truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. *Filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* casi aovado : *estilo* filiforme , y del largo de los estambres : con dos *estigmas* encorvados ácia atrás.

PERIC. ninguno : el *caliz* cerrado y aovado hace sus veces.

SEM. de quatro lados , obtusas y cortas : *vilano* peloso y sin estipite.

RECEPT. desnudo.

OBS. El Hieracio de Vaill *tiene* el tallo *ramoso*.

La Pelosilla de Tourn. *posee* el *escapo* *sencillo*.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 469.

La *flor* es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos sentados en el embrión y comprendidos en el

68 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

caliz. El embrión pasa después á semilla, adornada de vilano y recogida en cabezuela. A estas notas se añaden las de los tallos ramosos, y cierta traza propia con que se diferencia el Hieracio de la Escorzonera y de otras especies semejantes.

ESPECIES CON EL TALLEO DESNUDO Y DE UNA FLOR.

Incanum.

1. *HIERACIUM foliis integerrimis subdenticulatis lanceolatis scabris, scapo unifloro.* Jacq. austr. t. 287. Hieracio de hojas enterísimas, con algún dientecito, lanceoladas, ásperas; y escapo de una flor.

Apargia incana. Scop. carn. 2. n. 982. R. Apargia blanquicina.

Leontodon (Pyrenaicum) scapo laevi, pedunculis tumidis squamosis, calycibus villosis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis subintegerrimis. Gou. illustr. p. 55. t. 22. f. 1. 2. secundum de la Chenal. R. Leontodon (de Pirineos) con el escapo liso; pedunculos hinchados y escamosos; cálices vellosos; hojas entreaovadas y lanceoladas, con peciolo, y casi enterísimas.

Picris scapo nudo, squamoso, foliis ovato-oblongis, rariter dentatis. De la Chenal. Act. helv. 8. p. 133. R. Picris con el escapo sin hojas, escamoso; hojas entreaovadas y oblongas, y con dientes claros.

Hieracium montanum VI. Clus. pann. 645. 646. R. Hieracio montano, sexto.

Hieracium montanum, angustifolium II. Tabern. ic. 147. R. Hieracio montano, segundo, con hoja angosta.

Picridis varietas. Hall. helv. n. 25. Variedad de Picris. β

Cast. Hieracio blanquicino.

Habita en Austria y Suiza.

La variedad del *Leontodon* erizado señalada por Linneo con la letra β y por nosotros con la letra α pertenece á esta especie segun Reichard.

Pumi-
lum.

2. *HIERACIUM foliis ovatis, petiolis dilatatis, scapis subunifloris.* Jacq. Hieracio de hojas aovadas, con peciolos ensanchados; y escapos con una ó dos flores. austr. 2. t. 189?

Leontodon dentatum. Leontodon dentado. Mant. 1. p. 107.

Hieracium foliis ovato-lanceolatis, dentatis, petiolatis, petiolis dentatis. Hall. Hieracio de hojas entre aovadas y lanceoladas, con dientes, pecioladas, y los peciolos dentados. helv. n. 42.

Cast. Hieracio enano.

Habita en los alpes de Suiza y Saboya. 2f

Es planta de la altura de quatro dedos, poco mas ó menos. Produce todas las *hojas* radicales, de figura de corazón, ó aovadas, algo tomentosas por debaxo, un poco obtusas, pecioladas y con dientecitos: los *peciolos* del largo de las hojas, ensanchados por arriba, con dientecitos y de color de sangre: los *escapos* vellosos, tendidos, de una flor, de la longitud de las hojas, con dos ó tres hojuelas alesnadas y menudas: el *caliz* velloso, oblongo y blanquecino, con las escamas agudas: y la *corola* de la magnitud de la de la *Pelosilla*.

Es el *Hieracium* (*Prunellæfolium*) *caule ramoso multifloro, foliis lyratis tomentosis, pedunculis unifloris.* Gov. illustr. p. 57. t. 22. f. 3. con el qual une Linneo el *Crepis* enano. R.

El *Hieracio* baxo el nombre de *Hieracio enano* de Linneo descrito y pintado por *Jacquin* en la *Flora austriaca*, t. 189. conviene con la planta que la *Chenal* cogió en las peñas del monte Dornacense y se diferencia bastantemente del *Hieracio* de *Haller* helvet. n. 42. De la *Chenal* in Act. helv. VIII. p. 137. R.

Alpi-
num.

3. *HIERACIUM foliis oblongis integris dentatis, scapo subnudo unifloro, calyce piloso.* Jacq. Hieracio con hojas oblongas, enteras, dentadas; escapo casi desnudo, de una flor; y caliz peloso. austr. t. 191. Flor. dan. t. 27.

Hie-

70 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Hieracium caule unifloro, *foliis lingulatis, dentatis, hirsutis, calyce hirsuto.* Hieracio con el tallo de una flor; hojas en forma de lengüeta, dentadas, con pelo áspero; y caliz tambien con pelo áspero.
Hall. helv. n. 49.

Hieracium alpinum, pulmum, folio lanuginoso. C. Hieracio alpino, enano, con hoja lanuginosa.
B. P. 129.

Hieracium villosum, alpinum, flore magno, singulari. Rai. angl. 3. p. 169. Hieracio velloso, alpino, con una sola flor y grande.
t. 6. f. 2.

Pilosella monoclonos, non repens, alpina, minor, lanuginosa, amplo flore. Mo- Pelosilla alpina, menor, lanuginosa, que no es ras- trera, con un solo tallo; y
ris. hist. 3. p. 78. sect. 7. t. 7. flor ancha.
f. 5.

Cast. Hieracio alpino.

Habita en los alpes de Lapponia, de Bretaña y Austria: en Texadilla de Segovia y en las gargantas de nuestros Pirineos. 26

Tiene el *escapo* casi del largo de una pulgada y media, y adornado á veces en su ápice con una sola hojuela vaga. Varía con las *hojuelas* lampiñas, ó pelosas y aovadas; y con las *raices* fibrosas y en forma de cuerda.

Tara-
xaci.

4. *HIERACIUM foliis lanceolatis dentatis glabris, scapo subnudo unifloro, calyce hirsuto.* Hieracio de hojas lanceo- ladas, con dientes, lampi- ñas; escapo casi desnudo, de una flor; y caliz con pe- lo áspero.

Picris caule hirsuto, unifloro, foliis glabris, semipinnatis, calycibus hirsutissimis. Hall. helv. n. 27. Picris de tallo con pelo áspero y una flor; hojas lam- piñas, medio pinnadas; y cálices con mucho pelo ás- pero.

Dens Leonis alpinus, foliis oblongis, raro dentatis, calyce hispido, nigrescente. Diente de Leon de los al- pes, de hojas oblongas, con dientes claros; caliz erizado
Seguier. Suppl. p. 266. y negruzco.

Cast.

Cast. Hieracio de Taraxáco.

Habita en los alpes de Suiza y de la Lapponia Pitoense. 24

Acaso es *planta hybrida*, ó nueva? Se propone aqui porque no se pierda su conocimiento. Echa las *hojas* enteramente como las del *Leontodon de Otoño*: el *escapo* y *flor* absolutamente como los del *Hieracio alpino*: las *hojas* lanceoladas, lampiñas, con unos dientes mas cortos y otros oblongos, y las mas veces doblados ácia delante: el *escapo* con algunos rudimentos menudos de *hojas*, mas craso ácia la *flor*, é hinchado en su remate, como lo es tambien el *caliz*, y con pelos de color pardo. Se diferencia enteramente del *Leontodon de color de oro*; y tiene el *caliz* muy apiñado, lo que no se observa en el *Leontodon de color de oro*, ni en el *Leontodon de otoño*.

Ve-
nosum

5. HIERACIUM foliis cuneiformibus hirtis, scapo nudo crassissimo erecto. Hieracio de hojas en forma de cuña, con pelo áspero; escapo desnudo, muy craso y derecho.

Gron. virg. 114. Hieracio de la Isla Mariana, muy hermoso, de hojas como las del Lapato, señaladas con venas sanguineas; flor pequeña y de color amarillo-roxo.

Hieracium fruticosum, latifolium, foliis punctis & venis sanguineis notatis. Hieracio fruticoso, de hojas anchas, señaladas con puntos y venas de color de sangre.

Cast. Hieracio venoso.

Habita en la Virginia.

Pilo-
sella.

6. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. Hieracio con hojas enterissimas, aovadas, tomentosas por debaxo; vástagos rastreños; y escapo de una flor.

Hort. cliff. 388. Mat. med. 206.

Hie-

72 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Hieracium caule unifloro, stolonibus reptantibus, foliis petiolatis, ovatis, longè pilosis, subtus tomentos. Hall. helv. n. 55. Hieracio con el tallo de una flor; vástagos ó renuevos rastreros; hojas pecioladas, aovadas, con pelos largos y por debaxo tomentosas.

Pilosella major, repens, hirsuta. C. B. P. 262. Pelosilla mayor, rastrera, y con pelo áspero.

Dens Leonis qui Pilosella Officinarum. Tourn. 469. Diente de Leon, el qual es la Pilosella de las Oficinas.

Pilosella minor. Cam. Pelosilla menor.
epit. 709. Fuchs. hist. 605.

Cast. Hieracio Pelosilla. Farm. Auricula muris.

Habita en los pastos áridos de Europa: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña, Alcarria y en otras muchisimas partes de España. 26

PROPIED. Es planta amarga y láctescente, astringente y vulneraria: y el xugo se usa en la hernia, diarrea, sarna y herpes.

ESPECIES DE TALLO DESNUDO Y CON MUCHAS FLORES.

Du- 7. *HIERACIUM foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro.* Dalib. Paris. 237. Hieracio con hojas enteras, entre aovadas y oblongas; vástagos rastreros; escapo desnudo y con muchas flores.

Hieracium caule nudo, paucifloro, stolonibus reptantibus, foliis longe pilosis, lanceolatis. Hall. helv. n. 53. Hieracio de tallo desnudo, con pocas flores; vástagos rastreros; hojas con pelos largos y lanceoladas.

Pilosella major, repens, minus hirsuta. C. B. P. 262. Pelosilla mayor, rastrera, y con menos pelo áspero.

Dens Leonis, qui Pilosella, folio minus villosa. Tourn. p. 469. Diente de Leon, llamado Pelosilla, con hojas menos vellosas.

Pilosella major. Cam. Pelosilla mayor.
epit. 709,

Cast. Hieracio dudoso.

Habita en Suecia : en Cataluña y otras partes de España.

Tiene el tallo con pelo áspero : las *hojas* del mismo modo y señaladamente por debaxo.

Auricula.

8. *HIERACIUM foliis integerrimis lanceolatis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro.* Flor. lapp. 288.

Hieracio con hojas enterasimas, lanceoladas; vástagos rastreros; escapo desnudo y con muchas flores.

Hieracium caule nudo, stolonibus reptantibus, foliis longè pilosis, lanceolatis, floribus umbellatis. Hall. helv. n. 52.

Hieracio con el tallo desnudo; vástagos rastreros; hojas con pelos largos, lanceoladas; y flores en umbela.

Hieracium alpinum, folio oblongo, angustissimo. C. B. prodr. 64. Hall. R.

Hieracio alpino, con hoja oblonga y muy angosta.

Pilosella major, umbellifera, macrocaulos, montana & pratensis. Col. ecphr. 2. p. 248. t. 249. Hall. R.

Pelosilla mayor, montana y pratense, con el tallo largo; y flores en umbela.

Pilosella minor, folio angustiori, minus piloso, repent. Bauh. hist. 2. p. 1040. Hall. R.

Pelosilla menor, rastrera, con hoja mas angosta y menos pelosa.

Pilosella major, erecta, altera. C. B. P. 262.

Otra Pelosilla mayor y levantada.

Hieracium montanum, umbellatum, angustifolium. Tourin. p. 471.

Hieracio montano, con hoja angosta; y flores en umbela.

Cast. Hieracio oreja.

Habita en los prados áridos y junto á los sembrados de Europa : en Cataluña y otras partes de España. 26

Cymosum.

9. *HIERACIUM foliis lanceolatis integris pilosis, scapo subnudo basi piloso, floribus subumbellatis.* Pollich. pal. n. 743.

Hieracio con hojas lanceoladas, enteras, pelosas; escapo casi desnudo, peloso por su base; y flores casi en umbela.

Hie-

74 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Hieracium caule subnudo, foliis hirsutis, lanceolatis, floribus umbellatis, petiolis ramosis. Hall. helv. n. 51. Hieracio con el tallo casi desnudo; hojas con pelo áspero, lanceoladas; flores en umbela; y piececitos ramosos.

Hieracium Piloselloides majus, longifolium, floribus luteis ferè umbellatis. Vaill. act. 706. Hieracio mayor, semejante á la Pelosilla, de hoja larga; flores amarillas y casi en umbela.

Hieracium murorum, angustifolium, non sinuatum. C. B. P. 129. prodr. 67. t. 67. Tourn. p. 471. Hieracio de muros, con hoja angosta y sin senos.

Pilosella montana, hispida, parvo flore. C. B. P. 262. Pelosilla montana, erizada y con la flor pequeña.

Pilosella minori flore, hirsutior & elatior, non repens. Bauh. hist. 2. p. 1040. Pelosilla mas levantada, que no es rastrera, con mas pelo áspero; y flor mas pequeña.

Pilosella altera, major. Tabern. p. 197. Hall. Otra Pelosilla mayor.

Cast. Hieracio cimoso.

Habita en Rusia, Dinamarca, Alemania y Suiza; y en muchas partes de España sobre los edificios y muros viejos. ¶

Arroja la raíz despuntada: las hojas lanceoladas, algo largas, agudas, enterisimas, derechas y erizadas en ambas partes con pelos rígidos: el *escapo* del largo de un pie, salpicado de pelos claros, mas amontonados en su base, y adornado de una sola hojuela sobre de su misma base: las flores casi en umbela, y con piececitos ramosos.

Præ- 10. HIERACIUM *foliis ovatis subdentatis, scapo nudo racemoso, floribus superioribus primoribus.* Pollich. pal. n. 744. Hieracio de hojas aovadas, con algun diente; escapo desnudo, racimoso; y las flores superiores que salen y se abren primero.

Hie-

Hieracium caule nudo, Hieracio de tallo desnudo;
foliis petiolatis, ovatis, in- hojas con peciolo, aovadas,
tegerrimis, hirsutis, flori- enterisimas, con pelo aspe-
bus spicatis. Hall. helv. n. ro; y flores en espiga.

51.

Hieracium foliis ovatis, Hieracio con hojas aova-
tomentosis, caule nudo, flo- das, tomentosas; tallo des-
ribus spicatis, luteolis, ter- nudo y terminado con flores
minato. Gmel. sib. 2. p. 32. en espiga y algo amarillas.
 t. 13. f. 2. Amm. ruth.

Hieracium pratense, la- Hieracio pratense, mayor
tifolium, non sinuatum, ma- y menor, de hoja ancha y
jus 3 minus. C. B. P. 129. sin senos.

Hieracium latifolium, præ- Hieracio parecido á la Pe-
morsa radice, caule singula- losilla mayor, con hoja an-
ri, Pilosellæ majori affine. cha; raíz despuntada; y un
 Bauh. hist. 2. p. 1035. solo tallo.

Pilosella major, erecta. Pelosilla mayor, levanta-
 C. B. P. 262. Rai. hist. 241. da.

Intybus aphyll caulis, Endivia mayor, con el
major. Thal. harc. 66. tallo sin hojas.

Cast. Hieracio despuntado.

Habita en Suiza, Alemania y Uplandia. 2

Au- 11. *HIERACIUM foliis* Hieracio con hojas ente-
 rantia- *integris, caule subnudo* ras; tallo casi sin hojas, muy
 cum. *simplicissimo piloso corym-* sencillo, peloso y que lleva
bifero. Hort. cliff. 388. Jacq. corimbos.
 austr. t. 410.

Hieracium caule subnudo, Hieracio con el tallo casi
foliis ovatis, integris, flori- desnudo; hojas aovadas, en-
bus umbellatis, aurantiis. teras; flores en umbela y de
 Hall. helv. n. 50. color de Naranja.

Hieracium hortense, flo- Hieracio hortense, con las
ribus atro-purpurascenti- flores de color que de negro
bus. C. B. P. 128. Prodr. 65. tira á purpúreo.
 Tourn. p. 471.

Hieracium alpinum, non Hieracio alpino, con hojas
laciniatum, flore fusco. C. sin lacinias; y flor de color
 B. P. 128. Prodr. 65. pardo.

Au-

76 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Auricula muris Hispanica, aliis *Hieracium Pannonicum*, flore saturate croceo. Bauh. hist. 2. p. 1040. Oreja de Raton de España, llamada por otros Hieracio de Pannonia, con la flor de color azafranado subido.

Hieracium Germanicum, primum. Col. ecphr. 2. p. 28. t. 30. Hieracio primero, de Alemania.

Pilosella polyclonos, repens, major, *Syriaca*, flore amplo, aurantiaco. Moris. hist. 3. p. 78. sect. 7. t. 8. f. 7. Pelosilla de Siria, mayor, rastrera, con muchos tallos; flor ancha y de color de Naranja.

Cast. Hieracio de color de Naranja.

Habita en las selvas de Siria, Suiza y Austria. 2

Gronovii. 12. *HIERACIUM caule paniculato subnudo, foliis radicalibus obovatis intergerimis pilosis*. Gron. virg. 114. Hieracio con el tallo en panoja, casi desnudo; hojas radicales aovadas al revés, enterisimas y pelosas.

Hieracium foliis radicalibus obverse-ovatis, pubescentibus, caulinis ovatis, amplexicaulibus, floribus paniculatis, caule erecto. Gron. virg. p. 90. Hieracio con las hojas radicales aovadas al revés, vellosas; las del tallo aovadas y amplexicaules; flores en panoja; y tallo derecho.

Hieracium Marianum, Pulmonariae Gallicae subrotundo folio. Pluk. mant. 102. t. 420. f. 2. Hieracio de la isla Mariana, con hoja como la de la Pulmonaria de Francia y casi redonda.

Cast. Hieracio de Gronovio.

Habita en la Virginia y Pensilvania. 2

Tiene la raíz despuntada: las hojas radicales aovadas al revés, obtusas, enterisimas, delgadas como una membrana, salpicadas por encima de pelos claros, y de color casi violado por debaxo: el tallo del largo de un pie, angulado, filiforme, con una ú otra hoja lanceolada, y en panoja desigual.

13. *HIERACIUM caule paniculato nudo, foliis radicalibus ovatis serratis glabris.* Hieracio con el tallo en panoja, desnudo; hojas radicales ovadas, aserradas y lampiñas.

Hieracium foliis ex sinuato dentatis, caulibus supra ramosis, subnudis, pedunculis hirsutis, unifloris. Gmel. Hieracio con hojas entre sinuosas y dentadas; tallos ramosos por arriba, casi desnudos; pedunculos con pelo áspero y de una flor.

Cast. Hieracio de Gmelino.

Habita en la Siberia. 24

14. *HIERACIUM scapo nudo multifloro, foliis lyratis obtusis dentatis.* Amœn. Hieracio con el escapo desnudo y de muchas flores; hojas en forma de lira, obtusas y dentadas.

Crepis (Nemausensis) scapo nudo hirto, floribus corymbosis, foliis lyratis runcinatis. Gov. illust. 60. R. Crepis (de Nimes) con el escapo sin hojas, con pelo áspero; flores corimbosas; hojas en forma de lira y runcinadas.

Hieracium Dentis Leonis folio, monoclonon, subasperum. C. B. P. 37. Gov. R. Hieracio algo áspero, de hoja como la del Diente de Leon; y con un solo tallo.

Hieracium Intibaceum seu sextum. Tabern. ic. 183. Hieracio como Endivia 6 sexto.

Cast. Hieracio santo.

Habita en Palestina. 24

Tiene el caliz calzado; por lo que Govan reduxo esta especie al género *Crepis*.

15. *HIERACIUM caule nudo multifloro, pedunculis superioribus altioribus, foliis oblongis dentatis scabris.* Amœn. acad. 6. afr. 45. Hieracio con el tallo desnudo y de muchas flores; pedunculos mas tardíos mas altos; hojas oblongas, dentadas y ásperas.

Cast. Hieracio del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

ESPECIES CON EL TALLO FOLIOSO.

- Pa- 16. *HIERACIUM caule* Hieracio con el tallo de-
 nicu- *erecto, foliis alternis lan-* recho; hojas alternas, lan-
 latum. *ceolatis nudis dentatis, pa-* ceoladas, desnudas, denta-
nicula capillari. das; y panoja capilar.

Cast. Hieracio de panoja.

Habita en el Canadá. *Kalm.*

Echa el tallo del largo de un pie, derecho, rollizo, con lana blanca por debaxo y lampiño por arriba: las *hojas* lanceoladas, puntiagudas, algo anchas, adelgazadas por su base, con dientes apartados, tiernas y lampiñas; y las *inferiores* pelosas por debaxo, señaladamente en su quilla: la *panoja* terminal y variamente ramosa: los *pedunculos* muy delgados, casi capilares, y divergentes ó desparramados: las *bracteas* en las ramificaciones, cortísimas y setáceas: y las *flores* pequeñas.

- Chon- 17. *HIERACIUM caule* Hieracio con el tallo ra-
 drilloi- *ramoso, foliis caulinis elon-* moso; hojas del tallo lam-
 des. *gato-dentatis glabris, ra-* piñas, con dientes largos, y
dicalibus lanceolatis inte- las radicales lanceoladas y
gris. Jacq. vind. 273. t. 7. enteras.

Hieracium alpinum, pu- Hieracio alpino, enano,
milum, Chondrillæ folio. C. con hoja como la de la Chôn-
 B. P. 129. prodr. 64. Burs. drila.
 VI. 87. Tourn. p. 462.

Cast. Hieracio como Chôndrila.

Habita en Schneeberg de la Austria inferior.

Produce el tallo del largo de un xeme y liso: las *hojas* radicales, lanceoladas, con peciolo, enteras y lampiñas; cinco hasta seis en el tallo alternas, lampiñas y largas, con dientes largos y encorvados ácia atrás: los *pedunculos* que salen de las axilas superiores de las hojas tan altos como el tallo, solitarios, casi desnudos y de una flor; con una ú otra *bractea* setacea y algo vellosa por su ápice: los *cálices* con pelo rígido y negro, derechos, apinados con las hojuelas lineares: y
 la

la *corola* de color amarillo-roxo. Su *traza* es como la del *Leontodon* de otoño.

Porri-
folium

18. *HIERACIUM caule ramoso folioso, foliis lanceolato-linearibus subinterrimis.* Jacq. vind. 275. Hieracio con el tallo ramoso, folioso; hojas entre lanceoladas y lineares, y casi enterisimas.

t. 6. austr. t. 286.

Hieracium caule ramoso, foliis radicalibus linearibus, caulinis minimis. Ger. prov. Hieracio con el tallo ramoso; hojas radicales lineares, y las del tallo muy pequeñas.

167.

Hieracium Tragopogonis folio. C. B. P. 129. R. Hieracio con hoja como la del Tragopogon.

Hieracium folio Statices, caule foliato. Tourn. p. 471. Hieracio con hoja como la de la Estatices; y tallo folioso.

Segui. ver. 2. p. 270. n. 6. bona descriptio, exceptis synonymis. R.

Hieracium montanum, Asphodeli foliis acuminatis. Hieracio montano, con hojas como las del Asphodelo y puntiagudas.

Bocc. mus. 147. t. 106. Rai. Suppl. p. 142.

Cast. Hieracio con hoja de Puerro.

Habita en los alpes de Austria, Italia y Valesia. 2

Posee el tallo del largo de un pie, rollizo, con una ó otra hoja: las ramas claras y sin hojuelas: las hojas radicales lineares, derechas, con uno ú otro diente agudo, lisas y con pelillos claros en la quilla: las del tallo muy pocas y menudas: el caliz apiñado, oblongo, y que encanece: la corola amarilla y no muy grande.

Muto-
rum.

19. *HIERACIUM caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minori.* Hort. cliff. 388. Hieracio con el tallo ramoso; hojas radicales ovadas, dentadas, y la del tallo mas pequeña.

- Hieracium caule subnu-* Hieracio con el tallo casi
do, paucifloro, foliis ovato- desnudo, de pocas flores; ho-
lanceolatis, circa petiolum jas entre aovadas y lanceo-
dentatis. Hall. helv. n. 46. ladas, y con dientes cerca
del peciolo.
- α *Hieracium* (pilosissimum) Hieracio (muy peloso) de
murorum, folio pilosissimo. muros, y con hoja muy pe-
C. B. P. 129. Tourn. p. 471. losa. α
- Corchorus*. Dalech. hist. Corchôro.
565.
- β *Hieracium* (sylvaticum) Hieracio (silvatico) de
murorum, laciniatum, mi- muros, con hojas hendidas
nus pilosum. C. B. P. 129. en lacinias, y menos pelo-
Tourn. p. 471. so. β
- Hieracium* (sylvaticum) Hieracio (silvatico) con
caule ramoso folioso, foliis el tallo ramoso y folioso; ho-
radicalibus ovatis petiola- jas radicales aovadas, con
tis, caulinis sessilibus, pe- peciolo; las del tallo senta-
dunculis multifloris. Gov. das; y pedunculos de mu-
illustr. p. 56. Hall. helv. n. chas flores.
46. β α & distincta specie
- Gouano. R.
- Pulmonaria Gallorum*, Pulmonaria de los Fran-
flore Hieracii, Auricula ceses, con flor como la del
muris major, Tragi. Lob. ic. Hieracio; llamada oreja de
587. Gov. raton, mayor, de Trago.
- Pilosella major seu Pul-* Pelosilla mayor ó especie
monariæ luteæ species, an- de Pulmonaria amarilla, con
gustifolia. Bauh. hist. 2. p. hoja angosta.
1034. Gov. R.
- Pulmonaria Gallica*, fe- Pulmonaria femenina, de
mina. Tabern. hist. 504. Francia.
- χ *Hieracium macro-caulon*, Hieracio de tallo largo,
hirsutum, folio longiore. con pelo áspero; y hoja mas
Rai. angl. 3. p. 169. larga. χ
- α *Pulmonaria Gallica*, ro- Pulmonaria de Francia,
tundifolia. Barr. ic. 342. con hoja redonda. α
Hall. loco citato var. R.

Cast. Hieracio de muros.

Habita en lugares abrigados de Europa: en la Sierra de
Mi-

Miraflores, Bustarviejo, en Aragon, Cataluña y otras muchísimas partes de España.

Paludosum 20. *HIERACIUM caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis.* Flor. lapp. 285. Hieracio con el tallo en panoja; hojas amplexicaules, dentadas, lampiñas; y cálices erizados.

Hieracium foliis glabris, dentatis, imis petiolatis, superioribus amplexicaulibus, calycibus hirsutis. Hall. helv. n. 45. R. Hieracio de hojas lampiñas, dentadas, las de abaxo con peciolo, las superiores amplexicaules; y cálices con pelo áspero.

Hieracium Cichorei folio. It. w. Goth. 32. Hieracio con hoja como la de la Achicoria.

Hieracium montanum, latifolium, glabrum, minus. C. B. P. 129. Tourn. p. 471. Moris. hist. 3. p. 69. sect. 7. t. 5. f. 47. Hieracio montano, lampiño, menor, con hoja ancha.

Hieracium latifolium, glabrum, ex valle Griesbachiana. Bauh. hist. 2. p. 1033. Hieracio del valle Griesbachiano, lampiño, y con hoja ancha.

Cast. Hieracio de lagunas.

Habita en los bosques pantanosos de la Europa boreal.

Echa los cálices erizados con pelos negros, tiesos y que sobresalen.

Acaso es variedad de la especie antecedente; aunque su traza es muy distinta, por razon del lugar donde nace?

Lyra-tum. 21. *HIERACIUM caule multifloro, foliis lyratis glabris, calycibus pedunculisque hispidis.* Hieracio con el tallo de muchas flores; hojas liradas, lampiñas; cálices y pedunculos erizados.

82 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Hieracium caule ramoso, foliis semi-amplexicaulibus, teneris, oblongis, plerisque petiolatis, petiolis infimum dentatis. Gmel. sib. 2. p. 24. t. 9. Hieracio de tallo ramoso; hojas que abrazan la mitad del tallo, tiernas, oblongas, las mas con peciolo; y los peciolos de las de mas abaxo dentados.

Cast. Hieracio en forma de lira.

Habita en la Siberia. Gmel.

Es muy parecido al *Hieracio de lagunas*. Tiene el tallo liso: los cálices y pedunculos vellosos: las hojas mas liradas, pecioladas y con ángulos mas obtusos.

Cerinthoides.

22. *HIERACIUM foliis radicalibus obovatis denticulatis, caulinis oblongis semi-amplexicaulibus.* Roy. lugdb. 124. Hieracio de hojas radicales aovadas al revés, con dientecitos; y las del tallo oblongas y que le abrazan la mitad.

Hieracium foliis radicalibus obovatis obtusis petiolatis denticulatis, caulinis oblongis semi-amplexicaulibus acutis. Gov. illustr. 58. t. 22. f. 4. R. Hieracio de hojas radicales aovadas al revés, obtusas, pecioladas y con dientecitos; las del tallo oblongas, que le abrazan la mitad y agudas.

Hieracium Pyrenaicum, foliis Cerinthes, latifolium & angustifolium. Tourn. p. 472. Hieracio de Pirineos, con hojas como las de la Cerinthe, anchas y angostas.

Cast. Hieracio como Cerinte.

Habita en los Pirineos de Aragon y de Cataluña. 2

Vease el *Hieracium caule ramoso folioso, foliis & calyce longo villo barbatis.* Hall. helv. n. 774. Hieracio con el tallo ramoso, folioso; hojas y caliz barbudos con pelillos largos.

Amplexicaule.

23. *HIERACIUM foliis amplexicaulibus cordatis subdentatis, pedunculis unifloris hirsutis, caule ramoso.* Hort. cliff. 387. Hieracio con hojas amplexicaules, de figura de corazón y con algun diente; pedunculos de una flor, con pelo áspero; y tallo ramoso.

Hie-

Hieracium foliis ovato-lanceolatis, rariter dentatis, caulinis amplexicaulibus. Hail. helv. n. 36. secundum Gou. R. Hieracio de hojas entre aovadas y lanceoladas, con dientes claros, y las del tallo amplexícaules.

Hieracium (ampl-xicaule) foliis radicalibus ovato-lanceolatis acutis basidentatis, caulinis hastatocordatis amplexicaulibus. Gov. illustr. 58. quacum denominatione Hieracium Blatorioides ab ipso combinantur. R. Hieracio (*amplexicaule*) con hojas radicales entre aovadas y lanceoladas, agudas, y por su base dentadas; las del tallo entre de figura de alabarda y de corazon, y amplexícaules. *Con cuya denominacion combina Govan el Hieracio como Blataria.*

Hieracium Pyrenaicum, longifolium, amplexicaule. Tourn. p. 472. Hieracio de Pirineos, con hoja larga y que abraza el tallo.

Hieracium Pyrenaicum, rotundifolium, amplexicaule. Tourn. p. 472. Hieracio de Pirineos, con hoja redonda y que abraza el tallo. α

Cast. Hieracio amplexícaule.

Habita en los mismos lugares que la antecedente.

Es muy parecido al *Hieracio de Pirineos*: y se halla todo salpicado de pelos claros y glandulosos por su ápice. Posee el tallo estriado: las hojas verdes en ambas partes y con dientes agudos: las ramas que salen de las axilas superiores, las mas veces con dos flores: y la panocha casi tomentosa.

Pyrensi-
cum. 24. *HIERACIUM foliis amplexicaulibus obovato-lanceolatis retrorsum dentatis, caule simplici, calycibus laxis.* Hieracio de hojas amplexícaules, entre aovadas al revés y lanceoladas, con dientes vueltos ácia atrás; tallo sencillo; y cálices laxos.

84 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- α** *Hieracium* (Blattarioides) *foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis, floribus solitariis, calycibus laxis.* Spec. plant. 3. p. 1129. Amoen. acad. 1. p. 151. Hieracio (como *Blataria*) de hojas lanceoladas, amplexicaules, con dientes; flores solitarias; y cálices laxos.
- Hieracium Pyrenaicum, Blattariæ folio, minus hirsutum.* Tourn. p. 472. Hieracio de Pirineos, con hoja como la de la *Blataria* y con menos pelo áspero.
- β** *Hieracium pilosum.* Hieracio peloso. **β** *Picris* (Pyrenaica) *perianthiis laxis, caule piloso, foliis dentato-sinuatis.* Spec. plant. 3. p. 1115. Gov. *illustr.* 53. *Picris* (de Pirineos) con los periantios laxos; tallo peloso; y hojas entre dentadas y sinuosas.
- Hieracium Pyrenaicum, Blattariæ folio, minus pilosum.* Herm. parad. 184. t. 184. Hieracio de Pirineos, con hoja como la de la *Blataria* y menos peloso. *El vilano es plumoso y sentado segun Gov. R.*
- χ** *Hieracium Austriacum.* Hieracio de Austria. **χ** *Crepis* (Austriaca) *foliis oblongis denticulatis, involucro laxissimo & calycibus hispidis.* Jacq. vind. 270. t. 5. austr. t. 441. *Crepis* (de Austria) de hojas oblongas, con denticitos; involucro muy laxo; y cálices erizados.
- α** *Hieracium Helveticum.* Hieracio de Suiza. **α** *Hieracium foliis lanceolatis, serratis, hirsutis, calycibus villosis.* Hall. helv. n. 40. Hieracio de hojas lanceoladas, aserradas, con pelo áspero; y cálices vellosos.
- Hieracium* (Conyzæ-folium) *foliis argutè dentatis, radicalibus lanceolato-oblongis acutis, caulinis sagittatis oblongis, pedunculis unifloris, calycibus pilosissimis laxis.* Gov. *illustr.* 59. R. Hieracio (con hoja de *Coniza*) de hojas con dientes agudos; las radicales entre lanceoladas y oblongas, agudas; las del tallo en forma de saeta, oblongas; pedunculos de una flor; cálices muy pelosos y laxos.

Hieracium Britannicum, X Hieracio quarto, de Bre-
quartum. Clus. hist. 2. p. X taña.
151. Gov.

Hieracium alpinum, as- X Hieracio alpino, áspero,
perum, *Conyzæ facie*. C. B. X con traza de Coniza.
P. 128. Tourn. p. 472. X

Se diferencia de la *Picris de Pirineos* (*Hieracio peloso de Linneo*) por los *pedunculos* largos, de una flor, hinchados en su ápice, con pelos negros y que carecen de escamitas vagas; por el *caliz* cubierto por todas partes de pelos negros y apiñado con escamas laxas; y por el *vilano* peloso y sentado. Gov. en el lugar citado. R.

Cast. Hieracio de Pirineos.

Habita en Suiza y Austria: y en los mismos lugares de España que la antecedente. ¶

Es planta que varía mucho y se parece á la *Crepis de Siberia*. Se debe inquirir el modo con que se diferencian de esta especie las variedades α y β propuestas problemáticamente. *Syst. veg.* 598.

Villo-
sum.

25. *HIERACIUM caule* X Hieracio con el tallo ra-
ramoso folioso, *foliis hirtis*, X moso y folioso; hojas con pe-
radicalibus lanceolato-ova- X lo rígido, las radicales entre
tis dentatis, *caulinis am-* X lanceoladas y aovadas, con
plexicaulibus cordatis. Jaq. X dientes, y las del tallo am-
vind. 171. austr. t. 87. X plexicaules y de figura de
corozon.

Hieracium foliis villosis, X Hieracio con hojas vello-
integerrimis, *radicalibus* X sas, enterisimas, las radica-
ligulatis, *caulinis ovatis*, X les en forma de lengüeta, las
amplexicaulibus, *calycibus* X del tallo aovadas, amplexi-
villosis. Hall. helv. n. 44. X caules; y cálices vellosos.

Hieracium alpinum, la- X Hieracio de alpes, vello-
tifolium, *villosum*, *magno* X so, con hoja ancha; y flor
flore. C. B. P. 128. Tourn. X grande.
P. 472.

Hieracium alpinum, la- X Hieracio de alpes, peloso,
tiore folio, *pilosum*, *flore* X con hoja mas ancha; y flor
majore. Pluk. alm. 184. t. X mas grande,
194. f. 2. X

Hie.

86 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Hieracium alpinum V, Hieracio quinto, de alpes,
villosum. Clus. hist. 2. p. y veloso.
 141. Hall. opusc. 146.

α *Pilosella seu Pulmonaria* Pelosilla ó Pulmonaria se-
lutea, angustiori-folio, val- gunda, muy pelosa, con la
de pilosa, duplex. Bauh. flor amarilla; y hoja mas an-
 hist. 2. p. 1034. icon bona. gusta. α
 Hall. R.

β *Hieracium caule unifloro,* Hieracio con el tallo de
foliis lævibus, radicalibus una flor; hojas lisas, las ra-
lingulatis, obiter denta- dicales en forma de lengüet-
zis, caulinis ovato-lanceola- ta, con uno ú otro diente,
zis, amplexicaulibus. Hall. las del tallo entre aovadas y
 emend. 3. n. 254. cat. rar. lanceoladas, y amplexicau-
 n. 972. Helv. n. 44. R. les. β

Cast. Hieracio veloso.

Habita en los alpes de Bohemia, de Suiza y montes de
 Mompeller: en los de Avila, de Leon, Cataluña y en
 los Pirineos de España. 2

Produce el tallo estriado, algo peloso, y con ramas de la
 altura del mismo tallo: las hojas radicales lanceoladas,
 algo anchas, un poco pelosas y con dientes que no
 punzan; las del tallo de figura de corazon, amplexicau-
 les, y que por su base ácia arriba se cierran ó arriman
 entre sí: los pedunculos de una flor, con una bractea del
 caliz mas apartada: el caliz extendido, menos apifinado,
 con las hojuelas casi iguales en su longitud, salpica-
 do de pelos negros en su base, y con una glandula de
 color amarillo-roxo (como toda la planta) en su ápice:
 las semillas negras; con el vilano sentado y de mu-
 chos pelos.

Gluti-
 nosum

26. *HIERACIUM foliis* Hieracio con hojas lan-
lanceolatis runcinatis sca- ceoladas, runcinadas, algo
brusculis, floribus umbel- ásperas; y flores en umbe-
latis. la.

Hieracium Dentis Leo- Hieracio con hoja como
nis folio, floribus parvis. la del Diente de Leon; y
 C. B. P. 127. prodr. 63. To- flores pequeñas.
 urn. p. 470.

Cast.

Cast. Hieracio glutinoso.

Habita en la Francia Narbonense. ☉

Su traza es como la del *Crepis de texados*. Tiene el tallo estriado: las *hojas* blandas, glutinosas, y las de mas arriba lanceoladas y enterisimas.

Kal-
mii.

27. *HIERACIUM caule erecto multifloro, foliis lanceolatis dentatis, pedunculis tomentosis.* Hieracio con el tallo derecho, de muchas flores; hojas lanceoladas, dentadas; y pedunculos tomentosos.

Cast. Hieracio de Kalmio.

Habita en Pensilvania. *Kalm.*

Arroja el tallo derecho, mas angosto que el del *Hieracio de Saboya* y liso: las *hojas* lanceoladas, alternas, casi sentadas, puntiagudas, pequeñas, desnudas, con los dientes de ácia fuera mas agudos que en las demas especies de este género: los *pedunculos* en el remate del tallo alternos, las mas veces sencillos y de una flor, con tomento blanquecino: las *brácticas* mas claras y lineares: y las *flores* pequeñas, terminales y derechas.

Spre-
ngeria-
num.

28. *HIERACIUM caule ramoso folioso, foliis amplexicaulibus oblongis repandis hispidis.* Roy. lugdb. Hieracio con el tallo ramoso y folioso; hojas amplexicaules, oblongas, ondeadas por su margen y erizadas.

123.

Hieracium pulchrum, ramosum, Sprengerianum. Hieracio de Sprenger, hermoso y con ramas.

Bauh. hist. 2. 1026. Moris.

hist. 3. p. 65. sect. 7. t. 5.

f. 7.

Cast. Hieracio de Sprenger. (Dedicado al Doct. Sprenger, Boticario y Botánico muy famoso en Alemania).

Habita en Portugal: en los montes de Burgos, de Asturias y Alcarria. 24

Posee el tallo con pelos claros y algo rígidos: las *ramas* alternas, mas cortas y sencillas: las *hojas* amplexicaules, aovadas, algo obtusas, pestañosas con pelos claros, y por debaxo mas pelosas: muchos *cálices* terminales, con pedunculo y salpicados de pelos.

HIE-

Sabaudum. 29. *HIERACIUM caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus.* Gmel. sib. n. 30. t. 14. Hieracio con el tallo derecho, de muchas flores; hojas entre aovadas y lanceoladas, con dientes, y que abrazan la mitad del tallo.

Hieracium foliis hirsutis, dentatis, inferioribus ellipticis, superioribus ovato-lanceolatis. Hall. helv. n. 35. Hieracio de hojas con pelo áspero, dentadas, las inferiores elípticas, y las superiores entre aovadas y lanceoladas.

Hieracium caule multifloro, folioso, foliis lanceolatis, dentatis, dentibus glandulosis. Scop. carn. 1. p. 391. n. 10. descriptio ed. 2. n. 972. Hieracio con el tallo de muchas flores y folioso; hojas lanceoladas, dentadas; y los dientes glandulosos.

Hieracium virosum. Palas. it. 1. Hieracio hediondo y ponzoñoso.

Hieracium fruticosum, latifolium, hirsutum. C. B. P. 129. Tourn. p. 472. Hieracio fruticoso, de hoja ancha y con pelo áspero.

α *Hieracii Sabaudi varietas* I. Bauh. hist. 2. p. 1030. Hall. R. Primera variedad del Hieracio de Saboya. α

Hieracium Sabaudum, altissimum, foliis latis, brevibus, crebrius nascentibus. Moris. hist. 3. p. 71. Hall. Hieracio de Saboya, muy alto, con hojas anchas, cortas y que nacen mas espesas.

Cast. Hieracio de Saboya.

Habita en Saboya y Alemania: en los montes de Bustarviejo, de la Cartuxa del Paular de Segovia, en los de Avila y otros de España. 24

Sube á la altura de mas de dos pies: tiene las *hojas del tallo* amontonadas: y éste algo roxo.

Umbellatum. 30. *HIERACIUM foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis.* Flor. dan. t. 680. Hort. cliff. 387. Hieracio con hojas lineares, algo dentadas, esparcidas; y flores casi en umbel.

Hieracium fruticosum, *angustifolium*, *majus*. C. B. Hieracio fruticoso, mayor, con hoja angosta.
P. 129. Tourn. p. 472. Dill.
ephem. nat. cur. cent. 5. &
6. app. t. 13. f. 2.

Hieracium Sabaudum. Hieracio de Saboya.
Dalech. hist. 570.

Hieracium foliis penè ovatis, vix dentatis, caule humili, penè unifloro. Hieracio con hojas casi aovadas, apenas dentadas; tallo baxo, y con una ó dos flores. α

Hieracium fruticosum, angustifolium, minus. Dill. Hieracio fruticoso, menor, de hoja angosta.
ephem. nat. cur. V. VI. app. t. 13. f. 1. Vaill. paris. t. 48.
Hall. R.

Hieracium angustissimis, quasi Linariæ foliis, Hieracio con hojas muy angostas, y casi como las de la Linaria, β

Hieracium fruticosum, angustissimum, ineano folio. Hieracio fruticoso, con hoja muy angosta y blanquecina.
Vaill. Petiv. t. 13. Hall. R.

Cast. Hieracio umbelado.

Habita en pastos secos de Europa: en Cataluña y otras partes de España. ʒ

Sube á la misma altura que la antecedente. Echa las *hojas* comunmente aovadas, con uno ú otro diente; y los cálices desparramados.

1096. Género CREPIS. * Hieracioides. Vaill.

A. G. 1721. 47. 52. 13. 17. 18.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun doble:

El exterior cortísimo, extendido y que se cae quando las demas partes de la flor.

El interior aovado, sencillo, asurcado y persistente; con las escamas lineares y arrimadas entre sí.

COR.

90 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

COR. *compuesta* apañada, uniforme; con muchas corolillas hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, ligulada, linear, truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la antera cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* casi aovado: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno: el *caliz* casi redondo hace sus veces.

SEM. oblongas: *vilano* peloso y con *estipite*.

RECEPT. desnudo.

OBS. El vilano en algunas especies se halla sentado ó sin *estipite*. R.

ESPECIES.

- Pyg-
mæa. 1. CREPIS *foliis ovatis* X Crepis con hojas aovadas,
integris villosis petiolatis, X enteras, vellosas, peciola-
caule procumbente. † X das; y tallo tendido.
Hieracium alpinum, in- X Hieracio de alpes, blan-
canum, saxatile, Brunellæ X quecino, saxátil, con hojas
foliis, integris. Bocc. mus. X como las de la Brunela y
2. p. 33. t. 14. Rai. Suppl. X enteras.
p. 142. X

Cast. Crepis enana.

Habita en los alpes de Italia, y en Norsa cerca del Lago de Pilatos.

Govan en sus ilustraciones p. 57. une esta especie con el *Hieracio enano de Linneo*.

- Bursi-
folia. 2. CREPIS *foliis pinna-* X Crepis con hojas hendidas
tifidis crenatis, scapo nudo X al través y recortadas; esca-
paucifloro. X po desnudo y de pocas flo-
X res.

Hieracium Siculum, Bur- X Hieracio de Sicilia, con
sæ Pastoris folio. Bocc. X hoja como la de la Bolsa de
mus. 2. p. 147. t. 106. & X Pastor.
112. Rai. Suppl. p. 142. X

Hieracium minus, Pa- X Hieracio de Palermo, me-
normitanum, Cichorei folio. X nor, con hoja como la de la
Cup. cath. 95. Suppl. p. 3. X Achicoria.

Cast.

Cast. Crepis con hoja de Bolsa de Pastor.

Habita en Sicilia. 24

- Bar-
bata.
3. CREPIS *involucris calyce longioribus, squamis setaceis sparsis.* Hort. ups. 239. Crepis con involucros mas largos que el caliz; y escamas setáceas y esparcidas.
- Hieracium calycibus setis longissimis distantibus patentibus obvallatis.* Hort. cliff. 387. Hieracio con los cálices cercados de cerdas larguissimas, distantes y extendidas.
- Hieracium Bæticum, majus.* Herm. parad. 185. t. 185. Hieracio mayor y de Andalucia.
- Hieracium proliferum, falcatum.* C. B. P. 128. Hieracio prolifero, encorvado.
- Hieracium calyce barbato.* Col. ephr. 2. p. 28. t. 27. Hieracio con el caliz barbado.
- f. 1.

Cast. Crepis barbada.

Habita en lugares arenosos maritimos de Mompeller y de Mecina: en los circuitos de Madrid: en Cataluña, Aragon y en otras muchas partes de España. ☉

Tiene las *hojas* lanceoladas, lampiñas y con algun diente: las *ramitas* mas angostas por su base; y como si una naciese de la otra: el *caliz exterior* mas largo que la corola: las *flores* amarillas; pero en su base de color que tira á purpúreo; y los *flosculos del disco* casi todos de color entre negro y purpúreo: las *semillas* rollizas, coronadas con un ribete pestafioso muy menudo, y de dos cerdas largas y sencillas.

- Vesi-
caria.
4. CREPIS *involucris scariosis longitudine calycis, floribus corymbosis, bracteis ovatis.* Crepis con involucros escariosos, del largo del caliz; flores corimbosas; y bráctas ovadas.

- α *Hieracium montanum*, *rapifolium*. C. B. P. 129. prodr. 65. Tourn. p. 472. Rai. hist. 237. Moris. hist. 3. p. 65. secundum Burs. VI. 70. Hieracio montano, con hoja como la de la Naba. α
- β *Cichorium pratense*, *hirsutum*, *vesicarium*. C. B. P. 126. Achicoria pratense, vexigosa, con pelo áspero. β
- Hieracium Cichoroides*, *vesicarium*. Tourn. p. 471. Hieracio vexigoso, parecido á la Achicoria.
- Cichorium sylvestre*, *vesicarium*, *pratense*. Col. ephr. 1. p. 238. t. 237. Achicoria vexigosa, sylvestre y pratense.

Cast. *Crepis vexigosa*.

Habita en Suiza : y la variedad β en Pulla.

Posee la *raiz* de la variedad α crasa : las *hojas* en forma de lira, anguladas, ásperas y con dientes : el *tallo* corto : las *ramas* largas, desnudas, hendidas en dos ó tres partes y con una flor : las *brácteas* de los *pedunculos* aovadas, solitarias, cóncavas, enteras y palidas : las *flores* amarillas : los *cálices* ceñidos con un involucro de su misma longitud, compuesto de cinco ó seis hojuelas extendidas, aovadas, obtusas, cóncavas, membranosas y palidas. La *planta* de la variedad β se diferencia manifestamente por las *hojas* ; pero las *flores* unen á las dos.

El *Hieracio montano* con *hoja de Naba* de Gaspar Bauhino pertenece á la *Crepis bienne* segun Haller. R.

- Alpina 5. *CREPIS involucris* *scariosis longitudine calycis, floribus solitariis*. *Crepis foliis amplexicaulis, oblongis, acuminatis, inferioribus superne, summis infernè denticulatis*. Pall. it. 2. p. 523. *Crepis* con involucros escariosos, de la longitud del caliz ; y flores solitarias.
- Crepis* con hojas amplexicaules, oblongas, puntiagudas, las inferiores con dientecitos por arriba, y las superiores con dientecitos por abaxo.

Hieracioides annua, En-
diviæ folio , capite magno. Vaill. act. 1721. p. 246. Planta semejante al Hieracio, annua, con hoja como la de la Endivia; y cabezuela grande.

Hieracium alpinum, Scorzonerae folio. Tourn. p. 472. Hieracio de alpes, con hoja como la de la Escorzonera.

Leontodon calyce toto erecto , inferiore squamis siccis , foliis amplexicaulis. Gmel. sib. 2. p. 16. t. 5. Leontodon con el caliz todo derecho , y el inferior formado de escamas secas ; y hojas amplexicaules.

Cast. *Crepis alpina*.

Habita en los alpes de Italia : en los montes de Burgos , de Asturias y en otras partes de España. ○

El caliz es peloso y se halla cefido con las hojuelas del caliz exterior aovadas , lampiñas y áridas.

Rubra. 6. *CREPIS foliis amplexicaulibus lyrato-runcinatis*. Sauv. monsp. 295. *Crepis* con hojas amplexicaules, entre liradas y runcinadas.

Hieracium foliis caulinis sinuatis, calycibus ante florescentiam nutantibus. Hort. cliff. 338. Hieracio con las hojas del tallo sinuosas ; y cálices inclinados antes de florecer.

Hieracium Intybaceum , floribus ex purpura rubentibus. C. B. P. 128. Rai. hist. 231. Hieracio como Endivia , con flores de color que de purpúreo tira á roxo.

Hieracium Dentis Leonis folio, flore suave rubente. C. B. P. 127. Tourn. p. 469. Hieracio con hoja como la del Diente de Leon ; y flor de color roxo delicado.

Cast. *Crepis encarnada*.

Habita en Pulla. ○

Tiene el vilano con estipite , como en la *Crepis alpina* y en la *vexigora* : y el caliz inclinado antes de florecer.

94 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Fœ- 7. *CREPIS foliis runci-* Crepis de hojas entre run-
tida. *nato-pinnatis hirtis, petio-* cinadas y pinnadas, con pe-
lis dentatis. Gou. hort. 414. lo rígido; y peciolo denta-
illustr. 59. dos.
- Crepis foliis scabris, pin-* Crepis de hojas ásperas
natis, pinnis angulosis, den- pinnadas, con las hojuelas
tatis, retroversis, extrema ó lacinias angulosas, denta-
triangulari, maxima. Hall. das, vueltas ácia atrás, y la
helv. n. 29. extrema triangular y muy
grande.
- Hieracium luteum, Ci-* Hieracio con la flor ama-
chorii sylvestris folio, amyg- rilla; hoja como la de la
dalas amaras olens. Moris. Achicoria silvestre y que
hist. 3. p. 63. sect. 7. t. 4. huele á Almendras amargas.
f. 4.
- Hieracium foliis Cicho-* Hieracio con hojas como
rii sylvestris, villosis, odo- las de la Achicoria silvestre,
re Castorii. Magn. monsp. vellosas y de olor parecido
129. t. 128. al del Castór.
- Hieracium Orientale, al-* Hieracio Oriental, muy
tissimum, folio Cichorii syl- alto, con hoja como la de la
vestris, odore Castorii, flo- Achicoria silvestre, de olor
re magno. Tourn. cor. 35. semejante al del Castór; y
flor grande.
- Hieracium maximum, Eru-* Hieracio muy grande, con
ca folio. Tourn. p. 469. hoja como la de la Oruga.
- Hieracium Amygdalas* Hieracio que huele á Al-
amaras olens. Tourn. p. 469. mendras amargas.
- Senecio hirsutus, C. B. P.* Senecio con pelo áspero.
131.
- Erigeron tertium.* Dod. Erigeron tercero.
pempt. 641.
- Hieracium Apulum, flore* Hieracio de Pulla, con la
suave rubente. Col. ecphr. 1. flor de color roxo delicado.
p. 244.
- Chondrilla purpurascens,* Chôndrila fétida, y de co-
fætida. C. B. P. 130. prodr. lor que tira á purpúreo.
68. t. 68.

α *Hieracium foliis pinna-* Hieracio con hojas hendi-
tifidis , hastatis , pedun- das al través y en forma de
culis longissimis nudis . alabarda ; pedunculos lar-
 Gmel. sib. 2. p. 22. t. 8. f. guisimos y desnudos. α
 1. Gov.

Cast. Crepis fétida.

Habita en Alemania , Francia , Suiza y Austria : en los circuitos de Madrid junto al rio Manzanares , en Aragón , Cataluña y otras partes de España. ☉

As- 8. CREPIS foliis denta- Crepis de hojas dentadas,
 pera. tis , inferioribus ovatis au- las inferiores aovadas , con
riculatis , superioribus sa- orejillas , las superiores en
gittatis , caule setis rigidis forma de saeta ; tallo con
sparsis. cerdas rígidas y esparcidas.

Hieracioides Sicula , Ci- Hieracio de Sicilia , con
chorii folio , flore parvo fla- hoja como la de la Achico-
vescente. Vaill. act. 714. ria ; flor pequeña y de color
 amarillo-roxo.

Cast. Crepis áspera.

Habita en Oriente , Sicilia y Palestina.

Posee el tallo desnudo , ramoso y áspero , con cerdas es-
 parcidas , alesnadas , rígidas y extendidas : las flores
 casi cimosas , con piececitos rígidos , muy cortos y alter-
 nos , á excepcion de la ultima : el caliz pequeño , ao-
 vado , con eminencias y pelos rígidos : el exterior mas
 corto , con hojuelas aovadas , membranosas , y que se
 caen quando las demas partes de la flor.

Rha- 9. CREPIS foliis integris Crepis con hojas enteras,
 gadio- amplexicaulibus oblongis , amplexicaules , oblongas ;
 loides. calycibus interioribus toru- cálices interiores erizados ,
loso-articulatis hispidis , fo- articulados con eminencias
liolis cymbiformibus. y sus hojuelas en forma de
 navecilla.

Cast. Crepis como Ragadiolo.

Habita..... ☉

Echa el tallo del largo de medio pie , derecho , estriado ,
 áspero y ramoso : las hojas oblongas , enteras , ample-
 xi-

96 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

xícaules y lisas : los *pedunculos* alargados , ásperos , de una flor y desnudos : el *caliz* calzado ; el *exterior* con muchas hojuelas , lineares , obtusas , la mitad mas cortas que el interior y desiguales en su insercion ; el *interior* con eminencias , cortado en trece partes paralelas , de las quales cada una es en forma de navecilla , comprimida , y erizada en su dorso con agujoncillos ahorquillados : la *corola* amarilla y por defuera purpúrea : y todas las *semillas* con el vilano plumoso.

Sibi-
rica.

10. CREPIS *foliis amplexicaulibus oblongis rugosis inferne dentatis , caule hirsuto , calycibus carina ciliatis*. Gou. illustr. p. 60.

Crepis foliis ovatis denticulatis , petiolis alatis amplexicaulibus dentatis. Hort. ups. 239.

Hieracium foliis amplexicaulibus , serratis , glabris , imis aristatis , calycibus villosis. Hall. helv. n. 39.

Hieracium caule ramoso , foliis firmis , infimis petiolatis , reliquis ex ovato lanceolatis , omnibus sinuosis , petiolorum instar denticulatis. Gmel. sib. 2. p. 26. t. 10.

Hieracium magnum , Hispanicum. Pluk. alm. 184. t. 116. f. 1. bona.

Crepis de hojas que abrazan el tallo, oblongas, rugosas, y por debaxo dentadas; tallo con pelo áspero ; y cálices pestañosos en su quilla.

Crepis de hojas aovadas, con dientecitos ; peciolo alados, amplexicaules y dentados.

Hieracio de hojas amplexicaules , aserradas , lampiñas , las de abaxo terminadas en arista ; y cálices vellosos.

Hieracio con el tallo ramoso ; y hojas firmes , las de abaxo pecioladas , las restantes entre aovadas y lanceoladas , todas sinuosas y con dientes á manera de piececitos.

Hieracio grande, de España.

Cast. Crepis de Siberia.

Habita en los montes alpinos de Siberia : y en los pirineos de Cataluña y Aragon. 24

Produce el tallo yerto , del largo de dos pies , estriado y con pelos rígidos : las *hojas* entre lanceoladas y aovadas , rugosas , con venas , casi runcinadas , con mas dientes

tes ácia su base y ásperas por debaxo en sus nervios: las inferiores con los peciolos alados y dentados: los pedunculos de una flor, sin hojuelas, apretados, rígidos y mas crasos ácia la flor: y las semillas de color que tira á purpúreo obscuro.

Vease el *Hieracio pirenaico*.

El Doctor Govan une á esta especie con las variedades α y χ del *Hieracio pirenaico*.

Tecto-
rum.

11. *CREPIS foliis lanceolato-runcinatis sessilibus lævibus, inferioribus dentatis*. Oed. dan. 501. Gmel. sib. 2. p. 28. t. 11. & 12. Leers. herb. n. 60. Crepis con hojas entre lanceoladas y runcinadas, sin peciolo, lisas, y las inferiores con dientes.

Crepis foliis radicalibus pinnatis, superne amplexicaulibus, pinnatis, hastatis. Hall. helv. n. 31. Crepis con las hojas radicales pinnadas, las de arriba que abrazan el tallo, pinnadas y en forma de alabarda.

Hieracium foliis radicalibus pinnato-dentatis, caulinis lanceolatis subdentulatis. Hort. cliff. 387. Hieracio con las hojas radicales entre pinnadas y dentadas, las del tallo lanceoladas y con algun dientecito.

Hieracium Chondrillæ folio, glabrum vel hirtum. C. B. P. 127. Tourn. p. 470. Hieracio lampiño ó con pelo áspero, y con hoja como la de la Chóndrila.

Hieracium secundum. Ta-bern. hist. 491. benè. Hieracio segundo.

Hieracioides vulgarissima, penè glabra, annua, folio longo, dentato. Vaill. act. 1718. Planta muy vulgar como Hieracio, casi lampiña, annua, con hoja larga y dentada.

Cichorium pratense, luteum, lævius. C. B. P. 126. Achicoria pratense, mas lisa, con flor amarilla.

Cast. Crepis de texados.

Habita en los texados y lugares áridos de Europa: en Cataluña y otras partes de España. 24

Es planta muy vulgar, y de color entre ceniciento y verde. Produce el tallo entre anguloso y asurcado; con

ramas de su misma longitud : las *hojas radicales* como las del *Leontodon Taraxáco* : las del *tallo* como las del *Leontodon de otoño* con los dientecitos de la base levantados y mas largos ; las *de las ramas* lineares , casi en forma de saeta y redobladas por sus márgenes: las *flores* siempre derechas y parecidas á las de la *Lapsana* : y los *estilos* con las *anteras* de color obscuro: el *caliz* calzado, asurcado y salpicado longitudinalmente de pelos glutinosos.

Tiene el *vilano* sin estipite. *Leers en el lugar citado.*
La figura que trae *Gmelino sib. 11. t. 6. quadra* mas bien que las de las tablas 11 y 12. R.

Bien-
nis.

12. CREPIS *foliis runcinato-pinnatifidis scabris, basi supernè dentatis, calycibus muricatis.* Flor.suec. 2. n. 706. Crepis con hojas entre runcinadas y hendidas al traves, ásperas, dentadas por arriba de su base ; y cálices con puntitas rígidas.

Crepis foliis subscabris, semipinnatis, pinna extrema maxima. Hall. helv. n. 30. Crepis de hojas algo ásperas, medio pinnadas, con la hojuela ó lacinia extrema muy grande.

Crepis Scanensis. It.scan. 171. Crepis de Scania.

Hieracium maximum, Chondrillæ folio, asperum. C. B. P. 127. Prodr. 64. Tournef. p. 470. Hieracio muy grande y áspero, con hoja como la de la Chondrila.

Hieracium Erucae folio, hirsutum. Bauh. hist. 2. p. 1025. benè. Tourn. p. 469. Hieracio con pelo áspero, y hoja como la de la Oruga.

Hieracioides altissima, annua, Chondrillæ folio, flore utrinque luteo. Vaill. aët. 1718. Planta parecida al Hieracio, muy alta, annua, con hoja como la de la Chondrila; y flor amatilla en ambas partes.

Cast. Crepis bienne.

Habita en los prados de Scania y de la Europa mas austral. ♂

Tiene el *caliz* calzado, asurcado y erizado longitudinalmente con agujoncillos blandos : todas las *hojas* entre
li-

liradas y pinnadas , con pelos rígidos por debaxo : el tallo anguloso , fragil , áspero y casi de la altura de un hombre , ó de quatro pies.

- Vi- 13. *CREPIS foliis runci-* Crepis con hojas runcina-
rens. *natis glabris amplexicauli-* das , lampiñas , amplexicau-
bus , calycibus subtomento- les ; y cálices algo tomento-
sis. Gou. illustr. 61. sos.
- Crepis caule ramosissimo,* Crepis con el tallo muy
foliis glaberrimis , teneris, ramoso ; hojas muy lampiñas ;
integris & dentatis. Hall. tiernas , enteras y dentadas.
helv. n. 33.
- Lapsana capillaris.* Spec. Lapsana capilar.
plant. 1. p. 812.
- Hieracium minus , gla-* Hieracio menor , lampiño,
brum , foliis eleganter vi- y con hojas de color verde
rentibus. C. B. P. 127. pro- hermoso.
dr. 63. Tourn. p. 470.
- Hieracium minus , Dios-* Hieracio menor , de Dios-
coridis. Tabern. ic. 181. Hall. corides.
- α *Hieracium Dentis Leonis* Hieracio de hoja como la
folio , hirsutum , flore luteo, del Diente de Leon , con pe-
extus purpurascens. Tourn. lo áspero ; flor amarilla , y
paris. 99. por debaxo de color que tira
á purpúreo. α

Cast. Crepis verdosa.

Habita entre los sembrados de Suiza é Italia : en los circuitos y huertas de Madrid , en Cataluña , Aragon y en otras partes de España. ☉

Echa las *hojas radicales* lanceoladas , obtusas , lampiñas y con algun diente ; las del *tallo* lanceoladas , en forma de alabarda , casi amplexicaules , enterisimas , agudas y pequeñas : los *tallos* derechos , filiformes y casi ahorquiliados : las *flores* pequeñas y amarillas ; y los *calices* solos tomentosos. Acaso es variedad de la precedente ?

Govan une á esta especie con la siguiente.

Dios-
cori-
dis.

14. *CREPIS foliis radi-
calibus runcinatis, caulinis
hastatis, calycibus subto-
mentosis.* Pall. it. 2. p. 523.

Hieracioides vulgaris,
annua, *Cichorii folio*, flore
luteo, subtus purpurascen-
te. Vaill. act. 715. paris. 102.

Hieracium majus, erec-
tum, angustifolium, caule
lævi. C. B. P. 127. Tourn.
p. 469.

Hieracium majus, Dios-
coridis. Tabern. ic. 180. hist.
491.

Crepis con las hojas radi-
cales runcinadas, las del ta-
llo en forma de alabarda; y
los cálices algo tomentosos.
Planta vulgar, como Hie-
racio, annua, con hoja co-
mo la de la Achicoria; flor
amarilla, y por debaxo de
color que tira á purpúreo.

Hieracio mayor, derecho,
de hoja angosta; y tallo li-
so.

Hieracio mayor, de Dios-
corides.

Cast. Crepis de Dioscorides.

Habita en Francia y Siberia. ☉

Arroja el tallo del largo de un pie, casi anguloso y algo
liso; con las ramas mas claras, rollizas y extendidas:
las hojas radicales entre liradas y dentadas, desnudas,
lampiñas, con dientecitos y algo pestañosas: las del
tallo amplexicaules, en forma de alabarda, entre linea-
res y lanceoladas, con una mancha de color purpúreo
en el disco inferior, y por su base con orejillas muy
dentadas: las de las ramas lineares y con un diente en
su base: los pedunculos largos, desnudos, ascendentes,
de una flor y algo incrassados por su ápice: los cálices
harinosos, sin estar inclinados antes de florecer y el ex-
terior linear: la corola de color amarillo-roxo antes de
abrirse y que por debaxo tira á color purpúreo.

Pul-
chra.

15. *CREPIS foliis sagit-
tatis denticulatis, caule pa-
niculato, calycibus pyrami-
datis glabris.*

Crepis foliis sagittatis,
dentatis, pedunculis super-
ne turbinato-inflatis. Guett.
stamp. 378.

Crepis de hojas en forma
de saeta, con dientecitos;
tallo en panoja; cálices pi-
ramidales y lampiños.

Crepis con hojas en for-
ma de saeta, dentadas; y
pedunculos por arriba entre
cónicos inversos é inflados.

Chon-

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 101

Chondrilla Hieracii folio, Chôndrila annua, con ho-
annua. Tourn. p. 475. ja como la del Hieracio.

Hieracium pulchrum. Hieracio hermoso.

Bauh. hist. 2. p. 1024.

Hieracioides annua, glu- Planta parecida al Hiera-
tinosa, floribus parvis. Vaill. cio, annua, glutinosa y con
act. 1721. flores pequeñas.

α *Lapsana Chondrilloides*, Lapsana como Chôndrila,
calycibus pyramidatis, se- con los cálices piramidales;
minibus papposis, foliis semillas con pelusa; hojas
oblongis subdentatis sca- oblongas, con algun diente
bris. Hort. ups. 245. y ásperas. α

Hieracium montanum, Otro Hieracio montano,
alterum, leptomacrocaulon. con el tallo delgado y lar-
Col. ecphr. 1. p. 248. t. 249. go.

Rai. hist. 234.

Hieracium annuum, mon- Hieracio annuo, monta-
tanum, caule canaliculato. no, con el tallo acanalado.

Moris. hist. 3. p. 68. sect. 7.
t. 5. f. 37.

Cast. Crepis hermosa.

Habita en Francia é Italia. ○

Tiene el caliz liso, angosto, angulado, y calzado con es-
camas muy menudas y verdes.

Ne- 16. CREPIS *foliis am-* Crepis de hojas amplexi-
glecta. *plexicaulibus runcinatis* caules, runcinadas, con
dentatis subpilis, caule dientes y algo pelosas; tallo
paniculato, calycibus iner- en panoja; y cálices con al-
mi-subspinosis. guna espina que no punza.

Cast. Crepis despreciada.

Habita en Italia. ○

Produce el tallo del largo de un pie, ramoso, con algu-
nos pelos y derecho: las *hojas radicales* entre aovadas
al revés y oblongas, dentadas y algo pelosas; las *del*
tallo amplexicaules, runcinadas, algo pelosas y con
dientes alargados tambien en su base; y las *de mas ar-*
riba casi en forma de alabarda: las *ramas floriferas*
alargadas, desnudas, lisas, con dos flores en su ápice ó
hendidadas en dos partes: el *caliz exterior* muy corto,
agu-

102 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

agudo; y el *interior* con ocho ó diez hojuelas, señaladas en medio con una ú otra espina que no punza. Conviene con la *Crepis hermosa*, en la magnitud, y pequeñez de sus flores,

1097. Género ANDRYALA. * Eriophorus, Vaill.

A. G. 1721. 20.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun dividido en muchas partes, corto, redondeado y vellosos; con muchas *escamas* casi iguales y alesnadas.

COR. compuesta apiciada, uniforme; con numerosas corollas hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, ligulada, linear, truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la antera cilíndrica y tubulosa.

PIST. Germen aovado: estilo filiforme, del largo de los estambres: con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno: el caliz cerrado y globoso hace sus veces.

SEM. aovadas: vilano peloso y de la longitud del caliz.

RECEPT. vellosos, y algo plano.

ESPECIES.

Inter-grifolia

1. ANDRYALA *foliis inferioribus runcinatis, superioribus ovato-oblongis, tomentosis.* Gov. monsp. 415. Andriala con las hojas inferiores runcinadas, las superiores entre aovadas y oblongas, y tomentosas.

Sonchus villosus, luteus, major. C. B. P. 124. Cerraja mayor, vellosa y con la flor amarilla.

Hieracium villosum, Sonchus lanatus Dalechamptum. Rai. hist. 231. To-champio. Hieracio vellosos, llamado Cerraja lanuda por Dalechamptum.

urn. p. 470.

* *Andryala (sinuata) foliis runcinatis.* Spec. pl. ed. 3. p. 1137. Andriala (*sinuosa*) con las hojas runcinadas. *

An-

Andryala foliis inferioribus dentatis, summis integris. Hort. cliff. 387. Andriala con las hojas inferiores dentadas, y las de mas arriba enteras.

Eriophorus foliis inferioribus ad costam usque laciniatis. Vaill. act. 1721. p. 212. Eriophoro con las hojas inferiores laciniadas hasta su lomo.

Sonchus villosus, luteus, minor. C. B. P. 124. prodr. 61. Cerraja menor, vellosa, y con flor amarilla.

Cast. Andriala de hoja entera.

Habita en Mompeller y en Sicilia; en los circuitos de Madrid; en Aragon, Cataluña y en otras muchas partes de España. ☉

Ragusa. 2. *ANDRYALA foliis lanceolatis indivisis denticulatis acutis tomentosis, floribus solitariis.* Andriala de hojas lanceoladas, indivisas, con denticitos, agudas, tomentosas; y flores solitarias.

Hieracium incanum, lanuginosum, Ragusinum, Pilosellæ flore. Herm. lugdb. 672. t. 663. Mill. ic. 97. t. 146. f. 2. Hieracio de Ragusa, blanquecino, lanuginoso; y con la flor como la de la Pelosilla.

Cast. Andriala de Ragusa.

Habita en las islas del Archipielago. 24

Tiene las hojas mas apretadas y rígidas, mas agudas y con los dientes mas afilados que en las otras especies.

La-nata. 3. *ANDRYALA foliis oblongo-ovatis subdentatis lanatis, pedunculis ramosis.* Amœn. acad. 4. p. 288. Andriala de hojas entre oblongas y aovadas, con algun diente, lanudas; y pedunculos ramosos.

Hieracium foliis ovatis, crassis, lanatis. Hall. helv. n. 37. Hieracio con hojas aovadas, crasas y lanudas.

Hieracium montanum, tomentosum. Dill. elth. 181. t. 150. f. 180. Mill. ic. 97. t. 146. f. 1. Hieracio montano, tomentoso.

Cast.

104 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Andriala lanuda.

Habita en la Europa austral. 24

Es *planta* toda blanca; y tiene comunmente el *receptaculo* sin pelillos. *Gmel. it. 1. p. 138.*

1098. Género HYOSERIS. * Taraxaconastrum. *Vaill.*

A. G. 1721. 45. 31. 32. 24. Leontodontoides. Mich.

gen. 28. Hedypnois. Tourn. t. 271. Rhagadioloides.

Vaill. A. G. 1721. 29. 30.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* de diez hojuelas ó escamas lanceoladas . derechos , iguales; y calzado por su base con escamas muy cortas.

Propio encima del germen , dividido en cinco partes, cortísimo , agudo , persistente y que está en el lugar del vilano.

COR. *compuesta* algo apiñada y uniforme ; con corolillas hermafroditas dispuestas en uno ó dos cercos.

Propia de un petalo , ligulada , linear , truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. *Filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la antera cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* algo oblongo : *estilo* filiforme , del largo de los estambres : con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno : el *caliz comun* recto hace sus veces.

SEM. algo oblongas , comprimidas y del largo del caliz : con el *vilano* peloso y calzado con el caliz propio.

RECEPT. desnudo.

OBS. El Taraxâconastro de *Vaill.* tiene las semillas de afuera con el calicito propio de tres dientes ; las del medio coronadas con pelillos y con el calicito propio hendido en cinco partes ; y las intermedias con pelillos solamente.

El Leontodontoide de *Mich.* posee las semillas casi desnudas.

El Hedypnoe de *Tourn.* echa las semillas de las márgenes cubiertas con las escamas del caliz comun ; y las del

del centro coronadas con el caliz propio de cinco dientes.

El Ragadioloide de Vaill. posee las semillas encorvadas, y con una corona pajosa.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

HEDYPNOIS. p. 478.

La flor es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos, sentados en el embrión y comprendidos en el caliz; el qual pasa á fruto casi en forma de melon, lleno de semillas semejantes entre sí; aunque las unas adornadas como de una cabezuela (*es el vilano*) y que ocupan el centro de la flor; y las otras puestas en la circunferencia, terminadas en forma de ombligo y envueltas con una capsula ú hojuela del caliz.

ESPECIES CON EL TALLO DESNUDO Ó SIN HOJAS.

Fos-
tida.

1. *HYOSERIS scapis simplicissimis unifloris, foliis pinnatifidis, seminibus nudis.* Gou. hort. 415.

Lapsana caule nudo, indiviso, foliis semipinnatis, pinnis retroversis dentatis. Hall. helv. n. 5.

Taraxaconastrum Dentis Leonis folio, radicæ fætida. Vaill. 1721. p. 180.

Lentodontoides alpinus, glaber, Erysimi folio, radice crassa, fætida. Mich. gen. 31. t. 28.

Dens Leonis tenuissimo folio. C. B. P. 126. Prodr. 62. Tourn. p. 468.

Hieracium fætidum, ter- rium. Col. ecphr. 2. p. 29. t. 31.

Hioseris con los escapos muy sencillos, de una flor; hojas hendidas al través; y semillas sin vilano.

Lapsana con el tallo desnudo, indiviso; hojas medio pinnadas, y sus hojuelas ó lacinias vueltas ácia atrás y dentadas.

Taraxáco silvestre, con hoja como la del Diente de Leon; y raíz fétida.

Planta parecida al Leontodon, alpina, lampiña, con hoja como la del Erisimo; raíz crasa y fétida.

Diente de Leon con hoja muy delgada.

Hieracio tercero, fétido.

Cast.

106 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Hioseris fétida.

Habita en los alpes de Italia y de la Austria superior : en los circuitos de Madrid y en otras partes de España. 24

Tiene las *hojas* hendidas al través , lampiñas ; con sus *lacinias* ó *lóbulos* casi dentados por el lado de abaxo : los *escapos* sencillos y desnudos : el *caliz* tambien sencillos ; pero caizado en su base : y las *semillas* desnudas.

Ra-
diata. 2. HYOSERIS scapis uni-
floris nudis , foliis glabris
runcinatis , angulis denta-
tis , apice laciniatis.

Hioseris con los escapos
de una flor , desnudos ; hojas
lampiñas , runcinadas , con
sus ángulos dentados, y laci-
niadas por su ápice.

Hyoseris foliis glabris,
hastato-pinnatis. Roy. lug-
db. 127.

Hioseris con hojas lampi-
ñas , y entre de figura de
alabarda y pinnadas.

Taraxaconastrum Dentis
Leonis folio, ad summitatem
radiato. Vaill. act. 703.

Taraxáco silvestre , con
hoja como la del Diente de
Leon , y radiada en su ex-
tremidad.

Dens Leonis minor , fo-
liis radiatis. C. B. P. 126.
prodr. 62. Pluk. alm. 130.
t. 37. f. 2. Tourn. p. 468.

Diente de Leon , menor,
con hojas radiadas.

Cast. Hioseris radiada.

Habita en la Francia Narbonense : en Asturias , Alcarria
y otras partes de España. 24

Posee el *pedunculo* y *rachis* ó *lomo* de las *hojas* salpicados
de *harina* : los *lóbulos* de las *mismas* *hojas* puestos unos
encima de parte de otros , lisos , redoblados y con dien-
tes en ambas partes : las *semillas* membranosas ; con
el *vilano* sencillo y sin estipite.

Lu-
cida. 3. HYOSERIS scapis uni-
floris , foliis subcarnosis
runcinatis angulatis denta-
tis. Jacq. hort. t. 150.

Hioseris con escapos de
una flor ; hojas algo carno-
sas , runcinadas , anguladas
y con dientes.

Dens Leonis Græcus , fo-
liis Erysimi, crassis & suc-
culentis. Tourn. cor. 35.

Diente de Leon de Gre-
cia , con hojas como las del
Erisimo , crasas y xugosas.

Cast.

Cast. *Hioseris lustrorsa*.

Habita en Oriente. Forsk. 24

Es muy semejante á la precedente ; pero tiene las *hojas* mas crasas , algo carnosas , lustrosas y con dientes mas cortos : los *escapos* de color que tira á purpúreo y mas largos que las hojas : el *caliz* angulado : y las *semillas de la margen* casi sin vilano. Abre las *flores* antes de medio día.

4. *HYOSERIS scapis uni-floris , foliis scabris , seminibus papposis.* Hort. cliff. 386. *Hioseris* con los *escapos* de una flor ; hojas ásperas ; y semillas con pelusa.

Taraxaconastrum Erysimi folio , flore minimo. Vaill. act. 1721. p. 235. *Taraxáco* silvestre , con hoja como la del *Erisimo* ; y flor muy pequeña.

Hieracium minimum , subpinum , Tragopogoni capitulis. Bocc. mus. 2. p. 146. t. 106. *Hieracio* muy pequeño , echado , y con cabezuelas como las del *Tragopogon*.

Cast. *Hioseris áspera*.

Habita en Sicilia.

Produce las *hojas* casi en forma de lira , desnudas , un poco ásperas , opácas , algo pestafiosas ; con sus *lacinias* casi alternas , algo dentadas , y la extrema entre hendida en tres lóbulos y angulada : los *escapos* lisos y salpicados de harina transparente , fistulosos , incrasados por arriba é inclinados á un lado : el *caliz* oblongo , apretado , de seis ángulos , y con seis hojuelas , pocas ó menos , lanceoladas , algo aquilladas é iguales ; con otras tantas por defuera que cubren la base del mismo *caliz* : las *semillas* coronadas con un ribete áspero y con el vilano en forma de aristas.

5. *HYOSERIS scapis uni-floris , foliis lanceolatis lyratis glabris.* Gron. virg. 60. *Hioseris* con *escapos* de una flor ; hojas lanceoladas , en forma de lira y lampifias.

Cast. *Hioseris* de Virginia.

Habita en la Virginia.

Echa las primeras *hojas radicales* aovadas , alguna vez lan-

108 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

lanceoladas , y ultimamente en forma de lira , agudas y lampiñas: los *escapos* desnudos, de una flor, y tres veces mas largos que las hojas: los *cálices* muy sencillos y de diez hojuelas lanceoladas: la *corola* de color amarillo subido: las *semillas* de quatro lados, coronadas con un ribete membranoso y entero , y con tres ó quatro cerdas largas.

Mi-
nima.

6. HYOSERIS caule di-
viso nudo , pedunculis in-
crassatis . Hort. cliff. 386.
Flor. dan. t. 201.

Hioseris con el tallo divi-
dido , desnudo ; y peduncu-
los incrassados.

Hyoseris angustifolia .
Tabern. ic. 180.

Hioseris con hoja angos-
ta.

Lapsana foliis ovatis ,
dentatis , caulibus nudis ,
sub flore tumentibus . Hall.
helv. n. 4.

Lapsana de hojas aovadas,
con dientes ; tallos sin hojas
é inchados debaxo de la flor.

Hieracium minus , Den-
tis Leonis folio , oblongo ,
glabro . C. B. P. 127. Tourin.
p. 470.

Hieracio menor , con hoja
como la del Diente de Leon,
oblonga y lampiña.

Hieracium minimum .
Clus. hist. 2. p. 142.

Hieracio muy pequeño.

Cast. Hioseris muy pequeña.

Habita en lugares abrigados de Europa : en Aragon , Ca-
taluña y otras partes de España.

ESPECIES CON EL TALLO FOLIOSO.

Hedyp-
nois.

7. HYOSERIS fructibus
ovatis glabris , caule ramo-
so.

Hioseris con los frutos ao-
vados , lampiños ; y tallo ra-
moso.

Lapsana calycibus fruc-
tibus capitatis debiscentibus ,
pedunculis incrassatis , flo-
ribus nutantibus . Hort. cliff.
387.

Lapsana con los cálices
del fruto en cabezuela y que
se abren ; pedunculos incre-
sados ; y flores inclinadas.

Rhagadioloides Calthæ folio, calyce glabro. Vaill. act. 1721. p. 202. Planta parecida al Ragadiolo, con hoja como la de la Calendula; y caliz lampiño.

Hieracium capitulum inclinans, semine adunco. C. B. P. 128. Hieracio que inclina la cabezuela y con la semilla ganchosa.

Hieracium facie Hedypnois. Lob. ic. 239. Hieracio con traza de Hedipnoe.

Hedypnois annua. Tourn. p. 478. Hedipnoe annua.

Cast. Hioseris Hedipnoe.

Habita en la Europa austral: en los circuitos de Madrid, en Cataluña, y es comun en las mas provincias de España. ☉

Tiene los *pedunculos* increasados por arriba; y varía con el tallo muy sencillo, desnudo, y con las hojas lanceoladas, enteras ó hendidas al través.

Rhagadioloides. 8. HYOSERIS *fructibus ovatis pilosis*, caule ramoso. Kniph. cent. 5. n. 44. Hioseris con los frutos ovoides, pelosos; y el tallo ramoso.

Lapsana fructibus globosis pilosis, seminibus disciculato-pupposis. Hort. ups. 246. Lapsana con los frutos globosos, pelosos; y las semillas del disco con vilano calzado.

Cast. Hioseris como Ragadiolo.

Habita en la Europa austral: en Aragon, Cataluña y otras partes de España. ☉

Tiene las *hojas* entre sinuosas y dentadas, con pelo rígido y lanceoladas: los *tallos* y *cálices* ásperos y tambien con pelos rígidos: las *semillas* encorvadas y con aristas. *Synopsis plant. Aragon.* 112.

Cretica. 9. HYOSERIS *fructibus ovatis scabris*, caule ramoso. Kniph. cent. 11. n. 59. Hioseris con los frutos ovoides, ásperos; y tallo ramoso.

110 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Lapsana fructibus ovatis X *Lapsana* con los frutos aovados, ásperos; y semillas
scabris, seminibus disci caliculato-papposis. Hort. ups. del disco con vilano calza-
 246. do.

Cast. Hioseris de Creta.

Habita en Creta.

1099. Género SERIOLA. * *Achyrophorus. Vaill.*

A. G. 1721. f. 28. 13. 21. 18.

CAR. GEN. NAT.

CAL. común sencillo, con hojuelas lineares, casi iguales y derechas.

COR. compuesta apiñada y uniforme; con numerosas corollas hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, ligulada, linear, truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la antera cilíndrica y tubulosa.

PIST. Germen aovado: estilo filiforme, del largo de los estambres: con dos estigmas redoblados.

PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas, del largo del caliz: vilano con estipite, peloso, de diez radios y pelosos por sus lados.

RECEPT. pajoso y del largo del caliz.

ESPECIES.

Levi-
gata.

1. SERIOLA *leviuscula*, X
foliis obovatis dentatis.

Seriola algo lisa, con ho-
 jas aovadas al revés y den-
 tadas.

Achyrophorus fere gla- X
ber, Bellidis glauco denta- X
toquefolio. Vaill. act. 1721. X
 p. 278.

Achyrophoro ó sea plan-
 ta que lleva pajas, casi lam-
 piña, con hoja como la de la
 Margarita y dentada.

Hieracium ramosum, floribus amplis, calycibus valde hirsutis, foliis oblongis, obtusis, dentibus majoribus, inæqualibus, incis. Rai. Suppl. p. 144. Hieracio ramoso, de flores anchas; cálices con mucho pelo áspero; hojas oblongas, obtusas, con los dientes mayores, desiguales y cortados.

Cast. Seriola alisada.

Habita en Creta. ☉

Æt-nensis 2. SERIOLA hispida, foliis obovatis subdentatis. Jacq. obs. 4. p. 3. t. 79. Seriola erizada, con hojas aovadas al revés y algo dentadas.

Hypochæris calycibus æqualibus hispidis. Hort. cliff. 385. Hipochêris con los cálices iguales y erizados.

Achyrophorus hirsutus, *Bellidis obtuso folio*. Vaill. aët. 739. Achyrophoro ó planta que lleva pajas, con pelo áspero; hoja como la de la Margarita y obtusa.

Cast. Seriola del Etna.

Habita en Italia. ☉

Cre-tensis. 3. SERIOLA hirta, foliis runcinatis. Seriola con pelo rígido y hojas runcinadas.

Achyrophorus hirsutus, *Dentis Leonis folio, læviter dentato*. Vaill. aët. 740. Achyrophoro ó planta que lleva pajas, con pelo áspero; hoja como la del Diente de Leon, y dientes lisos.

Cast. Seriola de Creta.

Habita en Creta.

Urens. 4. SERIOLA urens, caule ramoso, foliis dentatis. Seriola que abrasa ó causa escozor, con el tallo ramoso; y hojas dentadas.

Hypochæris foliis dentatis, *caule ramoso folioso*, *calycibus hispidis*. Sp. pl. 1. p. 810. Hipochêris con hojas dentadas; tallo ramoso, folioso; y cálices erizados.

112 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Hieracium alpinum, Den-
ris Leonis folio, *acuto*, *pi-*
loso, *proscisso*, *capitulis pun-*
genti lanugine obsitis. Cu-
 pan. cath. 95. Rai. Suppl.
 p. 146.

Hieracio alpino, con hoja como la del Diente de Leon, aguda, pelosa, muy hendida ó lacerada por debaxo; y cabezuelas cercadas de pelusa que punza.

Cast. Seriola que abrasa.

Habita en Sicilia.

Tiene las escamas del caliz ásperas, y con espinitas que punzan y causan escozor.

1100. Género HYPOCHÆRIS. * Vaill.

A. G. 1721. 28. 21.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun casi redondo, apiñado y por su base ventricoso; con escamas lanceoladas y agudas.

COR. compuesta apiñada y uniforme; con numerosas corollas hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, ligulada, linear, truncada y con cinco dientes.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortisimos: con la antera cilindrica y tubulosa.

PIST. Germen aovado: estilo filiforme, del largo de los estambres: con dos estigmas redoblados.

PERIC. ninguno: el caliz cerrado, globoso y puntiagudo hace sus veces.

SEM. oblongas: vilano con estipite y plumoso.

RECEPT. con pajas entre lanceoladas y lineares, y del largo de las semillas.

OBS. Las semillas del disco de la Hypochæris lampiña tienen el vilano con estipite; y las del radio sin el.

Hall. R.

E S P E C I E S.

Mon-
 tana.

1. HYPOCHÆRIS caule
simplici folioso unifloro, fo-
liis lanceolatis dentatis,

Hypochæris con el tallo sencillo, folioso, de una flor; hojas lanceoladas y dentadas.

Hie-

Hieracium caule unifloro, Hieracio con el tallo de una flor; hojas del tallo entre aovadas y lanceoladas, *foliis caulinis ovato-lanceolatis*, *dentatis*, *amplexicaulis*, *caulibus*. Hall. helv. 38. con dientes y amplexicaules.

Hieracium montanum, Hieracio montano.

Jacq. austr. t. 190.

Hypochæris non ramosa, Hypochæris sin ramas, con hoja como la de la Endivia, *Endiviæ folio*, *prælongo*, muy larga; y con una sola flor. *monanthos*. Vaill. aët. 1721. p. 215.

Hieracium latifolium, Hieracio montano, muy alto, lampiño, con hoja como la de la Endivia y ancha. *montanum*, *præaltum*, *glabrum*, *Endiviæ folio*. Bocc. mus. 2. p. 148. t. 113. Rai. Suppl. p. 142.

Cast. Hypochæris montana.

Habita en los montes de Saboya.

Maculata.

2. HYPOCHÆRIS *caule subnudo ramoso solitario*, si desnudo, ramoso, solitario; *foliis ovato-oblongis intergrais dentatis*. Hort. cliff. 385. hojas entre aovadas y oblongas, enteras y dentadas. Flor. dan. t. 149.

Hypochæris hirsuta, En Endiviæ folio, magno flore. Vaill. aët. 1721. p. 385. Hypochæris con pelo áspero; hoja como la de la Endivia; y flor grande. Flor. lapp. 288.

Hypochæris caule unifloro, *foliis dentatis*, *hirsutis*. Hall. helv. 2. n. 2. t. 1. Hieracio con el tallo de una flor; hojas dentadas y con pelo áspero.

Hieracium alpinum, *latifolium*, *hirsutie incanum*, ancha, con pelo áspero blanquecino; y flor grande. *flore magno*. C. B. P. 128. Tourn. p. 472.

Hieracium latifolium, *primum*. Clus. hist. 2. p. 139. Hieracio primero, de hoja ancha.

Hieracium alpinum, *foliis dentatis*, *flore magno*. C. B. P. 128. prodr. 65. Hieracio alpino, con hojas dentadas; y flor grande. Hall. helv. 1. p. 760. t. 24.

114 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Dens Leonis foliis integris, caule raris foliis vestito, monanthos ferè. Rai. hist. 244. Diente de Leon con hojas enteras; tallo adornado de hojas claras; y casi con una sola flor.

Cast. Hypochêris manchada.

Habita en prados ásperos de la Europa mas fria; en los Pirineos de Cataluña y Aragon: en los montes de Burgos, de Leon, de Avila y en otras muchas partes de España. 24

Tiene las semillas rugosas: y varía con las hojas hendidas al través.

Glabra 3. *HYPOCHÆRIS glabra, calycibus oblongis imbricatis, caule ramoso nudo, foliis dentato-sinuatis.* Hort. cliff. 386. Flor. dan. t. 424. Hypochêris lampiña, con los cálices oblongos, apañados; tallo ramoso, desnudo; y hojas entre dentadas y sinuosas.

Hypochæris foliis glabris, semipinnatis. Hall. helv. n. 3. Goëtt. p. 421. Hypochêris con hojas lampiñas y medio pinnadas ó hendidas al través.

Hieracium minus, Dens Leonis folio, oblongo, glabro. C. B. P. 127. Tourn. p. 470. Hieracio menor, con hoja como la del Diente de Leon, oblonga y lampiña.

Hypochæris Porsellia. Tabern. ic. 179. Hypochêris Porselia.

Hypochæris Chondrilla folio, parvo flore. Vaill. act. 1721. P. 214. Hypochêris con hoja como la de la Chôndrila; y flor pequeña.

Cast. Hypochêris lampiña.

Habita en Dinamarca, Alemania, Flandes y Suiza. ☉

Posee las corolas muy menudas: el caliz con las escamas lisas: las semillas del disco con el vilano con estipites; y las del radio sin él.

Radi-
cata.

4. *HYPOCHÆRIS foliis runcinatis obtusis scabris, caule ramoso nudo, lævi, pedunculis squamosis.* Hort. cliff. 386. Flor. dan. t. 150. Hipochèris de hojas runcinadas, obtusas, ásperas; tallo ramoso; desnudo, liso; y pedunculos con escamas.

Hypochæris foliis semipinnatis, hirsutis, caule nudo, brachiato. Hall. helv. n. 3. Hipochèris de hojas medio pinnadas, con pelo áspero; tallo desnudo y con ramas opuestas en forma de aspa.

Hieracium Dentis Leonis folio, obtuso, majus. C. B. P. 127. Moris. hist. 3. p. 66. sect. 7. t. 4. f. 27. Tourn. p. 470. Hieracio mayor, con hoja como la del Diente de Leon y obtusa.

Hieracium Dentis Leonis folio, bulbosum. C. B. P. 127. prodr. 63. Tourn. 470. Hieracio bulboso, con hoja como la del Diente de Leon.

Hieracium longius radiatum. Lob. ic. 238. Rai. hist. 230. Hieracio con la raiz mucho mas larga.

Hieracium tertium. Dod. pempt. 639. Hieracio tercero.

Cast. Hipochèris arraygada.

Habita entre los pastos de Europa : en el circuito de Madrid ; en Cataluña , Aragon y otras muchas partes de España. 24

Tiene los pedunculos incrasados por arriba : las corolas grandes ; y las escamas del caliz pestafiosas en su quilla.

118 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Soneho affinis, *Lapsana* \times *Lapsana domestica* pare-
domestica. C. B. P. 124. \times cida á la Cerraja.

Cast. *Lapsana* comun.

Habita en lugares cultivados de Europa : en los circuitos de Madrid , en Cataluña , Aragon , Castilla la vieja y en otras muchas partes de España. ♂

Sube á la altura de tres pies. Echa las *hojas* liradas, con la *hojuela* ó *lacinia exterior* entre de figura de corazon y sinuosa : y la *inflorescencia* entre en panoja y casi corimbosa. Gov.

Za- 2. *LAPSANA calycibus* \times *Lapsana* con los cálices
cintha. *fructus torulosis depressis* \times del fruto con eminencias,
obtusis sessilibus. Mill. dict. \times deprimidos , obtusos y sen-
n. 4. \times tados.

Lapsana calycibus fruc- \times *Lapsana* con los cálices
tus subrotundis angulatis, \times del fruto casi redondos , an-
pedunculis incrassatis, *flo-* \times gulados ; pedunculos incre-
ribus erectis. Hort. cliff. 390. \times sados ; y flores derechas.

Chondrilla verrucaria, \times Chôndrila verrugosa , con
foliis Cichorei viridibus. C. \times hojas como las de la Achi-
B. P. 130. \times coria y verdes.

Zacintha sive Cichorium \times *Zacintha* ó Achicoria ver-
verrucarium. Matth. 505. \times rugosa.

Tourn. p. 476.

Cichorium verrucatum, \times Achicoria verrugosa , lla-
Zacintha. Clus. hist. 2. p. \times mada *Zacintha*.

144.

Cast. *Lapsana* de Zante.

Habita en Italia y Oriente : en el Real Sitio del Escorial; en los prados de Rascafría , de los de la Cartuxa del Paular de Segovia y en otras partes de España. ○

Echa las *hojas radicales* en forma de lira y agudas : las del tallo de figura de saeta , amplexicaules y dentadas : el tallo casi ahorquillado , estriado y algo rígido : las flores sentadas y las mas tiernas pendulas : las corolas de color leonado por debaxo y amarillo-roxo por encima : las *hojuelas exteriores del caliz* derechas ; las *interiores* gibosas por su base y de color rubio : y los *pedunculos* increasados.

LAP-

Stella.
ta.

3. LAPSANA *calycibus* X Lapsana con los cálices
fructus undique patentibus, X del fruto extendidos por to-
radiis subulatis, *foliis cau-* X das partes, y sus radios ales-
linis lanceolatis indivisis. X nados; hojas del tallo lan-
Sauv. monsp. 82. X ceoladas é indivisas.

Hieracium siliqua facal- X Hieracio con la siliqua en-
ta. C. B. P. 128. X corvada.

Hieracium stellatum. X Hieracio con el fruto dis-
Bauh. hist. 2. p. 1014. X puesto en forma de estrella.

Hieracium Narbonense, X Hieracio de Narbona, con
falcatum. Lob. ic. 240. X las semillas encorvadas.

Rhagadiolus alter. Cæsalp. X Otro Ragadiolo.
511. Tourn. p. 480. X

Cast. Lapsana estrellada.

Habita en Mompeller y Bolonia: en los circuitos de Ma-
drid, de Barcelona y Valencia, en Aragon, Cataluña
y otras partes de España. ☉

Varía con las *hojas* sinuosas, dentadas é indivisas. Ge-
rard.

Tiene las *hojas* sinuosas; las *del tallo* casi aovadas y con
dientecitos; y las *ramas* desparramadas. Varía con las
hojas inferiores hendidas al través; y con los *peduncu-*
los de una flor, sencillos y divergentes. Gov.

Rha-
galio-
lus.

4. LAPSANA *calycibus* X Lapsana con los cálices
fructus undique patentibus, X del fruto extendidos por to-
radiis subulatis, *foliis ly-* X das partes, con sus radios
ratis. Hort. ups. 245. X alesnados; y hojas en forma
de lira.

Lampsana Rhagadiolus. X Lampsana Ragadiolo.
Scop. carn. ed. 2. n. 990. X

Hieracium falcatum, *al-* X Otro Hieracio con el fru-
terum. Rai. hist. 256. X to encorvado.

Rhagadiolus Lampsane X Ragadiolo con hojas como
foliis Tourn. cor. 36. X las de la Lampsana.

Rhagadiolus edulis, *Hie-* X Ragadiolo comestible, se-
raciis affinis. Bauh. hist. 2. X mejante á los Hieracios.
1014. X

Cast. Lapsana Ragadiolo.

Habita en Oriente y en la Carniola: en los circuitos de
Ma-

120 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Madrid, y señaladamente en el Soto de Migas calientes. *Quer.*

Gerardo tiene á esta especie por variedad de la antecedente ; y acaso lo es constante.

Kol-
pinia. 5. LAPSANA *calycibus* X Lapsana con los cálices
fructus undique patentibus, X del fruto extendidos por to-
radiis subulatis incurvis X das partes, y sus radios ales-
echinatis, *foliis caulinis* X nados, encorvados y eriza-
lanceolatis indivisis. Suppl. X dos ; hojas del tallo lanceo-
p. 348. X ladas é indivisas.

Kolpinia linearis. Pall. X *Kolpinia linear.*
it. vol. 3. p. 755. t. L. l. f. 2. X

Cast. Lapsana *Kolpinia*.

Habita en Dauria. *Pall.* ☉

Tiene las *semillas* erizadas por toda su longitud con agui-
jones setáceos.

1102. Género CATANANCHE. * *Vaill. A. G.* 1721.

56. 11. Catanance. *Tourn. t.* 271.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun cónico inverso, apiñado ; con muchas *hojue-
las* ó *escamas* echadas floxamente unas sobre parte
de otras, escariosas, entre aovadas y puntiagudas,
cóncavas, laxás, lustrosas y persistentes.

COR. compuesta apiñada y uniforme ; con muchas *coroli-
llas* hermafroditas ; y las *exteriores* mas largas.

Propia de un petalo, ligulada, linear, truncada y con
cinco dientes.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y cortísimos ; con
la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* oblongo : *estilo* filiforme y del largo de los
estambres : con el *estigma* hendido en dos partes y
redoblado.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. entre de figura de trompo y aovadas : con el *vilano*
formado de un caliz pequeño con cinco aristas.

RECEPT. pajoso.

OBS.

Obs. Se halla especie en la qual la corola compuesta no es apiñada.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

CATANANCE. p. 478.

La flor es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos sentados en el embrion, y comprendidos en el caliz escamoso. El embrion pasa á semilla adornada de una cabezuela foliosa (es el vilano) y recogida en el mismo caliz.

ESPECIES.

Cœru-
lea,

1. CATANANCHE *squamis calycinis inferioribus ovatis*. Hort. cliff. 190. Catanance con las escamas inferiores del caliz aovadas.

Catananche cœrulea, *semiflosculorum ordine simplicis*. Vaill. act. 1721. p. 215. Catanance con la flor cerúlea, y un solo orden de semiflosculos.

Chondrilla cœrulea, *Cyani capitulo*. C. B. P. 430. Chôndrila con la flor cerúlea, y cabezuela como la del Ciano.

Catananche quorundam. Lugd. 1190. Tourn. p. 478. Catanance de algunos autores.

Chondrilla species tertia. Dod, pempt. 638. Tercera especie de Chôndrila.

Catananche Dalechampii, *flore Cyani, folio Coronopi*. Bauh. hist. 3. p. 26. Catanance de Dalechâmpio, con la flor parecida á la del Ciano, y hoja como la del Coronopo ó Estrellamar.

α *Catananche flore pleno, cœruleo*. Tourn. p. 478. Catanance con la flor plena y cerúlea. α

Chondrilla cœrulea, *Cyani capitulo, altera*. C. B. P. 130. Otra Chôndrila cerúlea, con la cabezuela como la del Ciano.

Cast. Catananche cerúlea.

Habita en cerros pedregosos de la Francia Narbonense: en la Alcarria, Cataluña, Aragon y en otras muchas partes de España. 24

Tie-

122 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Tiene las *hojas* canas y fragiles , entre lineares y lanceoladas , con uno ó dos dientecitos en ambas partes.

Lutea. 2. CATANANCHE *squamis calycinis inferioribus lanceolatis*. Hort. cliff. 390. X Catanance con las escamas inferiores del caliz lanceoladas.

Catananche lutea, longo, nervoso, dentatoque folio. Vaill. act. 1721. p. 216. X Catanance con flor amarilla; hoja larga, nerviosa y dentada.

Chondrilla Cyanoides, lutea, Coronopi folio, non diviso. Bocc. mus. 2. p. 21. t. 7. Barr. ic. 1135. X Chôndrila como Ciano, de flor amarilla; hoja como la del Coronopo é indivisa.

Stæbe Plantaginis folio. Alp. exot. 287. t. 286. X Estebe con hoja como la del Llantén.

Catanance flore luteo, latiore folio. Tourn. p. 478. X Catanance con la flor amarilla; y hoja mas ancha.

Cast. Catanance amarilla.

Habita en Creta. ☉

Echa las flores mas tardias sentadas junto á la raiz, que apenas se abren y mas fertiles: las *hojas* verdes, dobladizas y con tres nervios.

Græca 3. CATANANCHE *foliis incisis*. X Catanance con hojas cortadas.

Catananche lutea, foliis varie incisis. Vaill. act. 1721, p. 216. X Catanance con la flor amarilla; y hojas cortadas variamente.

Scorzonera Græca, saxatilis & maritima, foliis varie laciniatis. Tourn. cor. 3. it. 1. p. 223. t. 223. X Escorzonera de Grecia, saxátil y maritima, con hojas variamente laciniadas.

Cast. Catanance de Grecia.

Habita en lugares maritimos de Grecia.

Es variedad de la precedente, segun *Miller*.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 123

1103. Género CICHORIUM. * Tourn. t. 272.

Vaill. A. G. 1721. 9. 10.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* cilindrico y calzado; con ocho *escamas* angostas, lanceoladas, iguales, que constituyen el cilindro; y *cinco* echadas unas sobre otras y mas cortas.

COR. *compuesta* plana y uniforme; con veinte *corolillas* hermafroditas puestas en cerco.

Propia de un petalo, ligulada, truncada y con cinco dientes profundos.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilindrica, de cinco lados y tubulosa.

PIST. *Germen* oblongo: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con dos *estigmas* revueltos.

PERIC. ninguno: el *caliz* cilindrico y cerrado por su ápice hace sus veces.

SEM. comprimidas y con ángulos agudos: *vilano* obscuramente peloso y con cinco dientes.

RECEPT. algo pajoso.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.

CICHORIUM. p. 478.

La *flor* es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos sentados en el embrión, y comprendidos en el caliz; el qual se contrae y pasa como á capsula llena de simientes anguladas, casi en forma de cuña y con ombligo.

ESPECIES.

Inty-
bus. 1. CICHORIUM *floribus* X Achicoria con flores me-
geminis sessilibus, foliis X llizas, sentadas; y hojas
runcinatis. Knorr. del. 1. t. X runcinadas.
w. 9. Mat. med. 206. X

Chi-

124 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cichorium foliis pinnatis, pinnis triangularibus, dentatis, floribus sessilibus. Hall. helv. n. 1.

Achicoria de hojas pinnadas, con las hojuelas (ó lacinias) triangulares, dentadas; y flores sin pedunculo.

Cichorium caule simplic. Hort. cliff. 389.

Achicoria con el tallo sencillo.

Cichorium sylvestre seu officinarum. C. B. P. 125. Tourn. p. 479.

Achicoria silvestre ó de las oficinas.

Cichorium sylvestre, picrois. Dod. pempt. 635.

Achicoria silvestre, amarga.

Cichorium sylvestre. Bauh. hist. 2. 1007.

Achicoria silvestre.

Intybus sylvestris. Cam. epit. 285. Fuchs. hist. 979.

Endivia silvestre.

Cast. Achicoria silvestre.

Habita en las márgenes de los campos y caminos de la Europa austral: en los circuitos de Madrid y en las mas provincias de España. 2

PROPIED. Toda la planta es amarga, aperitiva, tónica y diuretica: se usa en la melancolia, hipocondria: en la gota, hemorragia y en la calentura lenta.

Endivia.

2. CICHORIUM floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. Hort. cliff. 389. Mat. med. 206.

Achicoria con flores solitarias, pedunculadas; hojas enteras y recortadas.

Cichorium latifolium seu Endivia vulgaris. C. B. P. 125. Tourn. p. 479.

Achicoria de hoja ancha ó Endivia vulgar.

Intybum sativum. Dod. pempt. 634.

Endivia que se cultiva.

Cichorium angustifolium sive Endivia vulgaris. Tourn. p. 479.

Achicoria de hoja angosta ó Endivia vulgar.

Intybus sativa, angustifolia. C. B. P. 125.

Endivia sativa, de hoja angosta.

Intybum sativum, angustifolium. Bauh. hist. 2. 1011.

Endivia sativa, de hoja angosta.

Cichorium crispum. To-urn. p. 479. Achicoria rizada.

Intybus crispa. C. B. P. 125. Endivia rizada.

Intybum sativum, *crispum*. Bauh. hist. 2. 1011. Endivia sativa y crespa-da.

Cast. Achicoria Endivia ó Escarola.

Habita en..... ☉

Vease la *Achicoria enana* Jacq. obs. 4. t. 80. que es parecida á esta.

PROPIED. Es aperitiva y diuretica, purifica los humores y afloxa algo el vientre: se usa en la itericia, en las inflamaciones y calenturas ardientes.

Spino-
sum. 3. CICHORIUM caule dichotomo spinoso, floribus axillaribus sessilibus. Hort. cliff. 388. Achicoria con el tallo ahorquillado y espinoso; flores axilares y sentadas.

Cichorium spinosum, *Creticum*. C. B. P. 126. prodr. 62. t. 62. Tourn. p. 469. Achicoria espinosa, de Creta.

Cichorium spinosum. C. B. P. 126. Bauh. hist. 2. 1013. Achicoria espinosa.

Chondrilla genus elegans, *cæruleo flore*. Clus. hist. 2. p. 145. Género hermoso de Chôn-drila, con la flor cerúlea.

Cast. Achicoria espinosa.

Habita en cerros arenosos y marítimos de Creta y Sicilia: junto á las aguas termales de Trillo en unos arenales de la ribera del Tajo; en los de la marina de Valencia y Andalucía. Quer.

1104. Género SCOLYMUS. *Tourn. t. 263. Vaill.*

A. G. 1721. 41. 42.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun aovado y apiñado; con *escamas* numerosas, lanceoladas, espinosas y laxás.

COR. *compuesta* apiñada, uniforme; con numerosas *corollas* hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, ligulada, linear, truncada y con cinco dientes muy delgados.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y muy cortos: con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. *Germen* oblongo: *estilo* filiforme y mas largo que los estambres: con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. algo oblongas, triangulares, puntiagudas por su base: y sin *vilano*.

RECEPT. convexo y pajoso: las *pajas* casi redondas, planas, con tres dientes en su ápice, mas largas que las semillas y que las separan.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 480.

La *flor* es semiflosculosa ó que consta de muchos semiflosculos, sentados en el embrión, cuyo capilamento horada la parte posterior; los semiflosculos se separan entre sí por medio de una hojuela y se hallan comprendidos en un caliz escamoso. El embrión pasa á semilla arrimada y unida á una hojuela fixada en el receptaculo.

ESPECIES.

- | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| Macu-
latus. | 1. SCOLIMUS <i>floribus</i> X | Escolimo con flores solita-
rias. |
| | <i>solitariis.</i> | |
| | <i>Scolimus foliis margine</i> X | Escolimo con hojas adel-
gazadas en su margen. |
| | <i>attenuatis.</i> Gou. hort. 419. X | |
| | <i>Scolimus chrysanthemus,</i> X | Escolimo annuo, con la |
| | <i>annuus.</i> Tourn. p. 480. Do- X | flor de color de oro. |
| | dart. mem. 4. p. 303. | |

Sco-

Scolimus Theophrasti, X Escolimo Narbonense, de
Narbonensis. Clus. hist. 2. X Teophrasto.
 P. 153. X

Cast. Escolimo manchado.

Habita en la Francia Narbonense é Italia : en los circuitos de Madrid ; en Castilla la vieja , Alcarria , Extremadura , Andalucía , Valencia y Cataluña; y en las mas provincias de España. ○

Echa la raíz delgada : el tallo ramoso por debaxo : las hojas lampiñas , lustrosas , cartilaginosas por su margen y escurridas casi hasta la base del tallo : las flores solitarias y que salen de las divisiones del mismo tallo : la corola mas pequeña : y las anteras de color obscuro.

Hispanicus. 2. SCOLYMUS floribus X Escolimo con flores amon-
 congestis. tonadas.

Scolymus foliis margine X Escolimo con hojas incre-
incrassatis. Mill. dict. n. 2. X sadas por su margen.

& ic. t. 229. Gou. hort. 419. X
Scolymus chrysanthemus. X Escolimo con la flor de
 C. B. P. 384. Tourn. p. 480. X color de oro.

Scolymus Theophrasti, X Escolimo de España , de
Hispanicus. Clus. hist. 2. X Teophrasto.

P. 153.
Carduus chrysanthemos. X Cardo con flores de color
 Dod. pempt. 725. X de oro.

Cast. Escolimo de España. vulgo: Cardillos.

Habita en los circuitos de Madrid , en Andalucía , en Aragón , Cataluña , en la Mancha y otras muchas partes de España. 26

Florece esta planta al segundo año de haber nacido. Tiene la raíz fusiforme ; el tallo menos ramoso por debaxo : las hojas algo ásperas , cenicientas , que se escurren sin llegar á la hoja mas cercana : y que no son cartilaginosas por su margen : quatro flores comunmente amontonadas : la corola al doble mayor : y las anteras del mismo color que ella.

El tallo del largo de pie y medio , ramoso y con vello : y las hojas vellosas por debaxo. Gou. hort. 419.

1105. Género ARCTIUM. * Lappa. Tourn. t. 256.

Vaill. A. G. 1718. f. 20.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun globoso y apiñado ; con *escamas* lanceoladas, que rematan en agujones alesnados , largos , redoblados por su ápice y ganchosos.

COR. *compuesta* tubulosa , uniforme ; con *corolillas* hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo , tubulosa ; con el *tubo* delgado y larguísimo ; el *borde* aovado , hendido en cinco lacinias lineares é iguales.

ESTAMB. *Filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica , tubulosa , del largo de la corola y de cinco dientes.

PIST. *Germen* oblongo y velloso por su ápice : *estilo* filiforme y mas largo que los estambres : con el *estigma* hendido en dos partes y redoblado.

PERIC. ninguno : el *caliz* cerrado hace sus veces.

SEM. en piramide vertical , con dos ángulos opuestos desfigurados , y gibosas ácia fuera : el *vilano* sencillo y mas corto que la semilla.

RECEPT. plano y pajoso : con las *pajas* setáceas.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

LAPPA. P. 450.

La *flor* es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes, sentados en el embrión y comprehendidos en el caliz escamoso , ganchoso y que se agarra á los vestidos ; y el embrión pasa á semilla, adornada de vilanos comunmente cortos.

ESPECIES.

Lappa.

1. ARCTIUM foliis cor-
datis inermibus petiolatis. Arcio con hojas de figura
de corazon , inermes y pe-
Mat. med. p. 207. Flor. dan. cioladas.
t. 642.

Per-

Personata seu Lappa major, altera. Matth. 1155. Hall. Personada ú otra Lappa mayor.

Lappa major, seu Arctium Dioscoridis. C. B. P. 196. Tourn. p. 450. Lappa mayor, ó Arcio de Dioscorides.

Bardana seu Lappa major. Dod. pempt. 58. Bardana ó Lappa mayor.

Personata. Cam. epit. 887. Personada.

Lappa major, montana, capitulis tomentosis. C. B. P. 198. Tourn. p. 450. Lappa mayor, montana, con cabezuelas tomentosas.

Cast. Arcio Lappa. vulgo; Lampazo. Farm. Bardana.

Habita en lugares cultivados y entre cascajales de Europa: en los circuiños de Madrid; en Aragon, Cataluña; y es freqüente en las mas provincias de España. ♂

PROPIED. La raiz es mundificativa, diuretica y diaforetica: se usa en la nefritis, artritide, lue venerea, y en la edema. Las hojas recientes, aplicadas exteriormente, hacen admirables efectos en las excoriaciones y úlceras; y las semillas se tienen por muy eficaces en el dolor nefritico, propinadas en forma de emulcion.

Perso
nata.

2. ARCTIUM foliis de- Arcio de hojas escurridas,
currentibus ciliato-spinosis, con espinas pestañosas, las
radicalibus pinnatis, cauli- radicales pinnadas; y las del
nis oblongo-ovatis. Jacq. tallo entre oblongas y aova-
vind. 275. das.

Carduus inermis, foliis Cardo inerme, con las
imis pinnatis, superioribus hojas de abaxo pinnadas, las
ovato-lanceolatis, serratis, superiores entre aovadas y
squamis calycinis reflexis. lanceoladas, aserradas; y las
Hall. helv. n. 162. x escamas del caliz redobladas.

Carduus Personata. Jacq. Cardo llamado Persona-
austr. t. 348. da.

Carduus mollis, foliis Cardo blando, con las ho-
imis laciniatis, superiori- jas de abaxo laciniadas, las
bus integris, squamis caly superiores enteras; y las es-
cinis reflexis. Hall. helv. ed. camas del caliz redobladas.
1. p. 678. t. 19. opusc. 232.

130 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Carduus mollis, *latifolius*, *Lappæ capitulis*. C.B. P. 377. prodr. 155. Burs. XXI. 13. Cardo blando, con hoja ancha; y cabezuelas como las del Lampazo.

Cirsium latifolium, *Lappæ capitulis*. Tourn. p. 488. Cirsio con hoja ancha; y cabezuelas como las del Lampazo.

Carduus capitulis in vertice congestis, *lanigeris*, *squamis reflexis*. Gmel. sib. 2. p. 62. t. 24. Cardo de cabezuelas que llevan lana, amontonadas en la sumidad del tallo, y con las escamas redobladas.

Cast. Arcio Personada.

Habita en los alpes de Suiza y Ginebra: y en el monte Taurero de Austria. ♂

Tiene las hojas del tallo entre aovadas y oblongas, tomentosas por debaxo, con aserraduras espinosas y otras espinitas muy pequeñas interpuestas, adelgazadas en su base, y escurridas, con sus bordes muy delgados y espinosos: los pedunculos tomentosos y sus bordes algo espinosos. Su traza es como la de la antecedente, en la textura de las hojas, en la panoja, en la figura del caliz, y en su magnitud. Es acaso especie de Cardo?

Las escamas del caliz no terminan en agujones ganchosos. Hall. R.

Carduelis. 3. ARCTIUM *foliis pinatifidis aculeatis*. Arcio de hojas hendidas al través y con agujones.

Cirsium Arctoides. Scop. carn. ed. 2. n. 997. t. 53. Cirsio como Arcio.

Cast. Arcio de Gilguero. (Llámase con este nombre trivial, porque los Gilgueros apetecen mucho su semilla).

Habita en los alpes de la Carniola superior.

Su estatura es como la de la *Serratula arvense*.

Echa el tallo crespado y con agujones: las hojas amplexicaules, hendidas al través, laciniadas y con agujones por su margen: los cálices terminales, pedunculados; con escamas entre lineares y setáceas, muy abiertas y encorvadas.

1106. Género SERRATULA. * *Dill. Giss. 8.**Elth. 261. 264.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun oblongo , casi cilindrico , apifado ; con *es-*
camas lanceoladas , agudas y sin espinas.COR. *compuesta* tubulosa , y uniforme ; con las *corolillas*
hermafroditas é iguales.*Propia* de un petalo , en forma de embudo ; con su *tu-*
bo doblado ; el *borde* ventricoso y hendido en cinco
partes.ESTAMB. *Filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la
antera cilindrica y tubulosa.PIST. *Germen* aóvado : *estilo* filiforme , del largo de los
estambres : con dos *estigmas* oblongos y redoblados.PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.SEM. aovadas al revés : y el *vilano* sentado.

RECEPT. desnudo , ó pajoso.

OBS. *El vilano en algunas especies es plumoso y en otras*
peloso.

ESPECIES.

Tinc-
toria.1. SERRATULA *foliis* X Serratula de hojas entre
lyrato-pinnatifidis , *pinna* X
terminali maxima , *flosculis* X
conformibus. Hort. cliff. 391. liradas y hendidas al través,
con la hojuela ó lacinia ter-
minal muy grande ; y flos-
culos conformes ó todos her-
mafroditos.*Carduus inermis* , *foliis* X Cardo inerme , con hojas
glabris serratis , *imis ova-* X
tis , *superioribus semipin-* X
natis. Hall. helv. n. 163. lampiñas , aserradas , las de
abaxo aovadas, y las de arri-
ba medio pinnadas.*Carduus tinctorius*. Scop. X Cardo de tintes.
carn. ed. 2. n. 1012.*Serratula*. C. B. P. 235. X Serratula.
Dod. pempt. 24.*Jacea quæ Serratula vul-* X Yacea llamada vulgar-
go. Tourn. p. 444. X mente Serratula.

Cart. Serratula de tintes.

132 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Habita en los prados de la Europa boreal. 26

Tiene las *hojas* pestañosas : y el *receptaculo* cerdoso.

Varia 1.^o con todas las *hojas* enteras : 2.^o con las *hojas* de *abaxo* enteras ; y las *superiores* cortadas : 3.^o con todas las *hojas* cortadas : 4.^o con todas las *hojas* laciniadas : y esta ultima variedad es la *Serratula alpina*. Zanon. nov. t. 94. Hall.

Coro-
nata.

2. SERRATULA *foliis lyrato-pinnatifidis*, *pinna terminali maxima*, *flosculis radii femineis longioribus*.

Serratula de hojas entre en forma de lira y hendidas al través, con la hojuela ó lacinia terminal muy grande ; y los flosculos del radio femeninos y mas largos:

Serratula præalta, *Centauroides*, *montana*. Bocc. mus. 2. p. 45. t. 37.

Serratula montana, muy alta y parecida á la Centaurea.

Carduus inermis, *foliis glabris*, *pinnatis*, *lacinia extima maxima*, *capitulis squalidis*. Gmel. sib. 2. p. 49. t. 20.

Cardo inermis, de hojas lampiñas, pinnadas, con su lacinia ú hojuela de mas afuera muy grande; y cabezuelas cargadas de lana blanquecina sucia.

Serratula foliis laciniatis. Amoen. ruth. n. 181.

Serratula con hojas laciniadas.

Cast. Serratula coronada.

Habita en la Siberia y en Italia. 26

Se asemeja mucho á la *Serratula de tintes* ; pero es tres veces mas grande ; y tiene el *tallo* asurcado : otros tantos *flosculos* : una *hojuela* declinada debaxo del caliz : y el *radio* con flosculos tubulosos mas angostos, femeninos y fértiles.

Esta especie es de género dudoso ; y aunque el *radio femenino* indica que es del género *Centaurea* ; se oponen, primeramente, su *traza*, y en segundo lugar, el que los *flosculos del radio*, igualmente que los del *disco*, son fértiles.

Alpina

3. *SERRATULA calycibus subhirsutis ovatis, foliis indivisis.* Mill. dict. n. 9. X Serratula de cálices con algun pelo áspero, aovados; y hojas indivisas.

Serratula foliis petiolatis, radicalibus ovato-oblongis dentatis, caulinis integerrimis. Flor. suec. 661. X Serratula de hojas con petiolo, las radicales entre aovadas y oblongas, dentadas, y las del tallo enterisimas.

P. 714.

Serratula foliis ovato-lanceolatis, radicalibus serratis, caule thyrsifloro. Flor. lapp. 291. X Serratula de hojas entre aovadas y lanceoladas, las radicales aserradas; y el tallo con la panoja en forma aovada.

Cirsium foliis ovato-lanceolatis, dentatis, subtus tomentosis, calycibus villosis. Hall. helv. n. 179. t. 6. X Cirsio de hojas entre aovadas y lanceoladas, con dientes, tomentosas por debaxo; y cálices vellosos.

Cirsium inerme, foliis ex ovato-lanceolatis, denticulatis, infra lanugine candidis. Gmel. sib. 2. p. 67. t. 26. X Cirsio inerme, de hojas entre aovadas y lanceoladas, con dientecitos, y candidas por debaxo con pelusa.

Carduo-Cirsium minus, Britannicum, floribus congestis. Pluk. alm. 83. t. 154. f. 3. X Cardo-Cirsio menor, de Bretaña, con flores amontonadas.

α *Serratula Cynoglossifolia.* X Serratula con hoja de Cynoglosa ó de lengua de perro. α

Cirsium humile, montanum, Cynoglossifolio, polyanthemum. Moris. hist. 3. p. 148. Dill. elth. 82. t. 70. f. 81. Vide Gmel. sib. 2. p. 76. t. 32. Flor. dan. t. 37. Hall. l. c. X Cirsio baxo, montano, de hoja como la de la Cynoglosa; y con muchas flores. β

β *Serratula Lapathifolia.* X Serratula con hoja como la del Lapato. β

Cirsium polyanthemum, molli, hastato folio. Moris. hist. 3. p. 148. sect. 7. t. 29. f. 1. X Cirsio de muchas flores, con hoja blanda y de figura de alabarda.

Cir-

134 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cirsium foliis triangularibus, lunatè dentatis. Hall. helv. 683. Cirsio de hojas triangulares y con dientes en forma de media luna.

Cirsium alpinum, Boni Henrici folio. Tourn. p. 488. Cirsio alpino, con hoja como la del Buen Enrique.

Carduus mollis, Lapathi foliis. C. B. P. 317. Cardo blando, con hoja como la del Lapato.

Carduus mollior II. Clus. hist. 2. p. 151. Cardo mas blando, segundo.

x *Serratula angustifolia.* Serratula de hoja angosta. x

Cirsium inerme, foliis linearibus utrinque viridibus, calycibus hirsutis. Gmel. sib. 2. p. 78. t. 33. Cirsio inerme, de hojas lineares, verdes en ambas partes; y cálices con pelo áspero.

Hall. loco citato. var. v.

Cast. *Serratula alpina.*

Habita en los alpes de Lapponia, Austria, Suiza y Siberia. 26

Es planta muy distinguida por las flores cerúleas, y por la figura de las hojas; pero no consta de qual causa provengan estas variedades constantes; siendo cierto, que no es suficiente el lugar donde nacen para producir las.

Salici-
folia.

4. *SERRATULA foliis lineari-lanceolatis alternis subtus incanis sessilibus integerrimis.* Serratula con hojas entre lineares y lanceoladas, alternas, blanquecinas por debaxo, sentadas y enterisimas.

Cirsium inerme, erectum, foliis ex lineari-lanceolatis, infra candidis. Gmel. sib. 2. p. 69. t. 27. Cirsio inerme, derecho, con hojas entre lineares y lanceoladas, y candidas por debaxo.

Cast. *Serratula* con hojas de Sauce.

Habita en lugares abrigados y secos de Siberia.

Echa el tallo angulado y por arriba ramoso: las hojas enterisimas, blanquecinas por debaxo y algo escurridas: las flores encarnadas: los cálices como los de la *Serratula alpina*, y tres ó quatro en cada rama.

SER-

Multi-
flora.

5. *SERRATULA foliis lanceolatis subtus villosis subdecurrentibus integerri- mis, caule corymboso, calycibus cylindricis.* Serratula con hojas lanceoladas, vellosas por debajo, algo escurridas, enteri- mas; tallo corimboso; y cálices cilindricos.

Cirsium inerme, caulibus adscendentibus, foliis linearibus infra cinereis. Cirsio inerme, con los tallos ascendentes; hojas lineares y por debaxo cenicientas. Gmel. sib. 2. p. 71. t. 28 ? sed flores mayores.

Cast. Serratula de muchas flores.

Habita en la Siberia. Gmel.

Arroja el tallo angulado y corimboso; con ramas igualmente corimbosas, de suerte que termina en muchisimas y muy densas flores: las hojas como las del Sauce, y vestidas por debaxo con pelillos blancos: los cálices mas abundantes que en la antecedente, cilindricos, lampiños, mas agudos, de color mas subido y mas alegre.

Nove-
boracensis.

6. *SERRATULA foliis lanceolato-oblongis serratis pendulis.* Hort. cliff. 392. Serratula con hojas entre lanceoladas y oblongas, aserradas y pendulas.

Pall. it. 3. p. 321.

Serratula Noveboracensis, maxima, foliis longis, serratis. Dill. elth. 255. t. 263. f. 342. Serratula muy grande, de la Nueva Yorc, con hojas largas y aserradas.

Serratula Noveboracensis, altissima, foliis Doricæ, mollibus, subincanis. Moris. hist. 3. p. 133. Ray. Suppl. p. 208. Serratula de la Nueva Yorc, altísima, con hojas como las de la Doria, blandas y algo blanquecinas.

Centaureum medium, Noveboracense, luteum, Solidaginis folio, integro, tenuiter crenato. Pluk. alm. 93. t. 109. f. 3. Centaurea media, de la Nueva Yorc, con flor amarilla; hoja como la del Solidago, entera y delgadamente recortada.

Cast. Serratula de la Nueva Yorc.

Habita en la Nueva Yorc, en la Virginia y Carolina: en el Canadá y Kamtschatca. 24

SER-

Præalta.

7. *SERRATULA foliis lanceolato-oblongis serratis patentibus subtus hirsutis*. Mill. dict. n. 8. & ic. t. 234. Serratula con hojas entre lanceoladas y oblongas, aserradas, extendidas y con pelo áspero por debaxo.

Serratula Virginiana, Persicæ folio, subtus incano. Dill. elth. 356. t. 264. f. 343. Serratula de Virginia, con hoja como la del Persico y blanquecina por debaxo.

Serratula præalta, angusto Plantaginis aut Persicæ folio. Bocc. mus. 2. p. 45. t. 32. Serratula muy alta, con hoja como la del Llantén, ó del Persico, y angosta.

Eupatoria Virginiana, Serratulae Noveboracensis latioribus foliis. Pluk. alm. 141. t. 280. f. 6. Eupatoria de Virginia, con hojas como las de la Serratula de la Nueva Yorc, y mas anchas,

Cast. Serratula muy alta.

Habita en la Carolina, en la Virginia y Pensilvania.

Tiene el *receptaculo* desnudo y no velloso. *Tozzet. app.* 166.

Glaucæ.

8. *SERRATULA foliis ovato-oblongis acuminatis serratis, floribus corymbosis, calycibus subrotundis*. Gron. virg. 116. Serratula con hojas entre ovadas y oblongas, puntiagudas, aserradas; flores en corimbo; y cálices casi redondos.

Serratula Marilandica, foliis glaucis, Cirsii instar denticulatis. Dill. elth. 354. t. 262. f. 341. Serratula de la isla Marilandia, con hojas de color garzo, y con dientecitos al modo que las del Cirsio.

Cast. Serratula de color garzo.

Habita en la Marilandia, en la Virginia y Carolina.

Squarrosa.

9. *SERRATULA foliis linearibus, calycibus squarrosis subsessilibus acuminatis lateralibus*. Hort. cliff. 392. Gron. virg. 116. Serratula con hojas lineares; cálices desparramados, casi sentados, puntiagudos y laterales.

Cirsium tuberosum, ca-
pitulis squarrosis. Dill. eith. 83. t. 71. f. 82.
Cirsio con la raíz tubero-
sa; y cabezuelas desparra-
madas.

Stoebe Virginiana, tube-
rosa, latifolia, capitulis
sessilibus, squamis folia-
ceis acutis donatis. Moris. hist. 3. p. 137. sect. 7. t. 27.
Est. be de Virginia, con
la raíz tuberosa; hojas an-
chas; cabezuelas sentadas, y
adornadas de escamas folio-
sas y agudas.
f. 10. bona.

Cast. Serratula desparramada.

Habita en la Virginia.

Tiene los flosculos encorvados ácia atrás; con los estilos
larguísimos y divididos en dos partes.

Sca-
rriosa. 10. SERRATULA foliis
lanceolatis integerrimis, ca-
lycibus squarrosis peduncu-
latis obtusis. Gron. virg. 2.
Serratula con hojas lan-
ceoladas, enterisimas; cáli-
ces desparramados, pedun-
culados y obtusos.
p. 116.

Cirsium non ramosum, fo-
liis lateralibus, flores fe-
rens pauciores, majores.
Cirsio sin ramas, con ho-
jas laterales, y que lleva
menos flores y mayores.
Gron. virg. 1. p. 92.

Eupatorio affinis, Ame-
ricana, bulbosa, floribus
scariosis capitulis contex-
tis. Pluk. alm. 142. t. 177.
Planta de America, pare-
cida al Eupatorio, de raíz
bulbosa; y flores compues-
tas de cabezuelas escariosas.
f. 4.

Cast. Serratula escariosa.

Habita en la Virginia.

Esta especie es muy diversa de la precedente; por los cá-
lices obtusos y desparramados; por los pedunculos la-
terales, alargados, de una flor y adornados de algunas
hojuelas; por las hojas anchas y lanceoladas, sin ser
nerviosas, sentadas, ni escurridas.

138 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Spi- cata. 11. *SERRATULA foliis linearibus basi ciliatis, floribus spicatis sessilibus lateralibus, caule simplici.* Serratula con hojas lineares, pestañosas por su base; flores en espiga, sentadas, laterales; y tallo sencillo. Gron. virg. 116.

Cirsium tuberosum, Lactuce capitulis spicatis. Dill. elth. 85. t. 72. f. 83. Cirsio con la raíz tuberosa; cabezuelas como las de la Lechuga y en espiga.

Yacea non ramosa, tuberosa radice, floribus plurimum rigidis, perangustis. Yacea sin ramos, con la raíz tuberosa; flores muy rígidas y muy angostas. Banist. virg. 1927.

Yacea angustifolia, tuberosa radice, Virginiana. Yacea de Virginia, con hoja angosta; y raíz tuberosa. Pluk. alm. 190. t. 424. f. 6.

Stoebe Virginiana, tuberosa, angustifolia, capitulis sessilibus. Moris. hist. 3. p. 137. sect. 7. t. 27. f. 10. Estebe de Virginia, con la raíz tuberosa; hoja angosta; y cabezuelas sentadas.

Cast. Serratula espigada.

Habita en la America septentrional. 26

Amara. 12. *SERRATULA foliis lanceolatis, squamis calycinis apice scariosis obtusis, patulis coloratis, floribus terminalibus.* Serratula con hojas lanceoladas; escamas del caliz escariosas por su ápice, obtusas, extendidas, de color; y flores terminales.

Cirsium inerme, foliis scabris, inferioribus ex sinuato dentatis, squamis calycum subrotundis membranaceis. Gmel. sib. 2. p. 72. t. 29. Cirsio inerme, con hojas ásperas, las inferiores entre sinuosas y dentadas; y las escamas de los cálices casi redondas y membranosas.

Cast. Serratula amarga.

Habita en la Siberia.

Su traza es como la de la *Serratula alpina*. Tiene las hojas lanceoladas, algo escurridas; las superiores enterisimas y ásperas, señaladamente por su margen: los tallos angulados: las ramas derechas y terminadas cada una con dos ó tres pedunculos, comunmente de tres flores

res y de la magnitud de las del *Ciano roxo* ; con el *vilano* blanco : los *cálices* escariosos, y sus escamas membranasas, blandas y coloradas.

Cen-
taurei-
des.

13. *SERRATULA foliis pinnatifidis obliquis acutis, glabris inermibus, squamis calycinis mucronatis, interioribus scariosis.* Serratula con hojas hendidas al través, obliquas, agudas, lampiñas é inermes; escamas del caliz terminadas en punta rígida, y las interiores escariosas.

Carduus caule ramoso, foliis pinnatifidis, foliolis dentatis, squamis ex lanceolato spinosis. Gmel. sib. 2. p. 44. n. 38. t. 17. Cardo con el tallo ramoso; hojas hendidas al través, hojuelas ó lacinias dentadas; y escamas lanceoladas y espinosas.

Cast. Serratula como Centaurea.

Habita en la Siberia. 24

Sube á la altura de un pie. Echa las *ramas* alternas, apretadas, rígidas, casi lampiñas y de una flor : las *hojas* lampiñas en ambas partes, venosas, agudas, inermes, lanceoladas, con dientes tambien lanceolados; y verticales ó que la haz superior no mira al cielo, sino vuelta á un lado : el *caliz* entre aovado y oblongo, apifado con escamas que rematan en una punta que no hiere, de las quales las mas cercanas á los flosculos son mayores y áridas : la *corola* purpúrea, sin flosculos marginales : y el *estilo* al doble mas largo que los flosculos. Su *traza* es como la de la *Centaurea moscada*; pero carece de *flosculos* neutros.

Ar-
vensis

14. *SERRATULA foliis dentatis spinosis.* Pall. it. 1. p. 59. Flor. dan. t. 644. Serratula con hojas dentadas y espinosas.

Cirsium caule anguloso, ramoso, foliis semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, calycibus inermibus, cylindricis. Hall. helv. n. 171. Cirsio con el tallo angulado y ramoso; hojas medio pinnadas, con las hojuelas ó lacinias anguladas y espinosas; cálices inermes y cilindricos.

Cir-

140 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cirsium foliis lanceolatis, dentatis, spinosis, calycinis squamis tomentosis, inermibus, aristatis. Scop. carn. ed. 2. p. 1001. Cirsio con hojas lanceoladas, dentadas y espinosas; escamas del caliz tomentosas, inermes y con arista.

Carduus vinearum, repens, Sonchifolio. C. B. P. 387. prodr. 156. Cardo que nace en las viñas, con la raíz rastrera; y hoja como la de la Cerraja.

Carduus in Avena proveniens. C. B. P. 377. Cardo que proviene entre la Avena.

Carduus arvensis. Tabern. p. 700. Cardo arvense.

Carduus serpens, levis-caulis. Bauh. hist. 3. p. 59. R. Cardo con la raíz rastre-
ra; y el tallo liso.

Ceanothus Theophrasti. Col. ecphr. 1. p. 45. t. 45. Ceanoto de Teofrasto.

Cirsium arvense, Sonchifolio, radice repente, flore purpurascense. Tourn. p. 448. Cirsio arvense, con hoja como la de la Cerraja; raíz rastrera; y flor de color que tira á purpúreo.

Cirsium arvense, Sonchifolio, radice repente, caule tuberoso. Tourn. p. 448. Cirsio arvense, con hoja como la de la Cerraja; raíz rastrera; y tallo tuberoso.

Cast. *Serratula arvense.*

Habita en los campos cultivados de Europa: en los circuitos de Madrid, en las dos Castillas, en Cataluña, Aragón y en otras muchísimas partes de España. 24
Su traza es de *Cardo*.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 141

1107. Género CARDUUS. * *Tourn. t. 253. Vaill. A. G.*

1718. Polyacantha. *Vaill. A. G. 1718. Silybum. Vaill.*

A. G. 1718. Eriocephalus. Vaill. A. G. 1718.

Cirsium. Vaill. A. G. 1718. Tourn. t. 255.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun ventricosos y apiñados; con escamas numerosas, lanceoladas, puntiagudas y espinosas.

COR. compuesta tubulosa y uniforme; con las corolillas hermafroditas, casi iguales y redobladas.

Propia de un petalo, en forma de embudo; con el tubo delgadísimo; borde derecho, aovado por su base, hendido en cinco lacinias, lineares, iguales; y la una separada mas profundamente.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares, y muy cortos; con la antera cilindrica, tubulosa, del largo de la corolilla y con cinco dientes en su boca.

PIST. Germen aovado: estilo filiforme y mas largo que los estambres: con el estigma sencillito, alesnado, desnudo y escotado.

PERIC. ninguno: el caliz algo cerrado hace sus veces.

SEM. aovadas al revés, de quatro lados, y los dos ángulos opuestos desfigurados: con el vilano sin estipite y larguísimo.

RECEPT. peloso y plano.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

CARDUUS. P. 440.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes, sentados en el embrión, y comprendidos en el caliz escamoso y con agujones; y el embrión pasa á semilla adornada de vilanos.

CIRSIIUM. P. 447.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes, sentados en el embrión, y com-

140 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cirsium foliis lanceolatis, dentatis, spinosis, calycinis squamis tomentosis, inermibus, aristatis. Scop. carn. ed. 2. p. 1001. Cirsio con hojas lanceoladas, dentadas y espinosas; escamas del caliz tomentosas, inermes y con arista.

Carduus vinearum, repens, Sonchifolio. C. B. P. 387. prodr. 156. Cardo que nace en las viñas, con la raíz rastrera; y hoja como la de la Cerraja.

Carduus in Avena proveniens. C. B. P. 377. Cardo que proviene entre la Avena.

Carduus arvensis. Tabern. p. 700. Cardo arvense.

Carduus serpens, levis-caulis. Bauh. hist. 3. p. 59. R. Cardo con la raíz rastrera; y el tallo liso.

Ceanothus Theophrasti. Col. ecphr. 1. p. 45. t. 45. Ceanoto de Teofrasto.

Cirsium arvense, Sonchifolio, radice repente, flore purpurascens. Tourn. p. 448. Cirsio arvense, con hoja como la de la Cerraja; raíz rastrera; y flor de color que tira á purpúreo.

Cirsium arvense, Sonchifolio, radice repente, caule tuberoso. Tourn. p. 448. Cirsio arvense, con hoja como la de la Cerraja; raíz rastrera; y tallo tuberoso. α

Cast. Serratula arvense.

Habita en los campos cultivados de Europa: en los circuitos de Madrid, en las dos Castillas, en Cataluña, Aragón y en otras muchísimas partes de España. 24
Su traza es de Cardo.

1107. Género CARDUUS. * *Tourn. t. 253. Vaill. A. G.*

1718. Polyacantha. *Vaill. A. G.* 1718. Silybum. *Vaill.*

A. G. 1718. Eriocephalus. *Vaill. A. G.* 1718.

Cirsium. *Vaill. A. G.* 1718. *Tourn. t. 255.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun ventricoso y apiñado ; con escamas numerosas , lanceoladas , puntiagudas y espinosas.

COR. compuesta tubulosa y uniforme ; con las corolillas hermafroditas , casi iguales y redobladas.

Propia de un petalo , en forma de embudo ; con el tubo delgadísimo ; borde derecho , aovado por su base , hendido en cinco lacinias , lineares , iguales ; y la una separada mas profundamente.

ESTAMB. Filamentos cinco , capilares , y muy cortos ; con la antera cilíndrica , tubulosa , del largo de la corolilla y con cinco dientes en su boca.

PIST. Germen aovado : estilo filiforme y mas largo que los estambres : con el estigma sencillo , alesnado , desnudo y escotado.

PERIC. ninguno : el caliz algo cerrado hace sus veces.

SEM. aovadas al revés , de quatro lados , y los dos ángulos opuestos desfigurados : con el vilano sin estipite y larguísimo.

RECEPT. peloso y plano.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

CARDUUS. p. 440.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes , sentados en el embrion , y comprendidos en el caliz escamoso y con agujijones ; y el embrion pasa á semilla adornada de vilanos.

CIRSIMUM. p. 447.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes , sentados en el embrion , y com-

142 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

comprehendidos en el caliz escamoso y sin aguijones; y el embrión pasa á semilla adornada de vilano. A estas notas se debe añadir la de las hojas pertrechadas de aguijones blandos.

ESPECIES CON LAS HOJAS ESCURRIDAS.

Leucogra-
phus.

1. *CARDUUS foliis de-currentibus dentatis spinosis, pedunculis nudis longissimis unifloris, calycibus spinosis inclinatis.* Willich. illustr. n. 69. Cardo con hojas escurridas, dentadas y espinosas; pedunculos larguissimos, desnudos y de una flor; calices espinosos é inclinados.

Carduus foliis sinuatis aculeatis, caule crispo, pedunculis unifloris. Roy. lug. db. 134. Cardo de hojas sinuosas, con aguijones; tallo crespado; y pedunculos de una flor.

Cirsium maculis argenteis notatum. Tourn. p. 448. Cirsio señalado con manchas de color de plata.

Carduus leucographus, seu Carduus Mariæ hirsutus, capitulo minore. Moris. bles. 244. Cardo con manchas blancas, ó Cardo de Maria con pelo áspero; y cabezuela mas pequeña.

Cast. Cardo con manchas blancas.

Habita en Campania.

Lanceola-
tus.

2. *CARDUUS foliis de-currentibus pinnatifidis hispida, laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso.* Gmel. sib. 2. p. 66. Cardo de hojas escurridas, hendidas al través, erizadas, y sus lacinias divergentes; cálices aovados, con espinas, vellosos; y tallo peloso.

Carduus foliis lanceolatis decurrentibus, denticulis superficiei spinosis. Hort. cliff. 392. Cardo de hojas lanceoladas, y escurridas con los dientecitos y superficie espinosos.

Cirsium foliis semipinnatis, pinnis bilobatis, spinosis, capitulis congestis, tomentosis, conicis. Hall. *holv. n. 169.* Cirsio de hojas medio pin-
nadas, con las hojuelas ó la-
cinias hendidas en dos lóbu-
los y espinosas; cabezue-
las amontonadas, tomento-
sas y cónicas.

Cirsium foliis spinosis, decurrentibus, pinnatifidis, laciniis alternis erectis, calycibus reticulato-ovatis. Scop. carn. ed. 2. n. 1007. Cirsio de hojas espinosas,
escurridas, hendidas al tra-
vés, con sus lacinias alter-
nas derechas; cálices ao-
vados y en redecilla.

Carduus lanceolatus. Ta-
bern. 699. Hall. Cardo lanceolado.

*Carduus lanceolatus, la-
rifolius*. C. B. P. 385. Tourn. Cardo de hoja ancha y
lanceolada.

*Carduus lanceolatus seu
sylvestris Dodonei*. Bauh. Cardo lanceolado ó sil-
vestre de Dodoneo.

Cast. Cardo lanceolado.

Habita en lugares cultivados de Europa: en los circuitos
de Madrid; y es frecuente en las mas Provincias de Es-
paña. ♂

Tiene las escamas de mas adentro del caliz inermes, se-
táceas y áridas.

Nu-
tans. 3. CARDUUS *foliis se-
midecurrentibus spinosis, squamis
floribus cernuis, calycinis superne patentibus*. Flor. dan. t. 675. Cardo con hojas medio es-
curridas, espinosas; flores
cabizbaxas; y escamas del
caliz extendidas por arriba.

*Carduus foliis sinuatis
decurrentibus margine spi-
nosis, floribus solitariis nu-
tantibus*. Hort. Clif. 393. Cardo con hojas sinuosas,
escurridas y espinosas por su
margen; flores solitarias é
inclinadas.

Carduus foliis semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, floribus nutantibus, calycinis squamis pungentibus, patulis. Hall. helv. n. 167. X Cardo de hojas medio pinnadas, con hojuelas ó lacinias angulares y espinosas; flores inclinadas; escamas del caliz que punzan y extendidas.

Carduus nutans. Bauh. hist. 3. p. 56. Tourn. p. 440. X Cardo con la flor inclinada.

Carduus spinosissimus, latifolius, sphaerocephalus, vulgaris. C. B. P. 385. X Cardo vulgar, muy espinoso, de hoja ancha y cabezuela redonda.

Cast. Cardo inclinado.

Habita en las orillas de los campos sembrados de Europa: en los circuitos de Madrid: en Aragon, Valencia, Cataluña y en otras partes de España. ♂

Tiene los estilos vueltos ácia los lados.

Acanthoides.

4. CARDUUS foliis decurrentibus sinuatis marginis spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis. Jacq. austr. t. 249. X Cardo de hojas escurridas, sinuosas, con espinas por su margen; cálices pedunculados, solitarios, derechos y vellosos.

Carduus foliis laciniatis, subtus tomentosis, ex margine spinosis, capitulis sessilibus, congestis, aculeatis. Dalib. paris. 248. X Cardo de hojas laciniadas, tomentosas por debaxo, con espinas que salen de su margen; cabezuelas sentadas, amontonadas y con agujones.

Carduus foliis ovatis semipinnatis, subtus-tomentosis, spinosis, calycibus molliter spinosis. Hall. helv. n. 165. secundum Jacquín. X Cardo de hojas ovadas y medio pinnadas, tomentosas por debaxo, espinosas; y cálices con espinas blandas.

Carduus Acanthoides. Bauh. hist. 3. p. 59. Tourn. p. 440. it. scan. 297. X Cardo parecido al Acanto.

Carduus spinosissimus, capitulis minoribus. Rai. angl. 3. p. 194. X Cardo muy espinoso, con cabezuelas mas pequeñas.

Carduus polyacanthos, X *Cardo* con muchas espinas;
capitulis longioribus & te- X cabezuelas mas largas y mas
nuioribus, foliis albicanti- X delgadas; y hojas blanque-
bus. Moris. hist. 3. p. 153. X cinas.

Cast. *Cardo* como *Acanto*.

Habita entre cascajales de Europa: en los circuitos de Madrid, en las dos Castillas, en Aragon, Cataluña y en otras muchas partes de España. ☉

Se diferencia del *Cardo inclinado* por los cálices derechos; y del *Cardo rizado* por los cálices solitarios y vellosos. Tiene las *escamas interiores del caliz* extendidas: las *corolillas* medio hendidas en cinco lacinias; y la *inf-*
ma casi separada hasta su base; de suerte que parecen divididas en dos labios: y los *estilos* al doble mas largos que los *flosculos*.

Cris-
pus.

5. *CARDUUS foliis de-* X *Cardo* de hojas escurridas,
currentibus sinuatis margi- X sinuosas, con espinas por su
ne spinosis, floribus aggre- X margen; flores agregadas,
gatis terminalibus, squa- X terminales; escamas del ca-
mis calycinis inermibus sub- X liz inermes, con alguna aris-
aristatis patulis. Hort. cliff. X ta y extendidas.
 393. Flor. dan. t. 621.

Carduus spinosissimus, X *Cardo* vulgar, muy espi-
angustifolius, vulgaris. X noso y con hoja angosta.
 Loes. prus. 34. t. 5.

Carduus caule crispo. X *Cardo* con el tallo rizado,
 Bauh. hist. 3. p. 59. Tourn.
 p. 440.

Cast. *Cardo* rizado.

Habita en los campos cultivados de la Europa septentrio-
 nal: en los circuitos de Madrid, en Cataluña y otras
 partes de España. ☉

Screber y *Jacquin* atribuyen á la especie precedente los
 sinonimos de *Loesel* y el de *Juan Bauhino.* hist. 3.
 p. 44.

Echa el *tallo* verde: las *hojas* por debaxo con tomento
 blanquecino, enteramente escurridas, y que no punzan;
 aunque las del tallo pinchan algo: los *piececitos* con
 tomento blanco; el *caliz* de la magnitud de una avella-
 TOM. VI. K na,

146 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

na , con sus escamas desparramadas y rugosas por encima.

Poly-anthemus.

6. CARDUUS *foliis de-*
currentibus sinuatis ciliatis Cardo de hojas escurridas,
subtus nudis , floribus pe- sinuosas , con pestañas , des-
dunculatis congestis. nudas por debaxo ; flores con
pedunculo y amontonadas.

Carduus pycnocephalus, Cardo palustre , con mu-
palustris. Triumph. obs. 103. chas y densas cabezuelas.
t. 103.

Cirsium palustre , lanceo- Cirsio palustre , con mu-
latum , alato caule , polyan- chas flores ; hojas lanceola-
themum. Vaill. act. 170. da ; y tallo alado.

Cast. Cardo con muchas flores.

Habita en Roma. ♂

Es muy semejante al *Cardo rizado* , tanto que con dificultad se distinguen ; pero no tiene los *peciolos* tomentosos , ni las *hojas* tampoco lo son por debaxo. Echa el *tallo* mas alto que el de aquel : las *hojas* profundamente runcinadas ó hendidas al través (*sin que sean rígidas*) , algo obtusas , con espinas pestañosas , inermes , y venas excavadas , mas pálidas por debaxo y no blancas : las *superiores del tallo* lanceoladas , rozadas , enteramente escurridas , crespadas y que punzan un poco : los *pedunculos* rizados y con alguna tela como de araña ; con tres ó quatro *flores* en su remate y casi sentadas : las *corolas* purpúreas en el borde , y encarnadas en el disco : las *anteras* de color violado : los *estilos* blancos : y los *estigmas* purpúreos.

Palustris.

7. CARDUUS *foliis de-* Cardo de hojas escurridas,
currentibus dentatis , mar- con dientes y espinosas por
gine spinosis , floribus ra- su margen ; flores en racimo,
cemosis erectis , pedunculis derechas ; y pedunculos iner-
inermibus. Gmel. sib. 2. p. mes.
57. t. 23. f. 2.

Cirsium caule recto, sub- X Cirsio con el tallo recto,
nudo, alato, foliis semipin- casi desnudo, alado; hojas
natis, spinosis, calycibus medio pinnadas, espinosas;
molliter spinosis. Hall. helv. y cálices con espinas blan-
 n. 170. das.

Cirsium foliis spinosis, X Cirsio de hojas espinosas,
decurrentibus, dentatis, flo- escurridas y con dientes;
ribus erectis, aggregatis, flores derechas, agregadas;
calycibus inermibus. Scop. y cálices inermes.
 carn. ed. 2. n. 1004.

Carduus foliis linearibus, X Cardo de hojas lineares,
dentatis, spinosissimis, cau- con dientes, muy espinosas;
le crispo, spinoso, floribus tallo rizado, espinoso; y flo-
erectis. Dalib. paris. 249. res derechas.

Carduus palustris. C. B. X Cardo palustre.
 P. 377. prodr. 156.

Cirsium pratense, poly- X Cirsio pratense, vulgar,
cephalon, vulgare. Tourn. con muchas cabezuelas.
 p. 488.

Carduus spinosissimus, X Cardo palustre, muy es-
erectus, angustifolius, pa- pinoso, derecho y de hoja
lustris. Moris. hist. 3. p. 153. angosta.
 sect. 7. t. 32. f. 13.

Carduus lanceolatus, an- X Cardo lanceolado, de ho-
gustifolius. C. B. prodr. 155. ja angosta.

Carduus polycephalus, an- X Cardo con muchas cabe-
gustifolius. Dalech. hist. zuelas; y de hoja angosta.
 1743.

Cast. Cardo palustre.

Habita en los prados algo pantanosos de Europa. 24

Tiene el caliz apiñado estrechamente, liso y con puntitas apenas manifiestas.

Picno-
 cepha-
 lus.

8. CARDUUS foliis de- X Cardo de hojas escurridas,
currentibus pinnatifido-si- entre hendidas al través y
nuatis pubescentibus, spi- sinuosas, vellosas y con es-
nosus, pedunculis nudis to- pinas; pedunculos desnudos
mentosus, calycibus deci- ó sin alas, tomentosos; y cá-
duis. Jacq. hort. t. 44. lices que se caen estando
 X maduros.

K 2

Car-

Carduus foliis spinosis, lanceolatis, utrinque tomentosis, radicalibus sinuato-pinnatifidis, caulinis semidecurrentibus sinuatis, pedunculis capitato-multifloris tomentosis inermibus. X Cardio con hojas espinosas, lanceoladas, tomentosas en ambas partes, las radicales entre sinuosas y hendidas al través, las del tallo medio escurridas y sinuosas; pedunculos de muchas flores Gov. illustr. p. 62. X en cabezuela, tomentosos é inermes.

Cast. Cardio con cabezuelas espesas.

Habita en la Europa austral. 24

Arroja el tallo del largo de un pie, ó mas, con pelos blancos, rizado por los bordes ó márgenes de las hojas escurridas en ambas partes, ondeadas alternadamente, y espinosas: las *hojas radicales* casi lanceoladas y algo sinuosas: las *del tallo* oblongas, medio hendidas al través, dentadas, vellosas en ambas partes, con tomento casi lanudo y por debaxo mas blancas: los *pedunculos* cortos, con tomento blanco: los *piececitos* con tres ó quatro flores, y comunmente de tres ó quatro flosculos: los *cálices* de la magnitud de una avellana, oblongos, apiñados con escamas alesnadas, derechas, ó extendidas y algo espinosas: la *corola purpurea* con el borde derecho y de la magnitud de la *Serratula* de tintes. Se diferencia del *Cardo* como *Acanto*. por los *pedunculos* sin alas; y por los *cálices* que maduros se caen enteramente.

Argen-
tatus.

9. CARDUUS foliis de- X Cardio con hojas escurridas, runcinadas y espinosas; *currentibus runcinatis spinosis, pedunculis subtomentosis unifloris, calycibus ovatis mucronatis inermibus.* X pedunculos algo tomentosos y de una flor; cálices aovados, terminados en punta Jacq. hort. t. 192. X rígida y que no punzan.

Cirsium Ægyptiacum, minus, foliis ad limbum argenteis. X Cirsio de Egipto, menor, con hojas de color de plata en su borde.

Cast. Cardio de color de plata.

Habita en Egipto. ☉

Produce el tallo del largo de un pie, ondeado, liso y alter-

ternadamente ramoso : las *hojas* totalmente escurridas , y su margen ondeada , con dientes y espinas que punzan ; y salpicadas, señaladamente ácia los senos , de manchas de color de plata : los *pedunculos* terminales , del largo de toda la planta , con una flor , casi sin hojuelas , tomentosos y derechos : el *caliz* aovado, sin espinas , de la magnitud de una avellana , con escamas estrechamente apiñadas , terminadas en punta alesnada y que no punza , derecho y que maduro se cae con el fruto : la *corola* muy pequeña , purpúrea , y que apenas se abre ; las *anteras* cerúleas : y el *vilano* ceniciento.

Dis- 10. CARDUUS foliis de- X Cardo de hojas escurridas,
sectus. currentibus lanceolatis, den- X lanceoladas , con dientecitos
ticulis inermibus , calycibus X sin espinas ; y cálices espi-
spinosis . Hort. cliff. 392. X nosos.
Dalib. paris. 249.

Cirsium Anglicum. Lob. X Cirsio de Inglaterra.
ic. 583. Dalech. hist. 584.
f. tenus.

Cirsium majus , singula- X Cirsio mayor , con una
ri capitulo , magno , seu in- X sola cabezuela , grande ; ó
canum , varie dissectum. C. X Cirsio blanquecino , con ho-
B. P. 377. Tourn. p. 447. X jas variamente cortadas.

Cast. Cardo cortado.

Habita en Inglaterra y Francia. 24

Cyano- 11. CARDUUS foliis de- X Cardo con hojas escurri-
ides. currentibus pinnatifidis li- X das , hendidas al través , li-
nearibus integerrimis iner- X neares , enterisimas , iner-
mibus petiolatis subtus to- X mes , pecioladas y por deba-
mentosis. X xo tomentosas.

Cardus (monoclonos) X Cardo (de un solo tallo)
caule simplici , foliis pinna- X con el tallo sencillo ; hojas
rifidis rarius denticulatis , X hendidas al través , con dien-
infra candidis , squamis ca- X tecitos claros , y candidas
lycum lanceolatis adscenden- X por debaxo ; escamas del ca-
tibus. Gmel. sib. 2. p. 42. X liz lanceoladas y ascenden-
t. 15. X tes. "

Car-

150 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

β *Carduus* (polyclonos) \times Cardo (de muchos tallos)
inermis, caule ramosissimo, \times inermes, con el tallo muy ra-
foliis inferioribus pinnatis, \times moso; hojas inferiores pin-
superioribus linearibus in- \times nadas, las superiores linea-
tegerrimis, infra candidis, \times res, enterisimas y por deba-
squamis calycum lanceola- \times xo candidas; escamas de los
tis, adscendentibus. Gmel. \times cálices lanceoladas y ascen-
sib. 2. p. 44. t. 16. \times dentes. β

Cast. Cardo como Ciano.

Habita en la Tartaria.

La variedad α tiene las *hojas* con tomento blanco por de-
baxo, y sin cerdas, ó aserraduras: las *escamas del caliz*
lineares, puntiagudas, algo vellosas: y las *cabezuelas*
de la magnitud de las de la *Escabiosa*. La variedad β po-
see las *hojas* muy angostas y lineares: y las *cabezuelas*
como las del *Ciano*. Su *traza* es como la de la *Tacea*
moscada. Bauh. hist. 3. p. 34.

La *Centaurea laciniada*; Gmel. it. 1. t. 24. es singular va-
riedad de esta especie. Pall. it. 3. p. 594. R.

Canus. 12. CARDUUS *foliis de-* \times Cardo de hojas escurridas,
currentibus lanceolatis ero- \times lanceoladas, entre rozadas y
so-dentatis ciliato-aculea- \times dentadas, con agujones pes-
tis, utrinque arachnoideo- \times tañosos, y algun vello en
subvillosis. Jacq. austr. 1. t. \times ambas partes semejante á la
42. & 43. \times tela de araña.

Cirsium montanum, ma- \times Cirsio montano, muy gran-
ximum. Rai. hist. 305. \times de.

Cirsium tomentosum, ra- \times Cirsio tomentoso, con la
dice bulbosa. Bauh. hist. 3. \times raíz bulbosa.
p. 44. \times

Cast. Cardo cano.

Habita en Austria. 24

Echa las *raíces* fusiformes, agregadas, carnosas y blan-
cas: el *tallo* del largo de quatro pies, verde, angulado
y con vello semejante á la tela de araña: las *hojas* lan-
ceoladas, entre casi sinuosas y dentadas, pestañosas
con espinitas blancas que no punzan, canas en ambas
partes con tomento como tela de araña, aquilladas, en-
teramente escurridas con sus alas tiesas y que sobre-



FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 151

salen : los *pedunculos* terminales , alargados , con hojas florales , pequeñas y verdes : las *flores* solitarias y purpúreas : y los *cálices* inermes , con escamas que por defuera tienen una linea blanca.

Pecti-
natus.

13. *CARDUUS foliis de-
currentibus lanceolatis pin-
natifido-pectinatis , pedun-
culis longissimis , floribus
defloratis cernuis.* X Cardo de hojas escurridas,
X lanceoladas , hendidas al tra-
X vés , con sus lacinias en for-
X ma de peyne ; pedunculos
X larguissimos ; y flores cabiz-
X baxas despues de su fecun-
X dacion ó de haber florecido.

Cast. Cardo de peyne.

Habita..... La recibió Linneo con otras semillas de Pen-
silvania. ♂

Arroja el tallo del largo de dos pies , derecho , liso , é iner-
me , como lo es toda la planta : las *hojas* del todo escur-
ridas , con una quilla pálida por debaxo , hendidas al tra-
vés , ó con dientes profundisimos , iguales , lanceola-
dos , grandes , enterisimos , algo pestañosos , termina-
dos en una espina que no punza y señalados por delan-
te en su base con un dientequito doblado : los *peduncu-
los* terminales , larguissimos , de una flor , casi sin hojue-
las y algo tomentosos : las *escamas del caliz* lineares y
extendidas : las *flores* de la magnitud de las del *Arcio*
lampazo , purpúreas , con el pistilo largo , y los filamen-
tos blancos y derechos ; hallandose cabizbaxas despues
de haber florecido.

Deflo-
ratus.

14. *CARDUUS foliis de-
currentibus lanceolatis ser-
ratis subspinoso-ciliatis nu-
dis , pedunculis longissimis
lanuginosis unifloris.* Jacq. X Cardo de hojas escurridas,
X lanceoladas , aserradas , con
X pestañas algo espinosas , des-
X nudas ; pedunculos larguissi-
X mos , lanuginosos y de una
X flor.
vind. 177. austr. t. 89. Pall.
it. p. 219.

*Carduus inermis , foliis
ciliatis , scapo nudo , pauci-
floro.* Hall. helv. ed. 2. n. 164. X Cardo inerme , con hojas
X pestañosas ; escapo desnudo
X y de pocas flores.
t. 4.

Car-

152 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Carduus dictus Cirsium folio laciniato , nigrius . Cardo llamado Cirsio mas negro y con hoja laciniada. Bauh. hist. 3. p. 43.

Carduus foliis rigidis , molliter spinosis , scapo longo , paucifloro . Hall. helv. Cardo de hojas rígidas, con espinas blandas ; escapo largo y de pocas flores. 677. t. 18. f. 2. opusc. 220.

Cirsium seu Carduus angustifolius . C. B. P. 377. Cirsio ó Cardo de hoja angosta. prodr. 155. Tourn. p. 488.

Cirsium singularibus capitulis , parvis . C. B. P. 377. Cirsio con cabezuelas de una en una y pequeñas. Tourn. p. 477.

Cirsium tertium , montanum I. Clus. hist. 2. p. 149. Cirsio tercero , montano, primero.

Cast. Cardo de pocas flores.

Habita en los montes subalpinos de Suiza , Austria y Mompeller. 24

Es semejante al *Cardo como Serratula* ; pero tiene los cálices mas angostos : las hojas escurridas : y el fruto derecho.

La flor, quando está crecida, se halla pendula. Varía con el tallo ramoso : y con las hojas tan espinosas que se asemejan á las de la *Carlina*. Hall.

Mons-
pessu-
laus. 15. CARDUUS *foliis de-* Cardo de hojas escurridas,
currentibus lanceolatis sub- lanceoladas , algo ondeadas
repandis glabris inæquali- por su margen , lampiñas y
ter ciliatis , pedunculis al- con pestañas desiguales ; pe-
ternis , calycibus inermibus . dunculos alternos ; y cálices
Gou. hort. p. 422. inermes.

Carduus Cirsium Mons- Cardo llamado Cirsio de
pelianum , folio longo , gla- Mompeller , con hoja larga
bro. Bauh. hist. 3. p. 44. y lampiña.

Cirsium foliis non hirsu- Cirsio de hojas sin pelo
is , floribus compactis . C. áspero ; y con flores compac-
B. P. 377. Tourn. p. 447. tas.

Cirsium. Dod. pempt. 377. Cirsio.

Cast. Cardo de Mompeller.

Habita en Mompeller : en el Real Sitio de Aranjuez : en los

los montes de Burgos , de Asturias , de Aragon , Cataluña y en otros de España. 24

Su traza es como la del *Cardo parecido á la Serratula*. Echa las *hojas lanceoladas* , lampiñas en ambas partes, de color garzo y enteras ; pero las *radicales* ondeadas por su margen y con pestañas desiguales ; y algunas *cabezuelas* en la sumidad del tallo , con los pedunculos cortos.

Tuber-
osus.

16. *CARDUUS foliis petiolatis subdecurrentibus subpinnatifidis spinosis, caule inermi, floribus solitariis.* Gov. hort. 423.

Cirsium radicibus bulbosis, foliis semipinnatis, pinnis angulosis, ciliatis, floribus nudis. Hall. helv. n. 177. R.

Carduus pratensis, Asphodeli radice, latifolius. C. B. P. 377. Moris. hist. 2. sect. 7. t. 29. f. 27. 28.

Cirsium pratense, Asphodeli radice, latifolium. Tourn. p. 188.

Carduus bulbosus, Montpellierensium. Lob. ic. 10.

* *Carduus pratensis, Asphodeli radice, foliis tenuiter incis. C. B. P. 377.*

Cirsium pratense, Asphodeli radice, foliis tenuiter incis. Tourn. p. 488.

Jacea aculeata, seu tuberosa. Tabern. ic. 154.

Cardo con hojas peciola-
das , algo escurridas , casi
hendidadas al través y espino-
sas ; tallo inermes ; y flores
solitarias.

Cirsio con raices bulbosas ;
hojas medio pinnadas , ho-
juelas ó laciniadas angulosas,
pestañosas ; y flores desnuda-
das.

Cardo pratense , con la
raiz como la del Asphodelo ;
y hoja ancha.

Cirsio pratense , con raiz
como la del Asphodelo ; y
hoja ancha.

Cardo bulboso , de los de
Mompeller.

Cardo pratense , con raiz
como la del Asphodelo ; y
hojas cortadas delgadamen-
te. α

Cirsio pratense , con raiz
como la del Asphodelo ; y
hojas cortadas delgadamente.

Yacea con agujijones , y
raiz tuberosa.

Cast. Cardo tuberoso.

Habita en lugares inundados de Mompeller , de Bohemia,
Austria y Suiza : en las praderas del rio Manzanares , y
de

154 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

de Jarama ; y en otras partes de España.

Produce las *hojas* inermes , verdes y lisas en ambas partes ; las *radicales* hendidas al través , y en lo demas semejantes á las del tallo ; las del *tallo* entre de figura de corazon y lanceoladas , algo escurridas , con dientes , pestañosas , floxas y desiguales.

Parvi-
florus.

17. CARDUUS foliis ba X Cardo con hojas pegadas
si adnatis lanceolatis nudis X por su base , lanceoladas,
erosis ciliato-spinulosis iner- X desnudas , rozadas , con es-
mibus. X pinitas pestañosas y que no
X punzan.

Cirsium pratense , alpi- X Cirsio pratense , alpino,
num , *polycephalum* , *As-* X con muchas cabezuelas ; y
phodeli radice. Tourn. p.448. X raíz como la del Asphodelo.

Cast. Cardo de flor pequeña.

Habita en los montes subalpinos de la Europa austral. 2

Arroja el *tallo* derecho : las *hojas* pegadas por su base , apenas escurridas , lanceoladas , ondeadas por su margen y con dientes , desnudas , verdes en ambas partes , con espinas pestañosas , floxas y desiguales : las *flores* terminales , pedunculadas , de la magnitud de las de la *Serratula de tintes* , blancas y con los estilos mas largos : el *caliz* aovado , y apiñado con escamas que tienen la quilla ó lomo de color de nieve , y una espina en su ápice que no punza.

Aus-
cralis.

18. CARDUUS foliis de X Cardo con hojas escurri-
currentibus runcinatis spi- X das , runcinadas y espinosas ;
nosis , calycibus subsessili- X cálices sentados y termina-
bus terminalibus. Suppl. p. X les.

348.

Cast. Cardo austral.

Habita en la Europa austral.

Produce el *tallo* del largo de un pie , rollizo , estriado y con vello como lana : las *hojas* alternas , apartadas , sin peciolo y escurridas casi hasta la hoja mas cercana , oblongas , algo sinuosas por sus lados , con vello como tela de araña , y venas de los lados que salen ácia afuera y rematan en espinas blancas : muchos *cálices* termina-
les,

les, sentados (*los laterales solitarios*), aovados, pequeños y apinados, con escamas lanceoladas, aguzadas en espina, derechas y algo extendidas: la *corola* con ocho flosculos, poco mas ó menos, y de color purpúreo. Es semejante al *Cardo de color de plata*; pero las *flores* no tienen pedunculo.

Pannonicus. 19. *CARDUUS foliis semidecurrentibus nudis indivisis ciliatis, flore subsolitario*. Suppl. p. 348. Cardo con hojas medio escurridas, desnudas, indivisas, pestañosas; y flor casi solitaria.

Cirsium angustifolium, non laciniatum. C. B. P. 377. Tourn. p. 447. Cirsio de hoja angosta y sin lacinias.

Cirsium Pannonicum, primum. Clus. hist. 2. p. 148. Bauh. hist. 3. 1. p. 46. Cirsio primero, de Pannonia.

Cast. Cardo de Pannonia.

Habita en Austria. 2

Es *planta* inerte. Tiene las *hojas* medio escurridas, señaladamente por un lado, lisas y con pestañas blandas: el *caliz* terminal, de la magnitud del de la *Serratula arvense*, inerte, con escamas señaladas con una linea blanca: y la *corola* de color purpúreo palido.

ESPECIES CON LAS HOJAS SENTADAS.

Casabona. 20. *CARDUUS foliis sessilibus lanceolatis integerimis subtus tomentosis, margine spinis ternatis*. Hort. cliff. 393. Cardo de hojas sin peciolo, lanceoladas, enterisimas, tomentosas por debaxo; y con espinas de tres en rama por su margen.

Acarna major, caule non folioso. C. B. P. 30. Acarna mayor, con el tallo sin hojas.

Acarna Theophrasti Anguillare. Lob. ic. 486. f. 1. Dalech. hist. 1484. Acarna de Teofrasto, segun Anguilara.

Polyacanthus Casabona, Acarnae similis. Bauh. hist. 3. p. 92. Planta del Doctor Casabona, con muchas espinas y semejante á la Acarna.

Car-

156 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Carduus seu polyacantha X Cardo vulgar ó planta con
vulgaris. Tourn. p. 441. X muchas espinas.

Cast. Cardo de Casabona.

Habita en la Europa austral. ♂

Stella- 21. CARDUUS foliis ses- X Cardo con hojas sentadas,
tus. silibus integris lanceolatis X enteras, lanceoladas, iner-
inermibus subtus tomento- X mes, y por debaxo tomento-
sis, spinis ramosis axilla- X sas; espinas ramosas, axila-
ribus, floribus sessilibus X res; flores sentadas y latera-
lateralibus. X les.

Carduus foliis integris X Cardo con hojas enteras,
subtus tomentosis, spinis X tomentosas por debaxo; es-
hamosis lateralibus. Roy. X pinas ganchosas y laterales.
lugdb. 133.

Carduus humilis, aculea- X Cardo baxo, con agujijo-
tus, Ptarmicæ Austriacæ X nes; y hojas como las de la
foliis. Triumph. obs. 96. t. 96. X Ptarmica de Austria.

Carduus stellatus, Leu- X Cardo estrellado, con ho-
coii lutei foliis. Dodart. X jas como las del Alheli ama-
mem. 4. p. 261. X rillo.

Cast. Cardo estrellado.

Habita..... ☉

Maria- 22. CARDUUS foliis am- X Cardo de hojas que abra-
nus. plexicaulibus hastato-pin- X zan el tallo, entre de figura
natifidis spinosis, calycibus X de alabarda y hendidas al
aphyllis, spinis canalicula- X través, y espinosas; cálices
tis duplicato-spinosis. Mat. X sin hojuelas, con espinas
med. 207. Knorr. del. 1. t. X acanaladas y duplicadas ó
M. 3. X dos veces espinosos.

Carduus squamis calyci- X Cardo con las escamas del
nis margine apiceque spi- X caliz espinosas por su mar-
nosis. X gen y ápice.

Silybum nervis foliorum X Silybo con los nervios de
albis. Hall. helv. n. 181. X las hojas blancos.

Carduus albis maculis X Cardo vulgar, señalado
notatus, vulgaris. C. B. P. X con manchas blancas.
381. Tourn. p. 440. X

Carduus Mariæ. Dalech. X Cardo de Maria.
hist. 1475.

Carduus leucographus. X Cardo con manchas blan-
Dod. pempt. 722. X cas.

Cast. Cardo de Maria.

Habita en Inglaterra, Francia, Italia y Alemania: en los circuitos de Madrid: en Aragon, Cataluña, Valencia y en otras muchas partes de España. ☉

PROPIED. La yerba y semilla son *pectorales, sudorificas y diureticas*; y se usan en la *pleuritide*.

Syria-
cus.

23. *CARDUUS foliis amplexicaulibus angulato-spinosis, floribus solitariis subsessilibus obvallatis foliolis subquinis.* Hort. cliff. 393. X Cardo de hojas que abra-
Gron. orient. 252. X zcan el tallo, con ángulos es-
pinosos; flores solitarias, ca-
si sentadas y cercadas con
cinco hojuelas poco mas ó
menos.

Carduus albis maculis notatus, exoticus. C. B. P. X Cardo exótico, señalado
381. X con manchas blancas.

Carduus luteus, Syriacus. Cam. Hort. 35. t. 10. X Cardo de Siria, con la
flor amarilla.

Cast. Cardo de Siria.

Habita en Siria, Creta; y en España. ☉

Tiene las flores blancas: y la especie natural de Egipto varia con flores purpúreas.

Etio-
phorus

24. *CARDUUS foliis sessilibus bifariam pinnatifidis, laciniis alternis erectis, calycibus globosis villosis.* X Cardo de hojas sentadas,
Mill. dict. n. 2. ic. t. 293. X hendidas al través en dos
maneras (ó sea con las laci-
nias tambien hendidas) con
las laciniias alternadamente
derechas; cálices globosos y
vellosos.

Cirsium foliis pinnatis, pinnis bilobatis, lanceolatis, spinosis, calycibus sphericis, spinosis, tomentosis. Hall. helv. n. 168. X Cirsio de hojas pinnadas,
con hojuelas ó laciniias hen-
didas en dos lóbulos, lanceo-
ladas y espinosas; calices es-
féricos, con espinas, y tomen-
tosos.

Cir-

158 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cirsium foliis spinosis, semipinnatis, laciniis alternis erectis, calycibus lanigeris, subrotundis. Scop. carn. ed. 2. n. 1008. Cirsio de hojas espinosas, medio pinnadas, con sus laciniias alternadamente derechas; cálices que llevan lana y casi redondos.

Carduus foliis sinuatis, decurrentibus, denticulis superficieque spinosis, calycibus lanigeris. Roy. lugdb. 133. Dalib. paris. 247. Cardo de hojas sinuosas y escurridas, con los diente-
citos y superficie espinosos; y cálices que llevan lana.

Carduus capite rotundo, tomentoso. C. B. P. 382. Tourn. p. 491. Cardo con la cabezuela redonda y tomentosa.

Carduus capite tomentoso. Bauh. hist. 3. p. 57. Cardo con la cabezuela tomentosa.

Carduus eriocephalus. Dod. pempt. 723. Cardo que lleva lana.

Carduus (spurius) foliis semidecurrentibus, duplicato-pinnatifidis, laciniis alternis erectis, calycibus ovatis. Hort. ups. 249. Cardo (espurio) de hojas medio escurridas, dos veces hendidas al través, con sus laciniias alternadamente derechas; y cálices aovados.

Carduus tomentosus, Pyrenaicus, floribus purpureis, glomeratis. Tourn. p. 441. Cardo de Pirineos, tomentoso, con flores purpúreas y conglobadas.

Cast. Cardo que lleva lana.

Habita en Inglaterra, Francia y Portugal: en Salamanca, Cataluña y Valencia: en los montes de Burgos, de Leon, de Galicia y en otros de España. ♂

Altissimus. 25. CARDUUS foliis sessilibus pinnatifidis sinuatis serratis inermibus, caule ramosissimo, calycibus villosis subserratis. Cardo con hojas sentadas, hendidas al través, sinuosas, aserradas é inermes; tallo muy ramoso; cálices vello-
sos y algo aserrados.

Cirsium altissimum, laciniato folio, subtu tomentoso. Dill. elth. 81. t. 69. f. 80. Cirsio muy alto, con hoja laciniada, y por debaxo tomentosa.

Cast.

Cast. Cardo altísimo.

Habita en la Carolina. 24

Virg-
nianus

26. CARDUUS caule fo-
lioso unifloro, foliis lanceo-
latis spinulosis subtus to-
mentosus, calyce inermi. Cardo con el tallo folioso
y de una flor; hojas lanceo-
ladas, con espinitas, tomen-
tosas por debaxo; y caliz
inermi.

Gron. virg. 117. Jacq. obs.
4. p. 13. t. 99.

Cirsium minus, Virgi-
nianum, singulari capitu-
lo, caule folioso. Moris. Cirsio menor, de Virgi-
nia, con una sola cabezue-
la; y tallo folioso.

hist. 3. p. 150. Rai. Suppl.
p. 197.

Cast. Cardo de Virginia.

Habita en la Virginia.

Hete-
rophyl-
lus.

27. CARDUUS foliis am-
plexicaulibus lanceolatis ci-
liatis integris laciniatisque, Cardo con hojas que abra-
zan el tallo, lanceoladas,
pestañosas, enteras y laci-
niadas; tallo casi de una
flor; y caliz inermi.

Hort. cliff. 392.
Gmel. sib. 2. p. 51. Pall. it.
1. p. 62. Flor. dan. t. 109.

Cirsium maximum, As-
phodeli radice. C. B. P. 377. Cirsio muy grande, con
la raíz como la del Aspho-
delo.

Cirsium maximum, foliis
carnosis, bulbosa radice, Cirsio muy grande, tal
vez de París, con hojas car-
nosas; y raíz bulbosa.

fortè Lutetianum. Bauh.
hist. 3. p. 44.

Cast. Cardo de hojas varias.

Habita en los prados baxos de la Europa mas fria. 24

Echa el tallo del largo de pie y medio, poco mas ó me-
nos, con cinco hasta diez hojas sin dientes, pestañosas
y de color de nieve por debaxo; unas enteras y otras
laciniadas: y la raíz rastrera. Haller no separa esta es-
pecie de la siguiente y la tiene por variedad.

He- 28. *CARDUUS foliis* X Cardo de hojas que abra-
lenioi- *amplexicaulibus lanceolatis* X zan el tallo, lanceoladas,
des. *dentatis, spinulis inæquali-* X dentadas y pestafiosas, con
bus ciliatis, caule inermi. X espinitas desiguales; y tallo
Hort. cliff. 392. X inermes.

Cirsium foliis ciliatis, X Cirsio con hojas pestafio-
subtus tomentosus, radica- X sas, por debaxo tomentosas,
libus petiolatis, ovato-lan- X las radicales con peciolo, en-
ceolatis, caulinis lanceola- X tre aovadas y lanceoladas,
ris & semipinnatis. Hall. X las del tallo lanceoladas y
helv. n. 180. var. α t. 7. X medio hendidas al través.

Cirsium singulari capi- X Cirsio con una sola cabe-
tulo, squamato, vel inca- X zuela, escamosa; ú otro Cir-
num, alterum. C. B. P. 377. X sio blanquecino.
Tourn. p. 447. Mill. dict.
t. 94.

Cirsium Britannicum, X Cirsio de Clusio, de Bre-
Clusii, repens. Bauh. hist. 3. X taña y rastrero.
p. 46.

Cirsium Anglicum, II. X Cirsio segundo, de In-
Clus. hist. 2. p. 148. X gllaterra.

Carduus mollis, foliis X Cardo blando, con hojas
Helenii. C. B. P. 377. vide- X como las del Helenio.
tur.

Cirsium Anglicum, radi- X Cirsio de Inglaterra, con
ce Hellebori nigri modo X la raíz fibrosa al modo que
fibrosa, folio longo. Bauh. X la del Heleboro negro; y
hist. 3. p. 45? X hoja larga.

Cast. Cardo como Helenio.

Habita en Inglaterra y en la Siberia. 2

Es muy semejante á la antecedente; pero al doble mas al-
to, ó que sube á la altura de un hombre. Produce la
raíz algo rastrera, con todas las hojas radicales indivi-
sas y blancas por debaxo, aunque no de color nevado
como las de aquel: el tallo asurcado y todo folioso,
con quarenta hasta cinquenta hojas, blanquecinas por
debaxo, medio amplexicaules (y orejillas pegadas, re-
dondas y redobladas), enteras, con dientes y espigas
pestañosas é inermes; y las hojas florales alesnadas.

Serratuloides.

29. *CARDUUS foliis subamplexicaulibus lanceolatis integris, serraturis spinoso-setaceis, pedunculis unifloris*. Jacq. vind. 281. austr. t. 127. Cardo de hojas casi amplexicaules, lanceoladas, enteras, con aserraduras entre espinosas y setáceas; y pedunculos de una flor.

Carduus calycibus inermibus acutis, foliis utrinque viridibus, firmis, integerrimis, inæqualiter ciliatis. Gmel. sib. 2. p. 52. t. 22. & 23. f. 1. Cardo con los cálices inermes y agudos; hojas verdes en ambas partes, firmes, enterísimas; y con pestañas desiguales.

Cirsium angustifolium, non laciniatum. C. B. P. 377. Tourn. p. 447. Cirsio de hoja angosta y sin lacinias.

Cirsium Pannonicum, primum, pratense. Clus. hist. 2. p. 148. Cirsio de Pannonia, primero, pratense.

Cast. Cardo como Serratula.

Habita en la Siberia, Suiza y en Mompeller. 2

Tiene el tallo la mitad mas pequeño que el de la antecedente especie y apenas asurcado: las hojas mas angostas; y las florales lanceoladas y no alesnadas.

Tataricus.

30. *CARDUUS foliis amplexicaulibus lanceolatis, serraturis spinoso-setaceis, floribus triphyllis*. Jacq. austr. t. 90? De la Chenal in act. helv. IV. p. 294. t. 16? Cardo de hojas amplexicaules, lanceoladas, con aserraduras entre espinosas y setáceas; y flores con tres hojuelas.

Cirsium foliis ciliatis, semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, superioribus amplexicaulibus. Hall. helv. n. 176? R. Cirsio de hojas pestañosas, medio pinnadas, hojuelas ó lacinias angulosas, con espinas; y las superiores amplexicaules.

Cast. Cardo de Tartaria.

Habita en la Siberia. 2

Su traza y altura son como las del Cardo como Serratula, de manera que se podria tomar por variedad; pero echa las hojas al doble mas anchas, mas dentadas y altas.

162 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

go tomentosas por debaxo : las *cabezuelas* rodeadas de tres hojuelas , alguna vez de dos ; y no con una sola , como aquella : las *hojas* que punzan por su base : el *caliz* cilindrico y no globoso : las *flores* de color blanco y no purpúreo ; pero conviene con aquel en el vilano plumoso y señaladamente en las hojas radicales hendidas al través. Conviene tambien con el *Cnico de hortaliza* en las *hojas* hendidas al través ; en las *escamas del caliz* que tienen la quilla blanca ; pero posee las *hojas superiores* indivisas ; las *florales* pequeñas y no cóncavas : y las *flores* solitarias , con el pedunculo largo.

Flaves-
cens-

31. CARDUUS *foliis lanceolatis integris inermibus dentatis glabris , floribus aphyllis inermis-spinosis.* Cardo con hojas lanceoladas , enteras , inermes , denticuladas y lampiñas ; flores sin hojuelas y con espinas que no punzan.

Cast. Cardo de color amarillo-roxo.

Habita en España. *Loefling.*

Arroja el *tallo* liso : las *hojas* lanceoladas , adelgazadas por su base y con dientes agudos é inermes : los *calices* entre cilindricos y aovados, terminados con escamas en forma de aguja , que no punzan y extendidas ; y la *corola* de color entre blanco y amarillo-roxo.

Mollis.

32. CARDUUS *foliis pinnatifidis linearibus subtus tomentosis , caule inermi unifloro.* Amoen. acad. 4. p. 328. Jacq. vind. 276. austr. t. 18. Cardo con hojas hendidas al través , lineares , tomentosas por debaxo ; tallo sin espinas y de una flor.

Carduus foliis decursive interrupteque pinnatis tomentosis , pinnulis integerrimis , caule unifloro , calycibus inermibus squarrosis. Cardo de hojas pinnadas con las hojuelas ó lacinias escurridas alternadamente mas grandes , tomentosas y enterisimas ; tallo de una flor ; calices inermes y desparramados.

Carduus mollis, laciniato folio. C. B. P. 377. Cardo blando , con hoja laciniada.

Car-

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 163

Carduus mollior I. Clus. X Cardo primero, mas blan-
hist. 2. p. 151. do.

Facea alpina Calcitrapæ Yacea alpina, con hoja
folio, flore cœruleo vel albo. como la de la Calcitrapa y
Tourn. p. 444. flor cerúlea ó blanca.

Cast. Cardo blando.

Habita en los alpes de Austria : en Alemania y Mompe-
ller : en Aragon, Cataluña y otras partes de España.

Acau- 33. *CARDUUS acaulis*, X Cardo sin tallo, y con el
lis. calyce glabro. Dalib. paris. caliz lampiño.
248. it. gotl. 297.

Cirsium floribus acauli- X Cirsio con flores sin tallos.
bus. Hall. helv. n. 178.

Carlina minor. Clus. hist. X Carlina menor.
156. R.

Carlina montana, minor, X Carlina montana, menor,
acaulos. Barr. rar. 493. R. sin tallo.

Carlina acaulis, minore X Carlina sin tallo, con la
purpureo flore. C. B. P. 380. flor mas pequeña, y de co-
lor purpúreo.

Cirsium acaulos, flore X Cirsio sin tallo, con la flor
purpureo. Tourn. p. 488. purpúrea.

Carlina minor, purpureo X Carlina menor, con la flor
flore. Clus. hist. 2. p. 156. purpúrea.

Chamæleon exiguus. Bauh. X Cameleon pequeño.
hist. 3. p. 62. Tiag. 852.

Cast. Cardo sin tallo.

Habita en pastos abrigados de Europa : en la Serrania de
Cuenca, en Navarra y otras partes de España. 24

1108. Género CNICUS. * Tourn. r. 257. Acarna.

Vaill. A. G. 1718.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun aovado, cercado de bracteas y apiñado ; con
escamas aovadas, apretadas y con espinas ramosas.

COR. compuesta tubulosa y uniforme ; con las corolillas
hermafroditas é iguales.

164 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Propia de la flor hermafrodita en forma de embudo y oblonga ; con el *borde* hendido en cinco lacinias , derecho y casi igual.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* corto: *estilo* filiforme , del largo de los estambres: con el *estigma* oblongo y escotado.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado hace sus veces.

SEM. oblongas: con el *vilano* plumoso.

RECEPT. plano y vellosos.

OBS. Los flosculos casi todos hermafroditos y fértiles , y algunos neutros en el radio: y el vilano compuesto de cerdas ó pelos. Wernisch.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 450.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes , sentados en el embrio , y comprendidos en el caliz escamoso , cercado de hojas anchas y á manera de cabezuela : y el embrio pasa á semilla adornada de vilano.

ESPECIES.

Olera-
ceus.

1. CNICUS foliis pinna- X Cnico con hojas hendidas
tifidis carinatis nudis, brac- X al través , aquilladas y des-
*teis concavis integris sub- X nudas ; bracteas cóncavas ,
coloratis. Hort. cliff. 394. X enteras y casi de color.*

Cirsium foliis ciliatis , X Cirsio con hojas pestaño-
amplexicaulibus, inermibus, X sas , amplexicaules , inermes
flores comprehendentibus . X y que comprenden las flo-
Hall. helv. n. 173. X res.

Carduus pratensis , lati- X Cardo pratense , de hoja
folius. C. B. P. 376. X ancha.

Cnicus pratensis , Acan- X Cnico pratense , con hoja
thi folio , flore flavescente. X como la del Acanto ; y flor
Tourn. p. 450. X de color que tira á amarillo-
roxo.

Carduus pratensis. Lob. X Cardo pratense.
ic. 2. p. 11. Bauh. hist. 3. X
p. 42. X

Cir-

α *Cirsium latissimum*. C. X Cirso con hoja muy an-
B. P. 177. X cha. α

Cast. Cnico de hortaliza.

Habita en los prados algo sombríos de la Europa septen-
trional. 26

Tiene los *cálices laterales* sentados, las mas veces de dos
en dos, y el intermedio casi con pedunculo; y una linea
pequeña, blanca, cerca de la quilla de las escamas del
caliz.

Erisi-
thales.

2. CNICUS foliis amplexi- X Cnico de hojas amplexi-
caulibus pinnatifidis aris- X caules, hendidas al través,
tato-serratis, pedunculis X con aserraduras terminadas
cernuis, calycibus glutino- X en arista; pedunculos ca-
sis. Jacq. obs. 1. p. 28. t. X bizbaxos; y cálices glutino-
17. austr. t. 310. X sos.

Cirsium foliis ciliatis, X Cirso con hojas pestaño-
imis ovatis, superioribus X sas, las de abaxo aovadas,
semi-pinnatis, floribus ses- X las superiores medio hendi-
silibus obtusis. Hall. helv. X das al través; flores senta-
n. 175. Comm. goett. 1. p. X das y obtusas.
206. t. 8.

*Carduus foliis amplexi- X Cardo de hojas amplexi-
caulibus, pinnatifidis, la- X caules, hendidas al través,
ciniis lanceolatis, spinulo- X sus laciniias lanceoladas y
so-ciliatis, calycibus gluti- X con espinitas pestañosas; cá-
nosis, nutantibus. Jacq. X lices glutinosos é inclinados.
vind. 279.*

*Carduus pratensis, foliis X Cardo pratense, con hojas
tenuibus, laciniatis. C. B. X delgadas y laciniadas.
P. 377.*

*Carduo-Cirsium maxi- X Cardo-Cirso muy gran-
mum, profundè laciniatum, X de, profundamente lacinia-
in foliorum ambitu spinis X do y con espinas blandas en
mollibus hirtum. Pluk. fit. X el ámbito de las hojas.
t. 154. f. 2. (sed flore pur-
pureo).*

Cirsium Acanthoides, X Cirso montano, parecido
montanum, flore flavescen- X al Acanto, con la flor de co-
te. Tourn. p. 448. X lor que tira á amarillo-roxo.

Cir-

166 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cirsium alatus, polycephalon, foliis imis integris, superioribus latis, profundè laciniatis. Rai. syllog. 398. Hall. Cirsio mas alado, con muchas cabezuelas; hojas de abaxo enteras, las superiores anchas y profundamente laciniadas.

Erisithales. Dalech. hist. 1094. Erisithale.

Cast. Cnico Erisithale.

Habita en los prados subalpinos de Austria y Francia: en los montes de Burgos, de Asturias y otros de España. 24

Produce las *hojas* entre pinnadas y divididas en muchas partes, sentadas y vellosas, señaladamente por debaxo: los *pedunculos* sin hojuelas: las *flores* solitarias, inclinadas y amarillas, con el disco convexo y mas largo. Las *flores* varían en blancas, purpúreas, y entre blancas y amarillas.

Ferox. 3. *CNICUS foliis decurrentibus ligulatis dentatospinosus, caule ramoso erecto*. Ger. prov. 181. Cnico de hojas escurridas, en forma de cintilla, con dientes espinosos; tallo ramoso y derecho.

Carduus foliis lanceolatis decursive pinnatis, pinnulis bilobis longissimis, subtus tomentosis, supra strigoso-spinosissimis. Gou. illustr. 63. Cardo de hojas lanceoladas, con hojuelas ó laciniadas, escurridas, hendidas en dos lóbulos larguissimos, tomentosas por debaxo, y muy espinosas por encima, con aguijoncillos rígidos.

Cnicus lanceolatus, validissimis aculeis munitus. Tourn. p. 450. Cnico de hojas lanceoladas, y guarnecido con muy fuertes aguijones.

Carduus lanceolatus, ferocior. Bauh. hist. 3. p. 58. Cardo mas feroz, con hojas lanceoladas.

Cast. Cnico feroz.

Habita en lugares montuosos y estériles de la Europa austral. ♂

Pyg-
mæus.

4. CNICUS caule uniflo-
ro, foliis sublinearibus ses-
silibus confertissimis, ca-
lyce inermi.

Carduus caule unifloro,
calyce inermi, foliis subli-
nearibus, sessilibus. Jacq.
vind. 282. t. 8.

Serratula pygmæa. Jacq.
austr. t. 440.

Carduus mollis, folio
oblongo, Cirsii capitulo. C.
B. P. 377.

Cirsium humile, angusti-
folium. Tourn. p. 488.

Carduus mollior, humi-
lis, angustifolius. Clus. hist.
2. p. 151.

Cnico con el tallo de una
flor; hojas casi lineares, sen-
tadas, muy amontonadas; y
caliz inerme.

Cardo con el tallo de una
flor; caliz inerme; hojas casi
lineares y sentadas.

Serratula enana.

Cardo blando, con hoja
oblonga; y cabezuela como
la del Cirsio.

Cirsio baxo, con hoja an-
gosta.

Cardo mas blando, baxo
y de hoja angosta.

Cast. Cnico enano.

Habita en Schneeberg de Austria. 2

Acarn-
a.

5. CNICUS foliis decur-
rentibus lanceolatis indivi-
sis, calycibus pinnato-spin-
osis. Gou. hort. 423.

Carduus Acarna. Spec.
plant. 1. p. 820.

Carduus caule alato, spi-
noso, foliis spinosis spinis
duplicibus. Roy. lugdb. 133.

Acarna major, caule fo-
lioso. C. B. P. 379.

Chamæleon Salmanticens-
is. Clus. hist. 2. p. 155.

Cnicus polycephalus, ca-
nescens, aculeis flavescenti-
bus munitus. Tourn. p. 451.

Acarna humilis, caule
folioso. C. B. P. 379.

Cnico con hojas escurri-
das, lanceoladas, indivisas;
y cálices con espinas pinna-
das.

Cardo Acarna.

Cardo con el tallo alado y
espinoso; hojas espinosas y
con espinas duplicadas.

Acarna mayor, con el ta-
llo folioso.

Cameleon de Salamanca.

Cnico que encanece, de
muchas cabezuelas, y guar-
necido con aguijones de color
que tira á amarillo-roxo.

Acarna baxa, con el tallo
folioso. α

Cast.

168 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Cnico Acarna.

Habita en el circuito de Madrid : en los campos y viñas de Fuencarral , de Leganés y Arabaca : en Castilla la vieja , en la Mancha , Alcarria , Aragon , Cataluña y en otras partes de España. ○

Echa el tallo sencillo y corimboso : las *hojas* pegadas , que encanecen , con espinas pestañosas , mellizas , transversales y de color amarillo-roxo : las *flores* terminales , axilares y sentadas : los *cálices* oblongos , apiñados , con escamas espinosas en su ápice , que no punzan , y pinadas con cinco espinitas extendidas : las *corolas* pequeñas y de color que tira á purpúreo.

Spinosis-simus.

6. CNICUS foliis amplexicaulis sinuato-pinnatis spinosis , caule simplici , floribus sessilibus. Mill. dict. n. 2. Cnico de hojas amplexicaules , entre sinuosas y pinadas , espinosas ; tallo sencillo ; y flores sentadas.

Cirsium foliis caulinis semipinnatis , pinnis angulosis , spinosissimis , terminantibus mollibus , ciliatis , umbellam floralem comprehendentibus. Hall. helv. n. 172. t. 5. Cirsio con las hojas del tallo medio pinadas , hojuelas ó lacinias angulosas , y espinosísimas , las terminales blandas pestañosas y que abrazan á la umbela de las flores.

Cirsium alpinum , spinosissimum , floribus ochroleucis inter flavescentia folia congestis. Hall. helv. ed. 1. p. 679. t. 20. Cirsio alpino , muy espinoso , con flores de color amarillo blanco y amontonadas entre hojas de color amarillo-roxo.

Cirsium spinosum , capitulis in vertice , inter foliorum valla congestis , nudis inermibus. Gmel. sib. 2. p. 64. t. 25. Cirsio espinoso , con cabezuelas en la sumidad , amontonadas entre cercas de hojas ; desnudas é inermes.

Carlina polycephalos , alba. C. B. P. 380. Tourn. p. 500. Carlina blanca , con muchas cabezuelas.

Cast. Cnico muy espinoso.

Habita en los alpes de Suiza , de Austria y Tartaria.

CNI-

Cen-
tauro-
ides. 7. *CNICUS foliis pinna-* X Cnico con hojas hendidas
tifidis , calycibus scariosis, X al través ; y cálices escario-
squamis acuminatis. X sos , con sus escamas puntia-
gudas.

Carduus inermis , foliis X Cardo inerme , con hojas
pinnatifidis serratis inermi- X hendidas al través , aserra-
bis, squamis calycinis mem- X das é inermes ; escamas del
branaceis acuminato lanceo- X caliz membranosas , puntia-
latis. Hort. cliff. 392. X gudas y lanceoladas.

Centaureum majus , foliis X Centaura mayor , de Cor-
Cinaræ, Cornuti. Moris. hist. X nuto , con hojas como las de
3. p. 131. sect. 7. t. 25. f. 2. X la Alcachofa.

Cast. Cnico como Centaurea.

Habita en los Pirineos y en la Siberia. *Georgi. it.* 1. p.
229. ¶

Uni-
florus. 8. *CNICUS foliis pinna-* X Cnico con hojas hendidas
tifidis , calyce scarioso vil- X al través ; caliz escarioso y
loso. X velloso.

Centaurea calycibus mem- X Centaurea con los cálices
branaceis , foliis pinnatifi- X membranosos ; hojas hendi-
dis dentatis. Gmel. sib. 2. X das al través y dentadas.
p. 86. t. 38. X

Cast. Cnico de una flor.

Habita en la Siberia. ¶

Produce el tallo del largo de dos pies , derecho , casi an-
gulado , del grueso del dedo meñique , algo lanuginoso
y de una flor : muchas *hojas* inermes , sentadas , con
algun pelo blanco , hendidas al través , y sus lacinias
alternas ; las *superiores* mas pequeñas y mas enteras ;
las *radicales* grandes , con peciolo , y sus lacinias lan-
ceoladas y aserradas : una sola *flor* terminal y sin pe-
dunculo : el *caliz* grande , globoso , apifado con esca-
mas escariosas , laxás , aovadas , vellosas y de color
gris : la *corola* grande , de color violado y hermafrodita
ó con todos los flosculos secundos : los *flosculos* hendi-
dos en seis lacinias lineares y agudas : los *estambres*
blancos y mas largos que la corola : el *estilo* mas largo
que los estambres , filiforme y de color violado.

170 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cer- 9. CNICUS *foliis corda-* X Cnico con hojas de he-
nuus. *tis, petiolis crispis, spino-* X chura de corazon; peciolo-
sis, amplexicaulibus, flori- X rizados, espinosos, que abra-
bus cernuis. Hort. ups. 251. X zan el tallo; y flores cabiz-
X baxas.

Carduus foliis ex cordato X Cardo con hojas entre de
lanceolatis, margine serra- X figura de corazon y lanceo-
tis & spinosis, squamis ca- X ladas, aserradas y espinosas
lycum membranaceis, lace- X por su margen; escamas de
ris, spinosis, capitulis nu- X los cálices membranosas, la-
tantibus. Gmel. sib. 2. p. 47. X ceradas, espinosas; y cabe-
t. 19. X zuelas inclinadas.

Cast. Cnico cabizbaxo.

Habita en la Siberia. 24

1109. Género ONOPORDUM. * Vaill. A. G. 1718.

f. 37. Cardui species. Tourn. t. 253.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun casi redondo, ventricoso y apiñado; con es-
camas numerosas, espinosas y que sobresalen por
todas partes.

COR. compuesta tubulosa y uniforme; con las corolillas
hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, en forma de embudo; tubo del-
gadísimo; borde derecho, ventricoso, hendido en
cinco lacinias iguales y la una separada mas profun-
damente.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortisimos: con la
antera cilíndrica, tubulosa, del largo de la corola y
con cinco dientes.

PIST. Germen aovado: estilo filiforme, mas largo que los
estambres: con el estigma coronado.

PERIC. ninguno: el caliz ligeramente cerrado hace sus
veces.

SEM. aovadas, obtusas, comprimidas y anguladas: con el
vilano capilar.

RECEPT. en redecilla y á manera de panal, con celdillas
membranosas y de quatro lados.

E S P E C I E S.

- Acan-
thium. 1. ONOPORDUM caly-
cibus squarrosis, squamis parramados, con escamas
patentibus, foliis ovato-extendidas; hojas entre ao-
oblongis sinuatis. Mattusch. vadas y oblongas, y sinuo-
sil. n. 593. Döerr. nass. p. sas.
161.
- Carduus caule alato, fo- Cardo de tallo alado; ho-
liis ovatis, dentatis, den- jas aovadas, con dientes an-
tibus angulosis, aristatis. gulosos y con aristas.
Hall. helv. n. 159.
- Spina alba, tomentosa, Espina blanca, silvestre,
latifolia, sylvestris. C. B. P. tomentosa y de hoja ancha.
382. Loes. prus. 261. t. 82.
- Carduus tomentosus, Cardo tomentoso, vulgar,
Acanthi folio, vulgaris. To con hoja como la del Acan-
urn. p. 441. to.
- Acanthium. Dod. pempt. Acanto.
721.

Cast. Onopordo Acantio. vulgo : Toba.

Habita entre cascajales y en tierras cultivadas de Euro-
pa : en los circuitos de Madrid : en Aragon, Cataluña
y otras muchas partes de España. ♂

Es planta verde con vello blanquecino. Tiene el tallo con
alas rectas y escurridas hasta el mismo caliz : y éste
con escamas extendidas y alesnadas.

- Illiri-
cum. 2. ONOPORDUM calyci-
bus squarrosis, squamis in- parramados, con las esca-
ferioribus uncinatis, foliis mas inferiores ganchosas;
lanceolatis pinnatifidis. Jacq. hojas lanceoladas y hendi-
hort. t. 148. das al través.
- Onopordum foliis decur- Onopordo con hojas es-
rentibus, ligularis, pinna curridas, en forma de cin-
tifidis. Sauv. monsp. 290. tilla y hendidas al través.
- Spina tomentosa, altera, Otra espina tomentosa,
spinosior. C. B. P. 382. con mas espinas.

172 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Carduus quibusdam dictus Acanthium Illiricum. Bauh. hist. 3. p. 55. Cardo llamado por algunos autores Acanto de Iliria.

Acanthium Illiricum. Lob. ic. 1. Barr. ic. 501. Acanto de Iliria.

Carduus tomentosus, Acanthi folio, angustiori. Tourn. p. 441. Cardo tomentoso, con hoja como la del Acanto y mas angosta.

Cast. Onopordo de Iliria.

Habita en la Europa austral: en el Real Sitio de Aranjuez y en varias partes de la Mancha.

Es planta entre cana y cenicienta. Echa el tallo con alas ondeadas y que no llegan al caliz: las escamas inferiores del caliz lanceoladas, redobladas y ganchosas.

Ara-
bicum. 3. ONOPORDUM *calycibus imbricatis.* Jacq. hort. t. 149. Onopordo con los cálices apiñados.

Carduus tomentosus, Acanthi folio, altissimus, Lusitanicus. Tourn. p. 441. Barr. ic. 591. Cardo altísimo, de Portugal, tomentoso y con hoja como la del Acanto.

Carduus tomentosus, Acanthium dictus, Arabicus. Pluk. alm. 85. t. 154. f. 5. Cardo de Arabia, tomentoso, llamado Acanto.

Cast. Onopordo de Arabia.

Habita en Narbona y Portugal: en el Piu de Ribas y en otras partes de España. ♂

Acau-
lon. 4. ONOPORDUM *acaule.* Mill. dict. n. 5. Onopordo sin tallo.

Carduus acaulon ferme, flore albicante. Juss. Vaill. act. 153. Hall. goett. 357. Cardo casi sin tallo, y con flor blanquecina.

Cast. Onopordo sin tallo.

Habita.....

Posee las hojas como las del Onopordo de Iliria, con tomento blanquecino: y un caliz sentado en la raíz, con otros laterales igualmente sentados.

ONO-

Græ-
cum. 5. ONOPORDUM caly-
cibus squarrosis arachnoi-
deo-tomentosis, foliis spi-
nosis subulato-lanceolatis
sinuatis tomentosis. Suppl.
p. 349. Onopordo de cálices des-
parramados, con tomento
como tela de araña; hojas
espinosas, entre alesnadas y
lanceoladas, sinuosas y to-
mentosas.

Onopordum Græcum. Gov.
bot. 64. Onopordo de Grecia.

Carduus Græcus, par-
vus, Acanthi folio tomento-
so, flore minore. Tourn.cor.
31. Cardo de Grecia, peque-
ño, con hoja como la del
Acanto, tomentosa; y flor
mas pequeña.

Cast. Onopordo de Grecia.

Habita en Oriente. Gov. ☉

Tiene el tallo tomentoso: el caliz aovado, y de la mag-
nitud de una nuez, con las escamas exteriores mas
cortas.

1110. Género CYNARA. * Vaill. A. G. 1718.

Cinara. Tourn. r. 254.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun ventricoso y apañado; con escamas numero-
sas, casi redondas, carnosas, con un apendice por
su remate en forma de escama, extendido, mayor,
casi redondo, acanalado y escotado con una espi-
nita.

COR. compuesta tubulosa y uniforme; con las corolillas
hermafroditas y casi iguales.

Propia de un petalo, en forma de embudo: tubo del-
gadísimo; borde derecho, aovado y hendido en cin-
co lacinias lineares, con la una separada mas pro-
fundamente.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: la an-
tera cilindrica, tubulosa, del largo de la corolilla y
con cinco dientes.

PIST. Germen casi aovado: estilo filiforme, mas largo que
los estambres: con el estigma sencillo, oblongo y
escotado.

174 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.
PERIC. ninguno : el *caliz* algo cerrado hace sus veces.
SEM. entre oblongas y aovadas , de quatro lados y comprimidas : con el *vilano* sentado y largo.
RCEPT. con cerdas.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.
CINARA. p. 442.

La *flor* es flosculosa ó que consta de flosculos hendi-
 dos en muchas partes , sentados en el *embrion* y compre-
 hendidos en el *caliz* escamoso , que termina las mas veces
 en un aguijoncillo ; y el *embrion* pasa á semilla adornada
 de vilano.

E S P E C I E S .

- | | | |
|-----------|--|---|
| Scolymus. | 1. <i>CYNARA foliis sub-spinosis pinnatis indivisis-que , calycinis squamis ovatis.</i> Blackvu. t. 488. | Cynara con hojas algo espinosas , pinnadas é indivisas ; y escamas del caliz aovadas. |
| | <i>Cinara sylvestris , latifolia.</i> C. B. P. 384. Tourn. p. 442. | Cinara silvestre , de hoja ancha. |
| α | <i>Cinara hortensis , aculeata.</i> C. B. P. 383. Tourn. p. 442. | Cinara hortense, con aguijones. α |
| | <i>Scolymus Dioscoridis.</i> Clus. hist. 2. p. 153. | Escolimo de Dioscorides. |
| β | <i>Cinara hortensis , foliis non aculeatis.</i> C. B. P. 383. Tourn. p. 442. | Cinara hortense , con hojas sin aguijones. β |
| | <i>Cinara.</i> Dod. pempt. 724. | Cinara ó Alcachofa. |

Cast. Cynara Escolimo. *vulgo* : Alcachofa silvestre.
Habita en los campos de la Francia Narbonense , de Italia y Sicilia : y se cultiva en varias provincias de España. 24

Las *flores* sirven para cuajar la leche ; y los *cálices* de la variedad hortense se comen crudos , y con ellos se componen sabrosos guisados.

Cardunculus. 2. CYNARA foliis spinosis, omnibus pinnatifidis, calycinis squamis ovatis. Mill. dict. n. 3. Cynara con hojas espinosas, todas hendidas al través; y escamas del caliz ovadas.

Cinara foliis pinnatis, foliolis oblongis indivisis, caule spinoso. Sauv. meth. 239. Cinara de hojas pinnadas, con hojuelas oblongas, indivisas; y tallo espinoso.

Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur. C. B. P. 383. Tourn. p. 442. Cinara espinosa, cuyos piecitos ó pencas se comen.

Scolimus aculeatus. Tabern. hist. 1075. Escolimo con agujones.

Cast. Cynara Cardunculo. vulgo: Cardo de comer.

Habita en Creta: y se cultiva en las huertas de España. 26

Es planta híbrida ó producida de la semilla de la precedente especie, segun Juan Bauhino. Tiene las corolas y pistilos de color cerúleo subido; pero los estambres de color gris.

Hamilis. 3. CYNARA foliis spinosis pinnatifidis subtus tomentosis, calycibus squamis subulatis. Mill. dict. n. 4. Cynara con hojas espinosas, hendidas al través, tomentosas por debaxo; y cálices con las escamas alesnadas.

Cinara sylvestris, Bætica. Clus. cur. post. 35. Tourn. p. 442. Cinara silvestre, de Andalucía.

Carduus Tingitanus, flore magno, cœruleo, foliis atrætylidis divisurâ subtus incano, spinis durioribus horrido. Pluk. alm. 85. t. 81. f. 2. Cardo de Tanger, con la flor grande y de color cerúleo; hoja como la del Atractylis, blanquecina por debaxo en su division, y horrida con espinas mas duras.

Cast. Cynara baxa.

Habita en Tanger: en Andalucía, Extremadura y en otras varias partes de España. 26

Vease el Cardo de Andalucía. Pluk. alm. 85. t. 19. Morris. hist. 3. p. 158.

Las semillas, en esta especie mas pequeña, son mucho mas-

176 FLOR. HERM. CON ANTER, UNID. EN CIL.

mayores que en las demas. Su *tallo* casi es del largo de las hojas : y el *caliz* entre aovado y oblongo , con las escamas extendidas.

Acau- 4. CYNARA *acaulos, foliis pinnatis inermibus supra glabris.* Cynara sin tallo , con hojas pinnadas , inermes , y lampiñas por encima.

Cinara acaulos , Tunetana , Tafga dicta , magno flore , suaviter olente. Till. Cinara sin tallo , de Tunetana , llamada Tafga , con la flor grande y de olor suave. pis. 41. t. 20.

Cast. Cynara sin tallo.

Habita en Berberia. 2

IIII. Género CARLINA. * Tourn. t. 285.

Vaill. A. G. 1718.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun ventricoso , radiado y apifinado ; con escamas numerosas , laxas y agudas ; de las quales las interiores se hallan puestas en cerco , larguissimas , extendidas , lustrosas , de color y que rodean á la flor compuesta.

COR. compuesta uniforme y tubulosa ; con las corolillas hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo , en forma de embudo ; con el tubo delgado ; y el borde en forma de embudo y hendido en cinco partes.

ESTAMB. Filamentos cinco , capilares y cortísimos : con la antera cilindrica y tubulosa.

PIST. Germen corto : estilo filiforme , del largo de los estambres : con el estigma oblongo , y hendido en dos partes , ó entero.

PERIC. ninguno : el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. algo rollizas : con el vilano plumoso y ramoso.

RECEPT. plano : con pajas de tres en tres y cortadas.

La flor es comunmente radiada ; cuyo disco se compone de muchos flosculos sentados en el embrión ; pero la corona consta de petalos planos, sin que estén fixados á embrión alguno , comprehendidos igualmente que los flosculos en un caliz espinoso y ancho : los embriones pasan á semillas, adornadas de vilano , y separadas entre sí por medio de una hojuela apañada. (*Esta hojuela es una de las pajas del receptaculo por medio de las quales quedan separados los peciolos*).

E S P E C I E S.

- Acaulis. 1. CARLINA caule uni-
floro flore brevior. Hort. una flor y mas corto que
cliff. 395. Mat. med. 207. ella.
Knorr. del. 2. t. C. 1.
- Carlina acaulos, magno
flore, albo. C. B. P. 380. To- flor grande y blanca.
urn. p. 500.
- Chameleon albus. Clus. Cameleon blanco.
hist. 2. p. 155. Cam. epit. 428.
- Carlina altera. Dod. Otra Carlina.
pempt. 727.
- Carlina acaulos. Bauh. Carlina sin tallo.
hist. 3. p. 64.
- Cast. Carlina sin tallo (ó casi sin el). Farm. Carlina.
Habita en los montes de Italia y Alemania : en el cerro
negro de los circuitos de Madrid : en Cataluña , Ara-
gon , Extremadura y Andalucia : en los montes de la
Alcarria , de Asturias y en otras partes de España. 26
- PROPIED. La raiz es acre , amarga y aromática : expelen-
te, sudorifica y estomática : se usa en la hipocondria ,
en el histerico y en la sarna.
- La- 2. CARLINA caule bifi-
nata. do , calycibus sanguineis
terminalibus , primo axilla-
ri sessili. Mill. dict. n. 4. sanguineos , terminales ; y
el primero axilar y sentado.
- TOM. VI. M Car-

178 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Carlina squamis calycinis terminalibus purpureo-rubentibus, floribus inferioribus proliferis. Ger. prov. 183. Carlina con las escamas de los cálices terminales de color entre purpúreo y roxo; y las flores inferiores proli-feras.

Carlina caule trifloro, dichotomo, intermedio sessili. Sauv. monsp. 293. Gou. hort. 426. illustr. 64. Carlina con el tallo ahorquillado, de tres flores; y la intermedia sentada.

Carlina flore purpureo-rubente, patulo. Tourn. p. 500. Garid. aix. 82. t. 21. Carlina con la flor extendida, y de color entre purpúreo y roxo.

Acarna Atractylidis folio, amplo flore. Barr. ic. 483. Acarna con hoja como la del Atractil; y flor ancha.

Acarna flore purpureo-rubente, patulo. C. B. P. 379. Acarna con la flor extendida y de color purpúreo que tira á roxo.

Acanthoides parva, Apula. Col. ecphr. 1. p. 29. t. 27. f. 2. Acantoide ó planta como el Acanto, pequeña, de Pul-lla,

Cast. *Carlina lanuda.*

Habita en Italia y Narbona: en la Alcarria, en la sierra de Miraflores y en otras partes de España. ☉

Todas las verdaderas *escamas del caliz* terminan en una espina muy sencilla; pero en las demas, las *espinas* se hallan compuestas.

El *radio* es de color purpúreo en ambas partes. *Gou. loco citato.*

Co-rymbosa. 3. CARLINA *caule multifloro subdiviso, floribus sessilibus, calycibus radio flavo.* Roy. lugdb. 135. Gou. illustr. 64. Carlina de tallo subdivi-
dido, con muchas flores, sentadas; y radio de los cá-lices de color amarillo-roxo.

Acarna capitulis parvis, luteis, in umbella. C. B. P. 379. Acarna con cabezuelas pe-queñas, de color amarillo y puestas en umbela.

Acarna Apula, umbellata. Col. ecphr. 1. p. 20. t. 27. Acarna de Pulia, con flo-res en umbela.

Carlina sylvestris, flore aureo, perennis. Tourn. p. 500. Carlina silvestre, perenne, con la flor de color de oro.

α *Carlina patula*, Atractylidis folio & facie. Tourn. p. 500. Carlina extendida, con hoja y traza como la del Atractil. α

Cast. *Carlina corimbosa*.

Habita en Italia en lugares no muy apartados del mar: en Cataluña y Valencia: en la Alcarria y otras partes de España. 2

El radio de la flor es de color amarillo-roxo; pero por fuera y en la base tan solamente de color que tira á purpúreo. Gerard.

Tiene el tallo mas lanudo; y menos flores que la *Carlina vulgar*. Gov.

Vulgaris. 4. *CARLINA caule multifloro corymboso, floribus terminalibus, calycibus radio albo*. Hort. cliff. 395. Gov. illustr. p. 64. Carlina de tallo corimboso, con muchas flores terminales; y cálices con el radio blanco.

Carlina foliis radicalibus semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, caulinis ovato-lanceolatis, amplexicaulibus. Hall. n. 182. Carlina de hojas radicales medio pinnadas, con las laciniás anguladas y espinosas; las del tallo entre aovadas y lanceoladas, y amplexícaules.

Carlina sylvestris, vulgaris. Clus. hist. 2. p. 155. Tourn. p. 500. Carlina silvestre, vulgar.

Cnicus sylvestris, spinosior. C. B. P. 378. Cnico silvestre, mas espinoso.

Carlina sylvestris quibusdam, aliis Atractylis. Bauh. hist. 3. p. 81. Carlina silvestre, llamada así por algunos autores y por otros Atractil.

Cast. *Carlina vulgar*.

Habita en lugares montuosos, áridos y areniscos de la Europa austral: en los circuitos de Madrid: en la Alcarria; en Aragon, Cataluña, Castilla la vieja; en la Mancha, Andalucía y otras partes de España. ♂

180 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Deseó Linneo se descubriesen los caracteres , con que pudiesen distinguirse perfectamente las especies , segunda , tercera y quarta de este género, con exclusion del color.

Racemosa.

5. CARLINA *floribus sessilibus lateralibus paucissimis*. Gou. illustr. p. 64. Carlina con flores sentadas , laterales y muy pocas.

Carlina squamis calycinis terminalibus longioribus , floribus inferioribus prolifera. Ger. prov. 184. Carlina con las escamas terminales del caliz mas largas ; y las flores inferiores proliferas.

Carlina sylvestris , minor , *Hispanica*. Clus. hist. 2. p. 157. Tourn. p. 500. Carlina silvestre , menor , de España.

Acarna flore luteo , patulo. C. B. P. 379. Acarna con la flor amarilla y extendida.

Cast. Carlina racimosa.

Habita en el circuito de Madrid. Quer. ☉

Las hojuelas del radio del caliz tienen por debaxo , desde la base hasta el ápice , el color entre negro y purpúreo ; pero amarillo-roxo por la parte superior. Gov.

Pyre-naica.

6. CARLINA *caule multiflora , foliis decurrentibus*. Carlina con el tallo de muchas flores ; y hojas escurridas.

Carduus tomentosus , Pyrenaicus , *spinosissimus* , flore albo. Burs. XXI. 43. Cardo tomentoso , de los Pirineos , muy espinoso ; con la flor blanca.

Cast. Carlina de Pirineos.

Habita y abunda en los Pirineos de España.

Echa las hojas tomentosas en ambas partes , con hojuelas sentadas , de figura de alabarda , dentadas , y sus ápices terminados en una espina de color amarillo-roxo: los cálices con escamas laxas , espinosas , derechas , es-cariosas , entre angostas y lanceoladas : y las flores de color que tira á purpúreo.

Atractyloides.

7. CARLINA *caule ramoso , calycinibus spinis ciliatis*. Amoen. acad. 6. afr. 46. Carlina de tallo ramoso ; y cálices con espinas pestañosas.

Cast.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 181

Cast. Carlina como Atractil.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

No tuvo Linneo por seguro el género de esta especie ;
pues dice que acaso es del género *Gorteria* , ó del
Atractil ; y asi debe nuevamente exâminarse.

Xeran-
themo-
ides.

8. CARLINA *fruticosa*, ~~X~~ Carlina fruticosa , ramosa
ramosa , tomentosa , ~~X~~ y tomentosa , de hojas entre
linearis-subulatis , ~~X~~ lineares y alesnadas , con
serratis ~~X~~ aserraduras que se reducen
spinescentibus , ~~X~~ á espinas ; panoja terminal ;
la terminali , ~~X~~ y rádio de color amarillo-
radio flavo. ~~X~~ roxo.
Suppl. p. 349.

Cast. Carlina como Xerantemo.

Habita en las Barrancas (de America) cerca de la Aldea
llamada Chasna. Francisco Masson. $\frac{f}{2}$

Es arbusto muy hermoso. Produce el tallo rollizo y con
lana apretada : las ramas muy sencillas ; pero por su
ápice ramosas y divididas en pedunculos foliosos : las
hojas sin orden, nada escurridas, alesnadas, con su mar-
gen espinosa y que terminan en una espina ; por enci-
ma verdes y lampiñas , y por debaxo con lana blanca :
los cálices cercados de algunas hojas semejantes á las
del tallo , sin que sean mas largas que ellos, inermes y
tomentosas ; con las escamas interiores mas largas , en-
corvadas ácia atrás , alesnadas y espinosas ; y las del
radio de color amarillo lustroso y algo aserradas.

1112. Género ATRACTYLIS. * Crocodiloides.

Vaill. A. G. 1718. f. 9.

CAR. GEN. NAT.

CAL. exterior de muchas hojuelas , linear , mayor , muy
áspero , persistente y que encierra al caliz comun.

Comun aovado y apiñado ; con muchas escamas oblon-
gas , lanceoladas , arrimadas entre sí , é inermes.

COR. compuesta radiada ; con las corolillas hermafroditas,
numerosas , y tubulosas , en el disco ; y hermafrodi-
tas , liguladas , en el radio.

Pro-

182 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Propia del disco en forma de embudo y hendida en cinco partes.

Propia del radio ligulada, plana y con cinco dientes.

ESTAMB. *del disco*: filamentos cinco, capilares, cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

Del radio: filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *del disco*: germen cortísimo: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con el *estigma* hendido en dos partes.

Del radio: germen muy semejante al del disco; pero desfigurado y marchito.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado hace sus veces.

SEM. *del disco* de figura cónica inversa y comprimidas: con el *vilano* plumoso.

Las del radio del mismo modo.

RECEPT. veloso y plano.

OBS. El Atractil enrexado rara vez se halla con radio.

ESPECIES.

Gum- miera	1. ATRACTYLIS <i>flore</i>	Atractil con la flor sin
	<i>acauli.</i> Mill. dict. n. 3.	tallo.
	<i>Cnicus Carlinæ folio, acau-</i>	Cnico con hoja como la de
	<i>los, gummifer, aculeatus.</i>	la Carlina, con agujones,
	Tourn. cor. 33.	sin tallo y que lleva goma.
	<i>Carlina acaulos, gummi-</i>	Carlina sin tallo y que lle-
	<i>fera.</i> C. B. P. 380. Tourn.	va goma.
	<i>inst.</i> 500.	
	<i>Carduus pinea</i> Theophras-	Cardo llamado Pinea de
	<i>ti.</i> Alp. exot. 126. t. 124.	Teofrasto: ó con la cabezue-
	125.	la como una pifia.
	<i>Chamæleon albus, Dios-</i>	Cameleon blanco, de
	<i>coridis.</i> Colum. ephr. 1. p. 1.	Dioscorides.
	t. 12.	
	<i>Cast.</i> Atractil que lleva goma.	
	<i>Habita</i> en Creta y en Italia.	

ATRAC-

Hu-
milis.

2. *ATRACTYLIS foliis dentato-sinuatis, flore radiato, obvallato involucro patente, caule herbaceo.* Mill. dict. n. 2.

Atractil con hojas entre dentadas y sinuosas; flor radiada, cercada con un involucro extendido; y tallo herbáceo.

Atractylis radiata, squamis calycinis truncatis, cum spinula setacea. Loeßl. it. 161.

Atractil radiada, con las escamas del caliz truncadas y terminadas en una espinita setácea.

Cnicus aculeatus, purpureus, humilior. Tourn. p. 451.

Cnico mas baxo, con agujones; y flor de color purpúreo.

Crocodiloides Atractylidis folio, flore purpureo coronato. Vaill. act. 1718. p. 172.

Planta semejante á la que se llama Cocodrilo, con hoja como la del Atractil; flor purpúrea y coronada.

Carlina minima, caules, Hispanica. Barr. rar. 1127. t. 592.

Carlina de España, muy pequeña y con tallo.

Cast. Atractil baxa.

Habita en los circuitos de Madrid: en los sotos y cerros del Real Sitio de Aranjuez: en la Mancha, Andalucia, Alcarria, Serrania de Cuenca y en otras partes de España. ♂

Su traza es como la del *Atractil enrexado*; pero tiene las *hojas* sinuosas: la *flor* radiada: las *escamas del caliz* terminadas en punta rígida: y el *involucro* compuesto de verdaderas hojas extendidas.

Echa la *raiz* sencilla, filiforme, ó del grueso de una pluma de paloma: el *tallo* unico, del largo hasta de medio pie, sencillo, derecho, rollizo, algo estriado, con tomento muy delgado, y vestido de abundantes hojas: las *hojas* alternas, lanceoladas, casi plegadas, con espinitas en cada diente, cortas, rígidas, y divergentes; lampiñas, verdes, y con el nervio del medio solamente cubierto de tomento apretado: una sola *flor* sentada, que termina el tallo, y envuelta por su base con algunas hojas extendidas y semejantes á las del tallo, aunque mas angostas por debaxo: las *semillas* oblongas, algo comprimidas, envueltas con tomento como seda mas largo que ellas, y

co-

coronadas con el vilano largo y muy plumoso. *Loefl. loco citato.*

Can-
cellata

3. *ATRACTYLIS involucri cancellatis ventricosis linearibus dentatis, calycibus ovatis, floribus flosculosis.*

Atractil con los involucros enrexados, ventricosos, lineares, dentados; cálices aovados; y flores flosculosas.

Atractylis foliis linearibus dentatis, calycibus conniventibus. Hort. cliff.

Atractil con hojas lineares, dentadas; y cálices cerrados.

395.

Atractylis flore radiato nudo, calyce inermi involucro connivente obtecto. Loefl. it. 162.

Atractil con flor radiada, desnuda; caliz inerm y cubierto con el involucro cerrado.

Acarna capitulis globosis. C. B. P. 379.

Acarna con las cabezuelas globosas.

Eryngium parvum, palmare, foliis serratis. Moris. hist. 3. p. 166. sect. 7. t. 39. f. 16.

Eryngio pequeño, del largo de quatro dedos ó de un palmo, con hojas aserradas.

Cnicus exiguus, capite cancellato, semine tomentoso. Tourn. p. 451.

Cnico pequeño, con la cabezuela enrexada; y semilla tomentosa.

Carduus parvus. Bauh. hist. 3. p. 93. Rai. hist. 316.

Cardo pequeño.

Cast. Atractil enrexado.

Habita en los campos de Creta: en los circuitos de Madrid; en la Cartuxa del Paular de Segovia, en la Mancha, Alcarria, Andalucia y en otras muchas partes de España. (○)

Tiene el tallo del largo de un palmo, poco mas ó menos, sencillo y cubierto con una tela blanca como de araña: las ramas que salen de las dos últimas axilas: las hojas entre lineares y lanceoladas, pestañosas, y con vello como tela de araña: la flor terminal, ceñida con tres bracteas extendidas y encerrada en otras ocho arrimadas entre sí, las cuales forman una periferia globosa, y de ellas las tres alternas se hallan por su ápice encor-

va-

vadas ácia atrás ; *todas* lineares y pinnadas con dientes ahorquillados : la *corola* pequeña , cerúlea , flosculosa y rara vez con algun radio : el *involucro* enrejado, y que defiende la flor y semillas de los daños de los insectos.

El *tallo* rollizo , ramoso y tomentoso : las *ramas* derechos las *hojas* entre lineares y lanceoladas , con pestanías espinosas , obtusas y que abrazan la mitad del tallo : las *bracteas* mas largas que los cálices , mas anchas por su remate , hendidas al través y con espinas dentadas. *Gov. hort.* 427.

Oppo-
siti-
fo-
lia.

4. *ATRACTYLIS foliis oppositis*. Kniph. cent. 3. n. 20. *Fabric. helmst.* 448. Atractil con hojas opuestas.

Gorteria (fruticosa) foliis lanceolatis integris dentato-spinosis subtus tomentosis, caule fruticoso. *Spec. pl.* 3. p. 1284. *Berg. cap.* 302. *Gorteria (fruticosa)* de hojas lanceoladas , enteras, con dientes espinosos , tomentosas por debaxo ; y tallo fruticoso.

Atractylis foliis oblongo-ovatis denticulatis spinosis, calycibus patentibus, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 395. Atractil de hojas entre oblongas y aovadas , con dientecitos, y espinosas ; cálices extendidos; y tallo fruticoso.

Carthamus Africanus, frutescens, folio Ilicis, flore aureo. *B. Walth. hort.* 13. t. 7. Cartamo de Africa , frutescente , con hoja como la del Acebo.

Carlina? Africana, foliis integris tomentosis & in ambitu spinulis aureis exasperata. *Pluk. alm.* 86. t. 273. f. 5. Carlina? de Africa , con hojas enteras , tomentosas y exâsperadas por su ámbito con espinitas de color de oro.

Cast. Atractil con hojas opuestas.

Habita en Etiopia. *h*

Tiene las *hojas* opuestas , y tomentosas por debaxo , igualmente que las del caliz : el *radio de la corola* ligado : los *estambres* como en los demas géneros de la *Singenesia* ; pero sin estilo y sin estigma , despues de haber echa-

186 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

echado las anteras su polvillo: y el *receptaculo* entre peloso y pajoso.

- Pur- 5. *ATRACTYLIS foliis* X Atractil con hojas en for-
purea. *hastatis runcinatis*. Suppl. X ma de alabarda y runcina-
p. 349. X das.

Cast. Atractil purpúrea.

Habita en la Nueva Granada. *Doct. Mutis.*

Echa las *hojas* como las de la *Cerraja alpina*, del largo de quatro dedos, en forma de alabarda y runcinadas en sus peciolos, con tomento blanco por debaxo y que se desnudan del vello de arriba: las *flores* con pedunculos largos y ramosos: el *caliz comun* casi apiñado, con sus hojuelas entre lanceoladas y lineares, mas delgadas por la margen exterior, terminadas en punta rígida; y las *exteriores* mas pequeñas: la *corola comun* radiada y purpúrea; con las *corolillas del radio* masculinas (*veinte*), lineares, con tres dientes por su ápice y el borde de las interiores menudo y derecho: las *del disco* hermafroditas, tubulosas, hendidas en cinco partes é iguales: el *germen* algo oblongo: el *estigma de las del radio* oblongo y obtuso; el *de las del disco* mas corto y ligeramente hendido en dos partes: las *semillas* oblongas; con el *vilano* peloso, del largo del caliz: y el *receptaculo* desnudo.

- Mexi- 6. *ATRACTYLIS foliis* X Atractil con hojas oblon-
cana. *oblongis integerrimis*. Sup- X gas y enterisimas.
pl. p. 350. X

Cast. Atractil de México.

Habita en México. *Doct. Mutis.*

Produce las *ramas* muy sencillas, ligeramente tomentosas y del largo de dos pies: las *hojas* alternas, con peciolo corto, enterisimas, lampiñas por encima y algo tomentosas por debaxo: la *flor* terminal y solitaria: el *caliz comun* apiñado, con escamas alesnadas y tomentoso: la *corola* radiada, purpúrea, con las anteras amarillas: los *petalos* con tres dientes: el *estilo* sencillo: el *vilano* algo veloso y casi plumoso: y el *receptaculo* con pajas cortísimas.

1113. Género CARTHAMUS. * *Tourn. t. 248. Vaill.*

A. G. 1718. Atractylis. Vaill. A. G. 1718.

Carthamoides. Vaill. A. G. 1718.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun aovado y apiñado; con *escamas* numerosas, apretadas por debaxo, y con un apendice folioso en su ápice, casi aovado, plano, extendido y obtuso.

COR. compuesta uniforme y tubulosa; con las *corolillas* hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, en forma de embudo; con el *borde* dividido en cinco partes, derecho y casi igual.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* cortísimo: *estilo* filiforme, mas largo que los estambres: con el *estigma* sencillo.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado hace sus veces.

SEM. aovadas y comprimidas.

RECEPT. plano, peloso, con los pelos mas largos que la semilla.

OBS. El Cartamo de Vaill. *posee* la semilla *casi desnuda*.

El Atractil de Vaill. *echa* la simiente con su *coronilla* *desfigurada*.

El Cartamoide de Vaill. *tiene* la semilla *adornada* de una *corona pelosa*.

El Cartamo lanudo *arroja* los flosculos del radio *neutros*: y los del Cartamo de Creta son *estériles*.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 457.

La *flor* es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes, sentados en el *embrion*, y comprendidos en el *caliz* escamoso y folioso: y el *embrion* pasa á semilla sin vilano.

ESPECIES.

Tinc-
torius. 1. *CARTHAMUS foliis* X Cartamo con hojas aova-
ovatis integris serrato-acu- X das, enteras y aserradas con
leatis. Hort. cliff. 394. Mat. X agujijones.
med. 208.

Cnicus sativus, seu *Car-* X Cnico sativo, ó Cartamo
thamus Officinarum. C. B. X de las Oficinas.
P. 378. Tourn. p. 457. Rum-
ph. amb. 5. p.... t. 79.

Cnicus vulgaris. Clus. X Cnico vulgar.
hist. 2. p. 152.

Cast. Cartamo de tintes. *valgo* : Alazor.

Habita en Egipto : y se siembra con frecuencia en Espa-
ña. ☉

Tiene el tallo del largo de tres pies y blanquecino : las
hojas con tres nervios y lampiñas : y los *tubos* de los
flosculos larguissimos , y de color roxo ó de azafran.

PROPIED. Las semillas son purgantes y diureticas : se
usan en la tos , en el asma , en la hidropesia é itericia.

Las flores tiñen de color amarillo-roxo ; y los que
comercian con el azafran suelen falsificarle con ellas.

Lana-
tus. 2. *CARTHAMUS caule* X Cartamo con el tallo pelo-
piloso : supernè lanato , fo- X so y por arriba lanudo ; ho-
liis inferioribus pinnatifi- X jas inferiores hendidas al tra-
dis , summis amplexicauli- X vés, y las de mas arriba am-
bus dentatis. Sauv. monsp. X plexícaules y dentadas.
292. Blackvu. 468.

Atractylis foliis cartila- X Atractil con hojas carti-
gineis , reticulatis , imis X laginosas , en redecilla , las
semipinnatis , superioribus X de abaxo medio pinnadas ,
lanceolatis , amplexicauli- X las superiores lanceoladas y
bus. Hall. helv. n. 192. X amplexícaules.

Cnicus Atractylis lutea, X Cnico llamado Atractil
dictus. Tourn. p. 457. X amarillo.

Atractylis lutea. C. B. P. X Atractil con la flor ama-
379. X rilla.

Atractylis Theophrasti \mathfrak{B} X Atractil de Teofrasto y de
Dioscoridis, *succo sanguineo*. Col. ecphr. 1. p. 19. 1. Dioscorides, que arroja xu-
 go sanguineo.

23.

Atractylis. Dod. pempt. X Atractil.
 736. Cam. epit. 561. X

Cast. Cartamo lanudo.

Habita en Francia, Italia, Creta, Suiza y Carniola: en
 los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña y en
 otras muchas partes de España. ○

Tiene los *flosculos* del radio neutros. Hall.

Cre- 3. *CARTHAMUS caule* X Cartamo con el tallo algo
 ticus. *leviusculo*, *calycibus sub-* liso; cálices un poco lanu-
lanatis, *flosculis subnove-* dos; flosculos casi de nueve
nis, *foliis inferioribus ly-* en nueve; hojas inferiores
ratis, *summis semiample-* liradas, las de mas arriba
xicaulibus dentatis. Mill. que abrazan el tallo y con
 dict. n. 3. X dientes.

Atractylis flore leuco- X Atractil con la flor de co-
phæo. Vaill. act. 172. Hall. lor blanco obscuro.
 goett. 363. X

Cnicus Creticus, *Atrac-* X Cnico de Creta, con hoja
tylidis folio \mathfrak{B} *facie*, *flore* y traza de Atractil; y flor
leucophæo, seu *candidissi-* de color blanco obscuro, 6
mo. Tourn. cor. 33. X muy candido.

Cast. Cartamo de Creta.

Habita en Creta.

Posee las corolillas blancas, con cinco lineas negras en
 su garganta: el caliz cubierto como de tela de araña:
 y el tallo liso.

Los *flosculos* del radio son estériles. Hall.

Tingi- 4. *CARTHAMUS foliis* X Cartamo con las hojas ra-
 tanus. *radicalibus pinnatis*, *cauli-* X dicales pinnadas, las del ta-
nis pinnatifidis, *caule uni-* X llo hendidas al través; y ta-
floro. Mill. dict. n. 4. X llo de una flor.

Carduus cœruleus, erectus, *Cnici foliis dissectioribus*. Moris. hist. 3. p. 159. sect. 7. t. 34. f. 19. Cardo derecho, con la flor cerúlea; hojas como las del Cnico y mas cortadas.

Cast. Cartamo de Tanger.

Habita en los campos de Tanger y de Argél. 24

Echa las *hojas radicales* enteramente pinnadas; las del tallo hendidas al través y espinosas por su remate: y el tallo algo ramoso. Es muy parecido á la especie siguiente.

Coerules. 5. *CARTHAMUS foliis lanceolatis spinoso-dentatis, caule subunifloro*. Hort. cliff. 135. Cartamo de hojas lanceoladas, con dientes espinosos; y tallo casi de una flor.

Cnicus cœruleus, asperior. C. B. P. 378. Tourn. p. 450. Cnico mas áspero, con la flor cerúlea.

Cnicus alter, cœruleo flore. Clus. hist. 2. p. 152. Otro Cnico, con la flor cerúlea.

Chartamus sive Cnicus, flore cœruleo. Bauh. hist. 3. p. 75. Cartamo ó Cnico, con la flor cerúlea.

Cast. Cartamo cerúleo.

Habita en la Alcarria, en los pedroches de Córdoba, en Sevilla y otras partes de Andalucía. 24

Arroja los tallos muy sencillos, comunmente tendidos, pelosos y de una flor: las *hojas* lampiñas por encima: el *caliz* folioso: la *flor* cerúlea: las *anteras* negras: y las *semillas* con el vilano peloso.

Miris-sinus. 6. *CARTHAMUS foliis inermibus, radicalibus dentatis, caulinis pinnatis*. Dalib. paris. 250. Cartamo de hojas inermes, las radicales con dientes, y las del tallo pinnadas.

Carthamus foliis inermibus, radicalibus lanceolatis serratis, caulinis pinnatifidis, calycum squamis sub-aveniis, enerviis, inermibus, integerrimis. Gou. illustr. p. 64.

Carduncellus montis lupi, minor species. Moris. hist. 3. p. 159.

Carthamoides cœrulea, humilis & mitior. Vaill. act. 1718. 772.

Cnicus cœruleus, humilis, & mitior. Tourn. 451.

Cast. Cartamo muy suave.

Habita cerca de París y de Mompeller.

Tiene las semillas con el vilano peloso: y varía con el tallo del largo de quatro dedos y á veces sin él. Gov.

Car-
dun-
cellus. 7. *CARTHAMUS foliis caulinis linearibus pinnatis longitudine plantæ.* Mill. dict. n. 5.

Carthamus foliis spinosis, radicalibus obovatis serratis, caulinis pinnatifidis, calycum squamis trinerviis spinosis. Gou. illustr. p. 65. R.

Carthamus foliis caule longioribus, ligulatis, pinnatifidis. Sauv. monsp. 292.

Carthamus foliis radicalibus supernè serratis, infernè dentatis, caulinis dentato-pinnatis. Roy. lugdb. 136.

Cnicus cæruleus, humilis, Cnico baxo, del monte
montis lupi. Herm. lugdb. lobo, con la flor cerúlea.
 164. Tourn. p. 451.

Carduncellus montis lupi. Cardillo del monte lo-
 Lob. ic. 2. p. 20. Bauh. hist. bo.
 3. p. 92.

Eryngium montanum, Eringio montano, muy
minimum, capitulo magno. pequeño, con la cabezuela
 C. B. B. 386. grande.

Cast. Cartamo Cardillo.

Habita en Mompeller : en el Real Sitio de Aranjuez : en
 el Paular de Segovia, en la Alcarria, Asturias, Ara-
 gon y Cataluña : en los montes de Burgos y otras par-
 tes de España.

Ar- 8. *CARTHAMUS foliis* Cartamo con hojas en for-
 bores- *ensiformibus sinuato denta* ma de espada, entre sinuo-
 cens. *tis*. Roy lugdb. 138. sas y dentadas.

Carthamoides lutea, al- Planta como Cartamo,
tissima & fœtidissima. Vaill. muy alta y muy fétida, con
 aët. 1718. p. 772. la flor amarilla.

Cnicus Hispanicus, ar- Cnico de España, arbo-
borescens, fœtidissimus. rescente y muy fétido.
 Tourn. p. 451.

Cast. Cartamo arborescente.

Habita en España. *h*

Produce el tallo vellosa, como toda la planta, firme, siem-
 pre verde y que sube a la altura de un hombre: las ho-
 jas amplexicaules, en forma de espada, ó lanceoladas,
 del largo de un pie, entre hendidas al través y sinuc-
 sas, dentadas, algo espinosas por sus ápices y con el
 lomo blanco: una ó dos flores terminales sentadas,
 amarillas y de olor suave: el caliz con escamas pesta-
 ñosas, extendidas y terminadas en punta rígida: el es-
 tilo al doble mas largo que las corolas: y el vilano pe-
 loso.

Co- 9. *CARTHAMUS flori-* Cartamo con las flores en
 r y in- *bis corymbosis numerosis*. corimbo y numerosas.
 bosus.

Echinops floribus fasciculatis, calycibus multifloris. Hort. cliff. 391. Gron. orient. 250. Echînops con flores en ha-
cecillo ; y cálices de muchos
flosculos.

Chamaeleon niger. Dalech. hist. 1454. Dod. pempt. 727. Cameleon negro.

Chamaeleon niger umbellatus, flore caeruleo-hyacinthino. C. B. P. 380. Cameleon negro, umbe-
lado, con la flor de color en-
tre cerúleo y de violeta.

Carduus Chamaeleon dictus, capitulis pluribus, minoribus, caeruleis, corymbatim dispositis. Moris. hist. 3. p. 159. sect. 7. t. 33. f. 17. Cardo llamado Cáme-
leon, con muchas cabezue-
las, mas pequeñas, de color
cerúleo y dispuestas en co-
rimbo.

Cast. Cartamo corimboso.

Habita en los campos de Pulla, de Helesponto, de Lem-
nos y de Tracia. 24

Tiene la traza como la del *Echinops*: y su fructificacion
debe exâminarse con mas exâctitud. Es planta corro-
siva.

Salici-
folius. 10. CARTHAMUS fruticosus, petiolis spinosis, foliis lanceolatis integris sub-
tus tomentosis apice pun-
gentibus, ramis unifloris. Cartamo fruticoso, con
peciolos espinosos; hojas lan-
ceoladas, enteras, tomento-
sas por debaxo, que punzan
por su ápice; y ramas de una
flor.
Suppl. p. 350.

Cast. Cartamo con hoja de Sauce.

Habita en las peñas de la isla de la Madera. Masson. 8
Su traza es como la de la *Gorteria*; pero vió Linneo en
ella todas las flores hermafroditas y sin radio: el es-
tigma indiviso: el vilano plumoso: y el receptacu-
lo con pajas. Es arbusto leñoso, y arroja las ramas
largas y tomentosas: las hojas acercadas, sin or-
den, lanceoladas, enterisimas, lampiñas por encima,
con tomento por debaxo, apretado y como seda; guar-
necidas por su base ó en el peciolo, y rara vez en la
margen, de dos ó quatro espinas; y siempre terminadas
en una: las ramitas con una flor, y blanca: el caliz
TOM. VI. N api-

apifado , con las escamas exteriores agudas , mas largas y semejantes á las hojas del tallo.

1114. Género BARNADESIA. *Suppl. p. 55. Mutis.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. algo ventricoso , extendido por su ápice y apifado; con *escamas* numerosas , gradualmente mas largas, desde la base hasta su ápice : las *inferiores* ó *exteriores* aovadas , estrechamente apifadas , agudas y que punzan ; las *superiores* ó *interiores* alesnadas , planas , extendidas y que tambien punzan.

COR. *compuesta* y radiada; con los *flosculos del disco* hermafroditos , poquisimos (*tres ó quatro*) y apartados: las *corolillas* tubulosas , y en forma de embudo ; con el *tubo* corto ; *borde* con pelo áspero , partido en cinco lacinias , derechas y arrimadas entre sí : los *flosculos del radio* hermafroditos y en una sola serie : las *corolillas* liguladas ; con el *tubo* mas largo que el caliz ; la *cintilla* ó *ligula* lanceolada , extendida en su base , encorvada por su ápice , hendida , y con mucho pelo áspero por defuera.

ESTAMB. *Filamentos* cinco : con las *anteras* unidas en cilindro , del largo de la *cintilla* y mas largas que su borde.

PIST. *Germen* aovado : *estilo* filiforme , y mas largo que los estambres : con el *estigma* hendido en dos lacinias extendidas , entre aovadas y redondas.

PERIC. ninguno : el *caliz* cerrado hace sus veces.

SEM. muchas , aovadas y con pelos vueltos ácia atrás : *vilano de las flores del disco* setáceo , con sus radios alesnados , rígidos , y como quebrados ácia atrás , desnudos , ó cubiertos con pelos muy menudos : *vilano de las flores del radio* largo , derecho , extendido , con muchos radios , plumoso y blando.

RECEPT. plano , vellosos y sin paja alguna.

E S P E C I E .

Spi- 1. BARNADESIA. Sup- $\begin{smallmatrix} \times \\ \times \end{smallmatrix}$ Barnadesia.
nosa. pl. p. 348.

Cart.

Cast. Barnadesia espinosa.

Habita en la America meridional. Mutis. $\frac{7}{8}$

Es *arbusto* con ramitas muy lampiñas y espinosas. Echa dos *espinas* en el origen de las mismas ramitas , extendidas , de color pardo y lampiñas ; las quales hacian al principio las veces de estipulas : las *hojas* alternas, sencillas , con peciolo , aovadas , enterisimas , agudas, planas , venosas , algo pelosas en ambas partes y blanquecinas por debaxo ; con los *peciolos* cortisimos : las *estipulas* de dos en dos , pequeñas y alesnadas : las *flores* en panoja y terminales : y el *caliz* vellosos. La *flor* es singular , por tener señaladamente el vilano diverso.

1115. Género SPILANTHUS. Jacq. Bidens acmelloides.

Bergius. Act. Holm. 1768. t. 7. Pyrethrum. Medic.

in Act. palat. vol. 3. phys. p. 237. t. 18.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun derecho , con muchas hojuelas , casi iguales , oblongas ; y dos *exteriores* mas largas.

COR. compuesta uniforme y tubulosa ; con las *corolillas* hermafroditas é iguales.

Propia en forma de embudo ; con el *borde* , las mas veces , hendido en quatro partes.

ESTAMB. Filamentos cinco y cortos : con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. Germen oblongo : *estilo* filiforme y del largo del caliz : con dos *estigmas* encorvados ácia atrás.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas , entre comprimidas y planas , con ribete membranoso , adornadas de dos aristas , y la una de ellas mas pequeña.

RECEPT. desnudo y cónico.

Obs. Debe observarse con mas exâctitud este género , el qual , acaso , no deberia separarse del Bidente.

ESPECIES.

Urens. 1. *SPILANTHUS foliis lanceolatis integerrimis, caule prostrato.* Syst. veg. 610. Jacq. amer. 214. t. 126. f. 1. Espilanto con hojas lanceoladas, enterisimas; y tallo postrado.

Cast. Espilanto que abrasa.

Habita en la America.

El receptaculo posee pajas. Jacq. R.

Pseudo-Acmella. 2. *SPILANTHUS foliis lanceolatis serratis, caule erecto.* Espilanto con hojas lanceoladas, aserradas; y tallo derecho.

Verbesina (Pseudo-Acmella) foliis lanceolatis subserratis, pedunculis longioribus. Spec. plant. ed. 3. p. 1270. Flor. zeyl. 308. Verbesina (Falsa-Acmella) con hojas lanceoladas, algo aserradas; y pedunculos mas largos que la flor.

Pyrethrum (Acmella) corollulis quadrifidis & quinquefidis, foliis ovato-acuminatis, profunde serratis, caule erecto. Medic. act. pal. vol. 3. phys. p. 243. t. 19. Pelitre (Acmella) con las corollillas hendidas en cuatro y en cinco partes; hojas enteras y puntiagudas, profundamente aserradas; y tallo derecho.
hanc & Pseudo-Acmellam conjungit. R.

Bidens Zeylanica, flore luteo, Melissæ folio, Acmella dicta. Seb. thes. 1. p. 19. t. 10. 11. Bidente de Zeylan, llamado Acmela, con la flor amarilla; y hoja como la del Torongil.

Chrysanthemum Madraspatanum, latifolium, Scabiosæ capitulis, parvis. Pluk. alm. 99. t. 159. f. 4. Chrysantemo de Madraspatan, con hoja ancha; cabezuelas como las de la Escabiosa y pequeñas.

Cast. Espilanto Falsa-Acmela.

Habita en Zeylan.

Produce el tallo derecho, rollizo, obscuro, algo rígido y áspero, con pelos blancos, esparcidos y echados: las

ramas opuestas : las *hojas* tambien opuestas , con peciolo , sin estipulas , aovadas , con tres nervios por detrás unidos mas arriba de su base , venosas , desnudas , profundamente aserradas y opacas : los *peciolos* algo acanalados y casi vellosos : los *pedunculos* que salen de la horquilladura del tallo , solitarios , de una flor , rollizos , derechos , desnudos y largos : la *flor* junto con el caliz aovada , amarilla y sin radio ; y las *corolillas* hendidas en cinco partes : el *caliz* apretado , con quatro ó cinco hojuelas y las exteriores poco mas cortas. (*En todas las flores se hallan pajas.* Medicus act. pal. loco citato. R.)

Acmella.

3. *SPILANTHUS foliis ovatis serratis , caule erecto , floribus radiatis.* Mat. med. p. 208. Espilanto de hojas aovadas , aserradas ; tallo derecho ; y flores con radios.

Verbesina (Acmella) foliis oblongo-ovatis trinerviis subdentatis petiolatis , pedunculis elongatis axillaribus , floribus conicis. Spec. plant. 3. p. 1271. Mill. dict. n. 6. Verbesina (*Acmela*) con hojas entre oblongas y aovadas , de tres nervios , algo dentadas , con peciolo ; pedunculos alargados , axilares ; y flores cónicas.

Verbesina foliis oppositis lanceolato ovatis petiolatis serratis , pedunculis unifloris dichotomiæ caulis. Flor. zeyl. 309. Verbesina de hojas opuestas , entre lanceoladas y aovadas , con peciolo , aserradas ; y pedunculos de la horquilladura del caliz con una flor.

Chrysanthemum Bidens , seu Bidens Zeylanica , flore luteo , Lamii folio , Acmella dicta. Rai. Suppl. p. 228. Breyn. prodr. 3. t. 48. Chrysantemo Bidente , 6 Bidente de Zeylan , llamado Acmela , con la flor amarilla ; y hoja como la del Lamio.

Senecio Indiæ Orientalis , Ocymi majoris folio , profunde crenato. Pluk. alm. 343. t. 315. f. 2. Senecio de la India Oriental , con hoja como la de la Albahaca mayor y profundamente recortada.

ABCdaria. Rumph. amb. 6. p. 145. t. 65. Abecedaria.

Cast.

Cast. Espilanto Acmela.

Habita en Zeylan. ☉

Es muy semejante á la precedente, tanto que apenas puede distinguirse de ella ; aunque produce los *tallos* mas ramosos y muchas flores, con la mayor parte de los *flosculos del disco* hendidos en quatro partes y algunos en cinco : y el *radio* de cinco *flosculos* menudos, de los quales carece la precedente, por razon, acaso, del clima. (*El receptaculo se halla tambien adornado de pajas. R.*)

Rumphio la llama *Abecedaria*, porque los Maestros de Etiopia hacen mascar las cabezuelas ó raicitas de esta yerba á sus discipulos, á fin de que tengan la lengua expedita para pronunciar las letras Arabigas.

PROPIED. La yerba y semillas son balsamicas y amargas; anodinas, diaphoreticas, diureticas, emenagogas; y adelgazan los humores: se usan en la gota, en la leucorrea y pleuritide: y se experimentan admirables efectos de ellas en la hidropesia, en la iscuria y en el cálculo.

Arri-
plicifolius.

4. *SPIRANTHUS foliis alternis deltoidibus dentatis petiolatis stipulatis, caule paniculato.* Syst. veg. 610. Espilanto de hojas alternas, parecidas á la figura de delta, dentadas, pecioladas, con estipulas; y tallo en panoja.

Bidens Atriplicifolius. Bidente con hoja de Armuelle.
Spec. pl. 3. p. 1168. Amoen.
acad. 4. p. 329.

Cast. Espilanto con hoja de Armuelle.

Habita en la America meridional. *Miller.*

Tiene las semillas sin arista; y el *receptaculo* cónico.

Insi-
pidus.

5. *SPIRANTHUS foliis obovatis subdentatis sessilibus.* Jacq. amer. 215. t. 126. f. 2. Espilanto con hojas aovadas al revés, algo dentadas y sin peciolo.

Cast. Espilanto insipido.

Habita en la America.

Posee el *receptaculo* pajoso. *Jacq. R.*

Olera-
ceus.

6. *SPILANTHUS foliis subcordatis serrulatis petiolatis*. Syst. veg. p. 610. Jacq. hort. t. 135. Espilanto con hojas casi de figura de corazon , aserraditas y pecioladas.

Pyrethrum (*Spilanthus*) *corollulis quadrifidis quinquefidis , foliis subcordatis , inordinate crenatis*. Med. in act. pal. 3. phys. p. 242. & 273. R. Pelitre (*Espilanto*) con las corolillas hendidas en cuatro y en cinco partes; hojas casi de figura de corazon y recortadas sin orden.

Bidens Acmelloides. Berg. act. holm. 1768. t. 7. R. Bidente parecido á la Ac-mela.

Cast. Espilanto de hortaliza.

Habita.....

Echa los tallos tendidos , del largo de un pie , rollizos y algo ásperos : las hojas obtusas , aserradas , opuestas y con peciolo : las flores solitarias , con el pedunculo muy largo y del todo amarillas.

Tiene el receptaculo pajoso. Berg. Medic. R.

1116. Género BIDENS. * Tourn. t. 262. Dill.

elth. 43. 47. Ceratocephalus. Vaill. A. G.

1720. f. 47. 48. 49.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun derecho , apifinado ; con hojuelas las mas veces iguales , oblongas , acanaladas y cóncavas.

COR. compuesta uniforme y tubulosa ; con las corolillas hermafroditas y tubulosas.

Propia en forma de embudo ; con el borde hendido en cinco partes y derecho.

ESTAMB. Filamentos cinco , capilares y cortísimos : con la antera cilíndrica y tubulosa.

PIST. Germen oblongo : estilo sencillo y del largo de los estambres : con dos estigmas oblongos y redoblad.

PERIC. ninguno : el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. obtusas y anguladas : vilano con dos ó mas aristas, oblon-

oblongas , rectas , agudas , ásperas y ganchosas con aguijoncitos vueltos ácia atrás.

RECEPT. plano ; y con pajas que se caen facilmente.

OBS. En muchas especies el caliz exterior se halla de cinco hojuelas , extendido y que ciñe la flor compuesta. Alguna vez , la corola está adornada de uno ú otro flosculo que forma radio. R.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 462.

La flor es comunmente flosculosa ó que consta de muchos petalos hendidos en muchas partes , sentados en el embrion , y comprehendidos en un caliz ; hallandose tambien á veces algunos semiflosculos : y el embrion pasa á semilla terminada en aguijoncitos.

E S P E C I E S.

Tri-
partita

1. *BIDENS foliis trifidis* , *calycibus subfoliosis* , *seminibus erectis*. Pall. it. p. 62. Knorr. del. 2. t. B. I. f. 2.

Bidente de hojas hendidas en tres partes ; cálices casi foliosos ; y semillas derechas.

Bidens foliis petiolatis , *trilobatis* & *quinelobatis* , *serratis* , *floribus circumvallatis*. Hall. helv. n. 121.

Bidente de hojas con petiolo , hendidas en tres y en cinco lóbulos , aserradas ; y flores cercadas de hojuelas.

Bidens foliis tripartito-divisis. Tourn. p. 462.

Bidente con hojas divididas en tres partes hasta su base.

Cannabina aquatica , *folio tripartitum diviso*. C. B. P. 321.

Cannabina aquatica , con hoja dividida en tres partes hasta su base.

Verbesina sive Cannabina aquatica , *flore minus pulcro* , *elatiores ac magis frequens*. Bauh. hist. 2. p. 2074.

Verbesina ó Cannabina aquatica mas levantada y mas frecuente , con la flor menos hermosa.

Hepatorium aquatile. Dod. pempt. 595.

Hepatorio aquatico.

α *Conyza palustris* , *foliis tripartito-divisis*. Loes. prus. 53. ic. 10. Hall. R.

Conyza palustre , con hojas divididas en tres partes hasta su base. α

Cast.

Cast. Bidente dividido en tres partes.

Habita en lugares inundados de Europa : en los bosques del Real Sitio de San Ildefonso , en Miraflores , Bustarviejo , en Cataluña y otras muchas partes de España. ☉

2. *BIDENS foliis lanceolatis sessilibus , floribus seminibusque erectis.* Fl. dan. t. 312. Bidente con hojas lanceoladas y sin peciolo ; flores y semillas derechas.

Verbesina minima. Dill. giss. 167. app. 66. Rai. angl. 3. p. 188. t. 7. f. 2. Verbesina minima.

Cast. Bidente muy pequeño.

Habita en lugares pantanosos de la Europa septentrional. ☉

Haller tiene á esta especie por variedad de la *Bidente cabizbaxa.* R.

3. *BIDENS foliis oblongis integerrimis unidentatis , caule dichotomo , floribus solitariis sessilibus.* Mill. dict. n. 2. Bidente de hojas oblongas , enterisimas y con un solo diente ; tallo ahorquillado ; flores solitarias y sentadas.

Bidens nodiflora, Brunel. *Bidens que florece en los nudos , y con hoja como la de la Brunela.* Dill. elth. 52. t. 44. f. 52.

Cast. Bidente que florece en los nudos.

Habita en Bengala.

Produce el tallo del largo de un palmo , algo rollizo , con pelos rígidos , blancos , y por su base purpúreos : las ramas opuestas en forma de aspa y extendidas : las hojas con peciolos algo anchos , aovadas (en la hortense) , entre anguladas y dentadas , un poco obtusas , lampiñas por encima , y pelosas por debaxo junto á las venas : los pedunculos terminales semejantes al tallo y del largo de las hojas : el caliz cilindrico , ceñido con hojas oblongas , mas largas que él y extendidas : los flosculos claros , hendidos en quatro ó cinco partes y amarillos.

- Te- 4. *BIDENS foliis lineari-* Bidente con hojas linea-
 nella. *ribus, pedunculis capillari-* res; pedunculos capilares;
bus, calycibus subtetra- cálices de quatro, ó cinco
phyllis, seminibus erectis hojuelas; semillas derechas
quinis. Amœn. acad. 6. afr. y de cinco en cinco.
 47. X

Cast. Bidente tiernecito.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

- Cer- 5. *BIDENS foliis lanceo-* Bidente con hojas lanceo-
 nua. *latis amplexicaulibus, flo-* ladas, amplexicaules; flores
ribus cernuis, seminibus cabizbaxas; y semillas dere-
erectis. Scop. carn. ed. 2. n. chas.
 1089. Knorr. del. 2. t. B. 1. X
 f. 1.

Bidens foliis sessilibus, Bidente con hojas sin pe-
floribus nutantibus, circum- ciolo; flores inclinadas, y cer-
vallatis. Hall. helv. n. 120. cadas con hojuelas.

Cannabina aquatica, fo- Cannabina aquatica, con
lio non diviso. C. B. P. 321. hoja entera.

Eupatorium Cannabinum, Eupatorio Cannabino ó co-
Chrysanthemum. Tabern. ic. mo Cañamo, con la flor co-
 117. mo la del Chrysantemo.

Verbesina pulchriore flo- Verbesina con la flor ama-
re luteo. Bauh. hist. 2. p. rilla y mas hermosa.

1074.

Bidens folio non dissecto. Bidente con hoja entera.
 Csal. p. 488. Tourn. p. 462. X

Cast. Bidente cabizbaxo.

Habita en las fuentes y fosos de Europa: en las faldas de los pirineos de Cataluña y señaladamente en las orillas de las acequias del circuito de la villa de Camprodon. ☉

Vease el *Coreopsis bidente* y la afinidad que tiene con esta especie.

Fron-
dosa.

6. *BIDENS foliis pinna-
tis serratis lineatis glabris,
seminibus erectis, calycibus
frondosis, caule lævi.*

Bidente de hojas pinna-
das, con aserraduras, raya-
das y lampiñas; semillas de-
rechas; cálices frondosos; y
tallo liso.

*Bidens Canadensis, lati-
folia, flore luteo.* Tourn. p. 362.

Bidente del Canadá, con
hoja ancha; y flor amarilla.

*Chrysanthemum Cannabi-
num, Bidens Virginianum,
caule erecto, firmo, subru-
bente.* Moris. hist. 3. p. 17.
sect. 6. t. 5. f. 21.

Chrysantemo Cannabino,
Bidente de Virginia, con el
tallo derecho, firme y algo
roxo.

Cast. Bidente frondoso.

Habita en la America septentrional. ☉

Tiene las hojas de abaxo de tres en rama, ó pinnadas con
cinco hojuelas: la flor flosculosa, con el disco cónico:
las semillas sin ser divergentes, con dos aristas aparta-
das: el tallo liso: y los pedunculos mas largos que la
hoja.

Echa las semillas aovadas al revés, comprimidas, y ter-
minadas en quatro aristas, con las dos alternas muy
cortas: muchas bractéas desiguales y pestafosas en su
base. Varía con las hojas de arriba muy sencillas y en-
terisimas. Gov. hort. 428.

Pilosa.

7. *BIDENS foliis pinna-
tis subpilosis, caule geni-
culis barbatis, calycibus
involucro simplici, semini-
bus divergentibus.*

Bidente de hojas pinna-
das, algo pelosas; tallo con
nudos barbados; cálices con
el involucro sencillo; y se-
millas divergentes.

*Bidens latifolia, hirsu-
tior, semine angustiore ra-
diato.* Dill. elth. 51. t. 43.
f. 51.

Bidente con mas pelo ás-
pero, de hoja ancha; y semi-
lla mas angosta y radiada.

Bidens Chinensis.
Agrimonia Molucca. Rum-
ph. amb. 6. p. 38. t. 15. f. 2.

Bidente de la China. α
Agrimonia de las Molu-
cas.

Cast. Bidente peloso.

Habita en la America: y la variedad en la China. ☉
Tie-

204 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Tiene el tallo con los nudos barbados : las hojas pinnadas, con las tres hojuelas de afuera coadunadas : el disco de las flores cónico : y las semillas intermedias mas largas y que quando maduran se ponen divergentes.

La variedad es muy semejante ; pero tiene las hojuelas separadas : las semillas siempre con quatro aristas : y el radio de la flor blanco y menudo.

Bipin-
nata.

8. BIDENS foliis bipinnatis incisís, calycibus involuocratis, corollis semiradiatis, seminibus divergentibus. Fabric. helmst. 158. Kniph. cent. 8. n. 13.

Bidente con hojas dos veces pinnadas, cortada ; cálices con involuacro ; corollas medio radiadas ; y semillas divergentes.

Chrysanthemum aquaticum, foliis multifidis, Cicutæ nonnihil similibus, Virginianum. Herm. lugdb. 416.

Chrysantemo aquatico, de Virginia, con hojas hendidas en muchas partes y algo semejantes á las de la Cicutá.

Chrysanthemum Americanum, Coridis indi folio. Herm. par. 123. t. 123.

Chrysantemo de America, con hoja como la del Corindo.

Chrysanthemum Cannabinum, Bidens Virginianum, Cicutariæ foliis, flosculis conniventibus. Moris. hist. 3. p. 17. sect. 6. t. 7. f. 23.

Chrysantemo Canabino, Bidente de Virginia, con hojas como las de la Cicutaria ; y flosculos arrimados entre sí ó cerrados.

Cast. Bidente dos veces pinnado.

Habita en la Virginia. ☉

Vease el *Chrysantemo de la China*, con hojas divididas en muchas partes y parecidas á las del *Halicacabo peregrino*.

Las flores, algunas veces, no tienen radio, y otras poseen uno ú otro flosculo estéril y que forma radio : las semillas son divergentes con tres aristas y la intermedia muy larga.

Las semillas se hallan con dos aristas, segun Villich. in nov. act. A. N. C. IV. p. 118. R.

Nivea.

9. *BIDENS foliis simpli-* X Bidente de hojas sencillas,
cibus subhastatis serratis X casi en forma de alabarda,
petiolatis, floribus globosis, X aserradas y con peciolo; flo-
pedunculis elongatis, semi- X res globosas; pedunculos
nibus lævibus. Mill. dict. n. 3. X alargados; y semillas lisas.

Bidens foliis cordatis ser- X Bidente con hojas de figu-
ratis petiolatis, floribus glo- X ra de corazon, aserradas y
bosis, pedunculis filiformi- X pecioladas; flores globosas;
bus. Roy. lugdb. 158. X y pedunculos filiformes.

Ceratocephalus foliis cor- X Ceratocephalo ó cabeza de
datis seu triangularibus, X cuernecillos con hojas de fi-
flore albo. Vaill. act. 1720. X gura de corazon, ó triangula-
 p. 327. vide Dill. elth. t. 47. X res; y flor blanca.
 f. 55. n. 3.

α *Bidens scabra, flore ni-* X Bidente áspero, con la flor
veo, folio trilobato. Dill. X de color de nieve; y hoja
 elth. 55. t. 47. f. 55. X hendida en tres lóbulos. α

β *Bidens scabra, flore ni-* X Bidente áspero, con la flor
veo, folio panduræformi. X de color de nieve; y hoja en
 Dill. elth. 54. t. 46. f. 54. X forma de bandurria. β

Cast. Bidente de color de nieve.

Habita en la Carolina. 24

Tiene los cálices algo apinados: y las semillas con dos aristas.

Verti-
cillata.

10. *BIDENS foliis oblon-* X Bidente con hojas oblon-
gis integris, infernè alter- X gas y enteras, las de abaxo
nis, supernè oppositis, flo- X alternas, las de arriba opues-
ribus verticillatis. Hort. cliff. X tas; y flores en verticilo.
 399.

Bidens Americana, pro- X Bidente de America, ten-
cumbens, Polygoni folio sub- X dido, con hoja como la del
tus incano. Houst. mss. X Polygono y blanquecina por
 X debaxo.

Cast. Bidente verticilado.

Habita en Vera-cruz.

Scandens. 11. *BIDENS foliis oppositis ovatis acuminatis integerrimis, caule scandente fruticoso, floribus oppositis paniculatis.* Hort. cliff. 399. Bidente con hojas opuestas, aovadas, puntiagudas y enterisimas; tallo trepador fruticoso; flores opuestas y en panoja.

Cast. Bidente trepador.

Habita en Vera-cruz.

Bullata. 12. *BIDENS foliis ovatis serratis, inferioribus oppositis, superioribus ternatis, intermedio majore.* Mill. dict. n. 6. Arduin. spec. 2. p. 37. t. 18. Bidente con hojas aovadas, aserradas, las inferiores opuestas, y las superiores de tres en rama, con la hojuela intermedia mayor.

Bidens palustris, annua, foliis subrotundis, latioribus, plerumque trilobis. Mich. flor. 120. Bidente palustre, annuo, con hojas casi redondas, mas anchas y las mas veces hendidas en tres lóbulos.

Bidens foliis ovatis tripteris, caulibus hirsutis & brachiatis. Hall. goett. 383. Bidente de hojas aovadas y de tres alas ú hojuelas; tallos con pelo áspero y con ramas opuestas en forma de aspa.

Cast. Bidente ampoloso.

Habita en America y en Italia. ☉

Posee el tallo derecho y del largo de dos pies: las hojas casi aovadas, aserradas, crasas, vellosas y con alguna ampolla: las inferiores sencillas; las superiores casi sentadas, y casi de tres en rama, con las hojuelas laterales muy pequeñas: las flores axilares y terminales, solitarias, amarillas y con pedunculo corto: los cálices ceñidos por su base con cinco hojuelas entre aovadas y oblongas, y extendidas: las semillas con dos aristas y con pestañas vueltas ácia atrás.

1117. Género CACALIA. * *Vaill. A. G.* 1719. *Tourn.*

t. 258. *Kleinia, edit. prior. Cacalianthemum. Dill.*

elth. 54. 55. An *Tithymaloides?* *Klein.*

Monogr. Porophyllum. Vaill.

A. G. 1719. t. 20. f. 39.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* sencillo, oblongo y cilíndrico; con cinco hasta diez *escamas* iguales, entre lanceoladas y lineares, que constituyen el tubo, y algo calzado por su base con otras pocas *escamas* cortísimas y echadas.

COR. *compuesta* tubulosa; con las *corolillas* hermafroditas del número de las hojuelas mas largas del caliz, y uniformes.

Propia en forma de embudo, adelgazada gradualmente en un tubo; con el *borde* hendido en cinco partes y derecho.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* oblongo: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con dos *estigmas* oblongos y revueltos.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas, aovadas y angostas: con el *vilano* peloso y larguísimo.

RECEPT. desnudo, plano y punteado.

OBS. *La Cacalia alpina se diferencia por las hojuelas del caliz conglutinadas; y por las corolas hendidas en quatro partes.*

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 451.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos petalos divididos en quatro partes, sentados en el embrión y comprendidos en el caliz á manera de cilindro: y el embrión pasa á semilla adornada de su vilano.

ESPECIES FRUTESCENTES.

Pa- 1. CACALIA caule fru- X Cacalia con el tallo fruti-
pillaris ticoso obvallato spinis petio- X coso, y cercado de espinas
laribus truncatis. Mill. dict. X como peciolo truncados.

n. 7.

Kleinia caule carnosu, pe- X Kleinia con el tallo car-
tiolis truncatis obvallato. X noso, y cercado de peciolo
Hort. cliff. 395. X truncados.

Cacalanthemum caudice X Cacaliantemo con el tron-
papillari. Dill. elth. 63. t. X co cercado de pezones.
55. f. 63. X

Cast. Cacalia de pezones.

Habita en Etiopia. *h*

Anteu- 2. CACALIA caule fru- X Cacalia con el tallo fruti-
phor- ticoso, foliis ovato-oblongis X coso; hojas entre aovadas y
bium. planis, petiolis basi linea X oblongas, planas; y peciolo
triplici deductis. Mill. dict. X prolongados por su base en
n. 8. X tres lineas.

Kleinia foliis carnosis X Kleinia con hojas carno-
planis ovato-oblongis. Hort. X sas, planas, y entre aovadas
cliff. 395. X y oblongas.

Ante-Euphorbium. C. B. X Anteuforbio ó planta que
P. 387. Dod. pempt. 387. X corrige la acrimonia del Eu-
Moris. hist. 3. p. 345. sect. 10. X forbio.
t. 5. f. 10. X

Cast. Cacalia Anteuforbio.

Habita en Etiopia. *h*

Cu- 3. CACALIA caule fru- X Cacalia con el tallo fruti-
neifo- ticoso, foliis cuneiformibus X coso; hojas en forma de cu-
lia. carnosis. X ña y carnosas.

Cast. Cacalia con hojas en forma de cuña.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Echa el tallo carnosu; y las hojas esparcidas, sin venas ni
lomo, carnosas y algo convexas por debaxo.

Kleinia.

4. *CACALIA caule fruticoso composito, foliis lanceolatis planis, petiolorum cicatricibus obsoletis.* Mill. dict. n. 6. Cacalia con el tallo fruticoso, compuesto; hojas lanceoladas, planas; y cicatrices de los peciolo poco manifestadas.

Kleinia foliis lanceolatis planis, caule levi ventricos. Hort. cliff. 395. Kleinia con hojas lanceoladas, planas; tallo liso y ventricos.

Cacaliantemum folio Nerii, glauco. Dill. elth. 61. t. 54. f. 2. Cacaliantemo con hoja como la de la Adelfa y de color garzo.

Frutex Indiæ Orientalis, Lavendulæ folio. C. B. P. 401. Arbusto de la India Oriental, con hoja como la del Espliego.

Nec Cacalia, nec Cacaliastrum, an Tithymaloides frutescens, Nerii folio? Klein. monogr. Burm. ind. 165. Planta que no es Cacalia, ni Cacaliastro; y así será semejante al Titimalo frutescente, con hoja de Adelfa?

Cast. Cacalia de Klein.

Habita en las Canarias. *h*

Sube á la altura de un hombre: y las hojas se adelgazan en peciolo.

Ficoides

5. *CACALIA caule fruticoso, foliis compressis carnosis.* Mill. dict. n. 5. Cacalia con el tallo fruticoso; hojas comprimidas y carnosas.

Kleinia foliis carnosis lanceolatis compressis, caule tereti. Hort. cliff. 395. Kleinia con hojas carnosas, lanceoladas, comprimidas; y tallo rollizo.

Senecio Africanus, arborescens, Ficoidis folio & *facie.* Comm. rar. 40. t. 40. Senecio de Africa, arborescente, con hoja y traza como las de la Ficoide.

Bradl. succ. 5. p. 11. t. 49.

Cast. Cacalia Ficoide.

Habita en Etiopia. *h*

Re-pens.

6. *CACALIA caule fruticoso, foliis depressis carnosis.* Cacalia con el tallo fruticoso; hojas deprimidas y carnosas.

TOM. VI.

O

Cast.

Cast. *Cacalia rastrera*.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

No vió Linneo la fructificación de esta especie. Tiene la raíz rastrera y su estructura es muy semejante á la de la *Cacalia Ficoide*, cubierta tambien de un rocío de color garzo; pero sus hojas se hallan entre deprimidas y cóncavas por encima, y no comprimidas por los lados.

Suf-
fruti-
cosa.

7. *CACALIA caule suf-
fruticoso ramoso, foliis li-
nearibus planis sparsis.*

Cacalia con el tallo sufruticoso y ramoso; hojas lineares, planas y esparcidas ó sin orden.

*Cacalia foliis linearibus,
in egerimis, caulibus uni-
floris.* Arduin. spec. 2. p. 39.
t. 19.

Cacalia con hojas lineares, enterisimas; y tallos de una flor.

Cast. *Cacalia sufruticosa*.

Habita en el Brasil. *h* Arduin.

Arroja el tallo sufruticoso, del largo de un palmo, variamente ramoso y filiforme: las hojas esparcidas, lineares, enterisimas y sin ser carnosas: los pedunculos terminales, solitarios, de una flor, derechos y del largo del tallo: el caliz muy sencillo, de cinco hojuelas aovadas, obtusas, derechas, con sus lados membranosos y escondidos: muchos flosculos, de color purpúreo: y el vilano con pelos rígidos.

Lauri-
folia.

8. *CACALIA fruticosa,
glabra, foliis petiolatis
ovatis triplinerviis obtusis
integerrimis glaberrimis,
thyrsis terminali, calyce te-
traphyllo glabro.* Suppl. p.
351.

Cacalia fruticosa, lampiña, de hojas pecioladas, aovadas, con tres nervios uniformes mas arriba de la base, obtusas, enterisimas, muy lampiñas; panoja aovada, terminal; caliz de cuatro hojuelas y lampiño.

Cast. *Cacalia* con hoja de Laurel.

Habita en México. Mutis. *h*

Es arbusto muy lampiño y parecido al *Viburno Tino* ó al Laurel. Echa las hojas opuestas, con el peciolo corto,

aovadas, enterisimas, obtusas y del largo de una pulgada, verdes por debaxo, relucientes por encima, consistentes y siempre verdes, con nervios que se escurren sobre su base: la *panoja* terminal, en forma aovada y cónica: el *caliz* con quatro flosculos, y de quatro hojuelas iguales, oblongas, obtusas y opuestas de dos en dos: el *borde de la corola* mayor que el tubo, con quatro dientes: y los *pistilos* mas largos.

Cordi-
folia.

9. *CACALIA frutescens*, *Cacalia frutescente*, con *hirsuta*, *foliis petiolatis* pelo áspero; hojas peciola-
cordato-ovatis nervosis acu- das, entre de figura de co-
tis scabris, calyce tetra- ragon y aovadas, nerviosas,
phyllo quadrifloro pubescen- agudas y ásperas; caliz de
te. Suppl. p. 351. quatro hojuelas, con quatro
flosculos y vellosos.

Cast. *Cacalia* con hoja de figura de corazon.

Habita en la America meridional. *Doct. Mutis.* *h*

Posee las *hojas* opuestas, anchas y aovadas, de figura de corazon por su base, puntiagudas en su ápice, aserradas, ásperas, con pelo rígido, con tres nervios y venosas; y sus *peciolos* largos y tomentosos: las *panojas* terminales, y cubiertas de hojas florales: los *cálices* muy lampiños, desnudos (*vellosos?*) y de quatro hojuelas iguales, opuestas, lanceoladas, y derechas: quatro *flosculos* iguales y hermafroditos: las *corolas* con el borde dividido en quatro partes: dos *estilos* apenas mas largos que los estambres: el *vilano* muy sencillo y mas largo que el caliz. Varía con las *hojas* enteras y aserradas.

Ascle-
piadæa

10. *CACALIA fruticosa*, *Cacalia fruticosa*, tomen-
tomentosa, foliis petiolatis tosa, de hojas con peciolo,
ovato-lanceolatis integerri- entre aovadas y lanceoladas,
mis supra glaberrimis sub- enterisimas, muy lampiñas
tus tomentosis margine re- por encima, tomentosas por
volutis, paniculis termina- debaxo, revueltas en su
libus. Suppl. p. 352. margen; y *panojas* termina-
les.

Cast. *Cacalia* parecida á la *Asclepias*.

Habita en la America meridional. Mutis. h

Tiene los *tallos* rollizos, rectos y blancos, con tomento blando: las *hojas* pecioladas, opuestas, extendidas, con su base aovada, y gradualmente adelgazadas, muy tomentosas por debaxo, muy lampiñas por encima, venosas, y de la consistencia de la hoja del *Laurel*; con sus *pecíolos* algo rollizos y tomentosos: las *panojas* terminales, pequeñas y amontonadas: el *caliz* de pocos flosculos y calzado con escamas mas grandes.

Ap-
pendi-
culata.

11. *CACALIA fruticosa*, tomentosa, foliis cordatis ovatis acutis angulatis subtus tomentosis, petiolis appendiculate foliosis. Suppl. p. 352. *Cacalia fruticosa*, tomentosa, con hojas de figura de corazon, aovadas, agudas, anguladas, tomentosas por debaxo; y peciolo con apendices foliosos.

Cast. Cacalia con apendices.

Habita en lugares aguanosos de Tenerife. *Masson.* $\frac{1}{2}$

Es *arbuscto* con el tallo angulado, tomentoso y cano. Produce las *hojas* mas altas con el peciolo largo, de figura de corazon, con algun ángulo, aovadas, agudas, algo escotadas ácia el peciolo, nerviosas, venosas, muy lampiñas, verdes por encima, y con tomento blanquecino por debaxo: el *peciola* con tres pares de hojuelas opuestas, muy pequeñas, pecioladas, aovadas, enterisimas; las mas apartadas de la hoja mayores; y las mas acercadas á ella gradualmente menores: las *panojas* terminales: los *piececitos* con brácteas: y las *flores* amarillas.

El célebre *Masson* halló otra planta en los montes de Tenerife, y pareciéndole que era distinta especie de esta la remitió á *Linneo*; pero solamente se diferencia de la *Cacalia* con apendices por el tallo muy lampiño; por las hojas entre de figura de corazon y oblongas, algo dentadas y sin ángulos.

To-mento-sa. 12. CACALIA tomento-sa, caule fruticoso, foliis lanceolatis dentatis subtus tomentosiss sessilibus. Suppl. P. 353. X Cacalia tomentosa, con el tallo fruticoso; hojas lanceoladas, dentadas, tomentosas por debaxo y sin peciolo.

Cast. Cacalia tomentosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. *h*

ESPECIES HERBACEAS.

Poro-phyl-lum. 13. CACALIA caule her-baceo indiviso, foliis ellipticis subcrenatis. X Cacalia con el tallo herbáceo é indiviso; hojas elípticas y algo recortadas.

Porophyllum foliis ellipticis. Hort. cliff. 394. X Porophylo con hojas elípticas.

Tagetes foliis integris, perforatis. Plum. spec. 10. X Tagetes con hojas enteras y horadadas.

Senecio Indicus, Atriplicis folio, glabro. Moris. hist. 3. p. 106. sect. 7. t. 17. f. 7. X Senecio de Indias, con hoja como la del Armuelle y lampiña.

Chrysanthemum Americanum, frutescens, Balsaminae foliis, nigris maculis punctatis. Pluk. alm. 100. t. 161. f. 1. X Chrysantemo de America, frutescente, con hojas como las de la Balsamina y punteadas con manchas negras.

Cast. Cacalia de hojas horadadas.

Habita en la America. ☉

Sonchifolia. 14. CACALIA caule herbaceo, foliis lyratis amplexicaulibus dentatis. Murray. comm. goett. nov. tom. 3. t. 7. Mill. dict. n. 9. X Cacalia con el tallo herbáceo; hojas en forma de lira, amplexicaules y dentadas.

Muel Schavi. Rheed. mal. 10. p. 135. t. 68. X Muel Schavi.

Senecio Maderaspatanus, Sinapios folio, floribus parvis, luteis. Pluk. amalth. 192. t. 444. f. 1. X Senecio de Madraspatan, con hoja como la de la Mostaza; flores pequeñas y amarillas.

214 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Sonchus Amboinensis. X Cerraja de Amboina.
Rumph. amb. 5. p. 297. t. X
103. f. 1. X

Cast. *Cacalia* con hoja de Cerraja.

Habita en Zeylan y en la China. ○

Arroja los tallos casi sencillos, algo lisos y herbáceos: las hojas inferiores en forma de lira, lisas, con sus lacinias algo agudas; las superiores entre de figura de corazón y lanceoladas, amplexicaules, con algun diente-cito por su base y salpicadas de pelos claros, señaladamente en su lomo: algunas flores terminales, cilindricas y con los pedunculos propios setáceos: el caliz muy sencillo: los flosculos de color de sangre y menudos.

Incana 15. *CACALIA caule herbaceo, foliis lanceolatis dentatis*. X *Cacalia* con el tallo herbáceo; hojas lanceoladas y dentadas. X

Cast. *Cacalia* blanquecina.

Habita en la India.

Su estatura es como la de la *Verbesina alada*. Tiene el tallo derecho y alto: las hojas entre anchas y lanceoladas, casi sin peciolo, algo crasas, y entre aserradas y dentadas: los pedunculos terminales, ramosos, largos y con una ú otra hojuela muy pequeña.

Sarracenic. 16. *CACALIA caule herbaceo, foliis lanceolatis serratis decurrentibus*. X *Cacalia* con el tallo herbáceo; hojas lanceoladas, aserradas y escurridas. X

Solidago foliis lanceolatis decurrentibus, caule angulato. Monnier. obs. 163. X *Solidago* con hojas lanceoladas, escurridas; y tallo anguloso. X

Virga-aurea seu Solidago Sarracenicata. Bauh. hist. 2. p. 1063. X *Virgaurea* ó *Solidago* Sarraceno de hoja ancha y aserrada. X

Virga-aurea maxima, radice repente, seu Doria major, repens. Moris. hist. 3. p. 123. X *Virgaurea* muy grande, con la raíz rastrera, ó *Doria* mayor, y rastrera. X

Cast. *Cacalia* Sarracena.

Ha-

Habita en la Francia austral. ¶

Es muy semejante al *Senecio Sarraceno* : y tiene las *bracteas* setáceas.

Has-
tata.

17. *CACALIA caule herbaceo, foliis trilobis acuminatis serratis, floribus nuntantibus.* Pall. it. 2. p. 662. X Cacalia con el tallo herbáceo ; hojas hendidas en tres lóbulos , puntiagudas, aserradas ; y flores inclinadas.

Senecio foliis ex dentato trilobis, acuminatis, serratis. Gmel. sib. 2. p. 136. t. 66. X Senecio con hojas entre dentadas y hendidas en tres lóbulos , puntiagudas y aserradas.

Cast. Cacalia en forma de alabarda.

Habita en la Siberia. Gmel.

Arroja el tallo cubierto como de rocío de color garzo : las hojas entre en forma de alabarda y de delta : las flores blancas , con cinco flosculos , poco mas ó menos : las anteras negras : los pedunculos blanquecinos y algo tomentosos : las flores sin bracteas setáceas , menos en las subdivisiones.

Suave-
olens.

18. *CACALIA caule herbaceo, foliis hastato-sagittatis denticulatis, petiolis supernè dilatatis.* Hort. ups. 254. Mill. dict. n. 3. X Cacalia con el tallo herbáceo ; hojas entre de figura de alabarda y saeta , con dientecitos ; y peciolo en- sanchados por arriba.

Cast. Cacalia de olor suave.

Habita en la Virginia y en el Canadá. ¶

Es planta que sube á la altura de un hombre. Echa las hojas entre de figura de saeta y triangulares , ó entre de hechura de alabarda y de delta , y aserradas por su margen : los pedunculos lampiños (no blanquecinos) y salpicados tambien de bracteas setáceas sobre las ramificaciones : las corolas blancas : y las anteras amarillas.

Atriplicifolia. 19. *CACALIA caule herbaceo, foliis subcordatis dentato-sinuatis, calycibus quinquefloris.* Gron. virg. 118. Mill. dict. n. 4. *Cacalia* con el tallo herbáceo; hojas casi de figura de corazon, entre dentadas y sinuosas; y cálices con cinco flosculos.

Cacalia Virginiana, glabra, foliis deltoidibus, sinuatis, subtus glaucis. Morris. hist. 3. p. 94. sect. 7. t. 15. f. 7. *Cacalia* de Virginia, lampiña, con hojas que se acercan á la figura de delta, sinuosas y de color garzo por debaxo.

Nardus Americana, procerior, foliis caesiis. Pluk. alm. 251. t. 101. f. 2. *Nardo* de America, mas alto, con hojas de color verde de azul.

Cast. *Cacalia* con hoja de armuelle.

Habita en la Virginia y en el Canadá. 24

Es semejante á la antecedente; pero tiene las *hojas inferiores* de figura de corazon; las *superiores* mas anchas que largas, sinuosas, de color garzo por debaxo y lisas: las *flores* de cinco flosculos, y cinco veces mas pequeñas que la antecedente.

Alpina 20. *CACALIA foliis reniformi-cordatis acutis denticulatis, calycibus subtrifloris.* *Cacalia* de hojas entre de figura de riñon y de corazon, agudas, con dientecitos; y cálices casi de tres flosculos.

Cacalia foliis cordatis, serratis, longissime petiolatis, floribus umbellatis. Hall. helv. n. 137. *Cacalia* de hojas en forma de corazon, aserradas, con peciolo muy largo; y flores en umbela.

Tussilago caule ramoso. Roy. lugdb. 159. *Tusilago* con el tallo ramoso.

21. *Cacalia foliis crassis, hirsutis.* C. B. P. 197. Morris. hist. 3. p. 94. sect. 7. t. 12. f. 1. Tourn. p. 452. Monnier. obs. 47. Hall. opusc. 207. *Cacalia* de hojas crasas y con pelo áspero. 22

Cacalia tomentosa. Jacq. austr. t. 235. *Cacalia* tomentosa.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 217

Cacalia (*Alliaræ*) *calycibus trifloris* , *foliis cordatis petiolatis dentato angulatis* , *caulinis subhastatis* , *vaginis stipularibus cordato-amplexicaulibus*. Gou. illustr. 65.

Cacalia (*de hoja como la de la Aliaria*) con cálices de tres flosculos ; hojas de figura de corazon , con peciolo , entre dentadas y angulosas , las del tallo casi en forma de alabarda ; vaynas estipulares ó que sirven de estipulas , de figura de corazon y amplexicaules.

Cacalia incano folio. Clus. hist. 2. p. 115.

Cacalia foliis cutaneis , *acutioribus & glabris*. C. B. P. 198. Moris. hist. 3. p. 94. sect. 7. t. 12. f. 6. Tourn. p. 452.

Cacalia con hojas de consistencia de pellejo , mas agudas y lampiñas. β

Cacalia alpina. Jacq. austr. t. 234.

Cacalia alpina.

Cacalia glabro folio. Clus. hist. 2. p. 115.

Cacalia con hoja lampiña.

Cacalia. Lob. ic. 592.

Cacalia.

Cast. *Cacalia alpina*.

Habita en los alpes de Suiza y Austria : en los montes de Arenas y de Asturias : en los pirineos de Cataluña señaladamente en los de Puig-cerdá y de Set-casas. 24

Tiene el *caliz* con tres flosculos , poco mas ó menos : las *hojuelas del caliz* conglutinadas : y las *corolillas* hendidas en quatro partes. *Scop.*

Echinata.

21. *CACALIA herbacea* , *foliis reniformibus cordatis angulato-dentatis subtus tomentosis* , *foliolis calycinis tuberculatis*. Suppl. p. 353.

Cacalia herbácea , con hojas en forma de riñon , y de corazon , entre angulosas y dentadas , tomentosas por debaxo ; y hojuelas del caliz con tuberculos.

Cast. *Cacalia* erizada.

Habita en despeñaderos maritimos de Tenerife. *Masson.* Es muy semejante á la *Cacalia alpina*.

CA-

218 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Albi- 22. CACALIA *herbacea*, X Cacalia herbácea, con ho-
frons. *foliis cordatis biserratis* X jas de figura de corazon, dos
acutis subtus tomentosis, X veces aserradas, algo agu-
stipulis oblongis rotunda- das, tomentosas por deba-
tis. Suppl. p. 353. X xo; estipulas oblongas y re-
X dondeadas.

Cacalia tomentosa. Jacq. X Cacalia tomentosa.
austr. vol. 3. p. 20. t. 235. X

Cast. Cacalia de hoja blanca.

Habita en Austria. Jacq.

Es singular y muy distinta esta especie, por las dos hojas en la base del peciolo, que parecen estipulas sentadas, oblongas, con dientecitos y por debaxo tomentosas.

Bipin- 23. CACALIA *caule her-* X Cacalia con el tallo her-
nata. *baceo, foliis bipinnatis li-* X báceo; hojas dos veces pin-
nearibus. Suppl. p. 353. X nadas y lineares.

Cacalia pinnatifida. Berg. X Cacalia hendida al través.
cap. p. 230. X

Cast. Cacalia dos veces pinnada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Arroja el tallo herbáceo, derecho, estriado y liso: las hojas algo amontonadas, dos veces pinnadas, lineares, con dientes, lisas y del largo de quatro dedos: la pantoja terminal y casi en ramillete horizontal: los piecitos escamosos: los cálices cilindricos, de cinco hojuelas, agudos y con cinco flosculos.

Acau- 24. CACALIA *acaulis* X Cacalia sin tallo, con ho-
lis. *foliis semiteretibus, scapis* X jas medio rollizas; y esca-
unifloris. Suppl. p. 353. X pos de una flor.

Cast. Cacalia sin tallo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Ra- 25. CACALIA *herbacea*, X Cacalia herbácea, con el
dicans *repens, radicans, foliis re-* X tallo rastrero y que echa rai-
teri-ovatis carnosis. Suppl. X ces; hojas rollizas, aovadas
p. 354. X y carnosas.

Cast. Cacalia que arrayga.

Ho.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 219

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Arti- 26. *CACALIA carnos*^{culara.}*a*, \times *Cacalia carnos*^a, con el
caule decumbente articulato, \times tallo tendido y articulado;
foliis inferioribus hastatis, \times hojas inferiores de figura de
superioribus lyratis. Suppl. \times alabarda; y las superiores
 p. 354. \times en forma de lira.

Cast. Cacalia articulada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

1118. Género *ETHULIA*. * *Sparganophorus*.

Vaill. A. G. 1719.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun redondeado, sencillo y de muchas hojuelas
 (quince) lineares, casi iguales y extendidas.

COR. compuesta tubulosa; con las corolillas hermafroditas,
 uniformes y apartadas.

Propia en forma de embudo; con el borde hendido en
 cinco partes y derecho.

ESTAMB. Filamentos cinco, cortísimos y capilares: con la
 antera cilíndrica y tubulosa.

PIST. Germen prismático: estilo filiforme, del largo de los
 estambres: con dos estigmas encorvados ácia atrás.

PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. truncadas, de figura de trompo, con cinco lados y
 cinco sulcos: vilano ninguno, sino que sea una mar-
 gen que sobresale algo.

RECEPT. desnudo, convexo y excavado con puntitos.

ESPECIES.

Cony- 1. *ETHULIA floribus pa-* \times *Ethulia* con flores en pa-
 zoides. *niculatis*. Linn. fil. dec. 1. \times noja.
 p. 1. t. 1. \times

Cast. Ethulia como Conyza.

Habita en la India. ☉

Es singular por sus flosculos distantes.

ETHU-

220 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Spar- 2. ETHULIA *floribus ses-* X Ethulia con flores senta-
gan o- *silibus lateralibus.* X das y laterales.
phora.

Sparganophoros Virgæ- X Esparganophoro con hoja
aureæ folio, floribus ex fo- X como la de la Virgaurea;
liorum alis absque pedicu- X flores que salen de las axilas
lis. Vaill. act. 368. X de las hojas y sin piececito.

Cast. Ethulia Esparganophora.

Habita en la India.

No conoció Linneo esta especie, y sacó su carácter del que trae Vaillant.

Diva- 3. ETHULIA *foliis li-* X Ethulia con hojas line-
ricata. *nearibus dentatis decurren-* X res, dentadas y escurridas;
tibus, pedunculis oppositifo- X pedunculos opuestos á las
liis unifloris, caule divari- X hojas, de una flor; y tallo
cato. Burm. ind. 176. t. 58. X desparramado.
f. 1.

Chrysanthemum Bengha- X Chrysantemo de Bengala,
lense, angustifolium, pu- X pequeñito, con hoja angosta,
sillum, summo caule ramo- X y ramoso en la sumidad del
sum. Pluk. alm. 102. t. 21. X tallo.
f. 4.

Cast. Ethulia desparramada.

Habita en los campos de Malabár. Koenig. ☉

Produce el tallo del largo de un palmo, derecho, corimboso, liso por debaxo, velloso por arriba y ramoso; con las primeras ramas de quatro ángulos agudos y mas cortas: las hojas lanceoladas, alternas, enterisimas, algo carnosas, con sus bases escurridas en ambas partes y que forman los ángulos del tallo: los cálices terminales, casi sentados y apiñados con escamas alesnadas, puntiagudas, tiesas, que sobresalen y de color que tira á purpúreo: el receptáculo desnudo: las semillas tambien desnudas: y los estilos mas largos que la corolilla.

To- 4. ETHULIA *suffrutico-* X Ethulia sufruticosa, con
mento- *sa, foliis linearibus integer-* X hojas lineares, enterisimas y
sa. *rimis tomentosis.* X tomentosas.

Cast.

Cast. *Ethulia tomentosa*.

Habita en la China. \hbar

Es *arbuscúto* con tallos estriados y ramosos. Echa las *hojas* alternas, sin peciolo, entre lanceoladas y lineares, enterisimas, blanquecinas, ó con tomento muy delgado, y semejantes á las del *Espliego*: los *cálices* terminales, sentados, laxos y algo foliosos.

Bi-
dents. 5. *ETHULIA racemulis* \times *Ethulia* con racimitos la-
secundis, calycibus sub- \times deados; cálices casi de cin-
co flosculos; hojas lanceo-
quinquefloris, foliis lanceo- \times ladas y opuestas.
latis oppositis. \times

Cast. *Ethulia* como *Bidente*.

Habita en la India. \odot

Arroja el tallo herbáceo, derecho, de seis lados y con ramas en forma de aspa: las *hojas* opuestas, de tres nervios, con el peciolo muy corto, lanceoladas, aserradas y lampiñas: dos ó quatro *racimos* que terminan el tallo y las ramas, y opuestos en forma de aspa; en los quales están sentadas por el lado superior las *flores* sin piececito, angostas, pequeñas, amarillas, casi de cinco flosculos, alternas, y sostenidas por debaxo con una bráctea alesnada: las *semillas* oblongas, lisas y con algunas estrias.

1119. Género EUPATORIUM. * *Tourn. t. 259.*

Vaill. A. G. 1719. Dill. elth. 114.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun oblongo y apiñado; con *escamas* entre lineares y lanceoladas, derechas y desiguales.

COR. compuesta uniforme y tubulosa; con las *corolillas* hermafroditas é iguales.

Propia en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco partes y extendido.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. Germen muy pequeño; *estilo* filiforme, larguísimo,
rec-

222 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

recto y hendido en dos partes hasta los estambres: con los *estigmas* delgados.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas: con el *vilano* plumoso y largo.

RECEPT. desnudo.

OBS. El Eupatorio manchado *tiene el vilano peloso*. R.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 455.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes (*de los quales salen capilamentos largos hendidos en dos*), sentados en el embrión y comprendidos en un caliz largo, rollizo y escamoso: y el embrión pasa á semilla adornada de vilano.

ESPECIES QUE TIENEN LOS CALICES
CON CUATRO FLOSCULOS.

Dalea. 1. EUPATORIUM *foliis* X Eupatorio de hojas lan-
lanceolatis venosis obsolete X ceoladas, venosas, lampiñas
serratis glabris, calycibus X y con aserraduras desfigura-
quadrifloris, caule frutico- X das; cálices de quatro floscu-
so. X los; y tallo futicoso.

Dalea fruticosa, foliis X Dalea fruticosa, con ho-
oppositis, oblongis, angus- X jas opuestas, oblongas, an-
tis, subserratis, utrinque X gostas, algo aserradas, alar-
productis, racemis termina- X gadas en ambas partes; y ra-
libus. Brown. jam. 314.t.34. X cimos terminales.
f. 1. X

Cast. Eupatorio Dalea.

Habita en la Jamaica. *h*

Hys- 2. EUPATORIUM *foliis* X Eupatorio de hojas entre
sop- *lanceolato-linearibus triner-* X lanceoladas y lineares, con
folium *viis subintegerrimis.* Mill. X tres nervios y casi enterisí-
dict. n. 12. X mas.

Eupatorium Virginianum, X Eupatorio de Virginia,
folio angusto, floribus al- X con hoja angosta; y flores
bis. Dill. elth. 141, t. 115. X blancas.
f. 140. X

Eu-

Eupatoria hirsuta, *hys-* *Eupatoria* de Virginia,
sopifoliorum amula, *Virgi-* con pelo áspero; y hojas se-
niana. Pluk. alm. 141. t. 88. mejantes á las del hisopo.
 f. 2. Rai. Suppl. p. 189.

Cast. Eupatorio con hoja de hisopo.
 Habita en la Virginia. 4

Scandens. 3. EUPATORIUM caule *Eupatorio* con el tallo vo-
volubili, foliis cordatis den- luble; hojas de figura de co-
tatis. Hort. cliff. 396. Gron. razon, dentadas y agudas.
 virg. 120.

Conyza scandens, *Solani* *Conyza* trepadora, con
folio, anguloso. Plum. ic. 99. hoja como la del Solano y
 angulosa.

Clematitis novum genus, Nuevo género de Clema-
Cucumeris folio, Virginia- tite, de Virginia, con hoja
num. Pluk. alm. 109. t. 163. como la del Pepino.
 f. 3.

Cast. Eupatorio trepador.

Habita en lugares aguanosos de Virginia. 4

La planta que se cria en la India oriental es mas lisa, y
 tiene los dientes de las hojas mas desfigurados; la qual
 es el *Eupatorium cordatum*. Burm. ind. 176. t. 58. f. 2.
 Eupatorio con hojas de figura de corazon.

Houstoni. 4. EUPATORIUM caule *Eupatorio* con el tallo vo-
volubili, foliis ovatis inte- luble; hojas aovadas y ente-
gerrimis. Hort. cliff. 396. risimas.

Eupatorium foliis corda- *Eupatorio* con hojas de fi-
tis acuminatis, caule volu- gura de corazon, puntiagu-
bili, floribus spicatis race- das; tallo voluble; flores en
mosis. Mill. dict. n. 16. espiga y racimosas.

Conyza Americana, scan- *Conyza Americana*, tre-
dens, foliis subrotundis, mu- padora, con hojas casi re-
cronatis, floribus spicatis, dondas, terminadas en pun-
singulis quatuor flosculis ta rígida; flores en espiga y
constantibus. Amm. herb. que cada una de ellas consta
 451. de quatro flosculos.

Cast. Eupatorio de Houston.

Ha-

224 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.
Habita en Vera-cruz.

ESPECIES QUE TIENEN LOS CALICES CON CINCO FLOSCULOS.

Zeyla- 5. EUPATORIUM *foliis* X Eupatorio de hojas entre
 nicum. *ovato—bustatis petiolatis* X aovadas y de figura de ala-
dentatis. Flor. zeyl. 306. X barda, con peciolo y denta-
 das.

Eupatorium Zeylanicum, X Eupatorio de Zeylan, de
foliis dentatis, ad pediculos X hojas dentadas, y con oreji-
breves auriculatis. Moris. X llas en sus piececitos cor-
 hist. 3. p. 99. X tos.

Cacalia foliis auriculatis, X Cacalia de hojas con ore-
serratis, supra nigricanti- X jillas, aserradas, negruzcas
bus, infra lanugine alba X por encima, y cubiertas de
obductis. Burm. zeyl. 52. X pelusa blanca por debaxo.

L. 21.

Jacoea Senecionis flore, X Jacobea de Zeylan, olo-
Zeylanica, odorata. Rai. X rosa, con la flor como la del
 Suppl. p. 188. X Senecio.

Cast. Eupatorio de Zeylan.

Habita en Zeylan.

La frutificacion de esta especie se debe exâminar con mas
 exâctitud; pues tiene las *hojas* alternas.

Ses- 6. EUPATORIUM *foliis* X Eupatorio con hojas sin
 sili fo- *sessilibus amplexicaulibus* X peciolo, amplexicaules, se-
 lium. *distinctis lanceolatis.* Gron. X paradas y lanceoladas.
 virg. 118.

Eupatorium Virginia- X Eupatorio de Virginia,
num, flore albo, foliis Men- X con la flor blanca; hojas co-
the angustioribus, sessili- X mo las de la Menta ó Yerba
bus, minutim dentatis. Mo- X buena, mas angostas, sin
 ris. hist. 3. p. 98. Rai. Suppl. X peciolo, y con dientes me-
 p. 188. X nudos.

Cast. Eupatorio con hoja sentada.

Habita en la Virginia. 26

- Al-
bum. 7. *EUPATORIUM foliis lanceolatis serratis, calycibus cum foliis lanceolatis apice scariosis coloratis.* Eupatorio con hojas lanceoladas, aserradas; hojas de los cálices lanceoladas, escariosas por su apice y de color.

Cast. Eupatorio blanco.

Habita en Pensilvania *Barthram.*

Posee el tallo derecho, estriado y algo vellosos: las hojas opuestas, casi sentadas, entre anchas y lanceoladas, aserradas y casi desnudas: el corimbo terminal, blanco, compuesto de ramitas alternas, ramosas y elevadas en ramillete horizontal: los cálices apinados, con hojuelas lanceoladas, membranosas por su ápice y blancas: y cinco flosculos con el vilano sencillo.

- Chi-
nense. 8. *EUPATORIUM foliis ovatis petiolatis serratis.* Eupatorio de hojas aovadas, con peciolo y aserradas.

Cast. Eupatorio de la China.

Habita en la China. *Osbeck.*

Echa el tallo rollizo, con ramas opuestas en forma de aspa y algo desnudo: las hojas opuestas, aovadas, puntiagudas, con peciolo, y aserraduras gruesas; lampiñas y por debaxo mas palidas: los corimbos terminales: y los flosculos de cinco en cinco.

- Ro-
tundi-
folium. 9. *EUPATORIUM foliis sessilibus distinctis subrotundo-cordatis.* Mill. dict. Eupatorio con hojas sin peciolo, separadas y entre redondas y de figura de con. 4. razon.

Eupatoria Valerianoides Virginensis, Trissaginis folio, absque pediculis. Pluk. como la del Trisago y sin piececitos.
alm. 141. t. 88. f. 4. Rai.
Suppl. p. 189.

Cacalia foliis rotundioribus, ad caulem sessilibus. Moris. hist. 3. p. 94. Cacalia con hojas mas redondas y sentadas en el tallo.

Cast. Eupatorio de hoja redonda.

Habita en la Virginia y en el Canadá.

Altis-
simum 10. EUPATORIUM fo-
liis lanceolatis nervosis, in-
ferioribus extimo subserra-
tis, caule suffruticoso. Eupatorio con hojas lan-
ceoladas, nerviosas, las in-
feriores algo aserradas por
defuera; y tallo fruticoso.
Gron. virg. 118. Jacq. hort.
t. 164.

Eupatorium Virginia-
num, longissimis & angus-
tissimis foliis. Moris. hist. 3. Eupatorio de Virginia,
con hojas larguissimas y muy
angostas.
p. 97. Rai. Suppl. p. 187.

Eupatorium folia oblon-
go, rugoso, ampliori, cau-
le virescente. Tourn. p. 456. Eupatorio con hoja oblon-
ga, rugosa, mas ancha; y
tallo verdoso.

Eupatorium (Ageratoides)
foliis ovatis serratis petio-
latis, caule glabro. Suppl. Eupatorio (como Agera-
to) de hojas aovadas, aser-
radas, con peciolo; y tallo
lampiño.
p. 355.

Ageratum altissimum. Agerato altísimo.
Spec. pl. ed. 3. p. 1176.

Cast. Eupatorio altísimo.

Habita en Pensilvania. 2

La descripcion que trae Morison es imperfecta: y Vail-
lant pone esta especie entre las del género *Inula*.

Hasta-
tum. 11. EUPATORIUM cau-
le volubili, foliis cordato-
hastatis subdentatis nudis,
floribus spicatis. Amœnit. Eupatorio con el tallo vo-
luble; hojas entre de figura
de corazon y alabarda, algo
dentadas, desnudas; y flo-
res en espiga.
acad. 4.

Kleinia scandens, foliis
triangularibus angulis acu-
tis. Brown. jam. 316. t. 34. Kleinia trepadora, de ho-
jas con tres ángulos agudos.
f. 3.

Cast. Eupatorio con hoja de figura de alabarda.

Habita en la Jamaica.

Trifo-
liatum. 12. EUPATORIUM fo-
liis ternis. Gron. virg. 119. Eupatorio con hojas de
tres en tres. (de tres en ra-
ma).
Mill. dict. n. 17.

Eupatorium caule erecto, foliis ovato-lanceolatis serratis, petiolatis, ternatis. Eupatorio con el tallo derecho; hojas entre aovadas y lanceoladas, aserradas, con peciolo y de tres en rama.
Gron. virg. 1. p. 178.

Eupatorium Cannabinum, foliis in caule ad geniculaturnis, Marilandicum. Eupatorio Cannabino, de Marilandia, con hojas de tres en tres, colocadas en los nudos del tallo.
Rai. Suppl. p. 189.

Cast. Eupatorio de tres en rama.

Habita en la Virginia.

Can-
nabi-
num. 13. EUPATORIUM foliis digitatis. Hort. cliff. Eupatorio con hojas divididas en forma de dedos.
396. Flor. dan. t. 745. Mat. med. 209.

Eupatorium foliis ovato-lanceolatis, tripteris. Eupatorio de hojas entre aovadas y lanceoladas, y con tres hojuelas.
Hall. helv. n. 136.

Eupatorium Cannabinum. Eupatorio Cannabino.
C. B. P. 320. Tourn. p. 455.

Eupatorium adulterinum. Eupatorio adulterino.
Fuchs. hist. 265. Bauh. hist. 1065.

Vulgare Hepatorium. Hepatorio vulgar.
Dod. pempt. 28.

Cast. Eupatorio Canabino.

Habita en Europa en las orillas de las aguas: en Cataluña, Aragón, Galicia, Castilla la vieja y en otras muchas partes de España. ¶

Varia con las hojas enteras ó aserradas.

PROPIED. Las flores y la yerba son olorosas, y su gusto es amargo: son corroborantes y vulnerarias. La raíz es diurética, y purga por vómito y por cámara: se usa en la cachexia, en la hidropesia, en la edema, é hidrocele.

Cine-
reum. 14. EUPATORIUM ca-
lycibus septemfloris, foliis siete flosculos; hojas opuestas, lanceoladas y tomentosis. Suppl. p. 354.
sas.

P 2

Cast.

228 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Eupatorio ceniciento.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

ESPECIES CON LOS CALICES QUE TIENEN OCHO FLOSCULOS.

Sca- 15. EUPATORIUM vil-
brum. losum, foliis oppositis pe-
tiolatis ovatis integriuscu-
lis rugosis supra scabris. y por encima ásperas.
Suppl. p. 354.

Cast. Eupatorio áspero.

Habita en la America meridional. Mutis.

Produce el tallo rollizo, vellosa y derecho: las hojas opuestas, con el peciolo mas corto, aovadas, rara vez enteras, cortadas comunmente por su margen, vellosas por debajo, lampiñas por encima, rugosas y ásperas: las panojas que terminan al tallo y á todas las ramitas laterales: las flores derechas: el caliz cilindrico, y apinado con escamas oblongas, obtusas, lampiñas y estriadas con lineas longitudinales que concurren en su ápice y de color obscuro: ocho flosculos apenas mas largos que el caliz; con el vilano peloso; pero aserrado, por lo que debe llamarse plumoso.

Purpu- 16. EUPATORIUM fo-
reum. liis quaternis scabris lanceolatis ovatis inæqualiter serratis petiolatis rugosis. Eupatorio con hojas de quatro en quatro, ásperas, entre lanceoladas y aovadas, desigualmente aserradas, con peciolo y rugosas.

Eupatorium foliis verticillatis. Cold. noveb. 180. Eupatorio con hojas verticiladas.

Eupatorium Enulæ folio. Corn. canad. 72. t. 72. Eupatorio con hoja como la de la Enula.

Eupatorium Canadense, Eupatorio del Canadá, elatius, longioribus foliis, mas levantado, con hojas rugosis, integris & caulibus ferrugineis. Moris. hist. 3. p. 97. sect. 7. t. 13. f. 4. mas largas, rugosas, enteras; y tallos de color ferrugineo.

Cast. Eupatorio purpúreo.

Habita en la America septentrional. 2

Arro-

Arroja el *tallo* rollizo , derecho , verde , y en el origen de los peciolos de color que tira á purpúreo : las *hojas* de quatro en quatro , ó de cinco en cinco , entre lanceoladas y aovadas , aserradas , rugosas , algo ásperas , con peciolo , y verdes en ambas partes : el *corimbo* terminal : los *cálices* encarnados : ocho *flosculos* , con las *corolas* blanquecinas : las *anteras* purpúreas : y los *es-tilos* larguissimos.

Macu- 17. EUPATORIUM fo-
latum. *liis quinis subtomentosis lanceolatis æqualiter serratis venosis petiolatis.* Amœn. acad. 4. p. 288. Eupatorio con hojas de cinco en cinco , algo tomentosas , lanceoladas , igualmente aserradas , venosas y con peciolo.

Eupatorium foliis lanceolato-ovatis serratis petiolatis , caule erecto. Hort. cliff. 396. Eupatorio de hojas entre lanceoladas y aovadas , aserradas , con peciolo ; y tallo derecho.

Eupatorium Novæ Angliæ , Urticæ foliis , floribus purpurascens , caule maculato. Herm. par. 158. t. 185. Moris. hist. 3. p. 97. sect. 7. t. 18. f. 3. Rai. Suppl. p. 187. Eupatorio de la Nueva Inglaterra , con hojas como las de la Ortiga ; flores de color que tira á purpúreo ; y tallo manchado.

Cast. Eupatorio manchado.

Habita en la America septentrional. 26

Tiene el *tallo* punteado con líneas purpúreas : y el *vilano* peloso.

ESPECIES QUE TIENEN LOS CALICES CON QUINCE
Ó MAS FLOSCULOS.

Perfo- 18. EUPATORIUM fo-
liatum. *liis connato-perfoliatis tomentosis.* Hort. cliff. 396. Gron. virg. 119. Eupatorio con hojas entre unidas por su base y perfoliadas , y tomentosas.

230. FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Eupatorium Virginia- X Eupatorio de Virginia ,
num , Salviæ foliis longis- X perfoliado , con hojas como
simis, acuminatis, perfolia- X las de la Salvia , larguissi-
tum. Pluk. alm. 140. t. 87. X mas y puntiagudas.
 f. 6. Rai. Suppl. p. 189. X

Cast. Eupatorio perfoliado.

Habita en lugares aguanosos de la Virginia. 24

Coe- 19. EUPATORIUM fo- X Eupatorio de hojas entre
 lesti- *liis cordato-ovatis obtuse* X de figura de corazon y aova-
 num. *serratis petiolatis, calyci-* X das , con peciolo y aserra-
bus multifloris. Gron. virg. X duras obtusas ; y cálices
 119. Mill. dict. n. 19. X con muchos flosculos.

Eupatorium Scorodoniae X Eupatorio con hoja como
folio , flore caeruleo . Dill. X la de la Escorodonia ; y flor
 elth. 140. t. 114. f. 139. X cerúlea.

Eupatorium Marianum, X Eupatorio de la isla Ma-
Scrophulariæ foliis, capitu- X riana , con hojas como las
lis globosis, colore caelestino. X de la Escrofularia ; cabezue-
 Pluk. mant. 71. t. 394. f. 4. X las globosas y de color de
 X cielo.

Cast. Eupatorio celestino.

Habita en la Carolina y en la Virginia.

Aro- 20. EUPATORIUM fo- X Eupatorio de hojas aova-
 mati- *liis ovatis obtusè serratis* X das , obtusamente aserradas ,
 cum. *petiolatis trinerviis , caly-* X con peciolo , de tres ner-
cibus simplicibus. Gron. virg. X vicios ; y cálices sencillos.
 120. X

Eupatorium caule erecto, X Eupatorio con el tallo
ramoso , foliis ovatis , ob- X derecho y ramoso ; hojas ao-
tusè serratis , petiolatis . X vadas , obtusamente aserra-
 Gron. virg. 1. p. 177. X das ; y con peciolo.

Eupatoria Valerianoides, X Eupatoria de Virginia, se-
flore niveo , Teucree foliis X mejante á la Valeriana , de
cum pediculis , Virginiana. X hojas como las del Teucro ,
 Pluk. alm. 141. t. 88. f. 3. X con piececito ; y flor de co-
 X lor de nieve.

Cast. Eupatorio aromático.

Ha-

Habita en la Virginia. 24

Echa el tallo rollizo , del largo de quatro pies , apretado y rígido , con ramas opuestas en forma de aspa y traza como la de la *Escutelaria* : las *hojas* entre aovadas y oblongas , obtusamente aserradas , de tres nervios , algo rugosas y con peciolo : los *racimos* terminales : las *flores* al doble mas largas que el caliz , de color enteramente de nieve , con diez y ocho hasta veinte y ocho flosculos ; y sus *estilos* apenas mas largos que ellos.

Urticæfolium. 21. EUPATORIUM *hispidum, foliis petiolatis cordatis inciso-serratis, panicula terminali, calycibus multifloris subulatis subpungentibus.* Suppl. p. 354. Eupatorio erizado , de hojas con peciolo, de figura de corazon , entre cortadas y aserradas ; panoja terminal; cálices alesnados, que casi punzan y con muchos flosculos.

Valeriana Urticæ folio, Valeriana con hoja como *flore albo.* Corn. canad. 20. la de la Ortiga ; y flor blanca. t. 21.

Cast. Eupatorio con hoja de Ortiga.

Habita en la America meridional. Mutis.

La yerba es muy parecida á la de la *Ortiga de bolillas*; y tiene tambien las *hojas* de diversos colores , pelosas y con aguijoncitos.

Odo-ratum. 22. EUPATORIUM *foliis deltoidibus infernè dentatis, subtus tomentosis, calycibus multifloris.* Amœn. acad. 5. p. 405. Eupatorio con hojas casi de figura de delta, dentadas por abaxo, tomentosas en su envés ; y cálices de muchos flosculos.

Eupatorium odoratum, hirsutum, foliis ovatis, acuminatis, basim versus crenatis, floribus comosis. Brown. jam. 313. Eupatorio oloroso , con pelo áspero ; hojas aovadas, puntiagudas, recortadas ácia su base ; y flores en penacho.

Eupatoria Conyzoides, folio molli & incano, capitulis magnis, Americana. Pluk. phyt. t. 177. f. 3. Eupatoria de America, semejante á la Conyza , con hoja blanda y blanquecina; y cabezuelas grandes.

Cast.

232 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Eupatorio oloroso.

Habita en la America.

- Iva-
folium. 23. EUPATORIUM fo-
liis angusto-lanceolatis tri- angostas y lanceoladas, de
nerviis subseratis, calyci- tres nervios, algo aserradas;
bus squarrosis multifloris. cálices desparramados y con
Amoen. acad. 5. p. 405. muchos flosculos.

Cast. Eupatorio con hoja de Iva.

Habita en la Jamaica.

- Stee-
chadi-
folium. 24. EUPATORIUM to-
mentosum, foliis petiolatis hojas con peciolo, lineares,
linearibus crenatis tomento- recortadas, tomentosas, ca-
sis subtus canis, panicula nas por debaxo; y panoja
terminali. Suppl. p. 355. terminal.

Cast. Eupatorio con hoja de Cantueso.

Habita en la America meridional. Mutis.

Tiene el tallo rollizo, derecho, y cubierto con tomento blanco y muy blando: las hojas opuestas, con peciolo corto, extendidas, lineares, obtusas, recortadas, planas, venosas y con tomento blando en la haz inferior: la panoja terminal y compuesta; con las flores conglobadas: el caliz de escamas alesnadas, lampiñas, y con muchos flosculos: las corolas de color violado, con su borde velloso por defuera; y el vilano con dientes muy delgados.

- Micro-
phyl-
lum. 25. EUPATORIUM fo-
liis triangulari-ovatis novem triangulares y aovadas, con
crenatis subtus tomentosis nueve festones, tomentosas
fusco-venosis, panicula con- por debaxo y con venas de
glomerata terminali, pedun- color pardo; panoja conglo-
culo elongato. Suppl. p. 355. bada, terminal; y peduncu-
lo alargado.

Cast. Eupatorio de hoja pequeña.

Habita en la America meridional. Mutis. *h*

Es arbusto con el tallo lampiño, leñoso y rígido. Produce las hojas muy pequeñas, opuestas, con peciolo, aovadas,

das , cortadas transversalmente por su base , obtusas , con quatro festones en ambas partes y uno impar terminal , rígidas , crasas , por encima , muy lampiñas , verdes , de tres nervios , con tomento blando por debaxo y venas de color pardo puestas en redequilla : el *pedunculo* terminal , alargado , velloso , filiforme , sin hojuelas , y que remata en una panoja compuesta y conglobada : los *cálices* apiñados , lampiños , alesnados y que punzan : las *corolas* apenas mayores que el caliz , de color violado y con su borde velloso por defuera.

Es muy semejante al *Eupatorio con hoja de Cantueso* , en quanto á la construccion de los flosculos.

ESPECIES DUDOSAS.

Macro-
phyl-
lum.

26. EUPATORIUM fo-
liis cordatis trinervatis ser-
ratis. †

Eupatorio de hojas en for-
ma de corazon, con tres ner-
vios unidos mas arriba de la
base y aserradas.

Eupatorium Petasitidis
folio. Pluk. spec. 10. ic. 129.

Eupatorio con hoja como
la de la Sombrerera.

Cast. Eupatorio con hoja grande.

Habita en la America.

So-
phia-
tolium

27. EUPATORIUM fo-
liis pinnatifidis. †

Eupatorio con hojas hen-
didas al través.

Eupatorium Sophiæ folio,
flore purpureo. Plum. spec.
9. ic. 128. f. 2.

Eupatorio con hoja como
la de la Sofia ; y flor purpú-
rea.

Cast. Eupatorio con hoja de Sofia.

Habita en la America.

1120. Género AGERATUM. * Carelia. *Pont. diss.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* oblongo ; con muchas *escamas* lanceoladas y casi iguales.

COR. *compuesta* uniforme ; con las *corolillas* hermafroditas, tubulosas, numerosas, iguales y apenas mas largas que el caliz.

Propia en forma de embudo ; con el *borde* hendido en quatro partes y extendido.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* oblongo : *estilo* filiforme, del largo de los estambres : con dos *estigmas* muy delgados y derechos.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas y anguladas : con el *vilano* de cinco *aristas*, extendido y acompañado de su *calicito propio* puntiagudo.

RECEPT. desnudo, convexo y muy pequeño.

ESPECIES.

Co-nyzoides. 1. AGERATUM *foliis ovatis, caule piloso.* Mill. dict. n. 1. Agerato con hojas aovadas ; y tallo peloso.

Ageratum. Hort. cliff. 396. Agerato.

Eupatorium humile, Africano, Senecionis facie, folio Lamii. Herm. par. 161. t. 161. Pluk. phyt. t. 88. f. 1. Eupatorio baxo, de Africa, con traza como la del Senecio ; y hoja parecida á la del Lamio.

Cast. Agerato como Conyza.

Habita en la America. ☉

Ci-liare. 2. AGERATUM *foliis ovatis crenatis obtusis, caule glabro.* Agerato con hojas aovadas, recortadas, obtusas ; y tallo lampiño.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 235

Centaurium ciliare, minus, *Bisnagaricum*, *Origanifoliis amplioribus*, *floribus in umbellis*. Pluk. alm. 93. t. 81. f. 4.

Centaura pestañosa, menor, de Bisnagar, con hojas como las del Oregano, mas anchas; y flores en umbela.

Cast. Agerato pestañoso.

Habita en Bisnagar.

1121. Género PTERONIA, † Pterophorus.

Vaill. A. G. 1719.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun apiñado; con escamas lanceoladas, aquilladas y puntiagudas.

COR. compuesta uniforme; con las corolillas hermafroditas, tubulosas, numerosas é iguales.

Propia en forma de embudo; con el borde hendido en cinco partes y agudo.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y muy cortos: con la antera cilindrica y tubulosa.

PIST. Germen oblongo: estilo filiforme, del largo de los estambres: con el estigma hendido en dos partes.

PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas y comprimidas: vilano sin estipite, casi plumoso, con sus radios algo pelosos.

RECEPT. un poco plano, setáceo, y con pajas divididas en cerdas mas cortas que las semillas.

OBS. La Pteronia de hojas opuestas se diferencia por tener los dos estigmas mas largos; por el vilano setáceo y erizado; y por el receptaculo pajoso. R.

ESPECIES.

Camphoraria.

1. PTERONIA foliis sparsis basi ciliatis. Amœn. acad. 6. afr. 48.

Pteronia con hojas esparcidas y pestañosas por su base.

Pterophorus Camphorata foliis, ad margines pilosis. Vaill. act. 375.

Pterophoro con hojas como las de la Alcanforada y pestañosas por sus márgenes.

Co.

236 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Conyza aromatica, frutescens, Mauritanica, Camphoratæ foliis, ad margines pilosis, flore magno, aureo, ex flosculis fistularibus composito. Pluk. mant. 56. t. 345. f. 2.

Conyza aromática, frutescente, de Mauritania, con hojas como las de la Alcanforada, pelosas por sus márgenes; flor grande, de color de oro y compuesta de flosculos fistulosos.

Cast. Pteronia alcanforada.

Habita en Etiopia. \hbar

Posee el tallo compuesto y del largo de tres pies: las hojas esparcidas ó sin orden, lineares, muy angostas, pestafiosas, planas y extendidas: las flores terminales, solitarias, amarillas y mas grandes que las de la Santolina.

Oppositifolia.

2. PTERONIA foliis oppositis, ramis dichotomis divaricatis. Syst. veg. 614.

Pteronia con hojas opuestas; ramas ahorquilladas y desparramadas.

Cyanus Centauroides, frutescens, Lavandulæ folio. Breyn. prodr. 3. p. 28. t. 17. f. 3. cent. fasc. p. 21.

Aciano como Centaura, frutescente, y con hoja como la del Espliego.

Cast. Pteronia con hojas opuestas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Es arbustito muy pequeño y desnudo. Echa las ramas opuestas y ahorquilladas: las hojas tambien opuestas, pequeñas, casi lanceoladas, blanquecinas ó algo tomentosas: las flores terminales, sentadas y amarillas: las corollas profundamente divididas: dos estigmas larguitos: las semillas con pelo áspero: el vilano setáceo y erizado: y el receptaculo pajoso. Roy.

Flexicaulis.

3. PTERONIA foliis filiformibus glabris, calycibus subtragonis, ramis brevibus rigidis. Suppl. p. 355.

Pteronia con hojas filiformes y lampiñas; cálices casi de quatro lados; ramas cortas y rígidas.

Cast. Pteronia con el tallo dobladizo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

PTE-

Re-
torta. 4. *PTERONIA foliis ovatis reflexis glabris margine ciliatis scabris, caule erecto, squamis calycinis integris.* Suppl. p. 356. Pteronia con hojas aovadas, redobladas, lampiñas, por su margen pestañosas y ásperas; tallo derecho; y escamas del caliz enteras.

Cast. Pteronia retorcida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Hir-
suta. 5. *PTERONIA foliis lanceolatis patentibus pilosis, caule procumbente, squamis calycinis integris.* Suppl. p. 356. Pteronia con hojas lanceoladas, extendidas, pelosas; tallo tendido; y escamas del caliz enteras.

Cast. Pteronia con pelo áspero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Su traza es como la de la *Pteronia retorcida*.

Glabra. 6. *PTERONIA foliis lanceolatis glabris, calycinis squamis ovatis membranaceis.* Suppl. p. 356. Pteronia con hojas lanceoladas, lampiñas; escamas del caliz aovadas y membranosas.

Cast. Pteronia pelona.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

In-
flexa. 7. *PTERONIA foliis ovatis pilosis, calycinis squamis subarticulatis membranaceis, pedunculo inflexo.* Suppl. p. 356. Pteronia con hojas aovadas y pelosas; escamas del caliz casi articuladas, membranosas; y pedunculo doblado ácia dentro.

Cast. Pteronia doblada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Scariosa. 8. *PTERONIA ramis spinosis, calycibus scariosis, foliis ovalibus.* Suppl. p. 356. Pteronia con ramas espinosas; cálices escariosos ó membranosos; y hojas ovalles.

Cast. Pteronia escariosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Pro-

238 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Produce el tallo frutescente y rígido; con las ramitas estériles terminadas en una espina: las hojas elípticas, sentadas, del largo de una uña ó pequeñas, lisas, enterisimas, lampiñas y apartadas: los cálices terminales, sentados, cilindricos, apiñados, lisos, y que rematan en punta rígida, con una membrana por su ápice, algo ancha y de color de cristal; con el disco amarillo y convexo.

Glo- 9. PTERONIA *foliis ova-* X Pteronia con hojas entre
merata *to-triquetris glabris, caule* X aovadas y de tres caras, lam-
tetragono. Suppl. p. 356. X piñas; y tallo de quatro la-
X dos.

Cast. Pteronia conglobada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Ci- 10. PTERONIA *foliis* X Pteronia con hojas oblon-
nerea. *oblongis tomentosis, calyci-* X gas, tomentosas; escamas
nis squamis ovatis membra- X del caliz aovadas y membra-
naceis. Suppl. p. 356. X nosas.

Cast. Pteronia cenicienta.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Villo- 11. PTERONIA *foliis* X Pteronia con hojas lanceo-
sa. *lanceolatis obtusis pilosis,* X ladas, obtusas, pelosas; es-
calycinis squamis ovatis X camas del caliz aovadas y
membranaceis. Suppl. p. 356. X membranosas.

Cast. Pteronia vellosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Spino- 12. PTERONIA *foliis* X Pteronia con hojas alesna-
sa. *subulatis spinescentibus* X das y que se reducen á espi-
pungentibus. Suppl. p. 357. X nas que punzan.

Cast. Pteronia espinosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \bar{h}

Tiene el tallo fruticoso, leñoso, rollizo y con muchas ramas: las hojas alternas, sin peciolo, distantes, alesnadas, casi estriadas, muy extendidas, rígidas, terminadas en punta que hiere, y persistentes: las flores hasta qua-

cuatro, sentadas en las axilas de mas arriba de las hojas, y señaladamente en el ápice de las ramas, cilindricas y apifinadas, con escamas obtusas.

Membrana-
cea.

13. *PTERONIA foliis ovatis pulverulento-tomentosis, calycinis squamis subulatis margine scariosis.* Pteronia de hojas aovadas, con tomento polvoriento; escamas del caliz alesnadas y por su margen escariosas.
Suppl. p. 357.

Cast. Pteronia membranosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Tiene el tallo inerme.

Pal-
lens.

14. *PTERONIA foliis filiformibus glabris, calycinibus teretibus ovatis, caule ramisque incurvis teretibus.* Pteronia con hojas filiformes, lampiñas; cálices rollizos, aovados; tallo y ramas encorvadas y rollizas.
Suppl. p. 357.

Cast. Pteronia palida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. $\frac{1}{2}$

Es arbusto desigual, con ramas blanquecinas y semejantes á las de la *Galenia*. Echa las hojas opuestas, lineares y algo ramosas: los corimbos de tres flores, terminales y amarillas.

Mi-
nuta.

15. *PTERONIA foliis linearibus vagis, floribus axillaribus.* Pteronia con hojas lineares, vagas; y flores axilares.
Suppl. p. 357.

Cast. Pteronia menuda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back.

Tiene los tallos del largo de un palmo; con las ramas ahorquilladas por arriba: las hojas lineares, alternas, ú opuestas, y á veces algo vellosas: las flores que salen de la horquilladura del tallo casi sentadas, y de la magnitud de la semilla del *Lithospermo*: el caliz liso: los flosculos menudos y en corto número.

Fasci- 16. PTERONIA *floribus* X Pteronia con flores en ha-
culata. *fascicularis uniflosculosis.* X cecillo y de un flosculo.
Suppl. p. 357.

Cast. Pteronia en hacecillo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. $\frac{f}{h}$

Posee el tallo fruticoso y ahorquillado: las ramitas con escamas adornadas de puntas rígidas en ambos lados: las hojas opuestas, apiñadas, derechas, del largo de una pulgada, lanceoladas, algo aquilladas y resinosas: los hacecillos de las flores elevados en ramillete horizontal, de color amarillo-rojo, terminales y sentados: los cálices oblongos y apiñados, con sus hojuelas lanceoladas y agudas: y los flosculos solitarios en cada caliz.

Ce- 17. PTERONIA *calyci-* X Pteronia con los cálices
phalo- *bus oblongis terminalibus* X oblongos, terminales y muy
tes. *minutissime laceris, foliis* X menudamente lacerados; ho-
subulatis conduplicatis ca- X jas alesnadas, plegadas,
rinatis serrulatis. Suppl. p. X aquilladas y aserraditas.
358.

Cast. Pteronia de cabezuela.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back. $\frac{f}{h}$

Es arbusto liso y prolifero. Echa las hojas opuestas, con las oposiciones apartadas, alesnadas, del largo de una pulgada, plegadas, y aserraditas por su margen y quilla: las flores terminales y derechas: los cálices grandes, crasos y apiñados, con escamas aovadas, escariosas, obtusas y divididas muy sutilmente en pestañas: las semillas aovadas al revés y mayorcitas: el vilano sencillo, denso, levantado como en ramillete horizontal, y de color melado: y el receptáculo desnudo.

1122. Género STÆHELINA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* oblongo, cilíndrico y apinado; con *escamas* lanceoladas, derechas, terminadas en una escamita corta y de color.

COR. *compuesta* tubulosa; con las *corolillas* hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco partes, igual, agudo y de figura de campana.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares: y las *anteras* con cola.

PIST. *Germen* cortísimo: *estilo* filiforme: con el *estigma* doble, oblongo, obtuso y derecho.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas, cortísimas y de quatro lados: con el *vilano* ramoso ó cortado, y mas largo que el caliz.

RECEPT. plano: con *pajas* cortísimas y persistentes.

OBS. La *Stehelina* como *Gnaphalio* tiene el caliz *escarioso*; el *estilo* hendido en dos partes; el *vilano* *plumoso* y pegado en su misma base.

La *Stehelina* dudosa posee el *estigma* sencillo; el *vilano* peloso y pegado en su misma base.

La *Stehelina* arborescente echa el caliz *apinado* con sus *escamas* *mochas*: el *vilano* *ramoso* y *plumoso*; las *pajas* divididas en muchas partes; y los *floscuos* desnudos y neutros. R.

ESPECIES.

Gna-
phaloi
des.

STÆHELINA *foliis filiformibus tomentosis, squamis calycinis lanceolatis apice membranaceis reflexis.* Berg. cap. 232.

Stehelina con hojas filiformes, tomentosas; escamas del caliz lanceoladas, membranosas por su ápice y reflexas. dobladas.

Gnaphalium foliis linearibus, floribus terminalibus, calycibus cylindricis, squamis reflexis. Roy. lugdb. 151. Gnaphalio con hojas lineares; flores terminales; y cálices cilindricos, con sus escamas redobladas.

Facea Æthiopica, Stæchados citrinæ majoribus tomentosis foliis, capitulorum spinis & squamulis ex aureo colore nitentibus. Pluk. alm. 193. t. 302. f. 3. Yacea de Etiopia, con hojas como las del Cantueso cetrino, mayores y tomentosas; espinas y escamitas de las cabezuelas de color de oro reluciente.

Cast. Stehelia como Gnaphalio.

Habita en Etiopia.

Tiene el estilo hendido en dos partes: el caliz escarioso: el vilano plumoso y pegado en su misma base: y las anteras con cola.

Dubia. 2. STÆHELINA *foliis linearibus denticulatis, squamis calycinis lanceolatis, pappo calycibus duplo longiore.* Allion. nicæens. 73. Stehelia de hojas lineares, con dientecitos; escamas del caliz lanceoladas; y vilano al doble mas largo que los cálices.

Ger. prov. 190. t. 6.

Stæchadi citrinæ affinis, capitulis longioribus. Bauh. hist. 3. p. 156. Planta parecida al Cantueso cetrino, con cabezuelas mas largas.

Elichrysum sylvestre, flore oblongo. C. B. P. 265. Elichryso silvestre, con la flor oblonga.

Chamæ-Chrysocome prælongis purpureisque *Facea capitulis.* Barr. ic. 406. Pequeño penacho de oro con cabezuelas como las de la Yacea, muy largas y purpúreas.

Facea capitata, Rosmarini folio. Tourn. p. 444. Yacea de cabezuela, con hoja como la del Romero.

Cast. Stehelia dudosa.

Habita en la Francia Narbonense: en la Alcarria, Galicia, serrania de Cuenca, en la Mancha, Cataluña y en otras partes de España. $\frac{1}{2}$

Tiene el vilano peloso y pegado en su misma base: el tallo y hojas tomentosas por debaxo.

Las escamas del caliz de color que tira á purpúreo : y los nervios de las hojas que se escurren por el tallo. Gov. hort.

Ar-
bores-
cens.

3. STÆHELINA *foliis ovalibus*. Schreb. dec. 1. t. 1. les. Stehelina con hojas ova-
lacea arborescens, *Styracis folio*. Tourn. p. 445. Yacea arborescente, con
Centaurea calycibus squamosis, foliis ovatis, subtus tomentosis. Ger. prov. 187. Centaurea con los cálices
escamosos; hojas aovadas y
por debaxo tomentosas.
Cyanus arborescens, altera, Styracis folio. Alp. exot. Otro Aciano arborescente,
con hoja como la del Esto-
raque.
33. t. 32. Frutex rotundo, argenteo folio, Cyani flore. C. B. P. Arbusto con hoja redonda,
de color de plata; y flor co-
mo la del Aciano.
452.

Cast. Stehelina arborescente.

Habita en Creta, en las islas Eras, y en la peña de la Victoria de Provenza. *h*

Posee el caliz apinado, con escamas mochas: las pajas divididas en muchas partes: el vilano ramoso y plumoso: las anteras dentadas por su base: los flosculos desnudos y neutros. *D. Schreb.* Las hojas con peciolo, ovales, enterisimas y por debaxo con vello como seda de color de plata.

Fru-
tcosa.

4. STÆHELINA *foliis lanceolatis obtusis*. Schreb. Stehelina con hojas lan-
in nov. act. A. N. C. tom. 4. ceoladas y obtusas.
P. 142.
Centaurea (fruticosa) calycibus inermibus oblongis, foliis lanceolatis obtusiusculis glabris, caule frutescente. Sp. pl. 3. p. 1280. Centaurea (fruticosa) con
los calices inermes y oblon-
gos; hojas lanceoladas, algo
obtusas, lampifias; y tallo
frutescente.
Cyanus repens, angustifolius. C. B. P. 274. Aciano rastrero, con ho-
ja angosta.
Cyanus repens. Lob. ic. Aciano rastrero.
548.

246 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

1123. Género CHRYSOCOMA. * Chrysocome.

Dill, gen. 14. Coma-aurea.

Boher. 1. p. 121.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun hemisférico y apinado ; con *escamas* lineares, convexas por defuera y puntiagudas.

COR. compuesta tubulosa y mas larga que el caliz ; con las *corollillas* hermafroditas, tubulosas, numerosas, é iguales.

Propia en forma de embudo ; con el *borde* hendido en cinco partes y revuelto.

ESTAMB. Filamentos cinco y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. Germen oblongo y coronado : *estilo* filiforme y apenas mas largo que los *flosculos* : con dos *estigmas* oblongos, deprimidos y envueltos.

PERIC. ninguno : el *caliz* apenas mudado hace sus veces.

SEM. entre aovadas y oblongas, y comprimidas : con el *vilano* peloso.

RECEPT. desnudo y plano.

OBS. La Chrysocoma linosyris se distingue por el caliz desparramado.

La Chrysocoma con hoja de Grama varía en las flores flosculosas y radiadas con el radio cerúleo. R.

ESPECIES FRUTESCENTES.

Oppo-
sitife-
lia.

1. CHRYSOCOMA fru-
tiosa, foliis oppositis obo-
vatis, floribus fasciculatis
pedunculatis. Amœn. acad.
6. afr. 49.

Chrysocoma fruticosa, con
hojas opuestas, aovadas al
revés ; flores en hacecillo y
con pedunculo.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 247

Eupatorium (divaricatum) X Eupatorio (desparramado) de hojas opuestas, con ovatis, obtusis, mucronatis, peciolo, aovadas, obtusas, ramis divaricatis fruticosis, y terminadas en punta rigifloribus corymbosis. Berg. da; ramas desparramadas, fruticosas; y flores en corimbo.

Cyanus arborescens, minor, foliis *Majoranae*. Breyn. X Aciano arborescente, menor, con hojas como las de la Mejorana.

Cast. *Chrysocoma* con hojas opuestas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ♀

Es semejante á la *Pteronia* con hojas opuestas, en su traza, en los cálices, tallo y demas; pero esta *Chrysocoma* tiene el receptaculo desnudo.

Co-
ma-au-
rea. 2. *CHRYSOCOMA* fruticosa, foliis linearibus rectis glabris dorso decurrentibus. Hort. cliff. 307. X *Chrysocoma* fruticosa, con hojas lineares, rectas, lampiñas, y escurridas por su dorso.

Conyza Æthiopica, flore bullato, aureo, *Pinastri brevioribus foliis late viridibus*. Pluk. alm. 400. t. 327. f. 2. X *Conyza* de Etiopia, con la flor hinchada, de color de oro; hojas como las del Pino silvestre, mas cortas y de color verde alegre.

Elichrysum Africanum, multiflorum, tenuifolium, frutescens. Volk. Norib. 148. t. 148. X *Elichryso* de Africa, frutescente, de hoja delgada; y con muchas flores.

Cast. *Chrysocoma* penacho de oro.

Habita en Etiopia. ♀

Patula. 3. *CHRYSOCOMA* sufruticosa, foliis linearibus glabris, ramis divaricatis. Berg. cap. 244. X *Chrysocoma* sufruticosa, con hojas lineares, lampiñas; y ramas desparramadas.

Cast. *Chrysocoma* extendida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ♀

Añoja el tallo sufruticoso, y compuesto con ramas muy des-

248 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

desparramadas, de tres en tres, ó de quatro en quatro y lisas : las *hojas* lineares , obtusas , lisas y extendidas : las *flores* terminales , solitarias y casi sin pedunculo. Es muy parecida á la *Chrysocoma penacho de oro*.

- Cer- 4. CHRYSOCOMA fru-
tua. tica, foliis linearibus re-
curvis subscabris , floribus
nubilibus cernuis. Hort.cliff. 397.
Coma-aurea Africana ,
fruticans , foliis Linariæ
angustis, major. Comm.hort. 2. p. 89. t. 45.
- Chrysocoma sufruticosa ,
con hojas lineares , encorva-
das ácia atrás , algo ásperas;
y flores cabizbaxas antes de
floreceer ó de abrirse.
Penacho de oro de Africa,
fruticoso , mayor , con hojas
como las de la Linaria an-
gostas.

Cast. Chrysocoma cabizbaxa.

Habita en Etiopia. *h*

- Ci- 5. CHRYSOCOMA suf-
liaris. fruticosa , foliis linearibus
rectis ciliatis , ramis pubes-
centibus. Mill. dict. n. 5.
Coma-aurea Africana ,
fruticans , Ericæ folio. Com.
hort. 2. p. 95. t. 48.
- Chrysocoma sufruticosa ,
con hojas lineares , rectas,
pestañosas ; y ramas vello-
sas.
Penacho de oro de Africa,
frutescente , con hoja como
la del Brezo,

Cast. Chrysocoma pestañosa.

Habita en Etiopia. *h*

- To- 6. CHRYSOCOMA suf-
mento- fruticosa , foliis ramisque
sa. tomentosis. Roy. Xsas.
- Chrysocoma sufruticosa ,
con hojas y ramas tomento-
sas.

Cast. Chrysocoma tomentosa.

Habita.....

Tiene las *ramas* tomentosas y blanquecinas : las *hojas* li-
neares , rectas y tomentosas por debaxo.

Sca-
bra.

7. CHRYSOCOMA *suf-
fruticosa, foliis lanceolato-
ovatis recurvis denticulato-
serratis, pedunculis pubes-
centibus.*

Chrysocoma sufruticosa,
de hojas entre lanceoladas y
aovadas, encorvadas ácia
atrás, aserradas con dien-
tecitos; y pedunculos vello-
sos.

*Baccharis foliis lanceola-
tis serratis, caule suffruti-
coso.* Hort. cliff. 404.

Bacara con hojas lan-
ceoladas, aserradas; y tallo
sufruticoso.

*Conyza Africana, tenui-
folia, suffrutescens, flore
aureo.* Dill. elth. 104. t. 88.
f. 103.

Conyza de Africa, sufru-
tescente, con hoja delgada;
y flor de color de oro.

Cast. Chrysocoma áspera.
Habita en Etiopia.

Dicho-
tonia.

8. CHRYSOCOMA *fru-
tiosa, prolifera, dichoto-
ma, glabra, foliis lineari-
bus planis serratis sca-
briusculis, pedunculis co-
rymbosis squamosis hirtis.*
Suppl. p. 359.

Chrysocoma fruticosa,
prolifera, ahorquillada, lam-
piña, con hojas lineares,
planas, aserradas y algo ás-
peras; pedunculos en corim-
bo, escamosos y con pelo
áspero.

Cast. Chrysocoma ahorquillada.

Habita en las peñas de Barrancas en la America meridio-
nal. Fr. Masson. \bar{h}

Es arbusto con el tallo lampiño, prolifero y ramoso por
sus ahorquilladuras, donde terminado el ramo en una
panoja, despues por debaxo de ella se divide el mismo
tallo en dos ramos que se subdividen en otros dos: las
hojas cortas, con aserraduras agudas, lineares, algo ob-
tusas, y un poco ásperas con puntos muy menudos y
elevados: los corimbo terminales y sencillos: los pe-
dunculos con pelo áspero y cubiertos de bracteas alesna-
das: el caliz de color purpúreo: y las flores amarillas.

250 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Se-
ricea. 9. CHRYSOCOMA *fruticosa, albo-sericea, foliis linearibus canaliculatis, ramulis apice paniculatis.* Sup-
pl. p. 360. Chrysocoma fruticosa, con vello blanco como seda; hojas lineares, acanaladas; y ramitas en panojas por su extremo.

Cast. Chrysocoma como seda.

Habita en las peñas marítimas de las Barrancas de America. Fr. Masson. $\frac{1}{2}$

Se conoce facilmente por las *ramas*; por las *hojas* y *pendunculos* con vello como seda, muy blancos; y por las *flores* amarillas. Echa las *hojas* lineares, acanaladas, mas largas y descaecidas: las *ramas* sencillas, en panoja y que florecen por su remate; con *ramitas* mas cortas, terminadas en otra panoja de pocas flores: los *cálices* lampiños, con escamas alesnadas y amarillas. La corteza y leño son de sabor acie.

ESPECIES HERBACEAS.

Lino-
syris. 10. CHRYSOCOMA *herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus laxis.* Flor. suc. 2. n. 729. Hall. helv. n. 144. Chrysocoma herbácea, con hojas lineares y lampiñas; y cálices laxos.

Chrysocome *Dioscoridis* & *Plinii.* Col. ephr. 1. p. 81. t. 82. Chrysocome de Dioscorides y de Plinio.

Osyris Austriaca. Clus. hist. 1. p. 325. Osyris de Austria.

Linaria folioso capitulo, luteo, major & minor. C. B. P. 213. Linaria mayor y menor, con la cabezuela foliosa y amarilla.

Conyza Linariæ folio. Tourn. p. 455. Conyza con hoja como la de la Linaria.

Linosyris nuperorum. Lob. ic. 469. Linosyris de los modernos.

Cast. Chrysocoma linosyris.

Habita en la Europa templada: en los montes de Austria, de Burgos, de Aragon y en otras partes de España. $\frac{1}{2}$

CHRY-



FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 251

Bi flora 11. *CHRYSOCOMA herbacea*, *paniculata*, *foliis lanceolatis trinerviis punctatis nudis*. Lepech. it. 1. *Chrysocoma herbácea y en panoja, con hojas lanceoladas, de tres nervios, punteadas y desnudas.*

P. 203.

Aster calycibus oblongis, *foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, trinerviis, infra scrobiculis excavatis*. Gmel. sib. 2. p. 189. *Aster con los cálices oblongos y laxos; hojas entre lineares y lanceoladas, enterisimas, de tres nervios y excavadas por debaxo con hoitos.*

Conyza Lini foliis asperis, rigidis & nervosis, floribus luteis, umbellatis. Amm. ruth. 192. *Conyza con hojas como las del Lino, ásperas, rígidas y nerviosas; flores amarillas y en umbela.*

Cast. Chrysocoma de dos flores.

Habita en la Siberia.

La flor varía con radio ó sin él, y en el color blanco ó ce-rúleo.

Grami- 12. *CHRYSOCOMA herbacea, foliis linearibus lanceolatis glabris, floribus corymbosis*. *Chrysocoma herbácea, con hojas lineares, lanceoladas, lampiñas; y flores en corimbo.*

Cast. Chrysocoma con hoja de Grama.

Habita en el Canadá. Kalm.

Su traza es como la de la Achílea llamada Ptarmica.

Arroja el tallo liso, derecho, herbáceo y un poco angulado: las hojas alternas, apartadas, entre lineares y lanceoladas, puntiagudas, lampiñas, enterisimas, algo aquilladas, ásperas por su margen, y con tres nervios desfigurados ó poco manifiestos: el corimbo folioso, y compuesto de muchísimas flores, y las mas veces tres ó quatro juntas en cada piececito, casi sentadas y de la magnitud de las de la Achílea: los cálices medio aovados, apifiados y lampiños; con el vilano sencillo.

Varía con flores flosculosas y radiadas; y con el radio ce-rúleo.

CHRY-

252 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Villo- 13. CHRYSOCOMA her- Chrysocoma herbácea, con
sa. bacea, foliis lanceolatis vil- hojas lanceoladas, vellosas ;
losis, calycibus arctis. Pall. y cálices apretados.
it. 1. p. 73. Lepech. it. 1. p.
203.

Aster incanus, calycibus Aster blanquecino, con
laxis, oblongis, foliolis ex los cálices laxos y oblongos ;
lineari-lanceolatis, floribus hojuelas entre lineares y lan-
nudis umbellatis. Gmel. sib. ceoladas ; flores desnudas y
2. p. 192. t. 82. f. 2. en umbela.

Conyza tomentosa & in- Conyza tomentosa y blan-
cana, floribus luteis umbel- quecina, con flores amarillas,
latis, Echii Scorpioides fo- en umbela ; y hoja como la
lio. Amm. ruth. 190. del Echîo Escorpioide.

Cast. Chrysocoma vellosa.

Habita en la Siberia y Tartaria.

1124. Género TARCHONANTHUS. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun cónico inverso, de una pieza, las mas veces
hendido en siete partes, de color por dentro, mas
corto que la corola, algo agudo y persistente.

COR. compuesta uniforme ; con veinte flosculos poco mas
ó menos ; y sus corolillas hermafroditas é iguales.

Propia de un petalo, en forma de embudo y con cinco
dientes.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos : con la
antera cilíndrica, tubulosa, del largo de la corolilla
y con cola por su base.

PIST. Germen encima de la flor y oblongo : estilo al doble
mas largo que ella : y con dos estigmas que se
abren.

PERIC. ninguno : el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas ; y el vilano peloso que viste la semilla por
todas partes.

RECEPT. muy pequeño, y con pelos de la longitud del
caliz.

OB3. El vilano en este género es singular, en quanto no
corona la semilla, sino que la viste.

E S P E C I E S.

Cam-
phora-
tus.

1. TARCHONANTHUS.

Tarchônantho.

Hort. cliff. 398. Berg. cap.

236.

Elichryso affinis, arbor
Africana, flore purpureo-
violaceo, folio *Salviæ*, odo-
re *Rosmarini*. Herm. lugdb.

227. t. 229. Pluk. alm. 134.

t. 174. f. 1. Moris. hist. 3.

p. 90.

Elichrysum, arbor *Afri-*
cana. Boerh. lugdb. 1. p. 121.

R.

Conyza Africana, frutes-
cens, folio *Salviæ*, odore
Camphoræ. Tourn. p. 455. R.*Tarchonanthus foliis oblon-*
gis planis, calyce *monophyl-*
lo quinquesido. Suppl. p. 361.Arbol de Africa, parecido
al *Elichryso*, con la flor en-
tre purpurea y violada; ho-
ja semejante á la de la *Salvia*;
y olor como el del *Romero*.*Elichryso* arbol de Africa.*Conyza* de Africa, frutes-
cente, con hoja semejante á
la de la *Salvia*; y olor como
el del *Alcanfor*.*Tarchônantho* con hojas
oblongas y planas; caliz de
una pieza y hendido en cin-
co partes.

Cast. Tarchônantho alcanforado.

Habita en Etiopia. 24

Eri-
soides

2. TARCHONANTHUS

Tarchônantho con hojas

foliis acerosis, calycibus *te-*
traphyllis. Suppl. p. 360.lineares y rígidas; y cálices
de quatro hojuelas.

Cast. Tarchônantho como Brezo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 25

Es arbusto ramoso, yerto, y alguna vez adelgazado por su remate. Echa las hojas lineares y rígidas, como las del Brezo, amontonadas y cortísimas: las flores amontonadas, laterales, mayores que las hojas y con peduncullos cortos: el caliz de quatro hojuelas ovales: pocas flores, menudas, y escondidas dentro de la pelusa muy blanca del receptaculo, la qual es mucho mas grande que la misma flor.

TAR-

254 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Glaber 3. TARCHONANTHUS X Tarchônantho con hojas
foliis glabris integris den- X lampiñas, enteras y denta-
tatisque. Suppl. p. 360. X das.

Cast. Tarchônantho lampiño.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Es muy semejante al *Tarchônantho alcanforado*; pero todo lampiño y sin olor. Varía con las *hojas* mas anchas, mas angostas, enteras, y con dientes.

1125. Género CALEA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun apiñado; con *escamas* oblongas y algo laxás.

COR. compuesta uniforme; con muchas *corolillas* hermafroditas e iguales.

Propia en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco partes.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. Germen algo oblongo: *estilo* filiforme, y del largo de la corolilla: con dos *estigmas* encorvados ácia atrás y agudos.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas: con el *vilano* peloso y del largo del caliz.

RECEPT. con *pajas* poco mas largas que el caliz, y que sobresalen entre los flosculos.

ESPECIES.

Jamai- 1. CALEA *floribus sub-* X Calea con flores casi de tres
censis. *ternis pedunculatis, foliis* X en tres, pedunculadas; ho-
ovato-oblongis subserratis X jas entre aovadas y oblon-
petiolatis. Amœn. acad. 5. X gas, algo aserradas y con
p. 404. X peciolo.

Santolina subhirsuta, foliis ovatis, acuminatis, oppositis, capitulis axillaribus, pedunculis ternatis sessilibus, associatis. Brown. jam. 315. Santolina con algun pelo áspero ; hojas aovadas , puntiagudas y opuestas ; cabezuelas axilares , con pedunculos de tres en tres y acompañados de una cabezuela sentada?

Cast. Calea de la Jamaica.

Habita en la Jamaica.

Tiene el vilano áspero y del largo de la flor.

Orpositifolia.

2. CALEA corymbis congestis, pedunculis longissimis, foliis lanceolatis, caule herbaceo. Amœn. acad. 5. Calea con los corimbos amontonados ; pedunculos larguissimos ; hojas lanceoladas ; y tallo herbáceo.

p. 404.

Santolina erecta, foliis linearibus, oppositis seu ternatis, floribus remotis, terminalibus. Brown. jam. 315. Santolina derecha, con hojas lineares, opuestas, 6 de tres en tres ; flores apartadas y terminales.

Cast. Calea con hojas opuestas.

Habita en la Jamaica.

Tiene las semillas desnudas ; y las pajas interiores mas largas.

Amellus.

3. CALEA floribus subpaniculatis, calycibus brevibus, seminibus nudis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis. Amœn. acad. 5. p. 404. Calea con flores casi en panoja ; cálices cortos ; semillas desnudas ; hojas entre aovadas y lanceoladas, y con peciolo.

Amellus ramosus, foliis ovatis dentatis, floribus remotis, terminalibus, fulcris longis divaricatis. Brown. jam. 317. Amelo ramoso, de hojas aovadas, con dientes ; flores apartadas, terminales ; y apoyos largos y divergentes.

Cast. Calea Amelo.

Habita en la Jamaica.

256 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

4. CALEA *caule suffruti-* X Calea con el tallo sufru-
 Sco- *coso, ramis suboppositis an-* X ticoso; ramas casi opuestas
 paria. *gularis*. Syst. nat. 3. p. 234. X y anguladas.

Cast. Calea de Escobas.

Habita en la Jamaica.

Es *arbusto* con traza como la del *Esparto de Escobas*.

Echa las *ramas* anguladas, opuestas y las mas veces de tres en tres: abundantes *ramitas* alternas y en lo largo casi iguales: las *hojas* menudas, casi lineares, obtusas y lisas: las *flores terminales* solitarias, sentadas, menudas y blancas.

1126. Género SANTOLINA. * Tourn. t. 260.

Vaill. A. G. 1719.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* hemisférico, y apinado; con *escamas* entre aovadas y oblongas, agudas y apretadas.

COR. *compuesta* uniforme, mas larga que el caliz; con numerosas *corolillas* hermafroditas é iguales.

Propia en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco partes y revuelto.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* de quatro lados y oblongo: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con dos *estigmas* oblongos, deprimidos y truncados.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas, de quatro lados; y sin *vilano*.

RECEPT. algo plano; y con *pajas* cóncavas.

OBS. La Santolina alpina tiene las flores sin *flosculos* *femeninos*. R.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 460.

La flor es flosculosa, globosa, ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes, sentados en el embrio, con hojuelas (ó pajas) apinadas, é intermedias, y comprendidos en un caliz escamoso, casi hemisférico: y
 el

el embrión pasa después á semilla sin vilano. A estas notas se añaden las de las flores que son mayores que las del Axenjo, y que las del Abrotano; como también la traza de toda la planta.

ESPECIES.

- Chamæ-cyparissus. 1. SANTOLINA *pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis*. Hort. cliff. 397. Mat. med. p. 209. Santolina con pedunculos de una flor; y hojas dentadas en quatro órdenes.
- Abrotanum femina, foliis teretibus*. C. B. P. 136. Abrotano femenino, con hojas rollizas.
- Abrotanum femina, vulgare*. Clus. hist. 1. p. 341. Abrotano femenino, vulgar.
- Abrotanum femina, incanum, Hispanicum*. Barr. ic. 463. Abrotano femenino, de España, y blanquecino.
- Chamæ-Cyparissus*. Bauh. hist. 3. p. 133. Pequeño Ciprés.
- Santolina foliis teretibus*. Tourn. p. 460. Santolina con hojas rollizas.
- Cast. Santolina pequeño-ciprés. *vulgo*: Guarda-ropa.
- Habita en la Europa austral: en el Real Sitio de Aranjuez, en la Alcarria, Serrania de Cuenca; en Aragon, Cataluña y otras partes de España. $\frac{1}{2}$
- PROPIED. La yerba y flores son admirables balsámicas, expelentes, tónicas, diaforeticas, carminativas y antelmínticas.

- Rosmarinafolia. 2. SANTOLINA *pedunculis unifloris, foliis linearibus margine tuberculatis*. Hort. cliff. 397. Santolina con pedunculos de una flor; hojas lineares y con tuberculos por su margen.
- Abrotanum femina, foliis Rosmarini, majus*. C. B. P. 137. Moris. hist. 3. p. 12. sect. 6. t. 3. f. 22. Abrotano femenino, mayor, con hojas como las del Romero.
- Abrotanum femina, quartum*. Clus. hist. 1. p. 342. Abrotano femenino, quarto.

258 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

<i>Santolina foliis Rosmarini</i> , major. Tourn. p. 461.	<i>Santolina</i> mayor, con hojas como las del Romero.
<i>Abrotanum femina</i> , foliis Rosmarini, minus. C. B. P. 137.	Abrotano femenino, menor, con hojas como las del Romero. α
<i>Santolina foliis Rosmarini</i> , minor. Tourn. p. 461.	<i>Santolina</i> menor, con hojas como las del Romero.
<i>Abrotanum femina viride</i> . C. B. P. 137.	Abrotano femenino, verde. β
<i>Abrotanum femina</i> , flore majore, foliis villosis & incanis. C. B. P. 137.	Abrotano femenino, con la flor mas grande; hojas vellosas y blanquecinas. χ
<i>Santolina flore majore</i> , foliis villosis & incanis. Tourn. p. 460.	<i>Santolina</i> con la flor mas grande; hojas vellosas y blanquecinas.
<i>Santolina</i> (villosa) pedunculis unifloris, calycibus globosis, foliis quadrifariam dentatis, tomentosis. Mill. dict. n. 2.	<i>Santolina</i> (vellosa) con pedunculos de una flor; cálices globosos; hojas dentadas en quatro órdenes y tomentosas.

Cast. *Santolina* con hoja de Romero.

Habita en el circuito de Madrid, orillas del rio Manzanares: en Castilla la vieja, en la Mancha, Andalucia, Alcarria, serranias de Cuenca y en otros terrenos de España. \mathcal{U}

La yerba es algo fruticosa, y tiene las *hojas* recortaditas en ambas márgenes, con tuberculos en dos órdenes; pero en el *tallo* que florece, son lineares y con dientecitos en ambas partes de su remate: los *pedunculos* largos, terminales y de una flor.

Erecta 3. SANTOLINA *pedunculis unifloris*, foliis bipinnatis, caulibus simplicibus. *Santolina* con pedunculos de una flor; hojas dos veces pinnadas; y tallos sencillos.

Santolinoides alpina, saxatilis, foliis glaucis & veluti argenteis, floribus luteis. Mich. gen. 31. t. 27. Planta como *Santolina*, de alpes, saxátil, con hojas de color garzo y como de plata; y flores amarillas.

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 259

Pyrethrum alterum, mi-
nus, *cespitosa radice*, *An-*
themidis flore, *Italicum*. y la flor parecida á la de la
 Barr. rar. 1105. t. 522. *Anthemis*.

Cast. Santolina derecha.

Habita en el monte de Moron de Italia. 24

Posee las flores sin flosculos femeninos.

An-
 themo-
 ides.

4. SANTOLINA *pedun-*
culis unifloris, *foliis bipin-*
natis, *caule ramosissimo* y vellosos.
villosa. Pall. it. 1. p. 438.

Santolina perennis, *Cha-*
mæmeli folio, *caule ramoso*.
 Vaill. act. 372. *Santolina perenne*, con
 hoja como la de la Manzanilla; y tallo ramoso.

Cast. Santolina como *Anthemis*.

Habita en España y en Italia. *Alstroem.* 24

Es planta del largo de un palmo, poco mas ó menos.

Echa el tallo con pelillos y folioso: las hojas como las de la Manzanilla y vellosas: los pedunculos terminales, mas largos que las hojas y algo rígidos estando en fruto.

1127. Género ATHANASIA. * *Baccharis*.

Vaill. A. G. 1719.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun aovado y apinado; con escamas lanceoladas y apretadas.

COR. compuesta uniforme, mas larga que el caliz; con numerosas corolillas hermafroditas é iguales.

Propia en forma de embudo; con el borde hendido en cinco partes, agudo y derecho.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortos: con la antera cilindrica y tubulosa.

PIST. Germen algo oblongo: estilo filiforme, y poco mas largo que los estambres: con el estigma hendido en dos partes y obtuso.

PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.

R 2

SEM.

260 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

SEM. oblongas: con el vilano pajoso, ó de cerdas muy cortas.

RECEPT. con pajas lanceoladas, y mas largas que la semilla.

OBS. La *Athanasia maritima* tiene las semillas de dos filos y sin vilano. R.

ESPECIES.

Squar-
rosa. 1. *ATHANASIA pedunculis unifloris lateralibus, foliis ovalibus recurvatis.* Athanasia con pedunculos de una flor, laterales; hojas ovales y encorvadas ácia atrás.
Amoen. acad. 4. p. 329. & 6.
Afr. 52.

Cast. Athanasia desparramada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Cre-
nata. 2. *ATHANASIA floribus solitariis terminalibus, foliis linearibus.* Athanasia con flores solitarias, terminales; y hojas lineares.

Santolina foliis linearibus, flore solitario terminali, squamis calycinis crenatis. Santolina con hojas lineares; flor solitaria, terminal; y escamas del caliz recortadas.
Hort. cliff. 398.

Stæhelina foliis subtrigonis, squamis calycinis crenatis. Stehelina con hojas casi de tres lados; y escamas del caliz recortadas.
Spec. pl. 1. p. 840.

Cast. Athanasia recortada.

Habita en Etiopia. \hbar

Capi-
tata. 3. *ATHANASIA floribus terminalibus subsessilibus, foliis lanceolatis hirsutis.* Athanasia con las flores terminales, casi sentadas; hojas lanceoladas y con pelo áspero.
Amoen. acad. 6. afr. 50. Berg.
cap. 237.

Chrysanthemum Conyzoides, *Æthiopicum*, *capitulo aphylo*, *foliis Majoranæ*. Brey. cent. t. 78. Moris. hist. 3. p. 21. sect. 6. t. 3. f. 48. Chrysantemo como Conyza, de Etiopia, con cabezuela sin hojuelas; y hojas como las de la Mejorana.

Athanasia punctata. Berg. cap. 238. Athanasia punteada.

Tanacetum Capense, *Buxifolio*. Petiv. gaz. 442. t. 81. f. 6. R. Tanaceto del Cabo de Buena-esperanza, con hoja como la del Box.

Cast. Athanasia de cabezuela.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Su traza es como la del *Bupthhalmo del Cabo de Buena-esperanza*; pero tiene las hojas alternas; las flores sin radio y flosculosas.

La *Athanasia punteada* Berg. cap. 238. es planta lampiña; con hojas casi redondas; y tres ó quatro flores terminales.

Mari-
tima.

4. ATHANASIA *pedunculis bifloris*, *foliis lanceolatis crenatis obtusis tomentosis*. Mill. dict. n. 6. Athanasia con peduncúlos de dos flores; hojas lanceoladas, recortadas, obtusas y tomentosas.

Santolina corymb terminali subdiviso, *foliis oblongis integerrimis obtusis*. Hort. cliff. 398. Gron. orient. 257. Santolina con el corimbo terminal, subdividido; hojas oblongas, enterisimas y obtusas.

Filago maritima. Spec. pl. 1. 927. Mill. dict. t. 135. Filago maritimo.

Gnaphalium maritimum. C. B. P. 263. Clus. hist. 1. 329. Tourn. p. 461. Gnaphalio maritimo.

Chrysanthemum perenne, *Gnaphaloides maritimum*. Moris. hist. 3. p. 81. sect. 6. t. 4. f. 47. Chrysantemo perenne, maritimo y parecido al Gnaphalio.

Cast. Athanasia maritima.

Habita en lugares maritimos de la Europa austral: en Ga-

262 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Galicia, Andalucía, Valencia, Cataluña; y en otras partes de la marina de España.

Posee las *semillas* de dos filos, y sin vilano: las *pajas* del largo del caliz; y es *planta* toda tomentosa.

Genis- 5. *ATHANASIA corym-* Athanasia con corimbo
tif. *bis simplicibus, foliis lan-* sencillos; hojas lanceoladas,
ceolatis indivisis nudis con- indivisas, desnudas y amon-
fertis. tonadas.

Cast. Athanasia con hoja de Ginesta.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Roy. 24

Arroja el *tallo* algo fruticoso y ramoso en su extremo, ro-
llizo y áspero por las cicatrices que dexan sus hojas: las
hojas sin peciolo, amontonadas, esparcidas, con rayas
cortas, lanceoladas, lisas, algo aquilladas y un poco
obtusas: los *corimbo*s pequeños y sencillos: tres ó qua-
tro *flores* casi sentadas: el *caliz* aovado al revés, liso,
apinado, apenas mayor que un grano de trigo y con
muchos flosculos.

Pubes- 6. *ATHANASIA corym-* Athanasia con corimbo
cens. *bis simplicibus, foliis lan-* sencillos; hojas lanceoladas,
ceolatis indivisis villosis. indivisas y vellosas.
Amoen. acad. 4. p. 329.

Coma-aurea Africana, Penacho de oro de Afri-
fruticosa, omnium maxima, ca, fruticoso, mas grande
foliis tomentosis & incanis. que todos, con hojas tomen-
Comm. hort. 2. p. 93. t. 47. X *tosas y blanquecinas.*

Cast. Athanasia vellosa.

Habita en Etiopia. *h*

Annuu 7. *ATHANISIA corym-* Athanasia con corimbo
bis simplicibus coarctatis, sencillos y coartados; hojas
foliis pinnatifidis dentatis. hendidas al través y denta-
Willch. illustr. n. 67. X *das.*

Elichrysum inodorum, Elichryso annuo, sin olor,
glabrum, Coronopi folio, lampiño, y con hoja como
annuum. Magn. monsp. 307. X *la del Coronopo.*
Herm. lugdb. 228. t. 227. X

Achil-

- α *Achillea* (inodora) *foliis* *Achílea* (sin olor) con ho-
dentato-laciniatis integer- *jas* entre dentadas y lacinia-
rimis, apice trifidis. Spec. *das*, enterisimas, y hendidas
pl. 3. p. 1265. Murray. *por su ápice en tres par-*
prodr. 182. *tes. α*

Cast. *Athanasia annua.*

Habita en Africa. ☉

Tiene las *hojas* ensanchadas ácia su remate, y casi pal-
meadas, con sus ápices setáceos: las *pajas* amarillas por
su punta y del largo de los flosculos. Varía con las *flo-*
res solitarias y al doble mayores.

- Den- 8. *ATHANASIA corym-* *Athanasia* con corimbos
tata. *bis compositis, foliis recur-* *compuestos*, hojas encorva-
vis, inferioribus linearibus *das* ácia atrás, las inferiores
dentatis, superioribus ova- *lineares y dentadas*, las su-
tis serratis. *periores aovadas y aserra-*
das.

Santolina corymbis com- *Santolina* con los corim-
positis fastigiatis, foliis in- *bos compuestos y elevados en*
ferioribus linearibus denta- *ramillete horizontal*; hojas
tis, superioribus ovatis *inferiores lineares, dentadas*,
serratis. Hort. cliff. 398. *las superiores aovadas y aser-*
radas.

Coma-aurea Africana, *Penacho de oro de Afri-*
frutescens, foliis inferiori- *ca, frutescente*, con las ho-
bus incisis, superioribus *jas inferiores cortadas, y las*
dentatis. Comm. rar. 41. *superiores dentadas.*
t. 41.

Athanasia (lævigata) co- *Athanasia (alisada)* con
rymbis compositis, foliis *corimbos compuestos*; hojas
ovatis amplexicaulibus sub- *aovadas, amplexicaules, con*
dentatis recurvis. Spec. pl. *algun diente y encorvadas*
3. p. 1181. Amoen. acad. 6. *ácia atrás.*
afr. 51.

Athanasia foliis lanceo- *Athanasia* de hojas lan-
latis dentatis serratis, co- *ceoladas, con dientes, aser-*
rymbo composito. Suppl. p. *radas; y corimbo compues-*
361. *to.*

Cast. *Athanasia dentada.*

Ha-

264 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. h

Tri- 9. ATHANASIA corym- Athanasia con corimbos
furca- bis simplicibus, foliis tri- sencillos; hojas hendidas en
ta. lobis cuneiformibus, tres lóbulos, y en forma de
cuña.

Santolina corymbo simpli- Santolina con el corimbo
ci terminali, foliis trifidis. sencillo, terminal; y hojas
Hort. cliff. 397. hendidas en tres partes.

Coma-aurea Africana, Penacho de oro Africano,
fruticans, foliis glaucis & fruticoso, con hojas de color
in extremitate trifidis. garzo, y hendidas por su
Comm. hort. 2. p. 97. t. 49. extremidad en tres partes.

Cast. Athanasia trifurcada.
Habita en Etiopia. h

Cri- 10. ATHANASIA corym- Athanasia con corimbos
thmi- bis simplicibus, foliis se- sencillos; hojas medio hen-
folia. mitrifidis linearibus. didas en tres partes y linea-
res.

Santolina corymbis sim- Santolina con corimbos
plicibus fastigiatis, foliis sencillos y elevados en rami-
semitrifidis linearibus. Mill. llete horizontal; hojas medio
dict. t. 327. f. 2. hendidas en tres partes y li-
neares.

Coma-aurea frutescens, Penacho de oro frutescen-
foliis angustissimis trifidis. te, con hojas muy angostas
Burm. afr. 186. t. 69. f. 1. y hendidas en tres partes.

Coma-aurea Africana, Penacho de oro Africano,
fruticans, foliis Crithmi ma- fruticoso, con hojas como las
rini. Comm. hort. 2. p. 99. del Hinojo marino.
t. 50.

Jacobaea Æthiopica, fo- Jacobea de Etiopia, con
liis Abrotani trifidis, sum- hojas como las del Abrota-
mo caule capitulis parvis no, hendidas en tres partes;
glomeratis. Pluk. alm. 194. y cabezuelas pequeñas con-
t. 302. f. 7. globadas en la sumidad del
tallo.

Cast. Athanasia con hoja de Hinojo marino.
Habita en Etiopia. h

FLOSC. HERM. EN EL DISCO Y EN EL RAD. 265

Tiene muchos *flosculos*: y las *hojas tiernas* casi conglutinadas.

Parvi-
flora.

11. ATHANASIA *corymbis compositis, foliis pinnatis linearibus.*

Tanacetum (*Crithmifolium*) *foliis pinnatis, pinnis linearibus remotis intergerimis.* Spec. pl. 3. p. 1182. Berg. cap. 239.

Santolina corymboposito terminali, foliis linearibus dentatis, dentibus longitudine folii. Hort. cliff. 397.

Coma-aurea foliis multifidis, glaucis, flosculis muscosis. Burm. afr. 185. t. 68. f. 4.

Elichrysum Africanum, frutescens, foliis Crithmi marini. Comm. hort. 2. p. 113. t. 57.

Ageratum Capense, Crithmi folio, capitulis parvis. Pet. gaz. t. 34. f. 1.

Elichrysum Æthiopicum seu Stæchas arborea, foliis Abrotani. Pluk. alm. 134. t. 325. f. 3.

Athanasia con corimbos compuestos; hojas pinnadas y lineares.

Tanaceto (con hoja de Hinojo marino) de hojas pinnadas, con sus hojuelas lineares, apartadas y enterisimas.

Santolina con el corimbo compuesto, terminal; hojas lineares y con dientes del largo de la hoja.

Penacho de oro con hojas hendidas en muchas partes, de color garzo; y flosculos musgosos.

Elichryso de Africa, frutescente, con hojas como las del Hinojo marino.

Ageiato del Cabo de Buena-esperanza, con hoja como la del Hinojo marino; y cabezuelas pequeñas.

Elichryso de Etiopia, ó Cantueso arboreo, con hojas como las del Abrotano.

Cast. Athanasia de flores pequeñas.

Habita en Etiopia. *h*

Lleva los *cálices* de la magnitud de un grano de Centeno y las mas veces con tres *flosculos*: las *semillas* coronadas con escamas como pajas: y el *receptaculo* pajoso; (contra la observacion de *Vaill.*) aunque las escamas son menudas.

ATHA-

266 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Pin- 12. *ATHANASIA foliis* \times Athanasia con hojas pin-
nata. *pinnatis linearibus tomen-* \times *nadas*, lineares y tomento-
tosis, corymbis densis com- \times *sas*; corimbos densos y com-
positis. Suppl. p. 361. \times *puestos.*

Cast. Athanasia pinnada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Arroja el tallo prolifero, frutescente y tomentoso: las ho-
jas amontonadas, tomentosas y pinnadas, con cinco ó
siete hojuelas, lineares y del largo de una pulgada: el
corimbo con muchísimas flores amontonadas: y los cáli-
ces vellosos.

- Lin- 13. *ATHANASIA foliis* \times Athanasia con hojas linea-
folia. *linearibus, corymbo simpli-* \times *res*; y corimbo sencillo.
ci. Suppl. p. 361. \times

Cast. Athanasia con hoja de Lino.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Produce el tallo sencillo, rollizo, liso y con traza como la
del Lino: las hojas alternas, muy sencillas, lineares, ó
alesnadas: el corimbo terminal y sencillo: las flores ao-
vadas y lisas.

- Fili- 14. *ATHANASIA foliis* \times Athanasia con hojas linea-
formis. *linearibus glabris patulis,* \times *res*, lampiñas, extendidas;
corymbo composito. Suppl. \times *y corimbo compuesto.*
p. 361. \times

Cast. Athanasia filiforme.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

- Ci- 15. *ATHANASIA foliis* \times Athanasia con hojas linea-
nera. *linearibus tomentosis inte-* \times *res*, tomentosas, enteras; y
gris, corymbo composito. \times *corimbo compuesto.*
Suppl. p. 361. \times

Cast. Athanasia cenicienta.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

- P: Ci- 16. *ATHANASIA foliis* \times Athanasia con hojas pin-
nata. *pinnatis glabris, corymbo* \times *nadas*, lampiñas; y corimbo
composito. Suppl. p. 361. \times *compuesto.*

Cast.

Cast. Athanasia peynada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

- Sessi-
liflora. 17. *ATHANASIA foliis* ~~X~~ Athanasia con hojas linea-
linearibus pilosis, peduncu- ~~X~~ res, pelosas; pedunculos de
lis unifloris folio breviori- ~~X~~ una flor y mas cortos que la
bus. Suppl. p. 362. ~~X~~ hoja.

Cast. Athanasia con flores sentadas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Es planta pequenita como la siguiente.

- Pumi-
la. 18. *ATHANASIA foliis* ~~X~~ Athanasia con hojas linea-
linearibus pilosis, pedun- ~~X~~ res, pelosas; pedunculos de
culis unifloris folio longio- ~~X~~ una flor y mas largos que la
ribus. Suppl. p. 362. ~~X~~ hoja.

Cast. Athanasia enana.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

- Uni-
flora. 19. *ATHANASIA foliis* ~~X~~ Athanasia con hojas aova-
obovatis imbricatis glabris, ~~X~~ das al revés, apañadas y lam-
floribus terminalibus sessi- ~~X~~ piñas; flores terminales, sen-
libus solitariis. Suppl. p. ~~X~~ tadas y solitarias.
362. ~~X~~

Cast. Athanasia de una flor.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

ORDEN II.

POLYGAMIA SUPERFLUA. DE LAS MISMAS FLORES QUE TIENEN
LOS FLOSCULOS DEL DISCO HERMA-
FRODITOS, Y LOS DEL RADIO
FEMENINOS.

1128. Género TANACETUM. * *Tourn. t. 261.*

Vaill. A. G. 1719. Balsamita. Vaill.

A. G. 1719.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* hemisférico y apinado; con *escamas* agudas y compactas.

COR. *compuesta* tubulosa y convexâ; con numerosas *corollas* hermafroditas, y tubulosas en el disco; y algunas femeninas en el ámbito ó radio.

Propia de la hermafrodita en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco partes y redoblado.

De la femenina hendida en tres partes, y dividida mas profundamente ácia dentro.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: *germen* oblongo y pequeño: *estilo* filiforme y del largo de los estambres: con el *estigma* hendido en dos partes y revuelto.

En las femeninas: *germen* oblongo: *estilo* sencillo: con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas; con el *vilano* algo ribeteado.

RECEPT. convexô y desnudo.

OBS. Las corollas del ámbito *se hallan á veces todas hermafroditas: y en algunas se observa la semilla desnuda.*

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 461.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos
hen-

hendidos en muchas partes , sentados en el embrión , y comprendidos en un caliz escamoso y casi hemisferico: y el embrión pasa despues á semilla , que carece de vilano. A estas notas se añaden las de las flores crasas y recogidas en una cabezuela.

ESPECIES.

- Suf-
fruti-
cosum
1. **TANACETUM** *foliis pinnato-multifidis , laciniis linearibus subdivisis acutis, caule suffruticoso.* Hort. cliff. 398. Berg. cap. 241. Tanaceto de hojas entre pinnadas y hendidas en muchas partes , con sus lacinias lineares, subdivididas y agudas ; y tallo sufruticoso.
- Abrotanum Africanum , fruticans , multiflorum , foliis Tanaceti decuplo minoribus.* Comm. hort. 2. p. 199. t. 100. Abrotano de Africa , fruticoso , con muchas flores ; hojas como las del Tanaceto, y diez veces mas pequeñas.

Cast. Tanaceto sufruticoso.

Habita en Etiopia. *h*

- Sibi-
ricum.
2. **TANACETUM** *foliis pinnatis , laciniis linearifiliformibus , corymbis glabris , caule herbaceo.* Tanaceto de hojas pinnadas , con sus lacinias entre lineares y filiformes ; corimbos lampiños ; y tallo herbáceo.

Tanacetum foliis pinnatis , multifidis , laciniis linearibus trifidis. Gmel. sib. 4. p. 134. t. 65. f. 2. Tanaceto de hojas pinnadas , y hendidas en muchas lacinias lineares hendidas en otras tres.

Cast. Tanaceto de Siberia.

Habita en la Siberia.

Echa las *hojas* lineares y pinnadas , con sus lacinias ú hojuelas lineares , filiformes y enterisimas ; aunque las mas veces se hallan hendidas en otras dos , ó tres lacinias: el *corimbo* terminal y axilar , con pocas flores y amarillas.

270 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Inca-
num. 3. TANACETUM *foliis bipinnatis tomentosis*, corimbo ovato composito. Tanaceto con hojas dos veces pinnadas, tomentosas; corimbo aovado y compuesto.

Artemisia caule simplici, corymbo composito ovato terminali. Hort. cliff. 404. Artemisa con el tallo sencillo; corimbo compuesto, aovado y terminal.

Absintium Orientale, incanum, tenuifolium, floribus luteis in capitulum congestis & sursum spectantibus. Tourn. cor. 34. Axenjo Oriental, blanquecino, con hoja delgada; flores amarillas, amontonadas en cabezuela y que miran ácia arriba.

Cast. Tanaceto blanquecino.

Habita en Oriente. 24

Cotu-
loides. 4. TANACETUM *foliis dentato-pinnatis, acumina- tis, caule ramosissimo, floribus subpaniculatis.* Tanaceto con hojas entre dentadas y pinnadas, puntiagudas; tallo muy ramoso; y flores casi en panoja.

Cast. Tanaceto como Cotula.

Habita en el Cabo de Buena esperanza. ☉

Es planta con traza de Manzanilla. Produce el tallo muy ramoso, del largo de medio pie; con ramas de la longitud del mismo tallo, ascendentes y extendidas: las hojas pequeñas y hendidas al través, con siete ó nueve dientes lanceolados, inermes, puntiagudos y opuestos: nueve hasta doce flores colocadas en los extremos de todas las ramas, amarillas, con pedunculos y piecécitos desiguales: el caliz de diez hojuelas, elípticas, laxas y casi iguales, sin que estén apinadas: las corolas globosas; y las corolillas hendidas en cinco partes.

An-
num. 5. TANACETUM *foliis bipinnatifidis linearibus acutis, corymbis tomentosis.* Tanaceto con hojas dos veces hendidas al través, lineares, agudas; y corimbos tomentosos.
Roy. lugdb. 155.

Tanacetum floribus corymbosis, ramis summis primordialibus caule longioribus, foliis radicalibus bipinnatis, caulinis rameisque difformibus. Gou. illustr. 66.

Tanaceto con flores corimbosas; ramas de arriba primordiales mas largas que el tallo; hojas radicales dos veces pinnadas, las del tallo y de las ramas disformes.

Santolina corymbis simplicibus, foliis linearibus confertis. Mill. dict. t. 227. f. 1.

Santolina con los corimbos sencillos; hojas lineares y amontonadas.

Absinthium corymbiferum, annuum. Tourn. 458.

Axenjo con flores en corimbo, y annuo.

Elichrysum foliis Abrotani. C. B. P. 264. Pluk. phyt. t. 160. f. 1.

Elichryso con hojas como las del Abrotano.

Elichryson. Clus. hist. 1. p. 325. t. 326.

Elichryso.

Cast. Tanaceto annuo.

Habita en Toscana y Francia: en el circuito de Madrid, en la Mancha, Castilla la vieja y en otras muchas partes de España. ☉

Tiene las ramas desparramadas y mas largas que la umbela primaria: las hojas lineares, entre pinnadas y hendidas en tres ó cinco partes: y los flosculos del ámbito que algunas veces no son femeninos.

Monanthos.

6. TANACETUM *caulibus simplicissimis unifloris, longitudine foliorum.*

Tanaceto con los tallos muy sencillos, del largo de las hojas y con una flor.

Tanacetum monanthemum, Chamæmeli folio & facie. Vaill. act. 337.

Tanaceto con una sola flor; hoja y traza como las de la Manzanilla.

Cast. Tanaceto de una sola flor.

Habita en Oriente. ☉ *Forsk.*

Produce muchas hojas radicales, dos veces pinnadas, del largo de un dedo y con traza como la de la *Achillea milenrama*: algunos tallos derechos, muy sencillos, algo rígidos, casi vellosos y del largo de una pulgada: pocas hojas en el tallo, con peciolo, entre dentadas y pinnadas: una sola flor terminal y con pedunculo: el

272 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

caliz oblongo , apiñado y veloso : la corola amarilla : las semillas desnudas : el receptaculo tambien desnudo : y otros tallos que salen despues desde la raiz , echados , ascendentes , mas largos , y terminados en un pedunculo de una flor.

Vul- 7. TANACETUM foliis Tanaceto con hojas dos
gare. bipinnatis incisiss serratis. veces pinnadas , cortadas y
Hort. cliff. 398. Gmel. sib.2. aserradas.
p. 133. t. 65. f. 1. Knorr.
del. 2. t. T. 2. Mat. med. p.
209.

Tanacetum foliis pinna- Tanaceto de hojas pinna-
tis , pinnis semipinnatis , das , con las hojuelas medio
acutè dentatis. Hall. helv. hendidas al través ó medio
n. 132. pinnadas , y con dientes
agudos.

Tanacetum vulgare , lu- Tanaceto vulgar , con la
teum. C. B. P. 132. Tourn. flor amarilla.
p. 471. Mat. med. p. 209.

Tanacetum vulgare , flo- Tanaceto vulgar , con la
re luteo. Bauh. hist. 3. p. flor amarilla.
131.

Athanasia seu Tanace- Athanasia ó Tanacetó.
tum. Dalech. hist. 955.

" Tanacetum (crispum) fo- Tanaceto (rizado) con ho-
liis crispis. C. B. P. 132. jas rizadas. "
Tourn. p. 461.

Tanacetum crispum. Dod. Tanaceto rizado.
pempt. 36.

Cast. Tanaceto vulgar.

Habita en Europa : en la Mancha , Cataluña , Castilla
la vieja y en otras muchas partes de España. 4

Quando el verano es muy caliente suele producir semi-
flosculos en el ámbito.

PROPIED. La yerba y flores son excelentes carminativas,
expelentes , sudorificas , emenagogas , antelminticas,
antiputredinosas , balsamicas , tónicas y estomáticas :
se usan en la terciana , en la hidropesia y en el his-
terico.

TA-

Balsa-
mita.

8. TANACETUM *foliis ovatis integris serratis*. Tanaceto con hojas aovadas, enteras y aserradas.

Hort. cliff. 398. Mat. med. 210.

Tanacetum hortense, *foliis & odore Menthae*. Tourn. Tanaceto hortense, con hojas y olor de Menta. p. 461.

Mentha hortensis, *corymbifera*. C. B. P. 226. Menta hortense, con flores en corimbo.

Costus hortensis. Dalech. Costo hortense. hist. 678.

Balsamita major. Dod. Balsamita mayor. comm. 299.

Cast. Tanaceto Balsamita. Farm. *Costus hortensis*, *Balsamita mas*, *Mentha Sarracenica seu Græca. vulgo*: Yerba de Santa María.

Habita en Toscana, Narbona y Suiza: en Aragon, Cataluña, Castilla la vieja y en otras partes de España. 4 PROPIED. Son las mismas que las de la antecedente.

1129. Género ARTEMISIA. * Tourn. t. 260. Vaill.

A. G. 1719. f. 23. 31. 36. 45. Abrotanum. Tourn.

t. 260. Absinthium. Tourn. t. 260.

Vaill. A. G. 1719. f. 32.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun casi redondo y apiñado; con escamas redondeadas y arrimadas entre sí.

COR. compuesta; con muchas corolillas hermafroditas, tubulosas, en el disco; y las femeninas casi sin pétalos, en el ámbito.

Propia de la flor hermafrodita en forma de embudo; con el borde hendido en cinco partes.

ESTAMB. en las flores hermafroditas: filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la antera cilíndrica, tubulosa y de cinco dientes.

PIST. en las flores hermafroditas: germen pequeño: estilo filiforme y de la longitud de los estambres: con el

TOM. VI.

S

es-

274 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

estigma hendido en dos partes y revuelto.

En las flores femeninas : *germen* muy pequeño : *estilo* filiforme , mas largo que en las hermafroditas : con el *estigma* semejante al de las hermafroditas.

PERIC. ninguno : el *caliz* apenas mudado hace sus veces.

SEM. desnudas en unas y otras flores.

RECEPT. plano , desnudo , ó vellosa.

OBS. El Axenjo de Tourn. *posee el receptaculo vellosa ; y el caliz mas globoso.*

El Abrotano y Artemisa del mismo Tourn. *tienen el receptáculo desnudo.*

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEF.

ARTEMISIA. p. 460.

La *flor* es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes, sentados en el embrión y comprendidos en un caliz escamoso. Entre los flosculos se hallan algunos embriones desnudos, y que terminan en un capilamento hendido en dos partes, los quales pasan á semilla semejante á la del Axenjo. Se diferencia del Axenjo por su sola traza exterior ; pues la diferencia de las flores casi no se percibe.

ABSINTHIUM. p. 457.

La *flor* es flosculosa y pequeña, que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes, sentados en el embrión y comprendidos en un caliz escamoso : y el embrión pasa á semilla sin vilano. A estas notas se añade la de la traza de toda la planta.

ABROTANUM. p. 459.

Es un género de planta con flores y frutos como los del Axenjo, del qual solamente se diferencia por su traza exterior.

ESPECIES FRUTICOSAS Y LEVANTADAS.

Ver-
micu-
lata.

1. ARTEMISIA frutescens, foliis acerosis confertis minimis, panicula racemosa, floribus subsessilibus. Artemisa frutescente, con hojas lineares y rígidas, amontonadas y muy pequeñas; panoja racimosa; y flores casi sentadas.

Absinthium Africanum, arborescens, folio vermiculato, incano. Tourn. p. 458. Axenjo Africano, arborescente, con hoja parecida á un gusanillo y blanquecina.

Frutex cineraceus, muscosus. Breyn. cent. p. 24. t. 12. R. Arbusto ceniciento y musgoso.

Cast. Artemisa de gusanillos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. $\frac{1}{2}$

Es arbusto derecho, rígido, algo ceniciento y en panoja.

Tiene las hojas lineares, muy menudas, tomentosas y planas por encima, desnudas y algo convexas por debajo: la panoja muy copiosa, y compuesta de racimos formados de espiguillas sentadas, aovadas y apiñadas, con sus flores tomentosas, en las quales la escama de abaxo se halla desnuda.

Judai-
ca.

2. ARTEMISIA fruticosa, foliis obovatis obtusilobatis parvis, floribus paniculatis pedicellatis. Mat. med. p. 210. Stechm. de Ar. tem. p. 20. Artemisa fruticosa, con hojas aovadas al revés, obtusas, hendidas en lóbulos y pequeñas; flores en panoja y con piececito.

Artemisia tota cinerea. Gron. orient. 259. Artemisa toda cenicienta.

Absinthium Halepense, tenuifolium, grati odoris, coma delicatiore. Pluk. alm. 4. t. 73. f. 2. Axenjo de Alepo, con hoja delgada, de olor grato; y penacho mas delicado.

Absinthium Santonicum, Judaicum & Alexandrinum. C. B. P. 139. Axenjo Santonico, de Judéa y de Alexandria.

Cast. Artemisa de Judéa.

276 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Habita en Judéa , en Arabia y Numidia. \hbar

Arroja el tallo sufruticoso , del largo de pie y medio , en panoja , ceniciento y algo velloso : las *hojas* aovadas al revés , hendidas en tres ó cinco lóbulos , con el de en medio mas ancho , obtusas , planas , cenicientas , menudas , y algo tomentosas : la *panoja* racimosa , con los racimos últimos pedunculados y con piececitos : las *flores* casi redondas , algo deprimidas , y de la magnitud de la semilla del *Cilantro*.

Æthiopica.

3. ARTEMISIA fruticosa , foliis palmatis linearibus minutissimis , floribus racemosis pedunculatis. Mill. dict. n. 18. Artemisa fruticosa , con hojas palmeadas , lineares y muy menudas ; flores en racimo y pedunculadas.

Abrotanoides Africanum , foliis cinereis , muscosis , capitulis florum globosis , magnis. Rai. Suppl. p. 232. Planta como Abrotano , de Africa , con hojas cenicientas , y musgosas ; cabezuelas de las flores globosas y grandes.

Cast. Artemisa de Etiopia.

Habita en Etiopia y en España. \mathcal{C}

Es *arbusto* del largo de un pie , ramoso , blanco y con tomento muy poco manifesto. Tiene las *hojas* menudas , amontonadas y algo tomentosas , con sus laciniás lineares y muy angostas : las *flores* racimosas , con pedunculo , inclinadas y casi globosas : y el *receptaculo* desnudo.

Contra.

4. ARTEMISIA fruticosa , foliis palmatis linearibus minutis , panicula racemosa , floribus sessilibus. Mat. med. 210. Artemisa fruticosa , con hojas palmeadas , lineares , menudas ; panoja racimosa ; y flores sentadas.

Cast. Artemisa contra. *Farm.* Semen Santonicum : Semen contra.

Habita en Persia. \hbar Doct. Lerche.

Es *arbusto* en panoja , derecho , tomentoso y blanco ; con las *ramas* mas tomentosas. Lleva las *hojas* lineares , las mas veces amontonadas , muy menudas , tomentosas y al-

algo obtusas : la *panoja* compuesta , las mas veces , de ramas sencillas , sobre las quales están las *espigas* alternadamente esparcidas , aovadas , muy pequeñas , menos tomentosas y apiñadas con flores chicas.

PROPIED. La yerba y semillas son balsámicas , tónicas , estomáticas , antelminticas ó sea contra lombrices ; por cuya razon , en las oficinas , la semilla se llama con el nombre de Semen contra.

Abro-
tanum.

5. ARTEMISIA fruticosa , foliis setaceis ramosissimis. Mat. med. 211.

Artemisa fruticosa , con hojas setáceas y muy ramosas.

Abrotanum mas , angustifolium , majus. C. B. P. 136. Tourn. p. 459.

Abrotano masculino , mayor , y de hoja angosta.

Abrotanum mas . Dod. pempt. 21.

Abrotano masculino.

Cast. Artemisa Abrotano. vulgo : Yerba lombriguera.

Habita en los montes de Siria , Italia , Carniola y de Mompeller : en Aragon , Cataluña y otras partes de España. \hbar

PROPIED. La yerba y semillas son balsámicas , antácidas , tónicas , estomáticas , expelentes , emenagogas y antelminticas : se usan en la tiña , en la gangrena y cachéxia.

Ar-
bores-
cens.

6. ARTEMISIA fruticosa , foliis compositis multifidis linearibus , floribus subglobosis. Mill. dict. 17.

Artemisa fruticosa , con hojas compuestas , hendidas en muchas partes , lineares ; y flores casi globosas.

Absinthium arborescens. Lob. ic. 753. Bauh. hist. 3. p. 173. Tourn. p. 457.

Axenjo arborescente.

Abrotanum latifolium , arborescens. C. B. P. 136.

Abrotano arborescente , y de hoja ancha.

Cast. Artemisa arborescente.

Habita en Italia y Oriente. \hbar

Es muy semejante á la *Artemisa Axenjo*.

ESPECIES TENDIDAS ANTES DE FLORECER.

- San-
tonica. 7. *ARTEMISIA foliis* X Artemisa con hojas del ta-
caulinis linearibus pinnato- X llo lineares , entre pinnadas
multifidis , ramis indivisis, X y hendidas en muchas par-
spicis secundis reflexis , flo- X tes ; ramas indivisas ; espi-
ribus quinquefloris . Zinn. X gas ladeadas , redobladas ;
goett. 397. Mill. dict. n. 8. X y flores con cinco flosculos.
Stechm. de Artem. p. 25.
- Artemisia fruticosa , in-* X Artemisa fruticosa , blan-
cana , ramosissima , corym- X quecina , muy ramosa , con
bis sessilibus , spicatis sub- X corimbos sentados, en espiga
rotundis , foliis superioribus X y casi redondos ; hojas supe-
linearibus , brevissimis , ob- X riores lineares , cortísimas y
rusiusculis . Gmel. sib. 2. p. X algo obtusas.
115. t. 51.
- Semen sanctum . Lob. ic.* X Semilla santa.
756.
- α *Absinthium Santonicum,* X Axenjo Santonico , de
Gallicum . C. B. P. 139. Cam. X Francia. α
epit. 457. Tourn. p. 458. X

Cast. Artemisa Santonica.

Habita en la Tartaria y Persia.

Su traza es como la del *Axenjo campestre* : echa el tallo en panoja y algo blanquecino : las *hojas inferiores* entre pinnadas y hendidas en muchas partes , lineares y blanquecinas ; las de las *ramas* muy pequeñas , lineares é indivisas : las *ramas* en varitas , con racimos , ó espigas alternas , ladeadas , encorvadas ácia atrás ; y sus *piecitos* salpicados de hojas lineares , encorvadas ácia atrás y algo obtusas : las *flores* solitarias y cilíndricas : y el *receptaculo* desnudo.

Todos los *tallos* derechos , en la planta que lleva el fruto , pierden su color blanquecino.

Cam-
pestris

8. *ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis*. Hort. cliff. 403. Ste-
chm. de Artem. 26.

Artemisa con hojas hendi-
das en muchas partes, linea-
res; tallos tendidos y en va-
ritas.

Abrotanum campestre, cauliculis albicantibus (vel *cauliculis rubentibus*). C. B. P. 136. Tourn. p. 459.

Abrotano campestre, con
tallitos blanquecinos (ó ro-
xos).

Ambrosia altera. Cam. epit. 597.

Otra Ambrosia.

Cast. Artemisa campestre.

Habita en campos abrigados y áridos de Europa : en los circuitos de Madrid : en Aragon , Cataluña y otras partes de España. 24

Tiene el *receptaculo* desnudo : los *racimos* sencillos , alternos y con flores solitarias.

Pa-
lustris.

9. *ARTEMISIA foliis linearibus pinnatis integerrimis, floribus glomeratis subsessilibus*.

Artemisa con hojas linea-
res , pinnadas , enterisimas ;
flores conglobadas y casi sin
piececito.

Artemisia herbacea, foliis multifidis, linearibus, corymbis in spica interrupta glomeratis, sessilibus. Gmel. sib. 2. p. 119. t. 55.

Artemisa herbáceo , con
hojas hendidas en muchas
partes, y lineares ; corimbos
conglobados en espiga inter-
rumpida y sin pedunculo.

Absinthium capillaceis foliis, flosculis aureis, densissime congestis. Amm. ruth. 197.

Axenjo con hojas capila-
res ; flores de color de oro y
muy densamente amontona-
das.

Cast. Artemisa palustre.

Habita en la Siberia.

Echa los tallos tendidos y ascendentes : las hojas como las del *Coronopo* , lineares y hendidas en cinco ó siete segmentos : las flores conglobadas , casi sin piececito , y de color amarillo-roxo : con el *receptaculo* desnudo.

Crimithi-folia.

10. ARTEMISIA *foliis compositis divaricatis linearibus carnosis glabris, caule ascendente paniculato*. Mill. dict. n. 10. Artemisa con hojas compuestas, desparramadas, lineares, carnosas y lampiñas; tallo ascendente y en panoja.

Abrotanum Hispanicum, maritimum, folio crasso splendente & rigido. Tourn. Abrotano de España, marítimo, con hoja crasa, resplandeciente y rígida.

P. 459.

Absinthium inodorum, foliis Crithmi, lucidis, obscurè virentibus. Moris. hist. 3. p. 11. Rai. Suppl. p. 232. Ajenjo sin olor, con hojas parecidas á las del Hinojo marino, lustrosas y de color verde obscuro.

Cart. Artemisa con hoja de Hinojo marino.

Habita en las playas arenosas de Portugal; y en los arenales y laderas del mar oceano de España.

Su traza es como la de la *Artemisa campestre lampiña*.

Echa los tallos del largo de medio ó de un pie, ascendentes y terminados con la panoja de las flores: las hojas hendidas al través y en tres partes, lineares, lampiñas y carnosas: las flores como las de la *Artemisa campestre*; con el receptaculo desnudo.

Maritima.

11. ARTEMISIA *foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis femineis ternis*. Pall. it. 1. p. 37. Jacq. vind. 149. Stechm. de Artem. p. 17. Artemisa con hojas hendidas en muchas partes, tomentosas; racimos cabizbaxos; y flosculos femeninos de tres en tres.

Artemisia foliis compositis multifidis, racemis simplicibus alternis, floribus erectis sessilibus. Roy. lugdb. 113. Artemisa con hojas compuestas, hendidas en muchas partes; racimos sencillos, alternos; flores derechas y sentadas.

Absinthium Seriphium, Belgicum. C. B. P. 139. Bauh. hist. 3. p. 178. Tourn. p. 458. Ajenjo Serifio, de Flandes.

α *Absinthium Seriphium*, X Axenjo Serifio, de Alema-
Germanicum. C. B. P. 139. nia. α
Tourn. p. 458.

β *Absinthium Seriphium*, X Axenjo Serifio, de Fran-
Gallicum. C. B. P. 139. To- cia. β
urn. p. 458.

Absinthium Seriphium, X Axenjo Serifio, marino,
tenuifolium, marinum, Nar- (maritimo) de Narbona,
bonense. Bauh. hist. 3. p. 177. X con hoja delgada.

Cast. Artemisa maritima.

Habita en las playas maritimas de la Europa septentrio-
nal: en las Salinas del Real Sitio de Aranjuez, en las
del rio Xarama, en las de Cardona, y en las laderas del
Mar mediterráneo. 2

Tiene el *receptaculo* desnudo.

Gla- 12. ARTEMISIA *foliis* X Artemisa con hojas pal-
cialis. *palmatis multifidis sericeis*, X meadas, hendidas en muchas
caulibus ascendentibus, flo- partes, y con vello como se-
ribus glomeratis fastigia- da; tallos ascendentes; flores
ris. Mill. dict. n. 19. X conglobadas y elevadas en
ramillete horizontal.

Absinthium foliis seri- X Axenjo de hojas con vello
ceis, petiolatis, pinnatis, X como seda, pecioladas, pin-
trifidis & quinquefidis. Hall. X nadas, y hendidas en tres
helv. n. 125. X y en cinco partes.

Absinthium alpinum, can- X Axenjo alpino, candido y
didum, humile. C. B. P. 139. X baxo.
Prodr. 71. Tourn. p. 458.
Rai. Suppl. p. 131. Allion.
pedem. 5. t. 1. f. 3.

Absinthium pumilum, pal- X Axenjo enano, menor, con
matum, minus, argenteo X hoja palmeada, de vello co-
sericeoque folio, Hispani- mo seda, y de color de pla-
cum. Barr. 1006. ic. 462. X ta.
Locc. mus. part. 2. 81. t. 71. X

Cast. Artemisa Glacial. *vulgo*: Genepi.

Habita en Suiza y Valesia: en la Alcarria, orillas del
camino Real; y en otras partes de España. 2

Su *estatura* es como la de la *Artemisa rupestre.* Lleva
las

282 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

las *hojas* pequeñas , divididas en tres *lacinias* , hendidas en otras tres , lineares , cortísimas , con tomento candido , y su peciolo largo ; y las *inferiores* con el peciolo que envayna el tallo : los *tallos* ascendentes , del largo de un xeme , muy sencillos , foliosos y algo tomentosos : las *flores* globosas , amarillas , terminales y conglobadas : los *pedunculos* cortísimos : los *cálices* algo tomentosos : y el *receptaculo* peloso.

Ru-
pestris

13. ARTEMISIA foliis

pinnatis , caulibus ascen-
dentibus hirsutis , floribus
globosis cernuis , receptacu-
lo papposo. It. gotl. t. 285.

Mill. dict. n. 12. Stechm. de
Artem. p. 9.

Artemisa de hojas pinna-
das ; tallos ascendentes, con
pelo áspero ; flores globosas,
cabizbaxas ; y receptaculo
con pelusa.

Artemisia foliis pinnatis,
pilosis , ramis ascenden-
tibus , floribus oblongis , sub-
erectis. Gmel. sib. 2. p. 111.
t. 49. f. 1. (Huic recepta-
culum nudum. R.)

Artemisa con hojas pinna-
das, pelosas ; ramas ascen-
dentes ; flores oblongas y
algo derechas. (Tiene el re-
ceptaculo desnudo. R.)

Absinthium ex alis flori-
dum , foliis angustis , seri-
ceis , pinnatis , pinnis tri-
fidis & quinquefidis. Hall.
helv. n. 126.

Axenjo con flores que sa-
len de las axilas ; hojas an-
gostas, vellosas como seda y
pinnadas , con las hojuelas ó
lacinias hendidas en tres y
en cinco partes.

Absinthium Ponticum,
repens & supinum. C. B. P.
139. Pluk. alm. 3. t. 73. f. 1.
Tourn. p. 458.

Axenjo de Ponto , echado
y rastrero.

Absinthium pumilum,
palmatum , minus , argen-
teo sericeoque folio. Bocc.
mus. 2. p. 81. t. 71. Barr.
rar. 106. t. 462.

Axenjo enano, menor, de
hoja palmeada , con vello
como seda, y de color de pla-
ta. α

Absinthium Orientale, te-
nuifolium , argenteum &
sericeum , flore magno. To-
urn. cor. 34.

Axenjo Oriental , de hoja
delgada , con vello como se-
da , de color de plata ; y flor
grande.

Absinthium alpinum, *spicatum*, *foliis petiolatis, bis trifidis*, *caulinis pinnatis*. Allion. pedem. 1. p. 3. t. 1. f. 2. Axenjo alpino, espigado, de hojas con peciolo, hendidas dos veces en tres partes; y las del tallo pinnadas.

8 *Absinthium viride*, *foliis multifidis*, *linearibus*. Gmel. sib. 2. p. 131. t. 64. f. 2. Axenjo verde, con hojas hendidas en muchas partes y lineares. 3

Cast. Artemisa rupestre.

Habita en las peñas calcareas de Siberia y de Oelandia: en Aragon y otras partes de España.

ESPECIES DERECHAS, HERBACEAS Y DE HOJAS
COMPUESTAS.

pecti- 14. ARTEMISIA *foliis pinnatis pectinatis glabris sessilibus*, *floribus axillaribus solitariis sessilibus quadrifloris*. Suppl. p. 362. Artemisa de hojas pinnadas, con sus hojuelas dispuestas en forma de peyne, lampiñas, y sin peciolo; flores axilares, solitarias, sentadas y de quatro flosculos.

Artemisia pectinata. Pall. it. vol. 3. p. 755. t. H. h.f.2. Artemisa peynada.

Cast. Artemisa peynada.

Habita en lugares secos de Dauria, junto con la Artemisa palustre. Pall. ☉

Es planta hermosa y muy fragante. Echa el tallo levantado, del largo de un palmo y herbáceo. Se distingue facilmente por las hojas sencillamente pinnadas, con sus hojuelas setáceas, paralelas, á manera de peyne y alguna vez bifurcadas; como tambien por las flores que nacen solitarias en las axilas á lo largo del tallo.

Pon- 15. ARTEMISIA *foliis multipartitis subtus tomentosis*, *floribus subrotundis nutantibus*, *receptaculo nudo*. Hort. cliff. 404. Jacq. vind. 149. austr. t. 99. Mat. med. p. 211. Artemisa con hojas hendidas en muchas partes, y tomentosas por debaxo; flores algo redondas, inclinadas; y receptaculo desnudo.

284 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Artemisia foliis seri- X Axenjo de hojas con vello
ceis , duplicato-pinnatis , X como seda, dos veces pin-
pinnulis parallelis . Hall. X nadas, y sus hojuelas para-
 helv. n. 129. R. X lelas.

Absinthium Ponticum , X Axenjo de Ponto, blan-
tenuifolium, incanum. C. B. X quecino y con hoja delgada.
 P. 138. Tourn. p. 487.

Absinthium tenuifolium. X Axenjo con hoja delgada.
 Dod. pempt. 24. X

Cast. Artemisa de Ponto.

Habita en la Hungria mas interior, en la Pannonia y
 en la Tracia. 24

PROPIED. Son las mismas que las de la siguiente, aun-
 que mas débiles.

Annua 16. ARTEMISIA foliis X Artemisa con hojas tres
triplicato-pinnatis utrinque X veces pinnadas, y lampiñas
glabris , floribus subglobo- X en ambas partes; flores casi
sis nutantibus , receptaculo X globosas, inclinadas; recep-
glabro conico. Mill. dict. n. X taculo lampiño y cónico.
 14.

Artemisia radice annua, X Artemisa verde, con la
viridis, foliis pinnatis, pin- X raiz annua; hojas pinnadas,
nis pinnatifidis , calycibus X con sus hojuelas hendidas al
subrotundis ferè erectis , ex X través; cálices algo rodondos,
alis copiosissimis. Gmel. sib. X casi derechos, y que salen
 2. p. 125. n. 108. X muy abundantes de las axí-
 las.

* *Absinthium folio tenui,* X Axenjo con hoja delgada,
multifido , Camphoram spi- X hendida en muchas partes, y
rans. Boerh. lugdb. 1. p. X que huele á Alcanfor. α
 126. X

Cast. Artemisa annua.

Habita en lugares montuosos de Siberia. ☉ ♂

Tanacetifolia.

17. ARTEMISIA foliis bipinnatis subtus tomentosis nitidis, pinnis transversis, racemis simplicibus. Mill. dict. n. 20. Stechm. de Artem. p. 12.

Artemisa de hojas dos veces pinnadas, tomentosas por debaxo y lustrosas; con hojuelas transversales; y racimos sencillos.

Absinthium foliis radicalibus multoties pinnatis, caulinis pinnatis, longe petiolatis, floribus parvis, raris, sessilibus. Allion. pedem. 6. t. 2. f. 1.

Axenjo con las hojas radicales muchas veces pinnadas; las del tallo pinnadas, con el peciolo largo; flores pequeñas, claras y sentadas.

Artemisia radice perenni, foliis pinnatis, pinnatifidis, incis, serratis, calycibus subrotundis, viridibus, nutantibus. Gmel. sib. 2. p. 122. n. 107.

Artemisa con la raíz perenne; hojas pinnadas, hendidas al través, cortadas y aserradas; cálices casi redondos, verdes é inclinados.

Cast. Artemisa con hoja de Tanaceto.

Habita en la Siberia y en el Piemonte. 24

Tiene el receptaculo peloso. Hall.

Absinthium.

18. ARTEMISIA foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villosa. Hort. cliff. 404. Mat. med. 212. Stechm. de Artem. p. 14.

Artemisa con hojas compuestas y hendidas en muchas partes; flores casi globosas, pendulas; y receptaculo veloso.

Absinthium foliis incanis, pinnatis, pinnis primis bilobatis, pinnulis incis, lanceolatis, spicis heteromallis, floribus pendulis. Hall. helv. n. 124.

Axenjo de hojas blanquecinas, pinnadas, con las primeras hojuelas hendidas en dos lóbulos cortados, y lanceolados; espigas ladeadas; y flores pendulas.

Absinthium incanum, foliis compositis, latiuscule multifidis, floribus subglobosis, pendulis. Gmel. sib. 2. p. 129. t. 63.

Axenjo blanquecino, con hojas compuestas, hendidas en muchas partes algo anchas; flores casi globosas y pendulas.

286 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Absinthium Ponticum X Ajenjo Pontico ó Roma-
seu Romanum Officinarum X no de las Oficinas ó de Dios-
seu Dioscoridis. C. B. P. X corides.

138. Tourn. p. 457.

Absinthium. Cam. epit. X Ajenjo.

452. Blackw. t. 17. Knorr.

del. 2. t. A. 17.

Absinthium latifolium. X Ajenjo de hoja ancha.

Dod. pempt. 23.

Cast. Artemisa Ajenjo. Farm. Absinthium.

Habita en lugares áridos y entre cascajales de Europa :
 en los Pirineos de Cataluña : en Aragon : en Sierra-mo-
 rena y en otras muchas partes de España. 24

Posee el *receptaculo* peloso.

PROPIED. La yerba y flores son muy amargas, balsámi-
 cas, antácidas, antiputredinosas, antelmínticas, es-
 tomáticas, febrífugas, antivenereas y expelentes.

Vul- 19. ARTEMISIA *foliis* X Artemisa con hojas hendi-
 garis. *pinnatifidis planis incis* X das al través, planas, corta-
subtus tomentosis, racemis X das y por debaxo tomento-
simplicibus recurvatis, flo- X sas; racimos sencillos, en-
rum radio quinquefloro. Mat. X corvados ácia atrás; y ei
 med. p. 212. Stechm. de Ar- X radio de las flores con cinco
 tem. p. 32. Black. t. 431. X flosculos.

Artemisia foliis inferne X Ajenjo de hojas tomento-
tomentosis, pinnatis, pin- X sas por debaxo, pinnadas,
nis acutè dentatis, spica X con sus hojuelas ó lacinias
paniculata, erecta. Hall. X agudamente dentadas; espi-
 helv. n. 130. X ga en panoja y levantada.

Artemisia vulgaris, ma- X Artemisa vulgar, mayor.
 jor. C. B. P. 137. Tourn. p. X
 460.

Artemisia vulgaris. Bauh. X Artemisa vulgar.

hist. 3. p. 184.

Artemisia rubra & alba. X Artemisa roxa y blanca.

Tabern. ic. 7. & 8.

Cast. Artemisa vulgar.

Habita en lugares cultivados y entre cascajales de Euro-
 pa :

pa : en Aragon , Cataluña , Castilla la vieja y en otras partes de España. 24

PROPIED. La yerba y flores son corroborantes , analepticas , uterinas , expelentes y emenagogas.

ESPECIES CON LAS HOJAS SENCILLAS.

Inte-
grifolia

20. ARTEMISIA foliis lanceolatis subtus tomentosis integerrimis dentatisque, flosculis femineis quinis. Mill. dict. n. 2. Artemisa con hojas lanceoladas, tomentosas por debaxo , enterisimas y dentadas ; y flosculos femeninos de cinco en cinco.

Artemisia foliis planis , lanceolato-linearibus , inferioribus sæpe ex pinnato dentatis. Gmel. sib. 2. p. 109. t. 48. f. 1. Artemisa con hojas planas, entre lanceoladas y lineares, y las inferiores las mas veces entre pinnadas y dentadas.

Cast. Artemisa de hoja entera.

Habita en la Siberia.

Su traza es como la de la *Artemisa vulgar* ; pero tiene las hojas lanceoladas , algo rígidas , lampiñas , con tomento blanco por debaxo , enterisimas por su margen y alguna vez señaladas con uno ú otro diente derecho : los racimos axilares , cortos , terminales y conglobados : las flores redonditas , y las mas veces con cinco flosculos femeninos.

Cœru-
lescentis

21. ARTEMISIA foliis caulinis lanceolatis integris, radicalibus multifidis, flosculis femineis ternis. Hort. cliff. 403. Pall. it. 2. p. 636. Artemisa con las hojas del tallo lanceoladas y enteras, las radicales hendidas en muchas partes; y flosculos femeninos de tres en tres.

Stechm. de Artem. p. 36.

Artemisia. Gmel. sib. 2. p. 131. t. 64. f. 1. secundum Pallas. R. Artemisa.

288 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Absinthium maritimum, X Axenjo marítimo, con ho-
Lavendule folio. C. B. P. X ja como la del Espliego.
 139. Tourn. p. 458. Moris. X
 hist. 3. p. 7. sect. 6. t. 1. f. 5. X
 Duham. arb. 1. t. 24. f. 5. X

Absinthium angustifo- X Axenjo de hoja angosta.
lium. Dod. pempt. 26. X

Abrotanum latifolium, ra- X Abrotano mas raro, de ho-
rius, *Artemisie folio*. Col. X ja ancha, y como la de la
 cphr. 2. p. 75. t. 76. X Artemisa.

Cast. Artemisa de color cerúleo.

Habita en las playas del Mar de la Europa austral.

Echa las *hojas* vellosas en ambas partes: las *flores* cilin-
 dricas, inclinadas, y con tres flosculos en el radio; por
 lo que se parece á la *Artemisa maritima*; aunque las
hojas son del todo diferentes.

22. ARTEMISIA *foliis* X Artemisa con hojas lan-
 Dra- *lanceolatis glabris integer-* ceoladas, lampiñas y enteri-
 cuncu- *rimis*. Gmel. sib. 2. p. 126. X
 lus. t. 59. & 60. f. 1. Stechm. de X
 Artem. 37. X

Abrotanum Lini folio, X Abrotano con hoja como
acriori & *odorato*. Tourn. X la del Lino, mas acre y olo-
 p. 459. X rosa.

Dracunculus hortensis. X Dragoncillo hortense.

C. B. P. 98.

Draco herba. Dod. pempt. X Yerba Dragon.

709. X

Cast. Artemisa Dragoncillo. *vulgo*: Estragon.

Habita en la Siberia y Tartaria. ¶

Tiene el *receptaculo* desnudo, segun Hall.: seis *flosculos*
 femeninos, y doce hermafroditos. Tozzet. app. 106.

PROPIED. Las hojas y flores de esta planta son diges-
 tivas, provocan la orina, el sudor y el menstuo: sua-
 vizan el dolor de muelas y purgan las superfluidades
 del cerebro: las hojas mezcladas en la ensalada pro-
 mueven el apetito, como igualmente el vinagre donde
 se hayan infundido.

Chi-
nensis. 23. *ARTEMISIA foliis simplicibus tomentosis obtusis lanceolatis, inferioribus cuneiformibus trilobis.* Artemisa con hojas sencillas, tomentosas, obtusas, y lanceoladas, las inferiores en forma de cuña y hendidas en tres lóbulos.

Artemisia foliis radicalibus decaulinis diversis. Gmel. Artemisa con las hojas radicales diversas de las del tallo. 2. p. 61. f. 1. 2.

Absinthium maritimum, Sinarum, Lavendulae folio, pulchrioribus corymbis, indorum, sapore aromatico. Axenjo marítimo, de la China, sin olor, de sabor aromático, con hoja como la del Espliego; y corimbos mas hermosos. Pluk. amalth. 3. t. 153. f. 5.

Cast. Artemisa de la China.

Habita en la China segun *Lagerstrom.*: y en la Siberia.

Produce las hojas tomentosas, del largo de media pulgada, poco mas ó menos; las inferiores en forma de cuña, hendidas en tres lóbulos; las superiores lanceoladas y obtusas: las flores en la sumidad del tallo, casi redondas, amontonadas comunmente en racimo aovado y sencillo; con el caliz laxo y tomentoso.

Ma-
deras-
patana 24. *ARTEMISIA foliis simplicibus lyrato-sinuatis, caulibus procumbentibus, floribus pedunculatis solitariis globosis oppositi-foliis.* Artemisa con hojas sencillas, entre liradas y sinuosas; tallos tendidos; flores pedunculadas, solitarias, globosas y opuestas á las hojas.

Absinthium Maderaspatanum, Senecionis incano folio, corymbis solitariis in ramulorum fastigio speciosis. Pluk. amalth. 3. t. 357. f. 3. Axenjo de Madraspatan, con hoja como la del Senecio, blanquecina; corimbos hermosos y solitarios en la sumidad de las ramitas.

Nelampala. Rheed. mal. Nelampala. 10. p. 97. t. 49.

Cast. Artemisa de Madraspatan.

Habita en la India. ☉

Es yerba tendida y apretada al suelo, con ramas alternas, rollizas, ondeadas, estriadas y vellosas. Produce las hojas pinnadas, ó entre dentadas y sinuosas, liradas, mas

290 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

anchas ácia afuera y blandas: los *pedunculos* solitarios, opuestos á la hoja, de una flor, desnudos, estriados y vellosos: las *flores* casi globosas, con el disco convexo, grandes y amarillas: los *flosculos marginales* femeninos y hendidos en tres partes: el *estilo* hendido en dos partes y mas delgado; y los *del disco* hermafroditos; con el *estilo* sencillo.

Mini-
ma.

25. ARTEMISIA *foliis* X Artemisa con hojas en for-
cuneiformibus repandis, cau- X ma de cuña, ondeadas por
te procumbente, floribus X su margen; tallo tendido;
axillaribus sessilibus. Burm. X flores axilares y sentadas.
ind. t. 58. f. 3. Mill. dict. X
n. 5. X

Cast. Artemisa minima.

Habita en la China. Lagerstrom. ☉

Es *planta* muy pequeña. Tiene las *hojas* lampiñas: las *flo-
res* compuestas de seis ó siete flosculos, muy chicas,
axilares y solitarias.

Es distinta de la *Ethulia desparramada*.

1130. Género GNAPHALIUM. * Elichrysum. Tourn.

t. 259. Dill. *elth.* 107. 108. Helichrysum.

Vaill. A. G. 1719. 21. 37. 38.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* redondeado y apiñado; con las *escamas* mar-
ginales tambien redondeadas, escariosas y de color.

COR. *compuesta*; con las *corolillas* hermafroditas tubu-
losas, y algunas veces mezcladas con las femeninas
sin petalo.

Propia en los flosculos hermafroditos: en forma de embu-
do; con el *borde* hendido en cinco partes y redoblado.

Los femeninos (*si lo hay*) sin corola.

ESTAMB. en los hermafroditos: *filamentos* cinco, capilares
y cortísimos: con la *antera* ciliada y tubulosa.

PIST. en los hermafroditos: *germen* ovado: *estilo* filiforme y del largo de los estambres: con el *estigma* hen-
dido en dos partes.

En

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 291

En los femeninos: *germen* aovado: *estilo* filiforme y del largo del de el hermafrodito: con el *estigma* hendido en dos partes y redoblado.

PERIC. ninguno: el *caliz* persistente y lustroso hace sus veces.

SEM. en los hermafroditos: oblongas, pequeñas y coronadas con *vilano*: en las femeninas: semejantes a las de los hermafroditos.

RECEPT. desnudo.

OBS. En algunas especies la corona de la semilla es un vilano capilar; y en otras plumoso.

El *Gnaphalio* arboreo se distingue por el receptáculo lanudo.

Se hallan especies con flores dioicas; lo qual es raro en esta clase.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.

ELICHRYSUM. P. 452.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos divididos á manera de estrella, sentados en el embrión, y comprendidos en el caliz escamoso, reluciente, de color de oro, de plata, ó de otro notable: y el embrión pasa á semilla adornada de vilano.

ESPECIES FRUTICOSAS CON LAS FLORES Ó PENACHO DE COLOR DE PLATA.

Arbo-
reum.

1. GNAPHALIUM fru-
ticosum, foliis sessilibus
linearibus supra glabris
margine revolutis, floribus
subcapitatis, pedunculis
elongatis. Amoen. acad. 6.
afr. 53. Berg. cap. 259.

Gnaphalio fruticoso, con
hojas sentadas, lineares, lam-
piñas por encima y revueltas
en su margen; flores casi
en cabezuela; y pedunculos
alargados.

Cast. Gnaphalio arboreo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \tilde{h}

Tiene el receptaculo lanudo.

Gran-
diflo-
rum.

2. GNAPHALIUM fru-
ticosum, *foliis amplexicaulibus ovatis trinerviis utrinque lanuginosis*. Berg. cap. 245.

Gnaphalio fruticoso, de
 hojas que abrazan el tallo,
 aovadas, con tres nervios y
 lanuginosas en ambas par-
 tes.

Gnaphalium tomentosum,
*foliis inferioribus subrotun-
 dis, superioribus acuminatis*. Burm. afr. 213. t. 76. f. 1.

Gnaphalio tomentoso, con
 las hojas inferiores casi re-
 dondas, y las superiores pun-
 tiagudas.

Elichrysum Africanum,
lanuginosum, *latifolium*,
*calyce floris argenteo & am-
 plisimo*. Oldenl. afr. 27.

Elichryso de Africa, la-
 nuginoso, con hoja ancha;
 caliz de la flor de color de
 plata y muy ancho.

Cast. Gnaphalio de flor grande.

Habita en Etiopia. \hbar

Posee la cabezuela con el pedunculo muy largo.

Fru-
ticans.

3. GNAPHALIUM fru-
ticosum, *foliis ovatis am-
 plexicaulibus, caule rigen-
 te, cyma sessili*.

Gnaphalio fruticoso, con
 hojas aovadas, amplexicau-
 les; tallo yerto; y cima sen-
 tada.

Cast. Gnaphalio fruticoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Arroja el tallo fruticoso, del grueso de un dedo, rígido,
 veloso y por su extremo ramoso: las *hojas* que abrazan
 el tallo, amontonadas, aovadas, de tres nervios, obtu-
 sas, con punta rígida, de la magnitud de una pulgada,
 tomentosas por debaxo, vellosas por encima y que ulti-
 mamente quedan desnudas: las *flores* terminales, y
 amontonadas en cabezuela sentada: y el *caliz* de color
 amarillo-roxo por defuera, y blanco por dentro.

Coro-
natum.

4. GNAPHALIUM fru-
ticosum, *foliis sessilibus lanceolatis, corymbis com-
 positis sessilibus, peduncu-
 lis aphyllis, calycibus coro-
 natis*.

Gnaphalio fruticoso, con
 hojas sin peciolo, lanceola-
 das; corimbo compuesto;
 sin pedunculo comun; pe-
 dunculos sin hojuelas; y cá-
 lices coronados.

Gnaphalium foliis oblongis, acutis, crassis & in- canis, floribus albis, umbel- latis. Burm. afr. 188. t. 69. f. 3.

Gnaphalio con hojas oblon- gas, agudas, crasas y blan- quecinas; flores blancas y en umbela.

Cast. Gnaphalio coronado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Produce los tallos leñosos: las ramas vellosas, con otras ra- mitas que salen de las axilas mas altas de las hojas: las hojas lanceoladas y muy tomentosas: el corimbo termi- nal y sin pedunculo comun: los piececitos parciales mas largos que la hoja que está debaxo de ellos; los la- terales mas largos que el intermedio, y que en su ex- tremo llevan muchos cálices sentados, en cabezuela, con pelo áspero, ensanchados por su margen en un radio ó círculo redondo, lampiño y de color de nieve.

Disco-
lorum.

5. GNAPHALIUM fruticosum, foliis sessilibus lanceolatis, calycibus albis, squamis inferioribus incar- natis.

Gnaphalio fruticoso, con hojas sin peciolo y lanceola- das; cálices blancos; y las escamas inferiores encarna- das.

Gnaphalium pyramidale. Berg. cap. 465.

Gnaphalio piramidal.

Gnaphalium frutescens, tomentosum, folio oblongo, floribus cymosis. Burm. afr. 224. t. 79. f. 4.

Gnaphalio frutescente, to- mentoso, con hoja oblonga; y flores cimosas.

Cast. Gnaphalio de dos colores.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Echa los tallos sufruticosos: las hojas lanceoladas, tomen- tosas y lanudas por debaxo: los pedunculos comunes alargados: los cálices conglobados, con seis escamas inferiores mas cortas y encarnadas, y doce interiores blancas y obtusas: las flores casi en umbela, y con cin- co flosculos poco mas ó menos.

Muri-
catum.

6. GNAPHALIUM fru- X Gnaphalio fruticoso, con
 ticosum, foliis subulatis X hojas alesnadas y terminadas
 mucronatis, umbella com- X en punta rígida; umbela
 posita, calycibus subtriflo- X compuesta; cálices cilindri-
 ris cylindricis. Berg. cap. X cos y casi con tres flosculos.
 262.

Gnaphalium caule fruti- X Gnaphalio con el tallo
 coso, foliis lanceolatis con- X fruticoso; hojas lanceoladas,
 tortis fasciculatis, calyci- X torcidas y en hacecillo; cá-
 bus cylindricis longis. Hort. X lices cilindricos y largos.
 cliff. 403.

Gnaphalium fruticosum, X Gnaphalio fruticoso, con
 foliis lanceolatis, congestis, X hojas lanceoladas, amonto-
 florum calycetubuloso. Burm. X nadas; y caliz de las flores
 afr. 221. t. 79. f. 1. X tubuloso.

Argyrocome Capitis Bo- X Penacho de color de plata
 nae spei, Thymi foliis. Pet. X del Cabo de Buena-esperan-
 gaz. t. 7. f. 3. X za, con hojas como las del
 Tomillo.

Xeranthemum Africa- X Xerantemo de Africa,
 num, frutescens, folio Eri- X frutescente, con hoja como
 ca seu Juniperi angustiore, X la del Brezo, ó del Enebro,
 brevior, acuto, floribus X mas angosta, mas corta, y
 conglobatis, exiguis, albis. X aguda; flores conglobadas,
 Rai. Suppl. p. 182. X pequeñas y blancas.

Gnaphaloides Æthiopi- X Planta como Gnaphalio, de
 cum, frutescens, Stæcha- X Etiopia, frutescente, con
 dis citrinæ foliis spinosis. X hojas como las de la Este-
 Pluk. alm. 92. Rai. Suppl. p. X cade cetrina y espinosas.
 193.

Lychnis coronaria, Mo- X Lycnide coronaria, de Mo-
 nomopatensis, globulifera, X nomopatan, que lleva las
 foliis exalbidis Genistæ acu- X flores en globulillos; con ho-
 leatæ. Pluk. amalth. 134. t. X jas blanquecinas y como las
 406. f. 6. X de la Ginesta con agujones.

“ Gnaphalium fruticosum, X Gnaphalio fruticoso, con
 foliis rarioribus, capitatum. X flores en cabezuela y hojas
 Burm. afr. 223. t. 79. f. 2. X mas claras. “

Eupatorioides Capensis, X Planta como el Eupatorio,
 capitatus. Pet. gaz. t. 8. f. 1. X del Cabo de Buena-esperan-
 Rai. Suppl. p. 239. X za, con flores en cabezuela.

Fru-

- Frutex Æthiopicus*, cenceus, foliis Nepetæ aculeatis, floribus albis coronatus. Pluk. phyt. t. 410. f. 2. Arbusto de Etiopia, ceniciento, de hojas como las de la Nepeta, con agujones, y coronado de flores blancas.
- β *Gnaphalium frutescens*, foliolis lanceolatis, æqualibus, umbellatum. Burm. afr. 223. t. 79. f. 3. Gnaphalio frutescente, umbelado, con hojas pequeñas, lanceoladas é iguales. β
- Elichrysum Æthiopicum*, frutescens, Coridis foliis, incanis, capitulis parvis glomeratis. Pluk. alm. 72. Elichryso de Etiopia, frutescente, con hojas como las del Coris, blanquecinas; cabezuelas pequeñas y conglomeradas.

Cast. Gnaphalio de puntitas.

Habita en Etiopia. \tilde{h}

Varía con tres, cinco, ó seis flosculos.

- Eri- 7. GNAPHALIUM fruticosum, foliis sessilibus linearibus, calycibus exterioribus rudibus, interioribus incarnatis. Amoen. acad. 6. afr. 57. Gnaphalio fruticoso, con hojas sentadas y lineares; cálices exteriores toscos, y los interiores encarnados.

Cast. Gnaphalio como Brezo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \tilde{h}

- Tereti- 8. GNAPHALIUM fruticosum, foliis confertis teretiusculis, corymbis ramosis, calycibus extus ferrugineis. Berg. cap. 261. Gnaphalio fruticoso, con hojas amontonadas, y algo rollizas; corimbos ramosos; y cálices de color amarillo ferrugineo por defuera.
- Gnaphalium frutescens*, foliis tenuissimis, teretibus, ramis creberrimis. Burm. afr. 217. t. 77. f. 3. Gnaphalio frutescente, con hojas muy delgadas, rollizas; y ramas muy espesas.
- Millesfolium Æthiopicum*, Ericæ foliis, incanum, flore specioso. Pluk. alm. 251. t. 308. f. 2. Milenrama de Etiopia, blanquecino, con hojas como las del Brezo; y flor hermosa.

Cast.

296 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Gnaphalio de hoja rolliza,

Habita en Etiopia. \bar{h}

Tiene los cálices todos lampiños, de color amarillo ferrugineo por defuera, y blanquecino por dentro: las hojas alesnadas, desnudas, tomentosas por debaxo y con su margen revuelta.

ESPECIES CON LAS FLORES DE COLOR DE ORO.

Eximium. 9. GNAPHALIUM fruticosum, foliis sessilibus ovatis confertis erectis tomentosis, corymbo sessili. Gnaphalio fruticoso, con hojas sentadas, aovadas, amontonadas, derechas, tomentosas; y corimbo sentado.

Elichrysum Africanum, foliis lanceolatis, integris, tomentosis, decurrentibus, capitulis congestis, ex rubello aureis. Edw. au. 183. Elichryso Africano, con hojas lanceoladas, enteras, tomentosas y escurridas; cabezuelas amontonadas, y de color entre roxio y de oro. t. 183.

Cast. Gnaphalio excelente.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \bar{h}

Echa el tallo fruticoso, del grueso de un dedo y tomentoso: las hojas amontonadas, sin peciolo, aovadas, algo agudas, sin venas y con tomento blanquecino en ambas partes: el corimbo terminal, y sin pedunculo comun: los pedunculos con una hojuela; y las mas veces de una flor: las flores globosas: los cálices grandes, apiñados, con escamas casi redondas, escariosas, cóncavas, obtusas, lampiñas, y de color que tira á purpúreo.

Mucronatum.

10. GNAPHALIUM fruticosum, foliis subulatis mucronatis, calycinis squamatis subrotundis. Gnaphalio fruticoso, con hojas alesnadas, terminadas en punta rígida; y escamas del caliz casi redondas.

Gnaphalium fruticosum, foliis subulatis, tomentosis, mucronatis, calycibus subrotundis, majusculis, paniculatis. Berg. cap. 269. Gnaphalio fruticoso, con hojas alesnadas, tomentosas, terminadas en punta rígida; cálices casi redondos, mayores y en panoja.

Xeranthemum frutescens, X Xerantemo frutescente,
foliis linearibus, angustis, X con hojas lineares, muy an-
simis, capitulis sulphureis. X gostas; y cabezuelas de co-
 Burm. afr. 179. t. 66. f. 3. X lor de azufre.

Cast. Gnaphalio con puntas rígidas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Stee- 11. GNAPHALIUM fru- X Gnaphalio fruticoso, con
 chas. *ricosum, foliis linearibus*, X hojas lineares; corimbo com-
corymbo composito, ramis X puesto; y ramas en vari-
virgatis. Hort. cliff. 401. X tas.
 Pall. it. 1. p. 207. Blackw.
 t. 438.

Filago foliis linearibus, X Filago de hojas lineares,
oris contractis, ramis sim- X con sus orillas encogidas;
plicissimis, umbella conve- X ramas muy sencillas y termi-
xa terminatis. Hall. helv X nadas en una umbela conve-
 n. 145. X xâ.

Elichrysum seu Stæchas X Elichryso ó Estecade ce-
citrina, angustifolia. C. B. X trina, de hoja angosta.
 P. 264. Tourn. p. 452.

Helichrysum seu Chri- X Helichryso ó Penacho de
come angustifolia, vulga- X oro vulgar, con hoja an-
ris. Moris. hist. 3. p. 401. X gosta.
 sect. 7. t. 11. f. 7.

Chrisocome seu Stæchas X Penacho de oro ó Esteca-
citrina, minor. Barr. ic. 410. X de cetrina, menor.
 409. 278.

Stæchas citrina. Dod. X Estecade cetrina.
 pempt. 268.

Cast. Gnaphalio Estecade. *vulgo*; Perpetuas amarillas sil-
 vestres.

Habita en cerros áridos de Alemania, Francia y Oriente:
 en la Real Casa de Campo y bosques del Real Sitio
 del Pardo: en Aragon, Cataluña, Castilla la vieja y en
 otras muchas partes de España. *h*

Tiene todos los *flosculos* hermafroditos. Haller. R.

Igres-
cens.

12. GNAPHALIUM fru-
ticosum, foliis sublanceo-
latis tomentosis sessilibus,
corymbis alternis congloba-
tis, floribus globosis. Roy.
lugdb. 149.

Gnaphalio fruticoso, con
hojas casi lanceoladas, to-
mentosas y sin peciolo; co-
rimbos alternos, congloba-
dos; y flores globosas.

Elichrysum flore suave-
rubente. Boerh. lugdb. 1. p.
120.

Elichryso con la flor de
color roxo delicado.

Cast. Gnaphalio que se enciende.

Habita::: h

Den-
tatum.

13. GNAPHALIUM fru-
ticosum, foliis cuneiformi-
bus sessilibus dentatis, co-
rimbo simplici. Roy. lugdb.
151.

Gnaphalio fruticoso, con
hojas en forma de cuña, sin
peciolo, dentadas; y corim-
bo sencillo.

Coma-aurea incana, foliis
obtusis, tridentatis, capitu-
lis oblongis. Burm. af. 185.
t. 68. f. 3.

Penacho de oro blanque-
cino, de hojas obtusas, con
tres dientes; y cabezuelas
oblongas.

Cast. Gnaphalio dentado.

Habita en Etiopia. h

Serra-
tuu.

14. GNAPHALIUM fru-
ticosum, foliis amplexicau-
libus lanceolatis serratis,
supra nudis.

Gnaphalio fruticoso, con
hojas que abrazan el tallo,
lanceoladas, aserradas y por
encima desnudas.

Gnaphalium folio oblon-
go, acuto, molli, floribus
ferrugineis. Burm. afr. 214.
t. 76. f. 3. Breyn. prodr. 3.
t. 18. f. 2.

Gnaphalio con hoja oblon-
ga, aguda, blanda; y flores
de color amarillo ferrugi-
neo.

Cast. Gnaphalio aserrado.

Habita en Etiopia. h

Patu-
lum.

15. GNAPHALIUM fruticosum, foliis amplexicaulis spatulatis, corymbis aggregatis, ramis patentibus. Hort. cliff. 402. Berg. cap. 256. Gnaphalio fruticoso, con hojas amplexicaules, en forma de espátula; corimbos agregados; y ramas extendidas.

Elichrysum Africanum, folio oblongo, tomentoso, caulem amplexante, flore luteo. Boerh. lugdb. 1. p. 121. Elichryso Africano, con hoja oblonga, tomentosa, que abraza el tallo; y flor amarilla.

Cast. Gnaphalio extendido.

Habita en Etiopia. \mathcal{H}

Varia con el tallo herbáceo; con las flores blancas; y las escamas del caliz lanceoladas.

Petio-
latum.

16. GNAPHALIUM fruticosum, foliis ovatis integerrimis petiolatis, floribus confertis terminalibus. Hort. cliff. 402. Gnaphalio fruticoso, con hojas aovadas, enterisimas y pecioladas; flores amontonadas y terminales.

Gnaphalium tomentosum, foliis orbiculatis, subtus incanis. Burm. afr. 214. t. 76. f. 2. Gnaphalio tomentoso, con hojas redondas y por debajo blanquecinas.

Cast. Gnaphalio peciolado.

Habita en Etiopia. \mathcal{H}

Es muy parecido á la especie antecedente.

Cras-
sifolium.

17. GNAPHALIUM fruticosum, foliis lato-lanceolatis subpetiolatis coriaceis tomentosis, corymbo composto, caule prolifero. Gnaphalio fruticoso, de hojas entre anchas y lanceoladas, con el peciolo corto, correosas, tomentosas; corimbo compuesto; y tallo prolifero.

Cast. Gnaphalio de hoja crasa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \mathcal{H}

Produce el tallo del largo de un pie, prolifero, ramoso y perenne, á excepcion de la rama prolifera: las hojas con

300 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

con peciolo, lanceoladas, mas anchas por arriba, obtusas, con tomento muy denso, algo rígidas, y ácia las flores gradualmente mas angostas: las *flores* numerosas, y dispuestas en corimbo compuesto y terminal: los *cállices* de color amarillo palido: las *corolas* de color amarillo mas subido: y los *flosculos* que antes de abrirse aparecen blancos.

Mari-
timum

18. GNAPHALIUM *fruticosum ramosissimum, foliis lanceolatis acutiusculis sessilibus, calycinis squamis intimis aureis.* Gnaphalio fruticoso, y muy ramoso, con hojas lanceoladas, algo agudas, sin peciolo; y escamas intimas del caliz de color de oro.

Gnaphalium sericeum, foliis oblongis, acutis, floribus cymosis. Burm. afr. Gnaphalio con vello como seda; hojas oblongas, agudas; y flores cimosas.

216. t. 77. f. 2.

Cast. Gnaphalio maritimo.

Habita en las playas del mar del Cabo de Buena-esperanza. *℥*

Es *arbusto* de la altura de quatro pies, con muchas ramas vellosas. Tiene las *hojas* alternas, algo amontonadas, sin peciolo, lanceoladas, tomentosas, cenicientas y las mas tiernas mas blancas, sin que se angosten por su base como las de la antecedente: los *corimbos* terminales, densos, casi redondos y con pedunculo corto: el *caliz* apifinado, tosco, con vello blanquecino; y sus *escamas* algo agudas por su ápice, obscuras en su margen y el ultimo orden de ellas de color de oro, igualmente que los *flosculos*.

Re-
pens.

19. GNAPHALIUM *subfruticosum, foliis linearibus, caule repente recto, ramis erectis simplicissimis.* Gnaphalio sufruticoso, con hojas lineares; tallo rastrero, recto; ramas derechas y muy sencillas.

Cast. Gnaphalio rastrero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *℥*

Posee el *tallo* perenne, rastrero, que arroja raices, muy sencillo, filiforme, angulado y del largo de quatro pies: las

las ramas alternas, derechas, muy sencillas, del largo de dos pulgadas, foliosas y que llevan las flores: las hojas filiformes, laxas, desnudas, algo viscosas, alternas, extendidas y agudas: las cabezuelas de las flores terminales y conglobadas: los cálices obtusos, con pocos flosculos, de color amarillo-roxo y de la magnitud de la semilla del cañamo.

ESPECIES HERBACEAS CON LAS FLORES Ó PENACHO DE COLOR DE ORO.

- Cylindricum. 20. GNAPHALIUM herbaceum, foliis sessilibus oblongis tomentosis, corymbis inaequalibus, calycibus glabris cylindricis sessilibus. Amoen. acad. 6. afr. 58. Gnaphalio herbáceo, con hojas sentadas, oblongas, tomentosas; corimbos desiguales; cálices lampiños, cilíndricos, y sin pedunculo.
- Gnaphalium Æthiopicum, minus ramosum, capitulis coccineis. Pluk. phyt. t. 298. f. 4. Gnaphalio de Etiopia, menos ramoso, con cabezuelas de color coccineo.

Cast. Gnaphalio cilíndrico.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

- Oriental. 21. GNAPHALIUM subherbaceum, foliis linearilanceolatis sessilibus, corymbo composito, pedunculis elongatis. Mill. dict. n. 10. Gnaphalio casi herbáceo, con hojas entre lineares y lanceoladas, sin peciolo; corimbo compuesto; y pedunculos alargados.

Gnaphalium foliis confertis angustolanceolatis, caule fruticoso, corymbo composito. Hort. cliff. 402. Gnaphalio con hojas amontonadas, entre angostas y lanceoladas; tallo fruticoso; y corimbo compuesto.

Elichrysum Orientale.

Elichryso Oriental.

C. B. P. 264. Prodr. 123.

Tourn. p. 453.

Elichrysum Africanum, *frutescens*, *angustis & longioribus foliis incanis*. Com. hort. 2. p. 109. t. 55. Elichryso Africano, frutescente, con hojas angostas, mas largas, y blanquecinas.

Helichrysum frutescens, *latifolium*, *flore corymbifero toto aureo*. Moris. hist. 3. p. 86. sect. 7. t. 10. f. ultim. Helichryso frutescente, con hoja ancha; flor en corimbo y toda de color de oro.

Cast. Gnaphalio Oriental. *vulgo*: Perpetuas amarillas de jardineria.

Habita en Africa. 2 *fl*

Arenarium. 22. GNAPHALIUM *herbaceum*, *foliis lanceolatis*, *inferioribus obtusis*, *corymbo composito*, *caule simplicissimo*. Pall. it. 3. p. 537. Flor. dan. t. 641. Gnaphalio herbáceo, con hojas lanceoladas y las inferiores obtusas; corimbo compuesto; y tallo muy sencillo.

Elichrysum seu Stæchas citrina, *latifolia*. C. B. P. 264. Tourn. p. 453. Elichryso ó Estecade cetrina, de hoja ancha.

Stæchas citrina Germanica, *latiore folio*. Bauh. hist. 3. part. 1. pag. 153. Rai. hist. 281. Estecade cetrina, de Alemania, con hoja mas ancha.

Cast. Gnaphalio arenario.

Habita en campos areniscos de Europa: en Cataluña, Valencia y otras partes de España. ☉

Rutans. 23. GNAPHALIUM *herbaceum*, *foliis lanceolatis*, *corymbo decomposito*, *caule infernè ramoso*. Hort. cliff. 401. Mill. dict. n. 18. Gnaphalio herbáceo, con hojas lanceoladas; corimbo decompuesto; y tallo ramoso por debaxo.

Elichrysum Africanum, *folio oblongo*, *angusto*, *flore rubello*, *postea aureo*. Boerh. Dill. elth. 127. t. 107. f. 127. Elichryso Africano, con hoja oblonga y angosta; flor primeramente roxita y despues de color de oro.

Cast. Gnaphalio que brilla.

Ha-

Habita en Africa. 24

Imbri-
catum.

24. GNAPHALIUM her-
baceum , foliis lanceolatis
tomentosis , squamis calyci-
nis reflexis , caule ramoso.

Gnaphalium paniculatum.
Berg. cap. 256.

Gnaphalium incanum, an-
gustifolium , calycis squa-
mis ferrugineis reflexis .
Burm. afr. 226. t. 80. f. 2.

Gnaphalio herbáceo , con
hojas lanceoladas , tomento-
sas ; escamas del caliz redo-
bladas ; y tallo ramoso.

Gnaphalio en panoja.

Gnaphalio blanquecino ,
con hoja angosta ; escamas
del caliz de color amarillo
ferrugineo y redobladas.

Cast. Gnaphalio apifinado.

Habita en Etiopia.

Cymo-
sum.

25. GNAPHALIUM her-
baceum , foliis lanceolatis
trinerviis supra glabris ,
racemo terminali , caule in-
ferne ramoso. Hort. cliff. 401.

Berg. cap. 258.

Elichrysum Æthiopicum,
numerosis & angustis fo-
liis. Pluk. alm. 134. t. 279.
f. 1.

Gnaphalio herbáceo , de
hojas lanceoladas , con tres
nervios y por encima lam-
piñas ; racimo terminal ; y
tallo ramoso por debaxo.

Elichryso de Etiopia , con
hojas numerosas y angostas.

Elichrysum Africanum,
folio longo , subtus cano,
supra viridi , flore luteo .
Boerh. Diss. elth. 128. t. 107.
f. 128.

Elichryso Africano , con
hoja larga , cana por debaxo,
verde por encima ; y flor
amarilla.

Cast. Gnaphalio cimoso.

Habita en Africa. 24

Posee las flores enteramente de color de oro : los cálices li-
sos ; y sus escamas obtusas.

Nudi-
folium.

26. GNAPHALIUM her-
baceum , foliis sessilibus
lanceolatis trinerviis nudis
reticulato-venosis. Berg. cap.
247.

Gnaphalio herbáceo , de
hojas sin peciolo , lanceola-
das , con tres nervios , des-
nudas y con venas en rede-
cilia.

Eli-

Elichrysum quinquener-vii folio. Pet. gaz. t. 82. f. 1. Elichryso de hoja con cinco nervios.

Chrysocoma Æthiopica, Plantaginis folio. Breyn. cent. t. 71. Penacho de oro de Etiopia, con hoja como la del Llantén.

Elichrysum Africanum, Plantaginis folio. Tourn. p. 454. Elichryso de Africa, con hoja como la del Llantén.

Cast. Gnaphalio con hoja desnuda ó sin tomento.

Habita en Etiopia. 26

Echa las *hojas radicales* entre lanceoladas y aovadas, con tres nervios, sin tomento alguno, con venas en redécilla, y ásperas por su margen: el *tallo* sencillo, del largo de un pie, desnudo por arriba, con hojas por debajo, pequeñas y mas lanceoladas: las *flores* de color de oro y dispuestas en corimbo compuesto: y el *receptaculo* desnudo.

Lu- 27. GNAPHALIUM her- Gnaphalio herbáceo, con
teo-al- baceum, foliis semiample-
bum. xicaulibus ensiformibus re-
pandis obtusis utrinque pu-
bescentibus, floribus con-
glomeratis. Roy. lugdb. 149. hojas que abrazan la mitad
del tallo, en forma de espa-
da, ondeadas por su mar-
gen, obtusas, vellosas en am-
bas partes; y flores conglo-
badas.

*Filago foliis mollissimis, tomentosis, obtusis, umbel-
lis convexis, electrinis.* Hall. Filago con hojas muy
blandas, tomentosas, obtu-
sas; umbelas convexas y de
color de oro.

*Chrysocome citrina, su-
pina, latifolia, Italica.* Barr. Penacho de oro, cetri-
no, de Italia, echado y de
hoja ancha.

Chrysocome altera. Clus. Otro penacho de oro.

*Elichrysum sylvestre, la-
rifolium, capitulis conglo-
batis.* C. B. P. 264. Tourn. Elichryso silvestre, con
hoja ancha; y cabezuelas
conglobadas.
p. 462.

Gnaphalium majus, lato *Gnaphalio mayor*, con
oblongo folio. C. B. P. 263. hoja ancha y oblonga.

Pluk. alm. 171. t. 31. f. 16.

Moris. hist. 3. p. 88. sect. 7.

t. 11. f. 20.

Gnaphalium ad Stachadem cirrinam accedens. Bauh. *Gnaphalio que se asemeja*
hist. 3. part. 1. pag. 160. al Estecade cetino.

Cast. *Gnaphalio* amarillo-blanco.

Habita en la Francia Narbonense, en Suiza y Portugal;
en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña, Va-
lencia y en otras partes de España en terrenos áridos y
peñascosos. ☉

Es planta muy lanuda. Tiene los cálices de color entre
amarillo-roxo y blanquecino, blandos, con sus esca-
mas entre aovadas y lanceoladas: y muchos radios fe-
meninos.

Pe- 28. GNAPHALIUM her- *Gnaphalio herbáceo*, con
duncu- *baceum, foliis spathulatis* hojas en forma de espatula,
lare. *subamplexicaulibus subtus* que casi abrazan el tallo, to-
tomentosis, calycinis squa- mentosas por debaxo; y es-
mis acutiusculis. camas del caliz algo agudas.

Cast. *Gnaphalio* peduncular.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Arroja el tallo herbáceo, del largo de pie y medio, ramo-
so y difuso, con sus ramas alargadas: las hojas am-
plexicaules, en forma de espatula (las superiores lan-
ceoladas), alternas, verdes y algo desnudas por enci-
ma, pero tomentosas por debaxo: los pedunculos ter-
minales, larguissimos, tomentosos y blanquecinos, con
hojas muy claras y muy angostas; terminados en una
cima conglobada: y el caliz de color amarillo-roxo,
con las escamas agudas.

Odo- 29. GNAPHALIUM her- *Gnaphalio herbáceo*, con
ratissi- *baceum, foliis decurrentibus* hojas escurridas, obtusas,
mum. *obtusis mucronatis utrinque* terminadas en punta rígida,
tomentosis planis. tomentosas en ambas partes
y planas.

306 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Gnaphalium aureo-fulvum. Berg. cap. 257. Gnaphalio de color entre de oro y leonado.

Elichrysum foliis linearibus decurrentibus, subtus incanis, floribus corymbosis. Mill. dict. n. 21. ic. t. 131. f. 2. Elichryso con hojas lineares, escurridas, blanquecinas por debaxo; y flores corimbosas.

Elichrysum latifolium, villosum, alato caule, odoratissimum. Pluk. alm. 134. t. 173. f. 6. Elichryso muy oloroso, de hoja ancha, vellosa; y tallo alado.

Cast. Gnaphalio muy oloroso.

Habita:::

Tiene las hojas enteramente escurridas.

ESPECIES HERBACEAS CON LAS FLORES
DE COLOR DE PLATA.

San- 30. GNAPHALIUM her- Gnaphalio herbáceo, con
g u i- baceum, foliis decurrenti-
neum. bus lanceolatis tomentosis, hojas escurridas, lanceola-
planis, apiculo nudo termi- das, tomentosas, planas y
natis. Amoen. acad. 4. p. 78. terminadas en una puntita
Mill. dict. n. 19. desnuda.

Gnaphalium Ægyptiacum, latiore folio, ramosius, flore ex albicante purpureo. Pluk. mant. 91. Gron. orient. 262. Gnaphalio de Egipto, mas ramoso, con hoja mas ancha; y flor de color entre blanquecino y purpúreo.

Gnaphalium Syriacum. Barr. ic. 34. Gnaphalio de Siria.

Gnaphalio montano affinis Ægyptiaca. C. B. P. 264. Planta de Egipto, parecida al Gnaphalio montano.

Chrysocoma Syriaca, flore atro-rubente. Breyn. cent. 146. Penacho de oro de Siria, con la flor entre negra y ro-
xa.

Baccharis Dioscoridis. Rau. it. 285. t. 285. Baccara de Dioscorides.

Cast. Gnaphalio sanguineo.

Habita en Egipto y Palestina ; en los montes Líbano y Carmelo.

Fœtidum.

31. GNAPHALIUM herbaceum , foliis amplexicaulis integerrimis acutis, subtus tomentosis, caule ramoso. Hort. cliff. 402. Mill. dict. n. 13. Berg. cap. 246.

Gnaphalio herbáceo , con hojas amplexicaules , enterissimas, agudas , tomentosas por debaxo ; y tallo ramoso.

Gnaphalium Africanum, latifolium, fœtidum, capitulo argenteo. Com. hort. 2. p. 111. t. 56. Volkam. Noëmb. 194. t. 194.

Gnaphalio Africano , fétido , con hoja ancha ; y cabezuela de color de plata.

Conyza Africana , graveolens, capitulis argenteis. Pluk. alm. 117. t. 243. f. 1. Moris. hist. 3. p. 115. sect. 7. t. 20. f. 32.

Conyza Africana , de olor pesado, y con cabezuelas de color de plata.

Cast. Gnaphalio fétido.

Habita en Etiopia. ☉

Varia con los cálices de color de oro.

Undulatum.

32. GNAPHALIUM herbaceum , foliis decurrentibus lanceolatis acutis undulatis subtus tomentosis, caule ramoso. Hort. cliff. 402. Mill. dict. n. 15.

Gnaphalio herbáceo , con hojas escurridas , lanceoladas , agudas , ondeadas , por debaxo tomentosas ; y tallo ramoso.

Elichrysium graveolens, acutifolium , caule alato. Dill. elth. 130. t. 108. f. 130.

Elichryso de olor pesado, con hoja aguda ; y tallo alado.

Cast. Gnaphalio ondeado.

Habita en Africa. ☉

Tiene las hojas de mas arriba escurridas.

- Cris-
pum. 33. GNAPHALIUM her-
baceum, foliis amplexicau-
libus spathulatis tomento-
sis, calycibus obtusissimis
plicato-undulatis, basi to-
mentosus. Berg. cap. 253.
Gnaphalium. Pluk. alm.
171. phyt. 298. f. 3.

Gnaphalio herbáceo , con
hojas amplexicaules , en for-
ma de espatula y tomento-
sas ; cálices muy obtusos ,
entre ondeados y plegados ,
y por su base tomentosos.

Gnaphalio.

Cast. Gnaphalio erizado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Produce los tallos sencillos , algo duros , tomentosos , con
ramitas que salen de las axilas y muy blancos , como lo
es toda la planta : las hojas entre de figura de espatula
y lanceoladas , que abrazan la mitad del tallo , y tomen-
tosas en ambas partes : los corimbo sin hojuelas : los
cálices blancos , desnudos , y entre plegados y ondea-
dos.

- Helian-
them
folium 34. GNAPHALIUM her-
baceum, foliis subamplexi-
caulibus lanceolatis, corym-
bis compositis, calycum
squamis subplicatis.
Gnaphalium Africanum,
floribus minimis, albicanti-
bus. Volkam. Norib. 194.
t. 194.

Gnaphalio herbáceo , con
hojas que casi abrazan el ta-
llo , y lanceoladas ; corimbo
compuestos ; y escamas de
los cálices casi plegadas.

Gnaphalio de Africa , con
flores muy pequeñas y blan-
quecinas.

Cast. Gnaphalio con hoja de Helianthemo.

Habita en Etiopia. 24

Arroja los tallos en varitas , ramosos y con tomento : las
hojas sentadas , casi amplexicaules , aovadas , obtusas ,
tomentosas en ambas partes , blancas y mas tomentosas
por debaxo , algo ondeadas y redobladas : el corimbo
compuesto , terminal y sin pedunculo comun ; y las
escamas del caliz casi plegadas.

Squar-
rosum.

35. GNAPHALIUM her-
baceum , foliis sessilibus
lingulatis tomentosissimis,
calycum squamis interiori-
bus subulatis recurvatis.

Gnaphalio herbáceo , con
hojas sentadas , en forma de
lengueta y muy tomentosas;
escamas interiores de los cá-
lices alesnadas y encorvadas
ácia atrás.

Gnaphalium foliis oblon-
gis , tomentos sessilibus,
capitulis foliosis villosissi-
mis. Roy. lugdb. 150.

Gnaphalio con hojas oblon-
gas , tomentosas , sentadas;
cabezuelas foliosas y con
muchísimo vello.

Gnaphalium latiore folio,
Æthiopicum, flore roseo, ca-
lyculis spinosis. Pluk. alm.
171. t. 323. f. 1.

Gnaphalio de Etiopia, con
hoja mas ancha ; flor como
rosa ; y calicitos espinosos.

Cast. Gnaphalio desparramado.

Habita en Etiopia.

Echa los tallos ascendentes , sencillos , casi del largo de
un pie y muy tomentosos : las flores amontonadas y
terminales: los cálices con escamas alesnadas, desnudas,
purpúreas ó blancas , encorvadas ácia atrás y con pelo
áspero en su base.

Stella-
tum.

36. GNAPHALIUM her-
baceum , foliis sessilibus
lanceolatis villosis , calyci-
bus acutis extus incarnatis.
Amœn. acad. 6. afr. 55.

Gnaphalio herbáceo , con
hojas sin peciolo , lanceola-
das , vellosas ; cálices agu-
dos y por defuera encarna-
dos.

Gnaphalium tomentosum,
foliis undulatis , flore spe-
cioso. Burm. afr. 225. t. 80.
f. 1.

Gnaphalio tomentoso, con
hojas ondeadas ; y flor muy
hermosa.

Cast. Gnaphalio estrellado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Luego que los cálices pierden las flores quedan muy pla-
nos y extendidos , purpúreos por dentro , y con sus ápi-
ces de color de nieve ; por cuyos caractéres se distin-
gue tambien esta especie.

310 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Ob-
tusifo-
lium.

37. GNAPHALIUM her- Gnaphalio herbáceo , con
baceum , foliis lanceolatis ,
caule tomentoso paniculato ,
floribus terminalibus glome-
ratis conicis. Gron.virg. 121.
Mill. dict. n. 23.

Gnaphalium foliis lanceo- Gnaphalio con hojas lan-
latis , caule tomentoso , co-
rymbis supradecompositis ,
floribus sessilibus , confer-
tis. Gson. virg. 1. p. 95.

Elichrysum obtusifolium, Elichryso con hoja obtu-
capitulis argenteis , conglo-
batis. Dill. elth. 130. t. 108.
f. 131.

Helichrysum Chrysoco- Helichryso penacho de
ma , Gnaphaloides , Virgi-
niana, annua, foliis obtusio-
ribus , capitulis argenteis ,
conglobatis. Moris. hist. 3.
p. 88. sect. 7. t. 10. f. 19.

Cast. Gnaphalio de hoja obtusa.

Habita en la Virginia y Pensilvania. ☉

Posee el tallo con tomento , peloso , derecho y ramoso :
las hojas lanceoladas , algo desnudas y encorvadas ácia
atrás : las flores terminales , conglobadas , desiguales y
casi sin pedunculo : los cálices cónicos , blancos y agu-
dos ; con las corolas de color amarillo-roxo.

Mer-
curia-
leum.

38. GNAPHALIUM her- Gnaphalio herbáceo , con
baceum , foliis lineari-lan-
ceolatis acuminatis alternis ,
caule superne ramoso , co-
rymbis fastigiatis . Hort.
cliff. 401. Gmel. sib. 2. p. 107.

Filago foliis lanceolatis, Filago con hojas lanceo-
subtus tomentosis , floribus
umbellatis. Hall. helv. n. 146.

Gnaphalium latifolium, X Gnaphalio de America,
Americanum. C. B. P. 263. X con hoja ancha.

Gnaphalium Americanum. X Gnaphalio de America.
 Clus. hist. 1. p. 327. Bauh.
 hist. 3. p. 162.

Elichrysium Americanum, X Elichryso de America, con
latifolium. Tourn. p. 453. X hoja ancha.

Cast. Gnaphalio de flores como perlas.

Habita en la America septentrional y en Kamtschatca. 2

Plantagini- 39. GNAPHALIUM sar- X Gnaphalio con vástagos
 folium *mentis procumbentibus, cau-* X tendidos; tallo muy sencillio;
le simplicissimo, foliis ra- X hojas radicales aovadas y
dicalibus ovatis maximis. X muy grandes.
 Gron. virg. 121. Mill. dict.
 n. 22.

Gnaphalium stolonibus X Gnaphalio con vástagos
reptatricibus longissimis, X rastreros y larguissimos; ho-
foliis ovatis, caule capitato. X jas aovadas; y tallo con flo-
 Gron. virg. 1. p. 95. X res en cabezuela.

Gnaphalium Plantaginis X Gnaphalio de Virginia,
folio, Virginianum. Pluk. X con hoja como la del Llan-
 alm. 171. t. 348. f. 9. X tén.

Cast. Gnaphalio con hoja de Llantén.

Habita en la Virginia. 2

Su traza es del todo como la de la precedente; pero tie-
 ne las *hojas radicales* ovales y mas largas de una pul-
 gada. Linneo vió solamente la planta con las *flores fe-*
meninas; y sospechó que fuese variedad de la siguiente.

Dioi- 40. GNAPHALIUM sar- X Gnaphalio con vástagos
 cum. *mentis procumbentibus, cau-* X tendidos; tallo sencillisi-
le simplicissimo, corymbo X mo; corimbo sencillo, ter-
simplici terminali, floribus X minal; y flores dioicas.
dioicis. Hort. cliff. 400. Mat.
 med. 213.

Gnaphalium (mas) mon- X Gnaphalio (masculino)
zanum, folio rotundiore. C. X montano, con hoja mas re-
 B. P. 263. X donda.

- Cris- 33. GNAPHALIUM her- X Gnaphalio herbáceo , con
pium. *baceum , foliis amplexicau-* X hojas amplexicaules , en for-
libus spathulatis tomento X ma de espatula y tomento-
sis , calycibus obtusissimis X sas ; cálices muy obtusos ,
plicato-undulatis , basi to- X entre ondeados y plegados ,
mentosus. Berg. cap. 253. X y por su base tomentosos.
Gnaphalium. Pluk. alm. X Gnaphalio.
171. phyt. 298. f. 3. X

Cast. Gnaphalio erizado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Produce los tallos sencillos , algo duros , tomentosos , con ramitas que salen de las axilas y muy blancos , como lo es toda la planta : las *hojas* entre de figura de espatula y lanceoladas , que abrazan la mitad del tallo , y tomentosas en ambas partes : los *corimbo*s sin hojuelas : los *cálices* blancos , desnudos , y entre plegados y ondeados.

- Helian- 34. GNAPHALIUM her- X Gnaphalio herbáceo , con
them- *baceum , foliis subamplexi-* X hojas que casi abrazan el ta-
folium *caulibus lanceolatis , corym-* X llo , y lanceoladas ; corimbos
bis compositis , calycum X compuestos ; y escamas de
squamis subplicatis. X los cálices casi plegadas.
Gnaphalium Africanum, X Gnaphalio de Africa , con
floribus minimis , albicanti- X flores muy pequeñas y blan-
bus. Volkam. Norib. 194. X quecinas.
t. 194. X

Cast. Gnaphalio con hoja de Helianthemo.

Habita en Etiopia. 24

Arroja los tallos en varitas , ramosos y con tomento : las *hojas* sentadas , casi amplexicaules , aovadas , obtusas , tomentosas en ambas partes , blancas y mas tomentosas por debaxo , algo ondeadas y redobladas : el *corimbo* compuesto , terminal y sin pedunculo comun : y las *escamas del caliz* casi plegadas.

Squar-
tosum. 35. GNAPHALIUM her-
baceum , foliis sessilibus
lingulatis tomentosissimis,
calycum squamis interiori-
bus subulatis recurvatis. Gnaphalio herbáceo , con
hojas sentadas , en forma de
lengueta y muy tomentosas;
escamas interiores de los cá-
lices alesnadas y encorvadas
ácia atrás.

Gnaphalium foliis oblon-
gis , tomentosis sessilibus,
capitulis foliosis villosissi-
mis. Roy. lugdb. 150. Gnaphalio con hojas oblon-
gas , tomentosas , sentadas;
cabezuelas foliosas y con
muchísimo vello.

Gnaphalium latiore folio,
Æthiopicum, flore roseo, ca-
lyculis spinosis. Pluk. alm.
171. t. 323. f. 1. Gnaphalio de Etiopia, con
hoja mas ancha ; flor como
rosa ; y calicitos espinosos.

Cast. Gnaphalio desparramado.

Habita en Etiopia.

Echa los tallos ascendentes , sencillos , casi del largo de
un pie y muy tomentosos : las flores amontonadas y
terminales: los cálices con escamas alesnadas, desnudas,
purpúreas ó blancas , encorvadas ácia atrás y con pelo
áspero en su base.

Stella-
tum. 36. GNAPHALIUM her-
baceum , foliis sessilibus
lanceolatis villosis , calyci-
bus acutis extus incarnatis. Gnaphalio herbáceo , con
hojas sin peciolo , lanceola-
das , vellosas ; cálices agu-
dos y por defuera encarna-
dos.

Amoen. acad. 6. afr. 55.
Gnaphalium tomentosum,
foliis undulatis , flore spe-
cioso. Burm. afr. 225. t. 80.
f. 1. Gnaphalio tomentoso, con
hojas ondeadas ; y flor muy
hermosa.

Cast. Gnaphalio estrellado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Luego que los cálices pierden las flores quedan muy pla-
nos y extendidos , purpúreos por dentro , y con sus ápi-
ces de color de nieve ; por cuyos caractéres se distin-
gue tambien esta especie.

Ob-
tusifo-
lium.

37. GNAPHALIUM her- Gnaphalio herbáceo , con
baceum , foliis lanceolatis ,
caule tomentoso paniculato ,
floribus terminalibus glome-
ratis conicis. Gron.virg. 121.

Mill. dict. n. 23.

Gnaphalium foliis lanceo- Gnaphalio con hojas lan-
latis , caule tomentoso , co-
rymbis supradecompositis ,
floribus sessilibus , confer-
tis. Gson. virg. 1. p. 95.

Elichrysum obtusifolium, Elichryso con hoja obtu-
capitulis argenteis , conglo-
batis. Dill. elth. 130. t. 108.

f. 131.

Helichrysum Chrysoco- Helichryso penacho de
ma , Gnaphaloides , Virgi-
niana, annua, foliis obtusio-
ribus , capitulis argenteis ,
conglobatis. Moris. hist. 3.
p. 88. sect. 7. t. 10. f. 19.

Cast. Gnaphalio de hoja obtusa.

Habita en la Virginia y Pensilvania. ☉

Posee el tallo con tomento , peloso , derecho y ramoso :
las hojas lanceoladas , algo desnudas y encorvadas ácia
atrás : las flores terminales , conglobadas , desiguales y
casi sin pedunculo : los cálices cónicos , blancos y agu-
dos ; con las corolas de color amarillo-roxo.

Myr-
torica-
teum.

38. GNAPHALIUM her- Gnaphalio herbáceo , con
baceum , foliis lineari-lan-
ceolatis acuminatis alternis ,
caule superne ramoso , co-
rymbis fastigiatis . Hort.
cliff. 401. Gmel. sib. 2. p. 107.

Filago foliis lanceolatis, Filago con hojas lanceo-
subtus tomentosis , floribus
umbellatis. Hall. helv. n. 146.

Gnaphalium latifolium, X Gnaphalio de America,
Americanum. C. B. P. 263. X con hoja ancha.

Gnaphalium Americanum. X Gnaphalio de America.

Clus. hist. 1. p. 327. Bauh.

hist. 3. p. 162.

Elichrysum Americanum, X Elichryso de America, con
latifolium. Tourn. p. 453. X hoja ancha.

Cast. Gnaphalio de flores como perlas.

Habita en la America septentrional y en Kamtschatca. 24

Plan-
tagini-
folium

39. GNAPHALIUM sar- X Gnaphalio con vástagos
mentis procumbentibus, cau- tendidos; tallo muy sencillio;
le simplicissimo, foliis ra- hojas radicales aovadas y
dicalibus ovatis maximis. muy grandes.

Gron. virg. 121. Mill. dict.
 n. 22.

Gnaphalium stolonibus X Gnaphalio con vástagos
reptatricibus longissimis, rastreros y larguissimos; ho-
foliis ovatis, caule capitato. jas aovadas; y tallo con flo-
 res en cabezuela.

Gnaphalium Plantaginis X Gnaphalio de Virginia,
folio, Virginianum. Pluk. con hoja como la del Llan-
 alm. 171. t. 348. f. 9. X tén.

Cast. Gnaphalio con hoja de Llantén.

Habita en la Virginia. 24

Su traza es del todo como la de la precedente; pero tie-
 ne las *hojas radicales* ovales y mas largas de una pul-
 gada. Linneo vió solamente la planta con las *flores* fe-
 meninas; y sospechó que fuese variedad de la siguiente.

Dioi-
cum.

40. GNAPHALIUM sar- X Gnaphalio con vástagos
mentis procumbentibus, cau- tendidos; tallo sencillisi-
le simplicissimo, corymbo mo; corimbo sencillo, ter-
simplici terminali, floribus minal; y flores dioicas.
dioicis. Hort. cliff. 400. Mat.

med. 213.

Gnaphalium (mas) mon- Gnaphalio (masculino)
tanum, folio rotundiore. C. montano, con hoja mas re-
 B. P. 263. X donda.

312 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Gnaphalium (femina) *Gnaphalio* (fementno)
montanum, *longiore folio* & montano, con hoja mas lar-
flore albo. C. B. P. 263. ga y flor blanca.

Pilosella minor. Dod. Pelosilla menor.
 pempt. 68.

Elichrysium montanum, *Elichryso* montano, con
longiore folio, *flore albo.* hoja mas larga; y flor blan-
 Tourn. p. 453. ca.

Cast. *Gnaphalio dioico.*

Habita en lugares abrigados y áridos de Europa: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña y otras partes de España. ¶

El vilano apenas es plumoso. *Leers.*

PROPIED. Las flores son desecantes, astringentes y corroborantes: y se usan en la diarrea.

Alpi-
 num.

41. *GNAPHALIUM sar-* *Gnaphalio* con vástagos
mentis procumbentibus, cau- tendidos; tallo muy sencil-
le simplicissimo, capitulo llo; cabezuela terminal, sin
terminali aphylo, floribus hojuelas; y flores oblongas.
oblongis. Flor. lap. p. 301.
 Pall. it. 2. p. 569. Flor. dan.
 t. 332.

Filago caule simplici, *Filago* con el tallo sencil-
umbella pauciflora, calycis llo; umbela de pocas flores;
basi tomentosa. Hall. helv. y la base del caliz tomento-
 n. 150. sa.

Gnaphalium alpinum, mi- *Gnaphalio* alpino, menor.
nus. C. B. P. 264.

Filago alpina, minor, *Filago* alpino, menor y
erecta. Scheuch. alp. 133. levantado.

Cast. *Gnaphalio alpino.*

Habita en los alpes de Lapponia y Suiza. ¶

Echa el tallo muy sencillo, mas corto de un dedo, con tres ó quatro hojas lanceoladas: las *hojas radicales* entre lanceoladas y en forma de cufiá, verdes y lisas por encima, blanquecinas por debaxo, con tomento estriado: pocas flores terminales, amontonadas, y sin hojas: el caliz cilindrico, ventricoso por su base, con escamas membranosas en el remate, lanceoladas, agudas y de-
 re-

rechas. Observó *Linneo* en esta planta, los *flosculos* femeninos ó sin estambres; por cuyo motivo y por tener vástagos, como tambien el tallo desnudo, sospechó si seria una variedad del *Gnaphalio dioico*; aunque no habia visto todavia la planta masculina.

Haller y *Scopoli* suponen que esta especie tiene las flores hermafroditas y que carece de vástagos.

Indicum.

42. GNAPHALIUM herbaceum, foliis lanceolatis, caule ramosissimo diffuso, corymbis inæqualibus, calycibus intus coloratis. Fl. zeyl. 307. *Gnaphalio* herbáceo, con hojas lanceoladas; tallo muy ramoso y difuso; corimbos desiguales; y cálices de color por dentro.

Gnaphalium latiore folio, minus, ramosum, capitulis pallescentibus. Pluk. alm. 162. t. 187. f. 5. *Gnaphalio* menor, ramoso, con hoja ancha; y cabezuelas de color que tira á palido.

Cast. *Gnaphalio* de Indias.

Habita en la India y en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Purpureum.

43. GNAPHALIUM herbaceum, foliis lanceolatis nudis, caule erecto simplicissimo, floribus spicatis lateralibus sessilibus. Roy. lugdb. 148. Gron. virg. 121. *Gnaphalio* herbáceo, con hojas lanceoladas, desnudas; tallo derecho, y muy sencillito; flores espigadas, laterales y sin pedunculo.

Elichrysum spicatum, obtusifolium, basi angustiore. Dill. elth. 131. t. 109. f. 132. *Elichryso* espigado, de hoja obtusa, con su base mas angosta.

Gnaphalium spicatum, majus, non ramosum, erectum, Virginianum, foliis obtusioribus. Moris. hist. 3. p. 92. *Gnaphalio* mayor, de Virginia, espigado, derecho, que no es ramoso, y con hojas mas obtusas.

Cast. *Gnaphalio* purpúreo.

Habita en la America septentrional.

314 FLOR. HÈRM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Sylva-
ticum. 44. GNAPHALIUM *caule herbaceo simplicissimo, floribus sparsis.* Hort. cliff. 402. Gmel. sib. 2. p. 106. Flor. dan. 254. Gnaphalio con el tallo herbáceo, muy sencillo; y flores esparcidas.
- Filago foliis linearibus, alis spiciferis.* Hall. helv. n. 148. Filago con hojas lineáres, y axilas que llevan las espigas.
- Gnaphalium Anglicum, vel Belgicum.* Lob. ic. 482. Hall. 6 de Flandes. Gnaphalio de Inglaterra,
- Gnaphalium majus, angusto oblongo folio, alterum.* C. B. P. 263. Otro Gnaphalio mayor, con hoja angosta y oblonga.
- Filago altera.* Dod. pempt. 67. Tourn. p. 464. Otro Filago.
- Gnaphalium rectum.* Bauh. hist. 3. p. 160. Gnaphalio recto.

Cast. Gnaphalio silvático.

Habita en las selvas arenosas de Europa. ♂

Tiene los *flosculos* femeninos en el ámbito y hermafroditos en el centro. Hall. R.

- Supi-
num. 45. GNAPHALIUM *caule herbaceo simplici procumbente, floribus sparsis.* Filago con el tallo herbáceo, sencillo, tendido; y flores esparcidas.
- Filago caule simplicissimo, spica pauciflora.* Hall. helv. n. 149. Filago con el tallo muy sencillo; y espiga de pocas flores.
- Gnaphalium supinum, Lavandulæ folio.* Bocc. mus. 107. t. 85. Gnaphalio echado, con hoja como la del Espliego.
- Gnaphalium oblongo folio.* Scheuchz. alp. 2. p. 134. Gnaphalio con hoja oblonga.

Cast. Gnaphalio echado.

Habita en los alpes de Suiza é Italia.

Es muy semejante al *Gnaphalio silvático*; pero baxo, y con el tallo tendido mientras florece.

Uligi-
nosum

46. GNAPHALIUM cau-
le herbaceo ramoso diffuso,
floribus confertis terminali-
bus. Hort. cliff. 402. Gmel.
sib. 2. p. 105.

Gnaphalio con el tallo
herbáceo, ramoso, difuso;
flores amontonadas y termi-
nales.

Filago caule ramosissi-
mo, diffuso, umbella sessi-
li terminato. Hall. helv. n.
151.

Filago con el tallo muy
ramoso, difuso y terminado
en umbela sentada.

Gnaphalium longifolium,
humile, ramosum, capitu-
lis nigris. Rai. hist. 295.
angl. 3. p. 18.

Gnaphalio baxo, ramoso,
con hoja larga; y cabezuelas
negras.

Elichrysum aquaticum,
ramosum, minus, capitulis
foliatis. Tourn. p. 452.

Elichryso aquatico, me-
nor, y ramoso, con cabe-
zuelas foliosas.

Gnaphalio vulgari simi-
lis. Bauh. hist. 3. p. 159.

Planta semejante al Gna-
phalio vulgar.

Cast. Gnaphalio de sumideros.

Habita en las balsas de Europa, y donde se encharca el
agua.

Glo-
me ra-
tum.

47. GNAPHALIUM cau-
le herbaceo diffuso, calyci-
nis squamis interioribus su-
bulatis nudis, foliis sub-
amplexicaulibus. Berg. cap.
251.

Gnaphalio con el tallo
herbáceo y difuso; escamas
interiores del caliz alesna-
das, desnudas; y hojas am-
plexicaules.

Cast. Gnaphalio conglobado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Posee las *hojas* en forma de espátula y con mucho pelo
áspero: las *cabezuelas* foliosas; y las *ramas* mas altas
que el tallo.

ESPECIES DEL SUPLEMENTO.

- Mille-
florum 48. GNAPHALIUM *flo-* Gnaphalio con flores co-
ribus corymbosis fastigiatis rimbosas, elevadas en rami-
ruferescenti-albidis, *calyci-* llete horizontal, de color
bus subcylindricis. Suppl. entre rubio y blanquecino;
p. 362. y cálices casi cilíndricos.

Cast. Gnaphalio de mil flores.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Arroja el tallo del largo de un pie y tomentoso: las *hojas* lanceoladas y con pelo áspero en ambas partes: el *corrimbo* terminal y elevado en ramillete horizontal, con mas de cinquenta flores: los *pedunculos* casi ahorquillados y alargados: las *brácteas* escariosas ó membranosas, aovadas y pálidas: los *cálices* cilíndricos, lisos y pálidos; con las *escamas inferiores* de color que tira á purpúreo: y las *corolas* de color amarillo-roxo.

- Cris-
pum. 49. GNAPHALIUM *fru-* Gnaphalio fruticoso, con
ticosum, *foliis subtus to-* hojas tomentosas por debaxo
mentosus supra scabris, *ra-* y ásperas por encima, las
dicalibus petiolatis oblon- radicales con peciolo y oblon-
gis, *caulinis amplexicauli-* gas, las del tallo amplexi-
bus undulatis. Suppl. p. 363. caules y ondeadas.

Cast. Gnaphalio rizado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.* *h*

Es *planta* con el penacho grande. Produce muchas *hojas* radicales, con peciolo, oblongas, enterisimas, por debaxo tomentosas y canas, y por encima ásperas; las del tallo amplexicaules, adelgazadas y ondeadas: el *pedunculo* alargado, tomentoso, terminado en una cima compuesta y de muchas flores pequeñas: los *cálices* exteriores rubicundos; y los *interiores* de color amarillo-roxo.

Ap- 50. GNAPHALIUM fru X Gnaphalio frutescente, con
pendi- tescens, foliis sessilibus X hojas sin peciolo, apinadas,
cula- imbricatis lanceolatis lana X lanceoladas, lanudas y con
tum. tis apice membrana scario- X una membrana escariosa pe-
sa appendiculatis. Suppl. X gada en su ápice.
p. 363. X

Cast. Gnaphalio con apendice.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. \bar{h}

Tiene el *penacho* de color de plata y grande. Es distin-
guida esta especie por la membranita lanceolada, pe-
queña y escariosa que termina la hoja. Echa las *hojas*
lanceoladas y lanudas; y el *tallo* vestido con ellas hasta
la cima.

Um- 51. GNAPHALIUM fru X Gnaphalio fruticoso, con
bella- ticosum, foliis fasciculatis X hojas en hacecillo, alesna-
tum. subulatis tortis, umbellis X das y torcidas; umbelas sen-
simplicibus terminalibus X cillas, terminales y sentadas.
sessilibus. Suppl. p. 363. X

Cast. Gnaphalio umbelado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. \bar{h}

Posee el *penacho* de color de oro. Es muy semejante, en
quanto á la yerba, al *Gnaphalio de puntitas*; pero se
diferencia por la *umbela* regular; por las *flores* mas
grandes; y por los *cálices* de color roxo hermoso. Se
parece tambien al *Xeranthemo* con las *escamas del ca-*
liz de color.

Hispi- 52. GNAPHALIUM fru X Gnaphalio fruticoso, con
dum. ticosum, foliis linearibus X hojas lineares, medio rolli-
semiteretibus sulcis exâra- X zas, asurcadas, erizadas y
tis hispidis patulis, capi- X extendidas; cabezuelas ter-
tulis terminalibus simplici- X minales y sencillas.
bus. Suppl. p. 263. X

Cast. Gnaphalio erizado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. \bar{h}

Se distingue fácilmente por las *flores* agregadas y por las
cerdas rígidas que tiene en las hojas.

318 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Ver-
ticilla-
tum.

53. GNAPHALIUM *caule simplicissimo, floribus verticillatis, foliis linearibus.* Suppl. p. 364. Gnaphalio con el tallo muy sencillo; flores en verticilo; y hojas lineares.

Cast. Gnaphalio verticilado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back. ☉

Arroja la raíz fibrosa: el tallo del largo de un xeme, derecho, muy sencillo y sin ramos: las hojas lineares, muy angostas y del largo de una pulgada: las flores verticiladas por todo el tallo y sin pedunculo. Es planta toda cenicienta, igualmente que las flores; y se asemeja al *Gnaphalio silvático*.

Ocu-
lus ca-
ti.

54. GNAPHALIUM *herbaceum, prostratum, foliis ovatis glomeratis terminalibus villosissimis.* Suppl. p. 364. Gnaphalio herbáceo, prostrado, con hojas aovadas, conglobadas, terminales y muy vellosas.

Cast. Gnaphalio de ojo de gato.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrman.

Produce la raíz fibrosa: muchos tallos filiformes, difusos por todas partes, algo ramosos y tendidos: las hojas aovadas, casi desnudas y sin peciolo: las flores en globulillos terminales, algo planas, muy vellosas y arriamadas entre sí formando cercos: el caliz que no se manifiesta por estar cubierto de tomento blanco muy espeso: y las corolas pequeñas.

Pilo-
sellum

55. GNAPHALIUM *herbaceum, foliis lanceolatis quinquenerviis subtus tomentosis, caule nudo, floribus capitatis.* Suppl. p. 364. Gnaphalio herbáceo, de hojas lanceoladas, con cinco nervios y por debaxo tomentosas; tallo desnudo; y flores en cabezuela.

Cast. Gnaphalio pelosillo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back. ♀

Tiene la raíz perenne: tres ó quatro hojas radicales, con cinco nervios, elípticas, algo obtusas, y con tomento blanco por debaxo: el escapo al doble mas largo que las hojas y peloso: las flores terminales y conglobadas en

ca-

cabezuela : los *cálices* casi redondos , vellosos y blanquecinos por su margen.

Denu-
datum.

56. GNAPHALIUM *ar-gyrocomum, foliis spathulatis subtus niveis tomentosis supra lævibus.* Suppl. p. 364. Gnaphalio con penacho de color de plata ; hojas en forma de espátula , con tomento por debaxo de color de nieve y lisas por encima.

Cast. Gnaphalio desnudo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. D. Montin.

Produce los tallos postrados , filiformes , algo duros ; con ramas alternas y derechas : las *hojas* alternas , sentadas , casi en forma de espátula , terminadas en punta rígida , desnudas , ó lisas por encima , tomentosas y blancas por debaxo : el *corimbo* ó *umbela* terminal y cortísima : las *flores* pedunculadas : el *caliz* verdoso , con su radio corto y blanco.

Decli-
natum

57. GNAPHALIUM *herbaceum, foliis lineari-lanceolatis, calycibus radio albo lanceolato.* Suppl. p. 365. Gnaphalio herbáceo , de hojas entre lineares y lanceoladas ; cálices con el radio blanco y lanceolado.

Cast. Gnaphalio declinado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Echa los tallos postrados , herbáceos y filiformes : las *hojas* entre lanceoladas y lineares , amontonadas , con tomento delgado , blanco y lustroso : las *flores* en corimbo terminal , ó elevadas en ramillete horizontal y sin hojuelas : el *caliz* aovado , liso , y escarioso , con el radio blanco y lanceolado : y muchos *flosculos* en el caliz pequeño.

Coro-
natum.

58. GNAPHALIUM *herbaceum, foliis lanceolatis, calycibus radio multiplici subrotundo.* Suppl. p. 365. Gnaphalio herbáceo , de hojas lanceoladas ; y cálices con el radio multiplicado y casi redondo.

Cast. Gnaphalio coronado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 26

Tiene los tallos del largo de un xeme , derechos , y vellosos ;

320 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

sos ; ramosos y pelosos en su remate donde llevan las flores : las *hojas* alternas , angostas , lanceoladas y con tomento muy espeso : las *flores* corimbosas y amontonadas : los *pedunculos* foliosos : y los *cálices* con una corona blanca , multiplicada y algo redondos en su borde. Las *flores* son casi llenas por el radio del caliz.

1131. Género XERANTHEMUM. * *Tourn. t.* 284.

Dill. gen. 8. *Vaill. A. G.* 1718. Xeranthemoides.

Dill. elth. 322.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun apinado ; con *escamas* lanceoladas , de las quales las de mas adentro son mas largas que el disco , membranosas , relucientes , de color , que constituyen el radio ó cerco , y coronan á la flor compuesta.

COR. compuesta desigual ; con muchas *corolillas* hermafroditas , tubulosas , en el disco ; y pocas femeninas tubulosas , en el ámbito.

Propia de los flosculos hermafroditos : en forma de embudo , mucho mas corta que el caliz ; con el *borde* hendido en cinco partes y extendido.

En las femeninas : tubulosa , del largo del flosculo hermafrodito , hendida en cinco partes y menos igual.

ESTAMB. en los flosculos hermafroditos : *filamentos* cinco y cortísimos : con la *antera* cilindrica , tubulosa y casi del largo de la corola.

PIST. en los hermafroditos : *germen* corto : *estilo* filiforme , mas largo que los estambres : con el *estigma* hendido en dos partes.

En los femeninos : *germen* como en los hermafroditos : *estilo* filiforme , del largo del de los hermafroditos : con dos *estigmas* oblongos y redoblados.

PERIC. ninguno : el *caliz* apenas mudado hace sus veces.

SEM. en los hermafroditos : oblongas y coronadas.

En los femeninos : semejantes á las de los hermafroditos.

RECEPT. desnudo , algo plano y punteado.

OBS.

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 321

Obs. El Xeranthemo de Tourn. tiene la corona de la semilla sencilla y de cinco cerdas : y el receptaculo pajoso.

El Xeranthemoide de Dill. posee la corona de la semilla con el vilano plumoso, ó peloso: y el receptaculo desnudo.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 499.

La flor es radiada, y su disco compuesto de muchos flosculos sentados en el embrión; pero la corona consta de petalos planos, que no están fixados á embrión alguno, sino comprendidos en un mismo caliz con los flosculos: y el embrión pasa á semilla adornada de una cabezuela foliosa.

ESPECIE CON EL RECEPTACULO PAJOSO, Y EL VILANO DE CINCO CERDAS.

- An-
num. 1. XERANTHEMUM X Xeranthemo herbáceo, con
herbaceum, foliis lanceola- X hojas lanceoladas y extendi-
tis patentibus. Jacq. vind. X das.
150. Austr. t. 388. Mill. X
dict. n. 1. Ic. t. 297. Pall. it. X
3. p. 590. Hall. helv. 122. X
Xeranthemum Oleæ folio, X Xeranthemo que no huele
capitulis simplicibus, inca- X mal, con hoja como la del
nis, non foetens, flore ma- X Olivo; cabezuelas sencillas
jore, violaceo. Moris. hist. 3. X y blanquecinas; flor mas
P. 43. sect. 6. t. 21. f. 2. X grande y de color de violeta.
Facea Oleæ folio, capitu- X Yacea con hoja como la
lis simplicibus. C. B. P. X del Olivo; y cabezuelas sen-
272. X cillas.
Xeranthemum flore sim- X Xeranthemo con la flor
plici, purpureo, majore. X sencilla, purpúrea y mas
Tourn. p. 499. X grande.
Ptarmica Austriaca. Dod. X Ptarmica de Austria.
pempt. 710. Clus. hist. 2. X
p. 11. X

- ^α *Xeranthemum* (inapertum) *Oleæ folio, capitulis simplicibus, incanum, fœtens, flore purpurascens, minore.* Moris. hist. 3. p. 43. sect. 6. t. 12. f. 1. *Xeranthemo* (cerrado) blanquecino, fetido, con hoja como la del Olivo; cabezuelas sencillas; flor de color que tira á purpúreo y mas pequeña. α
- Xeranthemum capitulis inapertis.* Hall. helv. ed. 1. p. 709. t. 23. *Xeranthemo* con cabezuelas cerradas.
- Facea Oleæ folio, minore flore.* C. B. P. 262. *Yacea* con hoja como la del Olivo; y flor mas pequeña.
- Xeranthemum flore simplici, purpureo, minore.* Tourn. p. 499. *Xeranthemo* con la flor sencilla, de color purpúreo y mas pequeña.
- ^β *Xeranthemum Orientale, fructu maximo.* Tourn. cor. 38. *Xeranthemo* Oriental, con el fruto muy grande. β
- Xeranthemum foliis lineari-lanceolatis, capitulis cylindraceis, semine maximo.* Mill. dict. n. 3. *Xeranthemo* con hojas entre lineares y lanceoladas; cabezuelas cilindricas; y semilla muy grande.
- Facea Oleæ folio, capitulis compactis.* C. B. P. 272. *Yacea* con hoja como la del Olivo; y cabezuelas compactas.
- ^χ *Facea incana, Cyani capitulis.* C. B. P. 272. *Yacea* blanquecina, con cabezuelas como las del Aciano. χ
- Xeranthemum incanum, flore albo.* Tourn. p. 499. *Xeranthemo* blanquecino, con la flor blanca.
- Xeranthemum.* Bauh. hist. 3. P. 25. *Xeranthemo.*

Cast. *Xeranthemo annuo.*

Habita en la Francia Narbonense y en la Suiza: en los circuitos de Madrid; en Aragon, Catalufia, Castilla la vieja, en la Mancha y otras muchas partes de España. ☉

Tiene el *estigma* de los flosculos del radio, sencillo: y la *semilla* desnuda: el *estigma* de los flosculos del disco, casi hendido en dos partes; y la *semilla* con cinco aristas. La

La planta de la variedad α , es robusta y derecha: posee muchas semillas, mas pequeñas: el caliz escarioso: las pajas enteras: y el radio con muchos petalos.

La planta de la variedad β , es mas angosta y debil: echa seis ó siete semillas mayores: las escamas del caliz membranosas solamente por su margen: las pajas laceradas: y el radio casi con seis petalos.

ESPECIES CON EL RECEPTACULO DESNUDO,
Y EL VILANO PELOSO.

Vestitum.

2. XERANTHEMUM

fruticosum erectum, foliis adnatis lanceolato-lineari-bus apice calloso-mucronatis, ramis unifloris foliosis.

Xeranthemum frutescens, lanuginosum, foliis longis, mollibus, flore argenteo, amplissimo. Burm. afr. 177. t. 66. f. 1.

Xeranthemum Africanum, ramosum, Gnaphalii foliis angustioribus, tomentosis, oblongis, floribus albis, magnis, apicibus nigris. Rai. Suppl. p. 182.

Xeranthemum speciosum, Capense, flore albo, maximo. Pet. gaz. 1. t. 1. f. 9.

Chrysocome seu argyrocome Africana, Ericoides, flore albo. Seb. thes. 2. p. 45. t. 43. f. 5.

Xeranthemo fruticoso, derecho, de hojas pegadas, entre lanceoladas y lineares, con su ápice calloso y terminado en punta rígida; ramas de una flor y foliosas.

Xeranthemo frutescente, lanuginoso, con hojas largas, blandas; flor muy ancha y de color de plata.

Xeranthemo de Africa, ramoso, con hojas como las del Gnaphalio, mas angostas, tomentosas y oblongas; flores blancas, grandes y negras por sus ápices.

Xeranthemo hermoso, del Cabo de Buena-esperanza, con la flor blanca y muy grande.

Penacho de color de oro ó de plata de Africa, parecido al Brezo, y con la flor blanca.

Cast. Xeranthemo vestido.

Habita en Etiopia. $\frac{1}{2}$

Es planta toda vestida de tomento denso.

324 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Proli-ferum. 3. XERANTHEMUM Xeranthemo con el tallo *caule fruticoso prolifero*, fruticoso y prolifero; flores *floribus sessilibus*, foliis sentadas; hojas como grani- *granulato-subrotundis im-* tos casi redondos, apiñadas *bricatis obsoletis*, Berg. cap. y poco manifestas.

272.

Elichrysum Abrotanifemine foliis. Seb. mus. 2. t. las del Abrotano femenino. 89. f. 8. Breyn. ic. 28. t. 17. f. 1.

Carduus Xeranthemoides. Cardo como Xeranthemo. Rai. Suppl. p. 199.

Cast. Xeranthemo prolifero.

Habita en Etiopia. \hbar

La planta que se cria en los montes mas altos, echa las ramas extendidas y rígidas: las hojas rollizas (muy extrañas), apiñadas por todas partes, con hojuelas que dudó Linneo si eran hojas ó ramitas: las flores con el radio sanguineo, muy lustroso y hermosísimo.

Imbri-catum. 4. XERANTHEMUM Xeranthemo con los tallos *caulibus fruticosis*, foliis fruticosos; hojas aovadas, *ovatis subtomentosis*, pe- algo tomentosas; y pedun- *dunculis squamosis*. Amoen. culos escamosos. acad. 6. afr. 60.

Xeranthemum variegatum. Berg. cap. 271. Xeranthemo de varios colores.

Xeranthemum Capense, Xeranthemo del Cabo de *Tarton-raire foliis*. Pet. gaz. Buena-esperanza, con hojas como las de la Timelea, llamada en Francés Tarton-raire.

Elichrysum foliis Thymi, incanis, dense stipatis. las del Tomillo, blanquecinas, y tupidas ó apretadas densamente. Breyn. ic. t. 18. f. 1.

Cast. Xeranthemo apiñado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Tiene los cálices lustrosos, y blancos; pero por defuera en el medio rubios: y el vilano rubicundo.

Canes.
cens.

5. XERANTHEMUM X Xeranthemo fruticoso, con
fruticosum, foliis imbrica- X hojas apinadas, entre aova-
tis ovato-subulatis glabris. X das y alesnadas, y lampi-
Amœn. acad. 6. afr. 20. X ñas.
Xeranthemum incanum, X Xeranthemo blanquecino,
foliis subrotundis, flore pur- X con hojas casi redondas; y
pureo. Burm. afr. 183. t. 68. X flor purpúrea.
f. 1. X

Cast. Xeranthemo blanquecino.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h

Posee los cálices lustrosos y purpúreos: y los de abaxo casi de color de ladrillo; con el vilano blanco.

ESPECIES CON EL RECEPTACULO DESNUDO,
Y EL VILANO PLUMOSO.

Spe-
ciosis-
simum

6. XERANTHEMUM X Xeranthemo fruticoso y de-
fruticosum erectum, foliis X recho, de hojas amplexicaul-
amplexicaulibus lanceolatis X les, lanceoladas, con tres
trinerviis, ramis unifloris X nervios; ramas de una flor,
subnudis, floribus pedun- X casi desnudas; y flores pe-
culatis. Mill. dict. n. 4. Berg. X dunculadas.
cap. 270.

Xeranthemum tomento- X Xeranthemo tomentoso,
sum, latifolium, flore ma- X con hoja ancha; y flor muy
ximo. Burm. afr. 178. t. 66. X grande.
f. 2.

Elichrysum Africanum, X Elichryso de Africa, la-
lanuginosum, latifolium, X nuginoso, con hoja ancha;
calyce floris argenteo & am- X caliz de la flor muy ancho y
plisimo. Breyn. ic. 27. t. 16. X de color de plata.
f. 1. Rai. Suppl. p. 182. n. X

13.

Chrysocome seu argyro- X Penacho de color de oro
come Gnaphaloides, Afri- X ó de plata, Africano, seme-
cana, amplissimis floribus. X jante al Gnaphalio, con flo-
Seb. thes. 2. p. 45. t. 43. f. 6. X res muy anchas.

Cast. Xeranthemo hermosísimo.

Habita en Etiopia. h

326 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Retor-
tum.

7. XERANTHEMUM X Xeranthemo con los tallos
caulibus frutescentibus pro- frutescentes y revueitos; ho-
volutis, foliis tomentosis jas tomentosas y encorvadas
recurvatis. Mill. dict. n. 5. ácia atrás.

Xeranthemoides procum- Planta como Xeranthemo,
bens, Polii folio. Dill. elth. tendida, y con hoja como la
423. t. 322, f. 415. del Polio,

Cast. Xeranthemo retorcido.

Habita en Etiopia. *h*

Sp-
nosum

8. XERANTHEMUM X Xeranthemo con escamas
squamis calycinis mucrona- del caliz terminadas en pun-
to-spinosis, tita espinosa.

Xeranthemum ramosum, Xeranthemo ramoso, con
foliolis simplicibus, capite hojuelas sencillas; y cabe-
spinoso. Burm. afr. 182. t. zuela espinosa.
67. f. 3.

Xeranthemum spinosum, Xeranthemo espinoso, de
Æthiopicum, capitulis com- Etiopia, con cabezuelas com-
paetis purpurascens. pactas y de color que tira á
Breyn, prodr. 2, p. 105. purpúreo.

Cast. Xeranthemo espinoso.

Habita en Etiopia.

Se-
samoi-
des.

9. XERANTHEMUM X Xeranthemo con ramas de
ramis unifloris imbricatis, una flor y apiñadas; hojas
foliis linearibus adpressis. lineares y apretadas.
Mill. dict. n. 6. Berg. cap.
273.

Xeranthemum ramosum, Xeranthemo ramoso, con
foliis squamosis linearibus, hojas escamosas, lineares; y
floribus argenteis. Burm. flores de color de plata.
afr. 181, t. 67. f. 2.

Xeranthemum Sesamoi- Xeranthemo como Sesa-
des, flore albo, Ericæ foliis, mo, con la flor blanca; hojas
cauli tomentoso adstrictis, semejantes á las del Brezo,
ad radicem verò Stæchadis y apretadas al tallo tomen-
citrinæ longioribus & solu- toso; pero en la raíz, como
tis. Pluk. amalth. 213. t. las del Estecade cetrino,
449. f. 5. mas largas y sueltas. *α*

Chry-

Chrysocome seu argyro- Penacho de color de oro
come Africana, Ericoides, ó de plata, de Africa, del
capitis Bonæ spei. Seb. thes. Cabo de Buena-esperanza,
 2. t. 43. f. 5. parecido al Brezo.

Elichrysium Africanum, Elichryso de Africa, la-
lanuginosum, angustissimum, nuginoso, con hoja muy an-
folio, calyce floris argenteo gosa; y caliz de la flor muy
& amplissimo. Breyn. ic. 27. ancho y de color de plata.
 t. 16. f. 2.

Xeranthemum Capense, Xeranthemo del Cabo de
Rorismarini folio, flore al- Buena-esperanza, con hoja
bo. Rai. Suppl. p. 239. R. como la del Romero; y flor
 blanca.

Cast. Xeranthemo como Sesamo.

Habita en Etiopia.

En unas plantas de esta especie se halla el caliz de co-
 lor de nieve y en otras purpúreo.

Virga- 10. XERANTHEMUM X Xeranthemo con ramas de
 tum. *ramis unifloris virgatis,* una flor y en varitas; hojas
foliis lanceolatis tomento- lanceoladas, tomentosas; y
sis, pedunculis subnudis. y pedunculos casi desnudos.
 Berg. cap. 275.

Elichrysium Africanum, Elichryso de Africa, la-
lanuginosum, angustissimum, nuginoso, con hoja muy an-
folio, calyce floris sulphu- gosa; caliz de la flor an-
reo, amplo. Breyn. prodr. 3. cho, y de color de azufre.
 t. 16. f. 3.

Cast. Xeranthemo de varitas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Roy.

Se diferencia del Xeranthemo como Sesamo, señaladamen-
 te por el caliz de color amarillo-roxo: y segun Royen
 tiene las anteras con cola.

Stæ- 11. XERANTHEMUM X Xeranthemo con los pe-
 helina. *pedunculis terminalibus ex-* dunculos terminales que so-
sertis nudis unifloris, foliis bresalen afuera, desnudos y
lanceolatis tomentosis. Syst. con una flor; hojas lanceo-
 veg. 624. ladas y tomentosas.

Cast.

328 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Xeranthemo Stehelinia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Royen.

Tiene el tallo leñoso, tierno, entre en panoja y ramoso, con tomento blanco como toda la planta: los peduncullos largos y terminales.

Variegatum. 12. XERANTHEMUM X Xeranthemo con flores solitarias é inclinadas; escamas del caliz obtusas y manchadas.

624.

Xeranthemum Africanum, Gnaphalii foliis tomentosissimis, foliis & squamarum summitatibus ferrugineis. Rai. Suppl. p. 181. X Xeranthemo de Africa, con hojas como las del Gnaphalio, tomentosas; hojas y sumidades de las escamas de color amarillo ferrugineo.

Cast. Xeranthemo de varios colores.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Paniculatum. 13. XERANTHEMUM X Xeranthemo con flores en panoja; y hojas entre lineares y lanceoladas.

Xeranthemum incanum, foliis oblongo-acutis, capitulis plurimis argenteis. Burm. afr. 180. t. 67. f. 1. X Xeranthemo blanquecino, con hojas entre oblongas y agudas; y muchas cabezuelas de color de plata.

Xeranthemum fruticosum, foliis subulatis canaliculatis lanatis cuspidatis patulis, corymbis terminalibus. Suppl. p. 366. X Xeranthemo fruticoso, con hojas alesnadas, acanaladas, lanudas, terminadas en punta, extendidas; y corimbos terminales.

Cast. Xeranthemo en panoja.

Habita en Etiopia, y en el Cabo de Buena-esperanza.

Thunb. *h*

Varía con los cálices blancos y rojos: y las flores apenas son mayores que las del Gnaphalio.

SIGUEN LAS RESTANTES ESPECIES DEL SUPLEMENTO.

Fulgidum. 14. XERANTHEMUM X Xeranthemo de hojas en-
foliis lato-lanceolatis, con- X tre anchas y lanceoladas,
voluto-incumbentibus, flo- X envueltas y arrimadas unas
ribus nonnullis. Suppl. p. X á otras; y con algunas flo-
365. X res.

Cast. Xeranthemo resplandeciente.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. $\frac{h}{2}$

Echa el tallo del grueso de un dedo, lanudo, y dividido por su remate en ramas que llevan las flores: las *hojas* lanceoladas, acercadas, del largo y ancho de un dedo, derechas y casi apiñadas, tomentosas, algo lanudas por su margen, blancas y blandas como las del *Gnaphalio*: cinco ó seis *flores* sentadas, y que salen de las ramitas mas altas: los *cálices* de la magnitud de una nuez, con muchísimos radios de color muy amarillo-roxo, y muy resplandeciente; y numerosos *flosculos* muy pequeños.

Las *flores* se asemejan á las del *Xeranthemo*; pero la *yerba* tiene la traza del *Gnaphalio*.

Stoloniferum. 15. XERANTHEMUM X Xeranthemo tendido, ras-
procumbens, repens, seri- X trero, y con vello como seda;
ceum, foliis oblongis recur- X hojas oblongas, entre encor-
vato-patulis, ramulis uni- X vadas ácia atrás y extendi-
floris. Suppl. p. 366. X das; y ramitas de una flor.

Cast. Xeranthemo de vástagos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Produce el tallo que parece herbaceo, debil, tendido y que echa raíces: las *ramitas* vestidas hasta la flor con hojas pequeñas, vellosas como seda y de color de plata: las *flores* mas pequeñas y rubicundas; con el *vilano* plumoso.

330 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Re-
curva-
tum.

16. XERANTHEMUM X Xeranthemo con hojas en-
foliis recurvatis lanceola- corvadas ácia atrás , lanceo-
tis complicato-canaliculatis ladas , entre plegadas y aca-
cuspidatis ciliatis , ramulis naladas , pestañosas , termi-
unifloris. Suppl. p. 366. nadas en punta ; y ramitas
X de una flor.

Cast. Xeranthemo encorvado ácia atrás.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Back.* *h*

Tiene el *tallo* fruticoso ; con las *ramas* vellosas : las *ho-*
jas alternas , algo rígidas , lanceoladas , agudas , aca-
naladas , pestañosas y por debaxo con vello apretado :
los *cálices* terminales , solitarios , sanguíneos , lampiños ,
puntiagudos y por encima blancos : con el *disco* de co-
lor que tira á amarillo.

1132. Género CARPESIMUM. * Conyzoides.

Tourn. act. 1706.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* apiñado ; con las *hojuelas exteriores* mayo-
res , extendidas y redobladas ; las *interiores* iguales ,
apretadas y mas cortas.

COR. *compuesta* igual ; con las *corolillas* hermafroditas , en
el disco , y femeninas , en el ámbito.

Propia en las hermafroditas : de figura de embudo ; con
el *borde* hendido en cinco partes y extendido.

En las femeninas : tubulosa y hendida en cinco partes
arimadas entre sí.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco y cortos :
con la *antera* cilíndrica.

PIST. en las hermafroditas : *germen* oblongo : *estilo* senci-
llo : con el *estigma* hendido en dos partes.

En las femeninas : muy semejante al de las hermafrodi-
tas.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. aovadas al revés y desnudas.

RECEPT. desnudo.

ESPECIES.

- Cernuum. 1. *CARPESIMUM floribus terminalibus*. Hall. hely. n. 134. Jacq. austr. t. 204. *Aster atticus, foliis circa florem mollibus*. C. B. P. 266. *Carpesium*. Aët. ups. 1741. p. 81. Hort. ups. 257. *Aster cernuus*. Col. ecphr. 1. p. 251. t. 252. Barr. ic. 1142. *Chrysanthemum Conyzoides, cernuum, foliis circa florem mollibus*. Moris. hist. 3. p. 18. secl. 6. t. 5. f. 27. *Conyzoides flore flavescens, cernuo*. Tourn. aët. paris. 1706. p. 108. Carpesio con flores terminales. Aster attico, con hojas blandas cerca de la flor. Carpesio. Aster con la flor cabizbaxa. Chrysanthemo parecido á la Conyza, con la flor cabizbaxa; y hojas blandas cerca de la flor. Planta como Conyza, con la flor de color amarillo-rojo y cabizbaxa.

Cast. Carpesio cabizbaxo.

Habita en Italia, en Suiza y en Aragon. 2

Tiene las hojas lanceoladas, adelgazadas acia el peciolo, vellosas y aserraditas: el caliz adornado por su base de hojuelas mas largas: las flores de color amarillo-rojo é inclinadas: las semillas relucientes y glutinosas. Synops. stirp. Aragon. p. 119.

- Abrotanoides. 2. *CARPESIMUM floribus lateralibus*. Osbeck. it. t. 10. Mill. dict. n. 2. Carpesio con flores laterales.

Cast. Carpesio como Abrotano.

Habita en la China. Osbeck.

Produce los tallos ramosos y algo duros: las hojas alternas, entre anchas y lanceoladas, adelgazadas en peciolo, del largo de un dedo y con festones poco manifestos: las flores esparcidas, y las mas veces solitarias en las axilas de las hojas á lo largo de las ramas, sentadas, ó con los pedunculos muy cortos, de la magnitud de una avellana é inclinadas: los cálices con omblis-

332 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

bligo y ceñido con hojuelas extendidas : los *flosculos* numerosos : las *semillas* oblongas , desnudas , lampiñas y como si fuesen untadas de balsemo.

1133. Género BACCHARIS.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun cilindrico y apiñado ; con *escamas* lineares y agudas.

COR. *compuesta* igual ; con las *corolillas* hermafroditas y femeninas mezcladas.

Propia en las hermafroditas : de figura de embudo y hendida en cinco partes.

En las femeninas : apenas manifesta ó casi ninguna.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco , capilares y muy pequeños : con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : *germen* aovado : *estilo* filiforme y del largo de la flor : con el *estigma* hendido en dos partes.

En las femeninas : muy semejante al de las hermafroditas.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : cortisimas y oblongas : con el *vilano* sencillo.

En las femeninas : del mismo modo.

RECEPT. desnudo.

OBS. El vilano en algunas especies es larguísimo y en otras apenas es mas alto que el caliz.

ESPECIES.

Ivaefolia.

1. BACCHARIS *foliis* X Baccara con hojas lanceo-
lanceolatis longitudinaliter X ladas y entre dentadas y
dentato-serratis. Hort. cliff. X aserradas longitudinalmente.
404. Berg. cap. 275.

Conyza frutescens , foliis X Conyza frutescente , con
angustioribus nervosis. Fe- X hojas mas angostas y nervio-
wil. peru. 750. t. 37. X sas.

Eupatorium Africanum, *Agerato affinis Peruviano*, *floribus albis*. Pluk. alm. 401. t. 308. f. 2. Eupatorio de Africa, semejante al Agerato del Perú, con flores blancas.

Eupatorium Indicum, *re albo*. Barth. act. 2. p. 57. t. 57. Eupatorio de Indias, con la flor blanca.

Conyza Africana, *humilis*, *foliis angustioribus*, *nervosis*, *floribus umbellatis*. Tourn. p. 455. Conyza de Africa, baxa, con hojas mas angostas, nerviosas; y flores en umbela.

Cast. Baccara con hoja de Iva.

Habita en el Perú. *h*

Tiene muchisimos *flosculos fementinos* con la corolilla hendida en tres partes; y pocos *hermafroditos* en el disco hendidos en cinco lacinias.

Neri-
folia. 2. BACCHARIS *foliis lanceolatis supernè uno alterove denticulo serratis*. Hort. cliff. 404. Roy. lugdb. 152. Baccara de hojas lanceoladas, y aserradas por arriba con uno ú otro diente.

Arbuscula foliis Nerii. Boerh. lugdb. 2. p. 263. Arbustito con hojas como las de la Adelfa.

Cast. Baccara con hoja de Adelfa.

Habita en Etiopia. *h*

Arbo-
rea. 3. BACCHARIS *foliis elliptico-lanceolatis integerimis nudis petiolatis*. Baccara de hojas entre elípticas y lanceoladas, enterisimas, desnudas y con peciolo.

Cast. Baccara arborea.

Habita en las selvas de la isla llamada Juana, en la India oriental. Koenig. *h*

Es arbol del largo de tres pies, del grueso de un brazo y que dá mucha sombra. Echa las *hojas* alternas, con peciolo, entre anchas y lanceoladas, enterisimas, agudas, algo ásperas y no tomentosas, del largo de quatro dedos y dos de ancho: el *corimbo* que termina las ra-

mas,

334 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

mas, en panoja, del largo y ancho de un xeme: el *caliz* casi globoso, estrechamente apinado con escamas alesnadas: el *vilano* de color melado, sin estipite, peloso y al doble mas largo que el caliz: y las *semillas* estriadas. Duda *Linneo*, que esta especie corresponda á esta clase.

Halimifolia

4. *BACCHARIS foliis ob-ovatis superne emarginato-crenatis*. Hort. cliff. 405. Gron. virg. 121. Du Ham. arb. 1. t. 35. Baccara con hojas aovadas al revés, y por arriba entre escotadas y recortadas.

Senecio Virginianus, arborescens, Atriplicis folio. Rai. hist. 1796. Herm. parad. 225. t. 225. Senecio de Virginia, arborescente, con hoja como la del Armuelle.

Pseudo-Helichrysum Virginianum, frutescens, Halimi latioribus foliis, glaucis. Moris. hist. 3. p. 90. sect. 7. t. 10. f. 4. Falso-Helichryso de Virginia, frutescente, con hojas como las del Halimo, mas anchas y de color garzo.

Elichryso affinis Virginiana, frutescens, foliis Chenopodii glaucis. Pluk. alm. 134. t. 27. f. 2. Planta de Virginia, parecida al Elichryso, frutescente, con hojas como las del Chénopodio y de color garzo.

Argyrocome Virginiana, Atriplicis folio. Pet. gaz. t. 7. f. 4. Penacho de plata, de Virginia, con hoja como la del Armuelle.

Cast. Baccara con hoja de Halimo.

Habita en la Virginia. \bar{h}

Dioscoridis

5. *BACCHARIS foliis lato-lanceolatis dentatis sessilibus stipularis*. Amoenit. acad. 4. p. 289. Suppl. 366. Baccara de hojas entre anchas y lanceoladas, dentadas, sin peciolo, y con estipulas.

Conyza major, altera. C. B. P. 265. Otra Conyza mayor.

Conyza Dioscoridis. Rauw. it. 54. t. 54. Conyza de Dioscorides.

Conyza Syrie. Bauh. hist. ~~X~~ *Conyza de Siria.*
 2. p. 1054. Rai. hist. 262. ~~X~~
 Gron. orient. 110. ~~X~~

Cast. Baccara de Dioscorides.

Habita en Siria y en Egipto.

Florece muy tarde ; y haciendose lozana en el Caldario, apenas llega á florecer.

Llábase malamente *Baccara de Dioscorides.*

Arroja los tallos frutescentes , del largo de seis pies , muy ramosos , débiles y algo pelosos : las *hojas* alternas , sin peciolo , que abrazan la mitad del tallo, aserradas, blandas y profundamente dentadas por su base : las *panojas* pequeñas y colocadas entre las ramificaciones: el *caliz* mas corto que la flor y apretado con escamas alesnadas : los *flosculos femeninos* copiosos, blanquecinos, delgados y desnudos: cinco ó seis *hermafroditos* en el disco: el *estilo* en los hermafroditos hendido en dos partes: el *vilano* sencillo y que sale afuera. *Suppl. p. 367.*

Indica. 6. BACCHARIS *foliis ob-* ~~X~~ Baccara de hojas aovadas
ovatis, denticulatis petio- ~~X~~ al revés, con dientecitos y
latis. ~~X~~ pecioladas.
Eupatorio affinis planta ~~X~~ Planta de Zeylan, pare-
Zeylanica, foliis Ulmi. Breyn. ~~X~~ cida al Eupatorio, con hojas
 cent. t. 70. ~~X~~ como las del Olmo.

Cast. Baccara de Indias.

Habita en la India segun *Braad*: y en el Cabo de Buena-esperanza.

Echa las *hojas* aovadas al revés , de la magnitud de una pulgada , y entre aserradas y dentadas en medio : el *corimbo* grande y terminal: los *pedunculos* angulados y con algunas bracteas alesnadas : los *cálices* cilindricos y lisos : las *ramas* con estrias elevadas , que salen de las axilas de las hojas mas altas; y mas largas que el corimbo.

336 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Brasi- 7. BACCHARIS *foliis ob* X Baccara con hojas aova-
liana. *ovatis integris scabris ses-* X das al revés, enteras, áspe-
silibus subtilius venosis. X ras, sentadas y venosas en
X su envés.
Tremate. Marcgr. bras. 81. X Tremate.

Cast. Baccara del Brasil.

Habita en el Brasil.

Arroja el tallo algo angulado : las *hojas* aovadas al revés, obtusas, casi enterisimas, venosas y ásperas por deba-
xo : las *ramas de la panoja* con alguna hojuela : las *flo-*
res apartadas y alternas : el *caliz* apiñado con escamas
agudas : y el *vilano* de color amarillo ferrugineo. Es
semejante á la *Baccara de Indias* ; pero las *hojas* de la
del Brasil son mas rígidas, sin peciolo y apenas denta-
das : las *flores* mayores, en menos número y mas dis-
tantes.

- Fec- 8. BACCHARIS *foliis lan-* X Baccara con hojas lanceo-
tida. *ceolatis serrato-dentatis,* X ladas, entre aserradas y den-
corymbis foliosis. Gron.virg. X tadas ; y corimbos foliosos.
121. Mill. dict. n. 4. X
Conyza Americana, fru- X Conyza de America, fru-
tescens, foetidissima. Dill. X tescente, y muy fétida.
eith. 106. t. 89. f. 105 ? X

Cast. Baccara fétida.

Habita en la Virginia. 2

1134. Género CONYZA. * Tourn. t. 259.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun casi redondo, apiñado ; con *escamas* despar-
ramadas, agudas y las exteriores algo extendidas.

COR. compuesta tubulosa ; con las *corolillas hermafrodi-*
tas numerosas, y tubulosas, en el disco ; las *flores*
femeninas en el radio, casi redondas, y á veces sin
petalo.

Propia de la hermafrodita : en forma de embudo ; con el
borde hendido en cinco partes y extendido.

De

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 337

De la femenina : en forma de embudo, ó ligulada ; con el *borde* hendido en tres partes.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : *germen* oblongo : *estilo* filiforme , del largo de los estambres : con el *estigma* hendido en dos partes.

En las femeninas : *germen* oblongo : *estilo* filiforme , del largo del de la hermafrodita y mas delgado : con dos *estigmas* delgadísimos.

PERIC. ninguno : el *caliz* cerrado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : oblongas ; con el *vilano* sencillo.

En las femeninas : del mismo modo que en las hermafroditas.

RECEPT. desnudo , y plano.

OBS. Las corolillas del ámbito *femeninas* , *hendid*as en tres partes , ó *liguladas* y *pequeñas* , ó *ninguna*. Wernisch.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 454.

La *flor* es flosculosa ó que consta de muchos flosculos , hendid

os en muchas partes , sentados en el embrión y comprendidos en un caliz escamoso comunmente cilíndrico : y el embrión pasa despues á semilla adornada de vilano.

ESPECIES.

Squar-
rosa.

1. CONYZA *foliis lanceolatis acutis , caule herbaceo corymboso , calycibus squarrosis*. Hort. cliff. 405. Flor. dan. t. 622. Conyza con hojas lanceoladas , y agudas ; tallo herbáceo , corimboso ; y cálices desparramados.

Conyza foliis ovato-lanceolatis , rariter serratis , floribus umbellatis. Hall. hely. n. 135. Conyza de hojas entre ovadas y lanceoladas , con aserraduras claras ; y flores en umbela.

Conyza major , vulgaris. C. B. P. 265. Tourn. p. 454. Conyza mayor , vulgar.

Conyza. Cam. epit. 612. Conyza.

TOM. VI.

Y

Bac-

338 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Baccharis Monspeliensis. Blackw. t. 102. Baccara de los de Montpellier.

Conyza major, *Matthioli*, *Baccharis quibusdam*. Bauh. hist. 2. p. 1051. Conyza mayor, de Matthiolo, llamada Baccara por algunos autores.

Cast. Conyza desparramada.

Habita en Alemania, Inglaterra y Francia: en la Alcarria, Castilla la vieja, Cataluña y en otras partes de España. ♂

Sube á la altura de un hombre y tiene á veces las hojas enterisimas.

Lini-
folia.

2. *CONYZA foliis linearilanceolatis integerrimis, corollis radiatis*.

Aster Americanus, albus, *Mezerei Arabum exasperatis foliis, florum petalis reflexis*. Pluk. alm. 56. t. 79. f. 2. Conyza con hojas entre lineares y lanceoladas, enterisimas; y corolas radiadas. Aster de America, blanco, con hojas como las del Mezereo de los Arabes, exasperadas; y petalos de las flores redoblados.

Cast. Conyza con hoja de Lino.

Habita en la America septentrional.

Sor-
dida.

3. *CONYZA foliis linearibus integerrimis, pedunculis longis trifloris, caule suffruticoso*.

Gnaphalium (sordidum) fruticosum, foliis linearibus, pedunculis subtrifloris, calycinis squamis lanceolatis. Spec. pl. 3. p. 1193. Hort. cliff. 401. Conyza con hojas lineares y enterisimas; pedunculos largos, de tres flores; y tallo sufruticoso. Gnaphalio (*sordido*) fruticoso, con hojas lineares; pedunculos casi de tres flores; y escamas del caliz lanceoladas.

Elichrysum sylvestre, angustifolium, capitulis conglobatis. C. B. P. 264. Tourn. p. 453. Elichryso silvestre, de hoja angosta; y cabezuelas conglobadas.

Stæchadi citrinæ affinis, capitulis parvis, raris. Bauh. hist. 3. p. 156. Rai. hist. 283. Planta parecida al Estechade cetrino, con cabezuelas pequeñas y claras.

Stæ-

Stæchas citrina spuria, X Estechâde ó Cantueso ce-
longioribus foliis. Barr. ic. X trino, espurio, con hojas mas
 368. 277. X largas.

Ageratum aliud quorun- X Otro Agerato de algunos
dam. Dalech. hist. 778. X autores.

Cast. *Conyza sordida*.

Habita en las peñas y muros de la Francia Narbonense y de Italia: en las laderas del Piul de Rivas; en los montes de Avila; y es comun en lugares incultos, áridos y guijarrosos de España. 24

Es muy parecida á la *Conyza saxâtil*. Fcha el tallo sufruticoso, como el del *Espliego*, ramoso y blanco: los pedunculos rectos, largos, y comunmente con tres flores en su remate: los cálices con las escamas de color pardo por su margen: y las hojas que abrazan la mitad del tallo.

Saxa-
tilis.

4. CONYZA *foliis linear-* X *Conyza* de hojas lineares,
ribus subdentatis, pedun- X con algun diente; peduncu-
culis longissimis unifloris, X los larguissimos, de una flor;
caule suffruticoso. X y tallo sufruticoso.

Gnaphalium foliis alter- X *Gnaphalio* con hojas al-
nis linearibus acutis planis, X ternas, lineares, agudas y
pedunculis longissimis uni- X planas; pedunculos largui-
floris. Hort. cliff. 401. X simos y de una flor.

Helicrysum capitulis sin- X *Elichryso* con cabezuelas
gularibus, brevibus. Moris. X de una en una, y cortas.
 hist. 3. p. 87. sect. 7. t. 10.
 f. 16.

Helicrysum saxatile, X *Elichryso* saxâtil, con
singulari capitulo amplo, X cabezuelas de una en una,
angusto Stæchadis folio. X y ancha; hoja como la del
 Bocc. mus. 142. t. 104. X Cantueso y angosta.

Elichryso sylvestri, flore X Planta semejante al Eli-
oblongo, similis. C. B. P. X chryso silvestre, con la flor
 265. Prodr. 123. t. 123. X oblonga.

Elichrysum sylvestre, la- X *Elichryso* silvestre, con
trifolium, flore parvo (vel X hoja ancha; flor de una en
magno) singulari. Tourn. X una, y pequeña (ó grande).
 p. 452.

340 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Chrysocoma latifolia, mi-
nima, *singulari flore*. Barr.
 ic. 425.

Penacho de oro muy pe-
 queño, con hoja ancha; y
 flor de una en una.

Cast. *Conyza saxâtil*.

Habita en Italia y Palestina, en Istria, Carinthia y Va-
 lesia: en Aragon, Cataluña y demas partes de España
 que la antecedente; como tambien en el Cabo de Bue-
 na-esperanza. *h*

Echa los tallos primeramente tendidos y despues levanta-
 dos: los cálices cilindricos, con su ápice extendido y
 membranoso: muchos flosculos, en el ámbito, femeninos
 y desnudos.

Tiene el tallo de la altura de un pie, rollizo y to-
 mentoso: las hojas con dientecitos y que abrazan la mi-
 tad del tallo: las escamas del caliz membranosas por su
 ápice y negruzcas. *Gov. hort.* 435.

Ru- 5. CONYZA *foliis spa-*
 pestris *thulatis subdentatis caule*
que suffruticoso tomentos,
pedunculis elongatis uniflo-
ris.

Conyza de hojas en forma
 de espatula, con algun dien-
 te y tomentosas igualmente
 que el tallo sufruticoso; pe-
 dunculos alargados y de una
 flor.

Conyza tomentosa, Polii
foliis crenatis. Shaw. afr.
 176. t. 176. mala.

Conyza tomentosa, con
 hojas como las del Polio y
 recortadas.

Cast. *Conyza rupestre*.

Habita en la Arabia. *Forsk.* *h* 2

Es muy semejante á la *Conyza saxâtil*; pero tiene las ho-
 jas mas anchas, mas cortas, mas obtusas y con tomento
 blanco en ambas partes, á excepcion de las de abaxo:
 las escamas del caliz sin ser agudas, ni extendidas;
 sino algo obtusas y estrechamente apiñadas: las corolas
 amarillas, con muchisimos flosculos; y el olor pesado.

Scabra 6. CONYZA *foliis oblon-*
gis subdentatis sessilibus
scabris, pedunculis uniflo-
ris elongatis.

Conyza de hojas oblongas,
 con algun diente, sentadas,
 y ásperas; pedunculos de
 una flor y alargados.

Cast.

Cast. Conyza áspera.

Habita en la India.

Posee las *hojas* ásperas en una y otra superficie , con quatro ó cinco dientes en ambos lados : los *pedunculos* axilares , ácia los remates de las ramas , con una flor, y ultimamente seis veces mas largos que las hojas.

Asteroides.

7. CONYZA foliis lanceolatis subserratis , corollis radiatis , calycibus squarrosis.

Aster Marilandicus, Ptar. micæ capitulis , flore albo, Baccharidis Mompelien- sium folio & effigie. Pluk. mant. 29.

Conyza con hojas entre anchas y lanceoladas , algo serradas ; corolas radiadas ; y cálices desparramados.

Aster de Marilandia , con cabezuelas como las de la Ptarmica ; flor blanca ; hoja y traza como las de la Bac- cara de los de Mompeller.

Cast. Conyza como Aster.

Habita en la America septentrional. 24

Tiene la traza de Aster : el corimbo casi elevado en ramillete horizontal : las flores como las de la precedente y radiadas.

Bifrons.

8. CONYZA foliis ovato-oblongis amplexicaulibus. Hort. cliff. 405.

Eupatoria Conyzoides , maxima , Canadensis , foliis caulem amplexantibus. Pluk. alm. 141. t. 87. f. 4.

Conyza con hojas entre ovadas y oblongas , y amplexicaules.

Eupatoria del Canadá , muy grande , parecida á la Conyza , y con hojas que abrazan el tallo.

Cast. Conyza de dos frentes.

Habita en el Canadá.

Unas hojas se presentan por la superficie superior , y otras por la inferior ; de lo qual le vino el nombre de Bifrons ó de dos caras.

Vease la Inula de dos frentes.

342 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Lo- 9. CONYZA *foliis infe-* X Conyza con las hojas in-
bata. *rioribus trifidis, superiori-* X feriores hendidas en tres
bus ovato-lanceolatis obso- X partes, las superiores entre
lete serratis, floribus co- X aovadas y lanceoladas, con
rymbosis. Hort. cliff. 405. X aserraduras poco manifies-
Mill. dict. n. 4. X tas; y flores corimbosas.

Conyza arborescens, lu- X Conyza arborescente, con
tea, folio trifido. Plum. spec. X la flor amarilla; y hoja hen-
9. ic. 96. X dida en tres partes.

Virga-aurea major seu X Virgaurea mayor, ó Do-
Doria folio sinuato, hirsuto. X ria de hoja sinuosa y con
Sloan. jam. 125. hist. 1. p. X pelo áspero.
260. t. 152. f. 4. X

Cast. Conyza hendida en lóbulos.

Habita en Vera-cruz. *h*

Bifo- 10. CONYZA *foliis ova-* X Conyza de hojas ovales y
liata. *libus dentatis, pedunculis* X dentadas; pedunculos con
diphyllis, bracteis opposi- X dos hojuelas; y bracteas
tis. X opuestas.

Eupatoria Conyzoides, X Eupatoria como Conyza,
íntegro Jacobææ folio molli X con hoja como la de la Ja-
& incano. Pluk. alm. 140. X cobeæ, entera, blanda y
t. 177. f. 1. X blanquecina.

Cast. Conyza de dos hojuelas.

Habita en la India.

Pubi- 11. CONYZA *foliis oblon-* X Conyza de hojas oblongas,
gera. *gis subdentatis subpetiola-* X con algun diente y algo pe-
tis, pedunculis lanatis sub- X cioladas; pedunculos lanu-
bifloris. X dos y casi de dos flores.

Sonchus volubilis. Rumph. X Cerraja voluble.
amb. 5. p. 299. t. 103. f. 2. X

Cast. Conyza con bozo.

Habita en la India.

Produce las ramas herbáceas y salpicadas de pelillos cla-
ros: las hojas oblongas, alternas, en forma de cuña
por su base, algo pecioladas, verdes en ambas superfi-
cies y salpicadas de pelillos claros, casi dentadas, ó
con

con tres ó quatro aserraduras agudas en ambos lados y sin que sean ásperas : los *pedunculos* que salen de las axilas superiores de las hojas , lanudos , con dos , tres ó quatro flores ; y el *caliz* antes de abrirse tambien lanudo.

Tortuosa. 12. *CONYZA caule tortuoso fruticoso , foliis ovato-oblongis integerrimis , racemis reflexis.* Hort. cliff. 405. Conyza con el tallo tortuoso y fruticoso ; hojas entre aovadas y oblongas , enterisimas ; y racimos redoblados.

Conyza Madagascariensis, fruticosa , tortuoso caule , Corni folio. Vaill. act. 1719. p. 396. Conyza de Madagascar, fruticosa , con el tallo tortuoso ; y hoja semejante á la del Corno.

Cast. Conyza tortuosa.

Habita en Madagascar y en Vera-cruz. $\frac{f}{h}$

Candida. 13. *CONYZA foliis ovatis tomentosis , floribus confertis , pedunculis lateralibus terminalibusque.* Hort. cliff. 405. Roy. lugdb. 157. Conyza con hojas aovadas y tomentosas ; flores amontonadas ; pedunculos laterales y terminales.

Conyza Cretica , fruticosa , folio molli , candidissimo , tomentoso. Tourn. cor. 33. Conyza de Creta , fruticosa , con hoja blanda , tomentosa y muy candida.

Conyza saxatilis , folio Filaginis. Buxb. cent. 2. p. 23. t. 17. Conyza saxátil , con hoja como la del Filago.

Aster tomentosus , luteus , Verbasci folio. Bocc. sic. 60. t. 31. f. 2. Aster tomentoso , con flor amarilla ; y hoja como la del Verbasco.

Jacobæa Cretica , incana , integro Limonii folio. Barr. rar. t. 17. Jacobea de Creta , blanca , con hoja como la del Limonio y entera.

Cast. Conyza candida.

Habita en Creta.

Tiene los *pedunculos* encrasados por arriba: y varía con la flor radiada , y el radio corto y encorvado ácia atrás.

344 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

An-
thel-
mini-
ca.

14. *CONYZA foliis lanceolato-ovatis serratis scabris , pedunculis unifloris , calycibus squarrosis.*

Conyza con hojas entre lanceoladas y aovadas , aserradas y ásperas ; pedunculos de una flor ; y cálices desparramados.

Baccharioides. Flor. zeyl.

Planta como la Baccara.

418.

Conyza Indica , Virga-aureæ folio , magno flore purpurascente. Vaill. act.

Conyza de Indias , con hoja como la de la Virgaurea ; flor grande y de color que tira á purpúreo.

358.

Scabiosa Conyzoides , foliis latis , dentatis , semine amaro , lumbricos enecante.

Escabiosa como Conyza , de hojas anchas , dentadas ; y semilla que mata las lombrices.

Burm. zeyl. 210. t. 95.

Cattu-Schiragam. Rheed. mal. 2. p. 39. t. 24. Rai. hist.

Cattu-Schiragam.

1444.

Cast. Conyza contra lombrices.

Habita en la India. ☉

Echa el tallo rollizo , vellosos y recto : las *hojas* alternas , agudas , aserradas , angostadas en peciolo , y por su base de color que tira á purpúreo : los *ápices del caliz* lanceolados , alargados y extendidos : la *corola* pequeña , de color que tira á purpúreo , y con veinte y cinco flosculos hermafroditos.

Balsa-
mifera.

15. *CONYZA foliis lanceolatis subtus tomentosis , petiolis etiam dentatis.* Burm. ind. 178.

Conyza con las hojas lanceoladas , tomentosas por debaxo ; y peciolos tambien dentados.

Conyza odorata. Rumph. amb. 6. t. 24. f. 1. Clus. exot. 92.

Conyza olorosa.

Conyza arbor Zeylanensis , subrotundo folio , maxime tomentoso. Pluk. amalth.

Conyza arbol de Zeylan , con hoja casi redonda y muy tomentosa.

64.

Cast. Conyza balsamifera.

Habita en la India.

Tiene el *vilano* de color amarillo-ferrugineo. Acaso es especie de *Baccara*?

- Cine-
rea. 16. *CONYZA foliis oblongis, floribus paniculatis, corollis cylindricis calyce duplo longioribus.* *Senecioides*. Flor. zeyl. 419. *Conyza* con hojas oblongas; flores en panoja; corolas cilíndricas y al doble mas largas que el caliz. Planta como *Senecio*.
- Senecio Indicus, Atriplicis folio.* Moris. hist. 3. p. 106. sect. 7. t. 17. f. 7. *Senecio* de la India, con hoja como la del Armuelle.
- Senecio Indica, foliis ternis, crenatis.* Burm. zeyl. 211. t. 96. f. 1. *Senecio* de la India, con hojas de tres en tres y recor-
tadas.
- Eupatorium angustiore folio, Bermudense, floribus flavescentibus.* Pluk. alm. 141. t. 243. f. 3. *Eupatorio* de la Bermuda, con hoja mas angosta; y flores de color que tira á amarillo-roxo.
- Olus scrofinum.* Rumph. amb. 6. t. 14. f. 1. Burm.ind. 179. *Hortaliza* de cerdos.

Cast. *Conyza* cenicienta.

Habita en la India. ☉

Arroja el tallo derecho, en panoja y vellosa: las *hojas* apartadas, blanquecinas, entre lanceoladas y elípticas, entre ondeadas por su margen y aserradas: las *corolas* cilíndricas y purpúreas: los *estilos* cortos: y el *vilano* mas largo que el caliz.

- Odo-
rata. 17. *CONYZA foliis ovatis serratis subtomentosis acutis, caule corymboso, corollis subglobosis.* Amœnit. acad. 5. pag. 406. Mill. dict. n. 17. *Conyza* con hojas aovadas, aserradas, algo tomentosas y agudas; tallo corimboso; y corolas casi globosas.
- Conyza odorata, minor, erecta, purpurascens, corymbosa, foliis ovatis, villosis.* Brown. jam. 318. *Conyza* olorosa, menor, derecha, de color que tira á purpúreo y corimbosa; con hojas aovadas y vellosas.

Co-

346 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Conyza arborescens, purpurea, folio *Verbasci dentato*. Plum. spec. 9. ic. 97. *Conyza arborescente*, de color purpúreo, con hoja como la del Verbasco y dentada.

Conyza major, odorata, seu *Baccharis floribus purpureis nudis*. Sloan.jam. 124. hist. 1. p. 258. t. 152. f. 1. *Conyza mayor*, olorosa, ó Baccara con flores purpúreas y desnudas.

α *Eupatoria Conyzoides*, *Maderaspatana*, foliis glabris, flore purpurascente. Pluk. alm. 141. t. 177. f. 2. *Eupatoria* como *Conyza*, de Madraspatan, con hojas lampiñas; y flor de color que tira á purpúreo. α

Cast. *Conyza* olorosa.

Habita en la America meridional.

Chi- 18. *CONYZA foliis lanceolato-ovatis reflexo-serratis subtus tomentosis, floribus terminalibus congestis*. *Conyza* con hojas entre lanceoladas y aovadas, redobladas y aserradas, y por debaxo tomentosas; flores terminales y amontonadas.

Senecio Amboinicus. Rumph. amb. 6. p. 36. t. 14. f. 2. *Senecio* de Amboina.

Cast. *Conyza* de la China.

Habita en la China. Toren.

Rara vez tiene mas de tres flores amontonadas.

Hir- 19. *CONYZA foliis ovalibus integerrimis scabris subtus hirsutis*. Mill. dict. n. 18. *Conyza* de hojas ovales, enterisimas, ásperas y por debaxo con pelo áspero.

Cast. *Conyza* con pelo áspero.

Habita en la China.

Posee el tallo algo vellosa: las hojas oblongas ú ovales, enterisimas, ásperas, con mucho pelo áspero por debaxo y pálidas: las flores amontonadas en racimos: y los cálices semejantes á los del *Aster*.

Arborescens. 20. *CONYZA foliis ovatis integerrimis acutis subtus tomentosis, spicis recurvatis secundis, bracteis reflexis.* Mill. dict. n. 9. Conyza con hojas aovadas, enterisimas, agudas y por debaxo tomentosas; espigas encorvadas ácia atrás; ladeadas; y bracteas redobladas.

Conyza arborescens, floribus cæruleis. Plum. spec. 10. t. 130. f. 2. Conyza arborescente, con las flores cerúleas.

Conyza fruticosa, flore pallide purpureo, capitulis è lateribus ramulorum spicatum exeuntibus. Sloan. jam. 124. hist. 1. p. 257. Conyza fruticosa, con la flor de color purpúreo pálido; y cabezuelas, que salen en forma de espiga de los lados de las ramitas.

Eupatorium erectum, hirsutum, foliis oblongis rugosis, floribus spicatis per ramulos terminales declinatis, uno versu dispositis. Brown. jam. 313. Eupatorio derecho, con pelo áspero; hojas oblongas y rugosas; flores en espiga, ueclinadas por las ramitas terminales, y dispuestas en una serie.

Cast. Conyza arborescente.

Habita en la America meridional. \hbar

Fruticosa. 21. *CONYZA foliis ovatis integerrimis obtusis, floribus sessilibus alternis, ramulis flexuosis.* Conyza con hojas aovadas, enterisimas y obtusas; flores sin pedunculo, alternas; y ramitas ondeadas.

Conyza frutescens, Cydoniæ folio. Plum. spec. 9. ic. 95. f. 1. Conyza frutescente, con hoja como la del Membrillo.

Cast. Conyza fruticosa.

Habita en la America meridional. \hbar

Virgata. 22. *CONYZA foliis decurrentibus lanceolatis serrulatis, caulibus virgatis, floribus spicatis sparsis congestis.* Conyza con hojas escurridas, lanceoladas y aserruladas; tallos en varitas; flores en espiga, esparcidas y amontonadas.

348 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Conyza altera, foliis Helenii angustis, alato caule. Plum. spec. 9. ic. 98. f. 2? Otra Conyza con hojas como las del Helenio, angostas; y tallo alado.

Conyza angustifolia, subincana, caule alato, spica multiplici, floribus inferioribus ternatis, superioribus paucioribus. Brown. jam. 318. Conyza de hoja angosta, algo blanquecina; con el tallo alado y con muchas espigas; flores inferiores de tres en tres, (sostenidas en un mismo pie ecito?) y las superiores en menos número.

Gnaphalium virgatum. Amoen. acad. 5. p. 405. Gnaphalio en varitas.

Helichrysum caule alato, floribus spicatis. Sloan. jam. 125. hist. 1. p. 206. t. 152. f. 5. Helichryso con el tallo alado; y flores en espiga.

Cast. Conyza de varitas.

Habita en la Jamaica y en la Carolina. 24

Decurrens.

23. CONYZA foliis decurrentibus lanceolatis serrulatis, caule subdichotomo, floribus axillaribus sessilibus glomeratis. Conyza con hojas escurridas, lanceoladas y aserraditas; tallo casi ahorquillado; flores axilares, sin pedunculo y conglobadas.

Cast. Conyza escurrida.

Habita en la India. (O)

Su estatura es como la del *Filago*. Tiene el tallo del largo de un palmo, derecho, con vello tomentoso igualmente que toda la planta: las hojas lanceoladas y muy escurridas, como en la *Ginesta de saeta*: los globulillos de las flores cenicientos y que salen de las axilas de las hojas.

Aurea.

24. CONYZA foliis dentato-sinuatibus, auriculis subdecurrentibus. Suppl. p. 367. Conyza de hojas entre dentadas y sinuosas, y con orejillas algo escurridas.

Cast. Conyza de orejillas.

Habita en lugares humedos de la India Oriental.

Produce las hojas radicales mayores que las restantes, mas

mas rígidas, muy lampiñas, aovadas al revés, con venas rojas, gruesamente aserradas y ondeadas entre las aserraduras: las *hojas del tallo* oblongas, casi lanceoladas, blandas, vellosas, aserradas por su ápice, sinuosas en medio, entre aserradas y dentadas por toda la margen, algo escurridas y casi pinnadas en su base con dos ó tres hojuelas en ambas partes y extendidas: el *tallo* derecho, rígido, del largo de un pie, rubicundo y peloso, con las ramas derechas y sencillas: las *flores* que salen del remate del tallo, con pedunculo y esparcidas de diferente modo: el *caliz* aovado, con hojuelas ó escamas lineares, y extendidas por su ápice; las *exteriores* mas anchas; y las *interiores* puestas en cilindro: las *flores* blancas: los *flosculos* menudos; y los *radios* lineares y tambien menudos: los *pistilos* mas largos y derechos.

Canes- 25. CONYZA *foliis li-* Conyza con hojas linea-
ceus. *nearibus, panicula fastigia-* res; y panoja levantada en
ta. Suppl. p. 367. *ramillete horizontal.*

Cast. Conyza blanquecina.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Es *planta* toda blanquecina. Arroja los *tallos* casi sencillos, rollizos y estriados; con *ramas* laterales y cortas: las *hojas* lineares, del largo de un dedo, redobladas por su margen y algo tomentosas por debaxo: la *panoja* terminal, casi ahorquillada y elevada en ramillete horizontal: el *caliz* casi aovado, apiñado, la mitad mas corto que la flor y que el vilano; y la *flor* purpúrea. Su *traza* es como la de la *Conyza cenicienta*.

1135. Género ERIGERON. * Conyzoides. *Dill. gen.*

Conyzella. Dill. gen.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* oblongo, cilindrico y apiñado; con *escamas* alesnadas, derechas, y gradualmente mas largas.

COR. *compuesta* radiada; con *corolillas* hermafroditas, tubu-

350 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

bulosas, en el disco, y femeninas liguladas, en el radio.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco partes.

De la femenina: ligulada, linear, alesnada, derecha y las mas veces enterisima.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortisimos: con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: *germen* muy pequeño y coronado con el vilano mas largo que su propia corola: *estilo* filiforme, de la longitud del vilano: con dos *estigmas* oblongos y revueltos.

En las femeninas: *germen* muy pequeño; con el *vilano* casi del largo de su corola: *estilo* capilar, y de la longitud del vilano: con dos *estigmas* muy delgados.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: oblongas y pequeñas: con el *vilano* largo y peloso.

En las femeninas: muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. desnudo y plano.

OBS. Dillenio advirtió que los *flosculos* de mas adentro del disco, ó intermedios, las mas veces se hallan masculinos.

Se halla tambien especie con *flosculos* femeninos desnudos.

E S P E C I E S.

Visco-
sum.

1. ERIGERON *pedunculis unifloris lateralibus*, *foliis lanceolatis denticulatis basi reflexis*, *calycibus squarrosis*, *corollis radiatis*. Gron. orient. 267. Jacq. hort. t. 165. Erigeron con pedunculos de una flor y laterales; hojas lanceoladas, con denticitos, y redobladas por su base; cálices desparramados; y corolas radiadas.



Eri-

Erigeron foliis lanceo- Erigeron con hojas lan-
latis semiamplexicaulibus ceoladas, que abrazan la mi-
dentatis, ramis multifloris, tad del tallo y dentadas; ra-
corollis radiatis, caule vir- mas de muchas flores; coro-
 gato. Gov. illustr. p. 67. las radiadas; y tallo en va-
 ritas.

Aster foliis serratis, pe- Aster con hojas aserradas;
dunculis simplicibus late- pedunculos sencillos, latera-
ralibus unifloris longitudine les, foliosos, con una flor, y
folii foliosis. Hort. cliff. 409. del largo de las hojas.

Virga-aurea major, fo- Virgaurea mayor, con ho-
liis glutinosis, & graveo- jas glutinosas y de olor pe-
lentibus. Tourn. p. 580. sado.
 Vaill. act. 579.

Conyza mas, Theophras- Conyza masculina de Theo-
ti, major Dioscoridis. C.B. phrasto, llamada mayor por
 P. 265. Dioscorides.

Conyza major. Dod. pempt. Conyza mayor.
 51. Clus. hist. 2. p. 20.

Cast. Erigeron viscoso. vulgo: Olivarda. Farm. Conyza
mayor. Pulicaria. Conyza mas.

Habita en la Francia Narbonense y en Italia: en la Man-
cha, Murcia, Castilla la vieja, Aragon, Cataluña y
en otras muchas partes de España. 2

Posee el tallo derecho, apretado y rígido: las hojas que
abrazan el tallo, crasas, ásperas, salpicadas de pelo,
viscosas, con algunas glandulas interpuestas, redobla-
das por su base y de olor pesado: los pedunculos con
dos hojuelas, de una flor y apenas mas largos que las
hojas: y las flores radiadas.

PROPIED. Las hojas machacadas en forma de cataplasma
restringen y curan las llagas recientes.

2. ERIGERON *foliis sub-* Erigeron con hojas casi
linearibus integerrimis, ra- lineares y enterisimas; ra-
mis lateralibus multifloris. mas laterales y de muchas
 flores.

Erigeron ramis laterali- X *Erigeron* con ramas late-
bus multifloris , foliis lan- X rales y de muchas flores; ho-
ceolatis integerrimis , caly- X jas lanceoladas , enterisimas;
cibus squarrosis. Spec. pl. 3. X y cálices desparramados.
 p. 1210. Amoen. acad. 4. p.
 290.

Erigeron foliis lanceola- X *Erigeron* con hojas entre
to-linearibus integerrimis X lanceoladas y lineares, ente-
sessilibus decurrentibus , X risimas, sentadas y escurri-
ramis multifloris , corollis X das; ramas de muchas flo-
radiatis , caule pyramidato. X res; corolas radiadas; y ta-
 Gou. illustr. p. 67. X llo en piramide.

Virga-aurea minor , fo- X *Virgaurea* menor, con ho-
liis glutinosis & graveo- X jas glutinosas y de olor pesa-
lentibus. Tourn. p. 484. X do.

Conyza femina Theophras- X *Conyza* femenina de Theo-
ti , minor Dioscoridis. C. B. X phrasto, llamada menor por
 P. 261. X Dioscorides.

Conyza minor vera. Lob. X *Conyza* menor verdadera.
 ic. 346. Barr. ic. 370. X

Cast. *Erigeron* de olor pesado. *vulgo*: Olivardilla.

Habita en Mompeller y en Oriente: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña, Castilla la vieja y en otras muchas partes de España. ☉

Arroja los tallos derechos y de color que tira á purpúreo: las ramas por debaxo alternas y sencillas: las hojas sin peciolo, lanceoladas, enterisimas, algo ásperas, de olor pesado y salpicadas de pelos muy pequeños y viscosos en su ápice: los pedunculos por arriba laterales, solitarios, de una flor y con algunas hojuelas mas largas que ella: el caliz oblongo, con escamas extendidas y de color purpúreo en su ápice antes de abrirse la flor: la corola amarilla, chica, con el radio menudo y derecho.

Gluti-
nosum

3. *ERIGERON foliis lan-* X *Erigeron* de hojas entre
ceolato-linearibus piloso-vis- X lanceoladas y lineares, con
cidis , pedunculis unifloris. X pelo viscoso; y pedunculos
 Ger. prov. 205. X de una flor.

Conyza montana, *foliis glutinosis*, *pilosis*. C. B. P. 265. Rai. hist. 256. *Conyza montana*, con hojas glutinosas y pelosas.

Conyza montana, *saxatilis*, *Hissopifolio villosa glutinosa*, *Hispanica*. Barr. ic. 158. *Conyza montana*, saxátil, de España, con hoja como la del Hisopo, vellosa y glutinosa.

Conyza montana, *Myconis*. Dalech. hist. 1200. *Conyza montana*, del Doct. Micó.

Cast. Erigeron glutinoso.

Habita en lugares montuosos y maritimos de Francia y España. 4

Tiene pocos *pedunculos*, alternos y de una flor: y las flores de color purpúreo.

Siculum. 4. ERIGERON *calycinis squamis inferioribus laxis*, *florem superantibus*, *pedunculis foliosis*. Hort. cliff. 407. Erigeron con las escamas inferiores del caliz laxas, mas altas que la flor; y pedunculos foliosos.

Conyza Sicula, *annua*, *foliis atro-virentibus*, *caule rubente*. Bocc. sic. 62. t. 31. f. 4. Moris. hist. 3. p. 115. sect. 7. t. 20. f. 28. Pluk. phyt. t. 168. f. 2. *Conyza* de Sicilia, annua, con hojas de color entre negro y verde; y tallo que tira á roxo.

Conyza caulibus rubentibus, *tenuioribus*, *flore luteo nudo*. Magn. monsp. 17. t. 76. *Conyza* con los tallos de color que tira á roxo, mas delgados; flor amarilla y desnuda.

Conyza species foliis Virgæ aureæ. Bauh. hist. 2. p. 1049. Especie de *Conyza* con hojas como las de la Virgaurea.

Cast. Erigeron de Sicilia.

Habita en lugares pantanosos de Sicilia y Mompeller. ☉ Echa las flores sin radio y mas pequeñas; los *pedunculos* cubiertos de hojas lineares, encorvadas ácia atrás y menudas. En quanto á las demas partes es muy semejante al *Erigeron* de olor pesado y á la *Inula pulicaria*.

Ca-
rolinia-
num. 5. ERIGERON *caule pa-
niculato, floribus subsoli-
tariis terminalibus, foliis
linearibus integerrimis.* Erigeron con el tallo en
panoja; flores casi solitarias,
terminales; hojas lineares y
enterisimas.

Virga aurea Carolinensis, Virgaurea de la Carolina,
Linariae Monspensulanæ fo- con hojas como las de la Li-
liis. Dill. elth. 412. t. 306. naria de Mompeller.
f. 393.

Cast. Erigeron de la Carolina.

Habita en la Carolina.

Can-
dense. 6. ERIGERON *caule flo-* Erigeron de tallo y flores
ribusque paniculatis, hir- en panoja, con pelo áspero;
tis, foliis lanceolatis cilia- hojas lanceoladas y pestaño-
tis. sas.

Erigeron caule floribus- Erigeron con tallo y flo-
que paniculatis. Hort. cliff. res en panoja.
407.

Conyzella. Dill. cat. app. Conyzela.
142.

Conyza annua, acris, al- Conyza annua, acre, mas
ba, elatior, Linariae foliis. levantada, con la flor blan-
Moris. hist. 3. p. 115. sect. 7. ca; y hojas como las de la
t. 20. f. 29. Bocc. sic. 85. Linaria.
t. 46.

Virga aurea Virginiana, Virgaurea de Virginia,
hirsuta, flore pallido. Zanon. con pelo áspero; y flor pá-
hist. 1. p. 204. t. 78. lida.

Cast. Erigeron del Canadá.

Habita en el Canadá y en la Virginia; y se ha hecho in-
digena en la Europa austral: en los circuitos de Ma-
drid, en Aragon, Cataluña, y otras muchas partes de
España. ☉

Bona-
riense. 7. ERIGERON *foliis ba-* Erigeron con hojas re-
si revolutis. Mill. dict. n. 3. vueltas en su base.
Murray prodr. 179.

Erigeron foliis inferioribus dentato-laciniatis, superioribus integris. Hort. cliff. 407. Erigeron con las hojas inferiores entre dentadas y laciniadas, y las superiores enteras.

Senecio Bonariensis, purascens, foliis imis coronopifolius. Dill. elth. 344. t. 257. f. 334. Senecio de Buenos-ayres, de color que tira á purpúreo, con las hojas de abaxo como las del Coronopo.

Cast. Erigeron de Buenos-ayres.
Habita en la America austral. ☉

Jamaicens. 8. ERIGERON caule paucifloro subvilloso, foliis cuneiformi-lanceolatis, serratis utrinque duabus. Amoen. acad. 5. p. 406. Erigeron con el tallo de pocas flores y algo veloso; hojas entre en forma de cuña y lanceoladas, con dos aserraduras en ambas partes.

Senecio minor, Bellidis majoris folio. Sloan. jam. 125. hist. 1. p. 260. t. 152. f. 3. Senecio menor, con hoja como la de la Belide ó Margarita mayor.

Senecio tomentosus, foliis oblongo-ovatis levissimè denticulatis, petiolis brevibus. Brown. jam. 320. Senecio tomentoso, de hojas entre oblongas y aovadas, muy ligeramente dentadas; y con peciolo cortos.

Cast. Erigeron de Jamaica.
Habita en la Jamaica.

Philadelphicum. 9. ERIGERON caule multifloro, foliis lanceolatis subserratis, caulinis semiamplexicaulibus, flosculis radii capillaceis longitudine disci. Erigeron con el tallo de muchas flores; hojas lanceoladas, algo aserradas, las del tallo que le abrazan la mitad; flosculos del radio capilares y del largo del disco.

Cast. Erigeron de Filadelfia.
Habita en el Canadá. Kalm. 24

Ægyptiacum

10. ERIGERON *foliis semiamplexicaulibus spatulatis dentatis, floribus globosis.*

Erigeron con hojas que abrazan la mitad del tallo, en forma de espátula, dentadas; y flores globosas.

Erigeron serratum. Forsk. Erigeron aserrado.

ægypt. 148.

Conyza capitata seu globosa. Bocc. sic. 13. t. 7. f. B. Conyza de flor en cabeza ó globosa.

Moris. hist. 3. p. 114. sect.

7. t. 20. f. 14.

Cast. Erigeron de Egipto.

Habita en Sicilia y Egipto. ☉

Produce el tallo derecho, del largo de pie y medio, un poco estriado, verdoso y con vello algo viscoso: las hojas alternas, sentadas, que casi abrazan la mitad del tallo, en forma de espátula, ó entre aovadas al revés y lanceoladas, algo obtusas, un poco vellosas y con algunos dientes (*casi cinco*); pero enteras por su base: las ramas que salen de las axilas superiores: quatro ó cinco flores terminales, casi redondas, con los pedunculos de color que tira á purpúreo: el caliz con escamas alesnadas y las de mas adentro casi de color sanguineo por su ápice: las corolas amarillas, con los flosculos menudos; y los radios desnudos, muy copiosos, con los pistilos amarillos, los quales se desvanecen pronto, y que casi ciñen el disco, mediante un anillo ancho y lanudo.

Gouani.

11. ERIGERON *floribus congestis, calycibus scariosis, foliis lanceolatis subdentatis margine scabris.*

Erigeron con flores amontonadas; cálices escariosos ó membranosos; hojas lanceoladas, con algun diente y ásperas por su margen.

Erigeron pedunculis multifloris corymbosis, foliis radicalibus petiolatis ovatis, caulinis linearibus lanceolatis sessilibus. Gov. illust. p. 66.

Erigeron con pedunculos de muchas flores, y corimbosos; hojas radicales con peciolo, y aovadas, las del tallo lineares, lanceoladas y sin peciolo.

Cast. Erigeron de Gouan.

Ha-

Habita..... ☉

Produce la *raiz* despuntada : el *tallo* rollizo , derecho , del largo de un pie , sencillo y con pelos levantados : las *hojas* alternas , que abrazan la mitad del tallo , en forma de espátula , lisas , con algunas aserraduras algo agudas , y un poco pestafiosas por su margen y quilla : las *flores* en panoja : el *caliz* casi redondo y apiñado , con escamas lanceoladas , desnudas , convexas , apretadas , escariosas por su margen y algo obtusas : las *corolillas* *fementinas* sin petalo y mas abundantes que las hermafroditas : y el *estigma* hendido en dos partes y oblongo. Se asemeja mucho al *Erigeron de Egipto*.

Acre. 12. ERIGERON *pedunculis alternis unifloris*. Hort. Erigeron con pedunculos alternos y de una flor.
cliff. 407.

Erigeron caule alterné ramoso , petiolis unifloris , semiflosculis pappum æquantibus. Hill. helv. n. 58. Erigeron con el tallo alternadamente ramoso ; piecitos de una flor ; y semiflosculos iguales al vilano.

Conyza cœrulea , acris. C. B. P. 265. Conyza acre, y con la flor cerúlea.

Aster arvensis , cœruleus , acris. Tourn. p. 481. Aster arvense , acre , con la flor cerúlea.

Amellus montanus Æquicolum. Col. ecphr. 2. p. 25. Amelo que se cria en los montes Equicolores (*de Italia*).
t. 26.

Cart. Erigeron acre.

Habita en lugares abrigados y secos de Europa : en los circuitos de Madrid , en Cataluña , Aragon y otras partes de España. 24

Alpim. 13. ERIGERON *caule subbifloro , calyce subhirsuto , foliis obtusis subvilosis*. Scop. carn. ed. 2. n. 1061. Erigeron con el tallo casi de dos flores ; caliz con algun pelo áspero ; hojas obtusas y por debaxo vellosas.

358 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Erigeron caule alternè ramoso, petiolis unifloris, semiflosculos. pappum superantibus. Hall. helv. n. 86. R. Erigeron con el tallo alternadamente ramoso; piececitos de una flor; y semiflosculos mas altos que el vilano.

Erigeron uniflorum. Oed. dan. t. 292. Erigeron de una flor.

Conyza cærulea, alpina, major (& minor). C. B. P. 265. Prodr. 124. Burs. XV. 33. Conyza alpina, mayor (y menor), con la flor cerúlea.

Aster atticus, cæruleus, major (& minor). Tourn. p. 481. Aster attico, mayor (y menor), con la flor cerúlea.

Asteri montano purpureo similis seu Globulariæ. Bauh. hist. 2. p. 107. Planta parecida al Aster montano de flor purpúrea, ó á la Globularia.

Cast. Erigeron alpino.

Habita en los alpes de Suiza y de la Carniola. 24

Tiene el vilano de color rubio ferrugineo. Es muy semejante á la especie siguiente y acaso sola variedad de ella. Fuera de los alpes varía con el tallo en panoja: y el caliz lampiño.

Uni- 14. ERIGERON caule unifloro, calyce piloso. Hort. cliff. 407. Erigeron con el tallo de una flor; y caliz peloso.

Erigeron caule unifloro, calyce tomentoso, radiis semiflosculosis. Hall. helv. n. 87. Erigeron con el tallo de una flor; caliz tomentoso; y radios semiflosculosos.

Aster caule unifloro, foliis integerrimis, calyce villosa subrotundo. Fl. lapp. 307. t. 9. f. 3. Aster con el tallo de una flor; hojas enterisimas; caliz vellosa y casi redondo.

Aster montanus, cæruleus, omnium minimus. Tourn. p. 481. Rai. hist. 3. p. 120. Hall. R. Aster montano, mas pequeño que todos, con la flor cerúlea.

Cast. Erigeron de una flor.

Habita en los alpes de Lapponia y Suiza. 24

Grami- 15. ERIGERON *caule* X Erigeron con el tallo de
neum. *unifloro , foliis linearibus* X una flor; hojas lineares, pes-
ciliatis scabris. X tañosas y ásperas.

Aster caule unifloro, lon- X Aster con el tallo de una
gitudine foliorum linea- X flor, y del largo de las hojas
rium. Gmel. sib. 2. p. 174. X lineares.
t. 76. f. 2.

Aster acaulos, albus, fo- X Aster sin tallo, con la flor
liis Gramineis Amm. ruth. X blanca; y hojas como las de
215. X la Grama.

Cast. Erigeron gramineo.

Habita en la Siberia. Gmel. 24

Es planta muy pequeña, y cercada de hojas marchitas y áridas.

Cam- 16. ERIGERON *foliis* X Erigeron de hojas entre
phora- *lanceolato-ovatis villosis,* X lanceoladas y aovadas, ve-
tum. *serraturis apice cartilagi-* X llosas y con aserraduras car-
neis. Hort. ups. 259. Gron. X tilaginosas por su ápice.
virg. 122.

Baccharis foliis ovato- X Baccara con hojas entre ao-
lanceolatis , serratis , caule X vadas y lanceoladas, aserra-
herbaceo. Gron. virg. 1. p. X das; y tallo herbáceo.
57. X

Cast. Erigeron alcanforado.

Habita en la Virginia. ☉

Tube- 17. ERIGERON *foliis li-* X Erigeron con hojas linea-
rosum. *nearibus , ramis unifloris,* X res; ramas de una flor; y
caule suffruticoso. Gron. X tallo sufruticoso.
orient. 266.

Erigeron foliis lanceola- X Erigeron de hojas entre
to-oblongis denticulatis, X lanceoladas y oblongas, con
pedunculis longis termina- X dientecitos; pedunculos lar-
libus unifloris. Gou. illustr. X gos, terminales y de una
p. 67. X flor.

360 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Aster maritimus*, *tuberosus*, *luteus*. Tourn.p. 483. *Aster maritimo*, con la raíz tuberosa; y flor amarilla.
- α *Chondrilla bulbosa*, *Syriaca*, *foliis angustioribus*. C. B. P. 130. *Condriila bulbosa*, de Siria, con hojas mas angostas. x
- Chondrilla altera*, *Dioscoridis putata*. Clus. hist. 2. p. 145. Otra Condriila tenida por la de Dioscorides.
- Conyza marina*. Moris. hist. 3. p. 114. sect. 7. t. 19. f. 20. bona. *Conyza marina* (*maritima*).
- β *Chondrilla bulbosa*, *Syriaca*, *feliis latioribus*. C. B. P. 130. *Condriila bulbosa*, de Siria, con hojas mas anchas. β
- Conyza tuberosa*, *lutea*, *foliis angustis & rigidis*. Magn. monsp. 77. Moris. hist. 3. p. 114. sect. 7. t. 20. f. 15. *Conyza* con la raíz tuberosa; flor amarilla; y hojas angostas y rígidas.
- x *Aster Conyzoides*, *Gesneri*. Moris. hist. 3. p. 118. sect. 7. t. 22. f. 7. *Aster* de Gesnero, parecido á la *Conyza*. x

Cast. *Erigeron tuberoso*.

Habita en la Siria, Provenza y Narbona: en Cataluña, Valencia y otras partes de España.

Arroja el tallo corto y leñoso: las ramas sencillas y de una flor: las hojas esparcidas, lanceoladas, con el peciolo corto y enterisimas: las flores amarillas, con traza de las del *Aster*, terminales y sin pedunculo: y el vilano de color gris.

- Feetidum. 18. *ERIGERON foliis lanceolato-linearibus retusis, floribus corymbosis*. *Erigeron* con hojas entre lanceoladas y lineares, terminadas en seno obtuso; y flores corimbosas.
- Senecio Africanus*, *folio retuso*. Mill. dict. n. 7. ic. t. 233. *Senecio* de Africa, con hoja terminada en seno obtuso.

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 361

Senecio foetidus, Africa-~~X~~ Senecio fétido, de Africa,
nus, perennis, foliis con-~~X~~ perenne, con hojas amonto-
fertim nascentibus. Pluk.~~X~~ nadas.

alm. 343. t. 223. f. 4.

Conyza Africana, Sene-~~X~~ Conyza de Africa, con la
cionis flore, retusis foliis.~~X~~ flor como la del Senecio; y
Herm. lugdb. 661. t. 662.~~X~~ hojas terminadas en seno ob-
tuso.

Cast. Erigeron fétido.

Habita en Africa. 24

Es muy parecido á la *Inula fétida*; pero posee las flores flosculosas.

Obli-
quum. 19. ERIGERON ramo-~~X~~ Erigeron muy ramoso,
sissimum, foliis ovatis obli-~~X~~ con hojas aovadas y obli-
quis.~~X~~ quas.

Cast. Erigeron obliquo.

Habita en la India Oriental. ☉

Produce el tallo herbáceo, del largo de un palmo, rollizo, derecho, peloso y muy ramoso: las ramas que salen de todas las axilas; las inferiores gradualmente mas largas, difusas, por arriba ahorquilladas y opuestas: las hojas alternas, sin peciolo, que abrazan la mitad del tallo, aovadas, venosas, sin arrugas, frágiles y con pelos claros; casi desnudas por debaxo, con dientecitos, algo agudas, y entre ondeadas y obliquas: las flores solitarias, del largo del pedunculo y abundantes: el caliz cilindrico y velloso, con hojuelas ó escamas numerosas, alesnadas, iguales y acercadas: las corolas amarillas: las corolillas del disco hermafroditas, y con cinco dientes; las del radio muy pequeñas, copiosas y femeninas: los estigmas del disco derechos; y los del radio extendidos.

Tri-
cunea-
tum. 20. ERIGERON fruticu-~~X~~ Erigeron fruticuloso, con
losum, foliis cuneatis tri-~~X~~ hojas en forma de cuña y
lobis. Suppl. p. 368.~~X~~ hendidas en tres lóbulos.

Cast. Erigeron de tres cuñas.

Habita en México. Mutis. 7

362 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Es *arbusto* muy pequeño, con muchas ramas, ó en panoja y folioso. Echa las *hojas* alternas, con el peciolo corto, en forma de cuña, apenas del largo de una uña y desnudas: algunas *flores* terminales, amontonadas, sin piececito y tan largas como la hoja: el *caliz* de la magnitud de una semilla de lenteja: los *flosculos femeninos* en el ámbito sin pétalos y abundantes: el *vilano* casi mas largo que el caliz y sencillo.

Pinna-
tum.

21. ERIGERON *foliis* X Erigeron con hojas hendi-
pinnatifidis dentatis. Suppl. X das al través y dentadas.
p. 368. X

Cast. Erigeron pinnado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Bladb.*

Posee el *tallo* herbáceo, derecho, del largo de un pie, algo erizado y sencillo: las *hojas* alternas, del largo de un dedo, hendidas al través, casi dentadas y un poco ásperas: las *flores* terminales, algo conglobadas, amarillas y de la magnitud de las del *Erigeron acre*; con el *vilano* blanco.

1136. Género TUSSILAGO. * *Tourn. t. 279. Vaill.*

A. G. 1720. f. 46. Petasites. Tourn. t. 258.

Vaill. A. G. 1719.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* cilindrico; con *escamas* entre lanceoladas y lineares (*de quince á veinte*), iguales, tan altas como el disco y algo membranosas.

COR. *compuesta* varia: en unas especies con todas las *corolillas* hermafroditas, y tubulosas; ó solamente en el disco.

En otras especies los *flosculos* femeninos sin *corolillas*; y en otras con ellas y liguladas.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo; con el *borde* hendido en quatro ó cinco partes, agudo, redoblado y mas largo que el caliz.

De la femenina: ninguna, ó ligulada, muy angosta, mas larga que el caliz y entera.

Es-

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 363

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : *germen* corto : *estilo* filiforme, y mas largo que el estambre : con el *estigma* gruesecito.

En las femeninas : *germen* corto : *estilo* filiforme , del mismo largo que en la hermafrodita : con el *estigma* hendido en dos partes y gruesecito.

PERIC. ninguno : el *caliz* apenas mudado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : oblongas y comprimidas : y el *vilano* peloso y con estípites.

En las femeninas (*si las hay*) muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. desnudo.

OBS. *Alguna vez se halla con el caliz calzado.*

La Sombreira de Tourn. *carece de flosculos ligulados en el radio; y en algunos individuos se hallan flosculos femeninos desnudos , en el mismo radio.*

El Tusilago del citado Tourn. *tiene siempre flosculos femeninos en el radio y ligulados.*

La especie llamada Tusilago Anandria *posee el vilano sin estípites.*

El Tusilago frio *varía con flores flosculosas y radiadas.*

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEF.

TUSSILAGO. P. 487.

La *flor* es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos, y la corona de semiflosculos, sentados en el embrión , y comprendidos en el caliz hendido en muchas partes. Los embriones pasan á semillas adornadas de vilano y fixadas en el talamo. A estas notas se añade la de las flores que nacen primero que las hojas.

PETASITES. P. 451.

La *flor* es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes , sentados en el embrión , y comprendidos en un caliz cilíndrico y hendido tambien en muchas partes : y el embrión pasa á semilla adornada de

364 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

de vilano. A estas notas se añade la de nacer las flores (segun Raio) primero que las hojas.

ESPECIES.

Anandria.

1. TUSSILAGO *scapo* X Tusilago con el escapo de
unifloro squamoso erecto, fo- X una flor , escamoso , dere-
liis lyrato-ovatis. Mill. dict. X cho ; y hojas entre en forma
n. 2. X de lira y aovadas.

Tussilago scapo unifloro, X Tusilago con el escapo de
calyce clauso. Hort. ups. 259. X una flor ; y caliz cerrado.

t. 3. f. 1. Gmel. sib. 2. p. 141.

t. 68. f. 1.

Anandria . Amœn. acad. Flor sin estambres.

1. p. 120. t. 11.

2. *Tussilago scapo unifloro*, X Tusilago con el escapo de
calyce subaperto. Gmel. sib. X una flor ; y caliz algo abier-
1. p. 143. t. 67. f. 2. X to. α

Cast. Tusilago sin estambres.

Habita en la Siberia. 24

Tiene el vilano sin estipite y peloso. En lugares mas frios posee el caliz cerrado y la flor flosculosa ; pero en los mas calientes echa la flor radiada y abierta.

Se persuadió Siegesbeck haber hallado una especie de planta con las flores sin anteras ; y por esta razon la puso el nombre de *Anandria* ; con cuyo principio , pretendió destruir el fundamento del sistema sexual de Linneo ; pero habiendo examinado los discipulos del mismo Linneo la fructificacion de esta planta, hallaron en ella las anteras y quantos caracteres eran necesarios para colocarla en el género de *Tussilago* ; y la dieron ironicamente el nombre trivial de *Anandria*.

Dentata.

2. TUSSILAGO *scapo* X Tusilago con el escapo de
unifloro ebracteato , foliis X una flor y sin bracteas ; ho-
lanceolatis dentatis villosis. X jas lanceoladas , dentadas y
Burm. ind. Plum. 28. † X vellosas.

Aster acaulos , Hieracii X Aster sin tallo ; con hojas
villosis foliis . Plum. spec. X como las del Hieracio y ve-
10. ic. 40. f. 2. X llosas.

Cast.

Cast. Tusilago dentado.

Habita en la America.

- Nu-
tans.
3. TUSSILAGO *scapo* X Tusilago con el escapo de
unifloro ebracteato, flore nu- X una flor y sin bracteas; flor
tante, foliis lyratis obtusis. X cabizbaxa; hojas en forma de
Amoen. acad. 5. p. 406. X lira y obtusas.
- Leontodon foliis radica-* X Leontodon con las hojas
libus oblongis, ovaris, sub- X radicales oblongas, aovadas,
rus lanuginosis, incanis, X lanuginosas por debaxo y
scapo simplici, nudo, uniflo- X blanquecinas; escapo sencii-
ro. Brown. jam. 316. X lio, desnudo y de una flor.
- Dens Leonis folio subtus* X Diente de Leon con hoja
incano, flore purpureo. X blanquecina por debaxo; y
Sloan. jam. 123. hist. 1. p. flor purpúrea.
255. t. 150. f. 2.
- Aster Primulæ veris fo-* X Aster de hoja como la de
lio, flore singulari, purpu- X la Primulaveris; con una so-
reo. Plum. spec. 14. ic. 41. X la flor y de color purpúreo.
f. 1. X

Cast. Tusilago inclinado.

Habita en la America.

- Alpina
4. TUSSILAGO *scapo* X Tusilago con el escapo
subnudo unifloro, foliis cor- X casi desnudo y de una flor;
dato-orbiculatis crenatis. X hojas entre de figura de co-
Hort. cliff. 411. Jacq. austr. X razon y redondas, y recor-
t. 246. X tadas.
- Petasites scapo unifloro,* X Sombrera con el escapo
foliis reniformibus. Hall. X de una flor; y hojas en for-
helv. n. 142. Planta adulta; X ma de ríñon.
- Tussilago alpina, rotun-* X Tusilago alpino, lampi-
difolia, glabra. C. B. P. X ño, y con hoja redonda.
197. X
- Tussilago alpina II.* Clus. X Tusilago alpino, segundo.
hist. 2. p. 1131. X
- Tussilago alpina, rotun-* X Tusilago alpino, blanque-
difolia, canescens. C. B. P. X cino, con hoja redonda. X
197. X

Tus-

366 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Tussilago discolor.* Jacq. X Tusilago de dos colores.
 austr. t. 247.
Petasites. Hall. helv. n. X Sombrerera.
 142. Planta junior.
Tussilago alpina I, *flore* X Tusilago alpino, primero,
evanido. Clus. hist. 2. p. 113. X con la flor desvanecida.

Cast. Tusilago alpino.

Habita en los alpes de Suiza, Austria, Bohemia y Siberia: en los montes de Asturias, de Navarra y en otras partes de España. 24

La flor es flosculosa; con los *flosculos* femeninos en el ámbito: y el *escapo* del largo de un palmo, con una ú otra bráctea.

- Far- 5. TUSSILAGO *scapo* X Tusilago con el escapo
 fara. *imbricato unifloro*, *foliis* X cubierto de escamas apañi-
subcordatis angulatis den- das, y de una flor; hojas casi
ticulatis. Hort. cliff. 411. X de figura de corazon, angu-
 Mat. med. 213. Flor. dan. X ladas y con dientecitos.
 595. Knorr. del. 1. t. H. 10.
Petasites scapo unifloro, X Sombrera con el escapo
flore radiato. Hall. helv. n. X de una flor y radiada.
 143.
Tussilago vulgaris. C. B. X Tusilago vulgar.
 P. 197. Tourn. p. 487.
Tussilago. Clus. hist. 120. X Tusilago.
 Cam. epit. 590. t. 591. X

Cast. Tusilago Farfara.

Habita en terrenos arcillosos y humedos de Europa: en la Sierra de Miraflores, en el Paular de Segovia, en los montes de Burgos, de la Alcarria, de Cataluña, Aragon y en otras muchas partes de España. 24

Tiene las flores radiadas; con las *corolillas del radio* enterisimas: y el *vilano* sin estipite. *Leers.*

PROPIED. Toda la planta es *pectoral* y se usa en la tos, en la asma y tisis.

- Japo- 6. TUSSILAGO *floribus* X Tusilago con flores alter-
 nica. *alternis radiatis.* X nas y radiadas.

Arnica Tussilaginea. X Arnica como Tusilago.

Burm. ind. 182.

Doronicum Tussilaginis X Doronico con hoja como
folio. Pluk. amalth. 71. t. la del Tusilago.

390. f. 6. Burm.

Cast. Tusilago del Japon.

Habita en el Japon. *Kleinboff*. 2

Posee las *hojas radicales* de figura de corazon, casi re-
dondas, con dientecitos desfigurados, tomentosas por
debaxo y de la magnitud de las de la *Calta*: el *escapo*
del largo de un pie, desnudo y veloso: las *flores* al-
ternas, con pedunculo, amarillas y de la magnitud de
las de la *Arnica*: una *bractea* lanceolada, baxo del pie-
cecito, y mas corta que él: el *caliz* de muchas hojuelas,
y algo apiñado por su base: y los *piececitos* del largo
de la flor.

Fri- 7. TUSSILAGO *thyrsos* X Tusilago con la panoja
gida. *fastigiato, floribus radia-* elevada en ramillete hori-
tis. Flor. lapp. 303. Oed. zontal; y flores radiadas.
dan. t. 61.

Tussilago scapo imbrica- Tusilago con el escapo cu-
to, floribus spicatis radia- bierto con hojuelas ó bracteas
tis, foliis infra incanis, apiñadas; flores en espiga,
acutis. Gmel. sib. 2. p. 150. radiadas; hojas agudas y por
t. 70. debaxo blanquecinas.

Cacalia tomentosa. C. B. X Cacalia tomentosa.

P. 198. Prodr. 102. Tourn.

P. 452. Scheuch. alp. 130.

t. 18. f. 1.

Cast. Tusilago frio.

Habita en los alpes de Lapponia, Suiza y Siberia; en los
montes de Asturias y en otros de España. 2

Varia con las *flores* flosculosas y radiadas.

Alba. 8. TUSSILAGO *thyrsos* X Tusilago con la panoja
fastigiato, flosculis femi- elevada en ramillete hori-
neis nudis paucis. Hort. cliff. zontal; pocos flosculos feme-
411. Pall. it. 1. p. 38. Flor. ninos y desnudos.
dan. t. 524.

368 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Petasites minor*. C. B. P. X Sombrerera menor.
 197. Tourn. p. 451.
Petasites albus, angulo- X Sombrera con la flor blan-
 so folio. Bauh. hist. 3. p. 567. ca; y hoja angulosa.
Petasites flore albo. Cam. X Sombrerera con la flor
 epit. 593. blanca.

Cast. Tusilago blanco.

Habita en Europa: en Cataluña y otras partes de España. 24

Posee las flores flosculosas, con los flosculos femeninos en el ámbito.

- Hy- 9. TUSSILAGO thyrso X Tusilago con la panoja
 brida. oblongo, flosculis femineis, oblonga; y muchos flosculos
 nudis plurimis. Hort. cliff. femeninos desnudos.
 411. Pall. it. 1. p. 36.
Petasites major, floribus X Sombrerera mayor, con
 pedunculis longis insidenti- las flores sentadas en pedun-
 bus. Dill. elth. 309. t. 230. culos largos.
 f. 297.
Petasites in medio majo- X Sombrerera con los flos-
 ribus flosculis, reliquis mi- culos que están en medio ma-
 noribus. Buxb. hal. 258. yores, y los restantes mas
 pequeños.

Cast. Tusilago híbrido.

Habita en Alemania y Holanda. 24

Tiene las flores flosculosas; y el vilano sin estipite. Leers.

- Peta- 10. TUSSILAGO thyrso X Tusilago con la panoja
 sites. ovato, flosculis femineis, aovada; pocos flosculos fe-
 nudis paucis. Syst. veg. 629. meninos y desnudos.
 Mat. med. 214.
Tussilago thyrso ovato, X Tusilago con la panoja
 flosculis omnibus hermafro aovada, y todos los floscu-
 ditis. Hort. cliff. 411. Knorr. los hermafroditos.
 del. 2. t. T.
Tussilago major. Cam. X Tusilago mayor.
 epit. 592.

Petasites major & vul- X Sombrera mayor y vulgar.
garis. C. B. P. 197. Tourn. X
 P. 451. X
Petasites. Dod. pempt. X Sombrera.
 597. X

Cast. Tusilago *Petasites*. *vulgo* : Sombrerera.

Habita en la Europa mas templada , en los montes de Burgos , de Asturias , en Monseñ de Cataluña y otras partes de España. 24

Tiene el *vilano* sin estipite. *Leers*.

PROPIED. La raíz y flores *se tienen por sudorificas y alexiterias*.

1137. Género SENECIO. * *Tourn. t. 260. Dill.*

elth. 258. Vaill. A. G. 1719. Jacobæa.

Tourn. t. 276.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun calzado , cónico , por arriba cilindrico y truncado ; con muchas *escamas* alesnadas , paralelas , contiguas , iguales , mas pocas en la base , apiñadas , y que la cubren ; y esfaceladas ó como quemadas por su ápice.

COR. *compuesta* mas alta que el caliz ; con numerosas *corolillas* hermafroditas , tubulosas , en el disco , y femeninas , en el radio.

Propia en la hermafrodita : en forma de embudo ; con el *borde* redoblado y hendido en cinco partes.

En las femeninas : oblonga y con tres dientes poco manifestos.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco , capilares y muy pequeños : con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en ambas : *germen* aovado : *estilo* filiforme , del largo de los estambres : con dos *estigmas* oblongos y revueltos.

PERIC. ninguno : el *caliz* cónico y cerrado hace sus veces.

SEM. en ambas : aovadas ; con el *vilano* sencillo y largo.

RECEPT. desnudo y plano.

370 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.
 OBS. El Senecio de Tourn. carece de radio en la flor ; pero goza de él la Jacobea del mismo Autor.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.
 SENECIO. p. 456.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes , sentados en el embrión , y comprendidos en el caliz cilindrico , de una pieza, hendido en muchas partes, y ultimamente ó por arriba en forma de cono : el embrión pasa á semilla adornada de vilano , en cuyo tiempo el caliz suele volverse ácia abaxo.

JACOBÆA. p. 485.

La flor es radiada ó que su disco se compone de muchos flosculos, y la corona de semiflosculos, sentados en el embrión , y comprendidos en el caliz , en forma de tubo y hendido en muchas partes : y los embriones pasan á semillas adornadas de vilano y fixadas en el receptaculo.

ESPECIES CON LAS FLORES FLOSCULOSAS.

Hieracitolius.	I. SENECIO <i>corollis nudis, foliis amplexicaulibus laceris, caule herbaceo erecto.</i> Hort. ups. 261.	X	Senecio con las corolas sin radio; hojas amplexicaules, laceradas; tallo herbáceo y derecho.
	<i>Senecio foliis lanceolatis amplexicaulibus lævibus acutè sinuatis denticulatis, caule herbaceo.</i> Hort. cliff. 406.	X	Senecio de hojas lanceoladas, amplexicaules, lisas, con dientecitos y senos agudos; y tallo herbáceo.
	<i>Senecio Americanus, altissimus, Blattaria seu Hieracii folio.</i> Herm. parad. 226. t. 226. Pluk. phyt. t. 112. f. 1.	X	Senecio de America, muy alto, con hoja como la de la Blattaria, ó del Hieracio.
		X	

Cast. Senecio con hoja de Hieracio.

Habita en la America septentrional. ☉

Arroja el tallo del largo de pie y medio, craso, rígido y me-

menos en panoja que en las demas especies: las *hojas del tallo* lanceoladas, con alguna aserradura, é inclinadas; y las de las *ramas* enterisimas: el *caliz* apiñado, con hojuelas derechas: el *disco de la corola* aovado, con los flosculos pequeños y pálidos: y el *estilo* de color amarillo-roxo. El *radio* es blanco y tan corto que apenas se puede llamar tal.

Purpureus.

2. *SENECIO corollis nudis, foliis lyratis hirtis, superioribus lanceolatis dentatis.* Berg. cap. 276.

Senecio con las corolas sin radio; hojas en forma de lira, con pelo áspero, y las superiores lanceoladas y con dientes.

Senecio viscosus, Æthiopicus, flore purpureo. Breyn. cent. 139. t. 67.

Senecio viscoso, de Etiopia, con la flor purpúrea.

Cast. Senecio purpúreo.
Habita en Etiopia.

Persicifolius.

3. *SENECIO corollis nudis, foliis lanceolatis integerrimis basi dentatis.* Amoen. acad. 6. afr. 62.

Senecio con las corolas sin radio; hojas lanceoladas, enterisimas y dentadas por su base.

Cast. Senecio con hoja de Persico.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Virgatus.

4. *SENECIO corollis nudis, foliis lyratis subtus tomentosis, pedunculis unifloris, squamis subulatis.* Amoen. acad. 6. afr. 63.

Senecio de corolas sin radio; hojas en forma de lira, tomentosas por debaxo; pedunculos de una flor; y con escamas alesnadas.

Cast. Senecio de varitas.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Divaricatus.

5. *SENECIO corollis nudis, foliis lanceolatis dentatis scabris, ramulis floriferis divaricatis.*

Senecio con las corolas sin radio; hojas lanceoladas, dentadas, ásperas; y ramitas que llevan las flores desparamadas.

Aa 2

Cast.

372 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Senecio desparramado.

Habita en la China. *Osbeck.*

Produce el tallo derecho, angulado, angosto, y de la altura de pie y medio: las hojas alternas, remotas, lanceoladas, con peciolo, entre aserradas y dentadas, y con tomento áspero: los rudimentos de las ramas que salen de las axilas de las hojas: algunos ramitos con flores muy divergentes por su base y que salen de las axilas superiores de las hojas: algunas flores terminales, pedunculadas; y los cálices adornados por su base de algunas escamas laxas y alesnadas.

Pseudo-China.

6. *SENECIO corollis nudis, scapo subnudo longissimo.* Roy. lugdb. 164. Senecio con las corolas sin radio; escapo casi desnudo y larguísimo.

Senecio Maderaspatanus, Rapi folio, floribus maximis, cujus radix a nonnullis China dicitur. Dill. elth. 345. t. 258. f. 335. Senecio de Madraspatan, con hoja como la de la Naba, y flores muy grandes; cuya raíz se llama China por algunos.

Cast. Senecio Falsa-China.

Habita en la India. 4

Vulgaris.

7. *SENECIO corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis.* Flor. dan. t. 513. Knorr. del. 2. t. S. 5. n. 5. Senecio con las corolas sin radio; hojas entre pinnadas y sinuosas, amplexicaules; y flores esparcidas.

Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, laciniis æqualibus patentissimis, rachis lineari. Hort. cliff. 406. Senecio de hojas hendidas al través, con dientecitos; sus lacinias iguales, muy extendidas, y el lomo linear.

Senecio minor, vulgaris. C. B. P. 131. Tourn. p. 456. Senecio menor, vulgar.

Erigeron minus. Dod. pempt. 641. Erigeron menor.

Cast. Senecio vulgar.

Habita en lugares cultivados y entre cascajales de Europa: en los circuitos de Madrid, y es muy común en todas las provincias de España. ☉

Tie-

Tiene el tallo fistuloso.

Ara-
bicus. 8. *SENECIO corollis nu-*X *Senecio con las corolas*
*dis, foliis subbipinnatis pe-*X *sin radio; hojas casi dos ve-*
*violatis levibus, calycibus*X *ces pinnadas, con peciolo,*
*intactis*X *lisas; y cálices intactos ó sin*
X *ser esfacelados.*

Cast. Senecio de Arabia.

Habita en Egipto. ♂

Echa el tallo del largo de pie y medio, y liso: las *hojas* tambien lisas, hendidas al través, ó sinuosas, dentadas, con peciolo y delgadas: los *pedunculos* de muchas flores; con los *piececitos* laterales y subdivididos: las *flores* como las del *Senecio vulgar*, amarillas, y con los cálices sin esfacelo.

Recli-
natus. 9. *SENECIO corollis nu-*X *Senecio con las corolas*
*dis, foliis linearibus spar-*X *sin radio; hojas lineares,*
*sis scabris recurvis, caule*X *esparcidas, ásperas, encor-*
frutescente. Suppl. p. 369. X *vadas ácia atrás; y tallo fru-*
X *tescente.*

Cast. Senecio reclinado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Arroja el tallo del largo de tres pies, verde, rollizo y herbáceo; pero persistente por debaxo, y que lleva algunos ramos en su base: las *hojas* esparcidas, del largo de un xeme, pegadas por su base, lineares, con una linea excavada, ásperas, ribeteadas por debaxo, encorvadas ácia atrás; y las *hojuelas de mas arriba* con algun diente en su base: las *flores* en panoja terminal, con algunas hojuelas esparcidas; y los *pedunculos* inclinados: el *caliz* cilindrico, con escamas esfaceladas en su ápice: el *calicito de la base* encorvado, igual y que casi se abre: las *corolas* flosculosas y amarillas.

Es diferente del *Senecio con hoja larga*; por las *corolas* sin radio; y por las *hojas* enterisimas y ásperas.

374 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cer-
nuus. 10. *SENECIO floribus* X Senecio con flores floscu-
flosculosis nubilibus cernuis, X losas y cabizbaxas antes de
foliis erosis auriculatis, X abrirse ó fecundarse; hojas
Suppl. p. 370. X rozadas y con orejillas.
Senecio rubens. Jacq. X Senecio de color roxo:
hort. 3. p. 50. t. 98. X

Cast. Senecio cabizbaxo.

Habita en Madagascar.

Produce el tallo del largo de un pie, derecho y herbáceo:
las *hojas* alternas, con peciolo, venosas, ásperas, ro-
zadas; y con dos *orejillas* anguladas como si fuesen
estipulas: los *pedunculos* que salen de la parte supe-
rior del tallo, largos, y los que no tienen la flor abierta
cabizbaxos y casi pendulos: las *flores* flosculosas ó sin
radio, de color de violeta y levantadas despues que se
han abierto: el *caliz* cilindrico, hinchado por su base y
ceñido con hojuelas lanceoladas.

Peu-
cedani
folius. 11. *SENECIO corollis* X Senecio con las corolas
nudis, foliis pinnatis fili- X sin radio; hojas pinnadas y
formibus. Suppl. p. 372. X filiformes.

Cast. Senecio con hoja de Peucedano.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Tiene los tallos herbáceos, del largo de pie y medio, y
estriados: las *hojas* alternas, apartadas, lineares ó fili-
formes, del largo de un dedo, y con nueve ó mas ho-
juelas apartadas: la *panoja* terminal, elevada en rami-
llete horizontal, y compuesta de las ramas que llevan
las flores, las quales son amarillas.

ESPECIES CON LAS FLORES QUE TIENEN EL RADIO REVUELTO.

Triflo-
rus. 12. *SENECIO corollis* X Senecio con las corolas
revolutis, foliis sessilibus X revueltas; hojas sentadas,
sinuatis, calycibus conicis, X sinuosas; cálices cónicos, con
squamis minimis intactis. X escamas muy pequeñas y sin
Hort. ups. 261. X escacelo.

Senecio foliis pinnatifidis, laciniis inæqualibus erectis. Hort. cliff. 406. X Senecio de hojas hendidas al través, con sus lacinias desiguales y derechas.

Senecio foliis sinuatis, petiolatis, pedunculis folio longioribus, florum radii disco brevioribus. Roy. lugdb. 265. X Senecio de hojas sinuosas, pecioladas; pedunculos mas largos que la hoja; y los radios de las flores mas cortos que el disco.

Jacobæa Ægyptiaca, Senecionis folio, semiflosculis vix conspicuis. Vaill. act. 1720. p. 298. X Jacobea de Egipto, con hoja como la del Senecio; y semiflosculos apenas manifestos.

Cast. Senecio de tres flores.

Habita en Egipto. ☉

Ægyptus. 13. *SENECIO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus sinuatis, squamis calycinis brevioribus integris sphacelatis.* Hort. ups. 261. X Senecio con las corolas revueltas; hojas amplexicaules, sinuosas; y escamas del caliz mas cortas, enteras y esfaceladas.

Jacobæa Ægyptiaca, Senecionis folio, flore minore. Vaill. act. 1720. p. 298. X Jacobea de Egipto, con hoja como la del Senecio; y flor mas pequeña.

Cast. Senecio de Egipto.

Habita en Egipto.

OBS. *Acaso la descripcion del Erigeron de Egipto nº. 10. pertenece mas bien á esta especie?*

Livi- dus. 14. *SENECIO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, squamis calycinis brevissimis intactis.* Hort. ups. 201. X Senecio con las corolas revueltas; hojas amplexicaules, lanceoladas y con dientes; escamas del caliz cortísimas y sin esfacelo.

376 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Senecio foliis sinuatis, basi latioribus amplexicaulis, floribus corymbosis, radiis disco brevioribus. *Senecio* con hojas sinuosas, mas anchas por su base y amplexicaules; flores corimbosas; y radios mas cortos que el disco.
 Roy. lugdb. 165?

Cast. *Senecio livido.*

Habita en Cataluña. ☉

Trilobus.

15. *SENECIO corollis revolutis, foliis amplexicaulis, squamis calycinis sphacelatis laceris.* *Senecio* con las corolas revueltas; hojas amplexicaules; escamas del caliz con esfacelo y laceradas.
 Hort. ups. 261.

Jacoea Hispanica, minus laciniata, petalis brevissimis. *Jacoea* de España, menos laciniada; y con petalos cortísimos.
 Vaill. paris. 21.

Cast. *Senecio de tres lóbulos.*

Habita en España. ☉

Viscosus.

16. *SENECIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii.* *Senecio* con las corolas revueltas; hojas hendidas al través y viscosas; escamas del caliz laxas y del largo de las del caliz interior.
 Flor. suec. p. 749.

Senecio foliis viscidis, pinnatis, pinnis semipinnatis, angulosis, calycibus hirsutis. *Senecio* de hojas viscosas, pinnadas, con sus hojuelas ó lacinias medio pinnadas, angulosas; y cálices con pelo áspero.
 Hall. helv. n. 60.

Senecio foliis pinnatifidis, sessilibus, laciniis angulosis, superioribus latioribus, florum radiis disco brevioribus. *Senecio* de hojas hendidas al través, sentadas, con lacinias angulosas, las superiores mas anchas; y los radios de las flores mas cortos que el disco.
 Roy. lugdb. 142.

Senecio hirsutus, viscidus, graveolens. *Senecio* con pelo áspero, viscoso y de olor pesado.
 Dill. elth. 347. t. 258. f. 336.

Senecio incanus, pinguis. *Senecio* blanquecino y pingüe.
 C. B. P. 131.

Jacobæa Pannonica I. X Jacobea de Pannonia,
 Clus. hist. 2. p. 21. Tourn. X primera.
 p. 486. X

Cast. Senecio viscoso.

Habita en Europa : en Aragon , Cataluña , en los montes
 del Real Sitio de San Ildefonso , en Castilla la vieja
 y otras partes de España. ☉

Varía con las corolas sin radio.

Sylva-
 ticus.

17. SENECIO *corollis revolutis , foliis pinnatifidis* X Senecio con las corolas
denticulatis , caule corymboso erecto. X revueltas ; hojas hendidas al
 Gov. illustr. p. 67. X través , con dientecitos ; ta-
 llo corimboso y derecho.

Senecio foliis pinnatis , pinnis alternè majoribus , semipinnatis , angulosis , calycibus lævibus , radiis brevissimis , revolutis. X Senecio de hojas pinna-
 Hall. helv. n. 59. X das , con las hojuelas ó laci-
 nias alternadamente mayo-
 res , medio pinnadas y an-
 gulosas ; cálices lisos ; radios
 cortísimos y revueltos.

Senecio minor , latiore folio , seu montanus. X Senecio menor , ó monta-
 C. B. P. no , con hoja mas ancha.
 131. Dill. elth. 258. t. 258.
 f. 337.

Jacobæa Senecionis folio incano , perennis. X Jacobea perenne , con ho-
 Rai. hist. 285. Tourn. p. 486. Hall. X ja como la del Senecio y
 blanquecina.
 jen. 177. t. 4.

Senecio montana , mollior , pallido parvo flore. X Senecio montano , mas
 Barr. ic. 401. Hall. X blando , con la flor pálida y
 pequeña.

α *Jacobæa Sicula , Chrysanthemi Cretici folio.* X Jacobea de Sicilia , con
 Barr. ic. 262. n. 2. rudis. Gov. X hoja como la del Chrysan-
 themo de Creta. *La lámina*
es tosca. α.

Jacobæa pumila , Gallica. X Jacobea enana , de Fran-
 Bocc. sic. t. 41. f. 1. op- cia. *La lámina es muy bue-*
 tima. Gov. X *na.*

Cast. Senecio silvático.

Habita en las selvas de la Europa boreal : en el circuito
 de

378 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

de Madrid , en Aragon , Cataluña y otras muchisimas partes de España. ☉

Nebro- 18. SENECEO *corollis re-* Senecio con las corolas
densis. *volutis, foliis lyratis sinua-* revueltas; hojas en forma de
tis obtusis petiolatis, caule lira, sinuosas, obtusas, pe-
hirsuto. cioladas; y tallo con pelo
áspero.

Jacobæa montana, Sene Jacobea montana, con la
cionis pallido parvo flore. flor como la del Senecio, pá-
Barr. rar. 1081. t. 401. lida y pequeña.

Jacobæa nebrodensis al- Otra Jacobea nebrodense
tera, oblongo folio, latiori, (ó del monte de los Gamos
minus incano, lacerato. Kai. en Sicilia), con hoja oblon-
Suppl. p. 179. ga, mas ancha, menos blan-
quecina, y lacerada.

Cast. Senecio del monte de los Gamos.

Habita en Sicilia, en España, y en los Pirineos. *Al-*
stroem. ☉

Su estatura es como la del *Senecio vulgar*; pero tiene las
hojas mayores, mas obtusas, entre ondeadas por su
margen y sinuosas, y enterisimas: el tallo menos divi-
dido y con mucho pelo áspero: los *pedunculos* solitarios
y viscosos: las *flores* solitarias, de la magnitud de las
del *Senecio Jacobæa*; con el *radio* menos revuelto: y
el *caliz*, sin esfacelo.

Glu- 19. SENECEO *corollis re-* Senecio con las corolas
cus. *volutis, foliis amplexicaui-* revueltas; hojas amplexicaui-
libus lanceolatis obtusis les, lanceoladas, obtusas,
dentatis integerrimis. Roy. con dientes y enterisimas.
lugdb. 164.

Jacobæa Ægyptia, an- Jacobea de Egipto, an-
nua, Coronopi folio glauco. nua, con hoja como la del
Vaill. act. 1720. p. 297. Coronopo y de color garzo.

Cast. Senecio garzo.

Habita en Egipto. ♂

Es planta vellosa y de color ceniciento.

20. *SENECIO corollis re-* Senecio con las corolas re-
volutis , foliis ovatis petio- vueltas ; hojas aovadas , pe-
latis dentatis punctulato- cioladas , con dientes , y va-
varicosis. Linn. dec. 9. t. 5. ricosas con puntitos.

Cast. Senecio varicoso.

Habita en Egipto. ☉

Tiene las hojas sanguineas por debaxo.

ESPECIES QUE POSEEN LAS FLORES CON EL RADIO
 EXTENDIDO ; Y LAS HOJAS HENDIDAS
 AL TRAVES.

21. *SENECIO corollis* Senecio de corolas con
radiantibus , petiolis am- radio ; peciolo que abrazan
plexicaulibus , pedunculis el tallo ; pedunculos tres ve-
folio triplo longioribus , fo- ces mas largos que la hoja ;
liis pinnato-sinuatis. Roy. y hojas entre pinnadas y si-
 lugdb. 164. nuosas.

Jacobæa Afra , perennis, Jacobea de Africa , pe-
viscosa , lutea , Asplenii renne , viscosa , con la flor
foliis. Vaill. act. 1720. p. 298. amarilla ; y hojas como las
 Dill. elth. 183. t. 152. f. 184. de la Doradilla.

Cast. Senecio de alabarda.

Habita en Africa. ♀

22. *SENECIO corollis* Senecio de corolas con ra-
radiantibus , petiolis radi- dio ; peciolo radicales la-
calibus lanatis , foliis run- nudos ; hojas runcinadas ;
cinatis , caulibus simplicis- tallos muy sencillos ; flores
simis , floribus lateralibus laterales y sentadas.
sessilibus. Amœn. acad. 6.
 afr. 65.

Jacobæa spicata , Mono- Jacobea espigada , de Mo-
mopatensis. Breyn. cent. t. nomopatan.
 65. Moris. hist. 3. sect. 7.
 t. 18. f. 32.

Cast. Senecio con bozo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

380 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Ele. 23. SENECIO corollis** Senecio de corolas con ra-
gans. radiantibus, foliis pinnati- dio; hojas hendidas al tra-
fidis æqualibus patentissi- vés, iguales y muy extendi-
mis, margine incrassato re- das, con la margen encrasa-
curvato. Syst. veg. p. 630. da y encorvada ácia atrás.
Senecio corollis radiantibus, foliis pinnatifidis æqualibus patentissimis, rachis inferne angustata. Spec. pl. 3. p. 1218. Hort. cliff. 406. Senecio de corolas con ra-
 dio; hojas hendidas al tra-
 vés, iguales y muy extendi-
 das, con el rachis ó lomo
 angostado por abaxo.
Aster Africanus, annuus, Senecionis folijs. Comm. hort. 2. p. 59. t. 30. Aster de Africa, annuo,
 con hojas como las del Se-
 necio.
Jacobæa Capensis, flore purpureo, Senecionis folio dentato. Seb. mus. 1. p. 33. t. 22. f. 1. Jacobea del Cabo de Bue-
 na-esperanza, cón la flor
 purpúrea; hoja como la del
 Senecio y dentada.
Senecio Americanus, purpureo-cæruleo flore. Tourn. p. 456. Senecio de America, con
 la flor entre purpúrea y ce-
 rúlea.
Jacobæa Africana, frutescens, flore amplo, purpureo elegantissimo, Senecionis folio. Volk. norib. 225. t. 225. Jacobea de Africa, fru-
 tescente, con la flor ancha,
 purpúrea, muy hermosa; y
 hoja como la del Senecio. *

Cast. Senecio hermoso.

Habita en Etiopia: y se conserva en el Caldario.

Tiene las *escamas del caliz* algo pestañosas.

El *tallo* de color garzo, y siempre verde: los *pedunculos* casi de una flor: y el *radio de la corola* purpúreo. Gov.

- Squa- 24. SENECIO corollis** Senecio de corolas con ra-
lidus. radiantibus calyce longiori- dio, mas largas que el caliz
bus integris, foliis pinna- y enteras; hojas hendidas al
rifidis, laciniis linearibus través, con sus lacinias li-
distantibus. Hort. ups. 260. neares y apartadas.

Cast. Senecio desaliñado.

Habita en la Europa austral. ☉

Eru-
caefo-
lius.

25. *SENECIO corollis* X Senecio de corolas con ra-
radiantibus, foliis pinnati- X dio ; hojas hendidas al tra-
fidis dentatis subhirsutis, X vés, dentadas, con algun
caule erecto. Flor. suec. 2. X pelo áspero ; y tallo dere-
n. 750. X cho.

Senecio Jacobæa, Selan- X Senecio Jacobea, blan-
dica, incana. Lob. illustr. X quecina, de Selandia.

76. *Jacobæa incana, altera.* X Otra Jacobea blanqueci-
C. B. P. 131. X na.

Jacobæa Artemisiæ folio, X Jacobea con hoja como la
radice repente. Vaill. act. X de la Artemisa ; y raíz ras-
566. X trera.

Jacobæa altissima, foliis X Jacobea muy alta, con
Erucae Artemisiæve simili- X hojas semejantes y que re-
bus æmulis. Rupp. jen. X median á las de la Oruga ó
164. X á las de la Artemisa.

Jacobæa incana, repens. X Jacobea blanquecina, ras-
Barr. rar. 1075. t. 153. X trera.

Cast. Senecio con hoja de Oruga.

Habita en los montones de tierra de la Europa templada.

Con el cultivo pierde su vello. *Willich.* Tiene las *escamas*
del caliz que terminan en punta roxita y no negra.

Haller une esta especie con el *Senecio Jacobæa. R.*

Inca-
pus.

26. *SENECIO corollis* X Senecio de corolas con ra-
radiantibus, foliis utrinque X dio ; hojas tomentosas en
tomentosis subpinnatis ob- X ambas partes, casi pinnadas,
tusis, corymbo subrotundo. X obtusas ; y corimbo algo re-
Gou. illustr. p. 67. X dondo.

Senecio tomentosus, foliis X Senecio tomentoso, de ho-
pinnatis, pinnis subrotun- X jas pinnadas, con hojuelas
dis, umbella globosa. Hall. X casi redondas ; y umbela
helv. n. 61. X globosa.

Jacobæa pumila, Absin- X Jacobea enana, con hojas
thii melliferi foliis incanis, X como las del Axenjo melife-
floribus velut in umbellam X ro, blanquecinas ; y flores
positis. Pluk. alm. 194. t. X puestas como en umbela.
39. f. 6. X

Chrysanthemum alpinum, *incanum*, *foliis laciniatis*. C. B. P. 134. Chrysanthemo alpino, blanquecino, con hojas laciniadas.

Jacobaea alpina, *Absinthii folio*, *humilior*. Tourn. p. 486. Jacobea alpina, mas baja, con hoja como la del Axenjo.

Chrysanthemum alpinum, I. Clus. hist. 1. p. 333. Chrysanthemo alpino, primero.

Jacobaea alpina, *incana*, *minor*. Barr. ic. 262. Bocc. mus. 2. p. 20. t. 8. Jacobea alpina, menor y blanquecina.

Absinthium alpinum, *umbelliferum*, *tenuifolium* & *minus*. C. B. P. 140. Axenjo alpino, menor, con flores en umbela; y hoja delgada.

Cast. Senecio blanquecino.

Habita en los alpes de Suiza y de Austria: en Mompeller: en los Pirineos de Cataluña y señaladamente en las grietas de las peñas mas altas del lugar de Set-casas. Echa los tallos del largo de un dedo y foliosos: las hojas como las de la *Achilea Clavena*, ó como las de la *Othonna maritima*; aunque pequeñas, hendidas al través, obtusas, blancas y rayadas.

Las *lacinias* de las hojas obtusas y enterisimas: los *pedunculos* axilares, corimbosos y mas largos que las hojas. Gov.

Abro-
tanifo-
lius.

27. **SENECIO** *corollis* *radiantibus*, *foliis pinnato-multifidis linearibus nudis acutis*, *pedunculis subbifloris*. Syst. veg. 631. Senecio de corolas con radio; hojas entre pinnadas y hendidas en muchas partes lineares, desnudas, agudas; y pedunculos casi de dos flores.

Senecio corollis radiantis, *foliis pinnato-multifidis linearibus nudis acutis*, *floribus corymbosis*. Spec. pl. 3. p. 1219. Jacq. austr. t. 79. Senecio de corolas con radio; hojas entre pinnadas y hendidas en muchas lacinias lineares, desnudas, agudas; y flores corimbosas.

Achil-

Achillea montana, *Artemisia tenuifoliae facie*. Lob. *adver.* 333. ic. 746. Hall. R. *Achillea montana*, con *traza* como la de la *Artemisia* de hoja delgada.

Ageratum Ferulaceum. Munt. ic. 87. Bauh. hist. 3. *Ageratum* con hojas como las de la *Ferula*.
part. 1. p. 152. Hall.

Chrysanthemum alpinum, *foliis Abrotani*, *multifidis*. C. B. P. 134. *Chrysanthemum alpinum*, con hojas como las del *Abrotano* y hendidas en muchas partes.

Chrysanthemum alpinum, II. Clus. hist. 1. p. 333. 334. *Chrysanthemum alpinum*, segundo.

Jacobaea foliis Ferulaceis, *flore minore*. Tourn. p. 486. *Jacobaea* con hojas como las de la *Ferula*; y flor mas pequeña.

Cast. Senecio con hoja de *Abrotano*. *Catal.* Herba tosera.

Habita en los alpes de *Astiria* y *Carintia*: en los *Pirineos* de *Cataluña*, en *Castilla* la vieja, en *San Martin* del *Pimpollar* y otras partes de *España*. ¶

Posee las *hojas radicales* dos veces hendidas al través; y las del *tallo* una vez sola: los *pedunculos* vellosos, y con dos, tres, ó quatro flores.

Canadensis. 28. SENECEO *corollis radiantibus*, *foliis omnibus bipinnatis linearibus*, *pedunculis corymbosis*. Senecio de corolas con radio; todas las hojas dos veces pinnadas, lineares; y pedunculos corimbosos.

Jacobaea Chærophylli foliis, *Mariana*. Pluk. mant. 101. *Jacobaea* de la *Isla Mariana*, con hojas como las del *Chærophilo*.

Cast. Senecio del *Canadá*.

Habita en el *Canadá*. *Kalm*.

Posee el *tallo* derecho y liso: las *hojas* dos veces pinnadas, lineares y lampiñas, con las de mas arriba sencillamente pinnadas: el *corimbo* terminal, compuesto, elevado en ramillete horizontal, con flores de color amarillo-roxo; y los *cálices* que tiran al de rubio.

Jacobaea. 29. *SENECIO corollis radiantibus, foliis pinnatolyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto.* Hort. cliff. 406. Knor. del. 1. t. I. Pollich. pal. 797. Senecio de corolas con radio; hojas entre pinnadas y en forma de lira, con sus laciniyas hendidas en otras pequeñas; y tallo derecho.

Senecio foliis lineatis, pinnis dentatis, extrema maxima. Hall. helv. n. 62. Senecio de hojas rayadas, con las hojuelas ó laciniyas dentadas, y la extrema ó de mas afuera muy grande.

Jacobaea vulgaris, laciniata. C. B. P. 131. Tourn. da. p. 485. Jacobea vulgar, lacinia-

Herba Sancti Jacobi. Fuchs. hist. 742. Yerba de Santiago.

• *Jacobaea vulgaris, flore nudo.* Rai. angl. 2. p. 82. Moris. hist. 3. p. 108. Pollich. loc. cit. Jacobea vulgar, con la flor sin radio. α

Jacobaea vulgaris, laciniata, flore discoideo. Vaill. act. 1720. p. 383. Jacobea vulgar, lacinia-da, con la flor sin radio.

Cast. Senecio Jacobea.

Habita entre pastos humedos de Europa: en los circuitos de Madrid; en Cataluña, Aragon, Valencia, Extremadura, y en otras muchas partes de España. 24

Varia con las *hojas inferiores* aovadas, aserradas y las restantes pinnadas; con las *corolillas del radio* crasas, cortas, estriadas, punteadas y hendidas profundamente en tres lóbulos. *Pollich. loc. cit.*

Aureus. 30. *SENECIO corollis radiantibus, foliis crenatis, infimis cordatis petiolatis, superioribus pinnatifidis lyratis.* Gron. virg. 126. Senecio de corolas con radio; hojas recortadas, las de mas abaxo de figura de corazon, pecioladas, y las superiores hendidas al través y en forma de lira.

Jacobæa Virginiana, fo-
lis imis Alliariæ glabris,
caulescentibus Barbæræ.
 Moris. hist. 3. p. 110. Rai.
 Suppl. p. 180.

Jacobeá de Virginia, con
 las hojas de abaxo parecidas
 á las de la Aliaria, lampiñas,
 y las del tallo como las de la
 Barbarea.

Cast. Senecio de color de oro.

Habita en lugares humedos y sombríos de la Virginia y
 del Canadá. 4

Es muy semejante á la especie antecedente.

Um-
 bellus.
 31. SENECEO *corollis*
radiantibus linearibus, fo-
lis pinnato-denticulatis,
laciniis distantibus.

Senecio de corolas con ra-
 dio, y lineares; hojas entre
 pinnadas y con dientecitos;
 y sus lacinias apartadas.

Senecio corollis radianti-
bus calyce longioribus, fo-
lis pinnato-dentatis denti-
culatis, *laciniis distanti-*
bus. Amœn. acad. 6. afr. 64.

Senecio de corolas con ra-
 dio, mas largas que el ca-
 liz; hojas entre pinnadas y
 dentadas, con dientecitos;
 y sus lacinias apartadas.

Spec. pl. 3. p. 1220.

Senecio filifolius. Berg.
 cap. 278.

Senecio con hoja como hi-
 lo.

Cast. Senecio umbelado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Tiene el tallo del largo de dos pies: las *hojas* lineares,
 casi pinnadas, con las hojuelas apartadas, lineares y
 largas: y el *radio de la corola* de color purpúreo.

Lyras.
 32. SENECEO *pilosus*,
corollis radiantibus, *foliis*
infimis lyratis dentatis, *su-*
premis serratis amplexi-
caulibus, *lobis margine mu-*
ricatis. Suppl. p. 369.

Senecio peloso, de coro-
 las con radio; hojas de mas
 abaxo en forma de lira, den-
 tadas, las de mas arriba aser-
 radas, amplexicaules, y los
 lobulos con puntitas rigidas
 por su margen.

Cast. Senecio en forma de lira.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Es planta muy alta. Tiene las *hojas* profundamente si-
 nuosas y casi pinnadas, y sus lóbulos redondeados, con
 puntitas rigidas por su margen.

Ero-
sus. 33. *SENECIO corollis* *radiantibus, foliis radicalibus petiolatis oblongis sinuatis serratis villosis, caule unifloro subnudo.* Suppl. p. 370. *Senecio de corolas con radio; hojas radicales peciola- das, oblongas, sinuosas, aserradas y vellosas; tallo de una flor y casi desnudo.*

Cast. Senecio rozado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Posee las *hojas radicales* alargadas, sinuosas, con lóbulos aserrados, tomentosas y envueltas ácia la raiz: el *tallo* casi sin hojas, ó con muy pocas y que abrazan algo el tallo.

Diffu-
sus. 34. *SENECIO corollis* *radiantibus, foliis bipinnatis linearibus, caulibus diffusis.* Suppl. p. 361. *Senecio de corolas con radio; hojas dos veces pinna- das, lineares; y tallos difu- sos.*

Cast. Senecio difuso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Alpi-
nus. 35. *SENECIO corollis* *radiantibus, foliis cordatis lyratis grosse serratis, petiolis auritis.* Suppl. p. 371. *Senecio de corolas con radio; hojas de hechura de corazon, en forma de lira, con aserraduras gruesas; y peciolo con orejillas.*

Cineraria alpina. Syst. veg. ed. 13. p. 636. *Cineraria alpina.*

Senecio foliis crassis, serratis, imis petiolatis, subrotundis, caulinis lanceolatis. Hall. hist. vol. 1. p. 23. n. 67. *Senecio de hojas crasas, aserradas, las de abaxo con peciolo, casi redondas, y las del tallo lanceoladas.*

Senecio foliis imis petiolatis, cordatis, obiter dentatis, caulinis lingulatis, sessilibus. Hall. hist. vol. 1. p. 23. n. 68. *Senecio con las hojas de abaxo pecioladas, de figura de corazon, con algun diente, las del tallo en forma de lengüeta y sentadas.*

Cast. Senecio alpino.

Habita en los alpes de Suiza, de Suecia y Alemania. *Orbeck.* 24

Produce el *tallo* herbáceo, estriado y anguloso, ó rollizo, derecho, sencillo, del largo de dos pies y aun mas; por arriba ramoso y en forma de panoja corimbosa: las *hojas* alternas, con peciolo, apartadas, de figura de corazon; y las de mas arriba aovadas, en forma de lira, con aserraduras gruesas, algo obtusas, blanquecinas por debajo y venosas: los *peciolos* del largo de las hojas, con dos ó quatro dientes en medio y foliosos, como en el *Erisimo Barbarea*: el *corimbo* terminal; los *axilares* solitarios y con pedunculos muy largos: los *pedunculos propios* salpicados de escamas menudas y alesnadas: el *caliz* calzado, igual y esfacelado por su ápice: el *calicito exterior* menudo, apretado y tambien esfacelado en su ápice: la *corola* amarilla, y como la del *Senecio Jacobea*.

En tierra fertil de los jardines, varía con el *tallo* muy ramoso; y con las *hojas* laciniadas, de forma que parece otra planta.

ESPECIES QUE TIENEN LA FLOR CON EL RADIO
EXTENDIDO; Y LAS HOJAS INDIVISAS.

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| <p>Lini-
folius.</p> | <p>36. <i>SENECIO corollis</i> X
<i>radiantibus, foliis lineari-</i>
<i>bus integerrimis, corymbo</i>
<i>subsquamato, caule herba-</i>
<i>ceo.</i> Forsk. ægypt. cent. 5.
p. 150. Pall. it. 1. p. 372.</p> | <p>Senecio de corolas con
radio; hojas lineares, ente-
risimas; corimbo con alguna
escama; y tallo herbáceo.</p> |
| <p></p> | <p><i>Solidago foliis linearibus</i>
<i>integerrimis, corymbo sim-</i>
<i>plici.</i> Hort. cliff. 410.</p> | <p>Solidago con hojas linea-
res, enterisimas; y corimbo
sencillo.</p> |
| <p></p> | <p><i>Linariæ aureæ affinis.</i> C.
B. P. 213. Prodr. 107.</p> | <p>Planta semejante á la Li-
naria de color de oro.</p> |
| <p></p> | <p><i>Jacobæa Hispanica, Ro-</i>
<i>rismarini folio.</i> Tourn. p.
486.</p> | <p>Jacobea de España, con
hoja como la del Romero.</p> |
| <p></p> | <p><i>Jacobæa Linifolia, His-</i>
<i>panica</i> & <i>Italica.</i> Bocc.
mus. 2. p. 60. t. 49. Barr.
rar. 97. t. 802.</p> | <p>Jacobea de España y de
Italia, con hoja como la del
Lino.</p> |

388 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Senecio con hoja de Lino.

Habita en Italia y Rusia: en Andalucía junto á Cantillana, camino de Sevilla; y en otras partes de España. 26

Tiene los pedunculos salpicados de escamas menudas y agudas: y el caliz sin esfacelo.

Paludosos.

37. *SENECIO corollis radiantibus, foliis ensiformibus acutè serratis subtus subvillosis, caule stricto.* Flor. dan. t. 385.

Senecio foliis linearibus, serratis, floribus umbellatis. Hall. helv. n. 66. R. Senecio con hojas lineares, aserradas; y flores en umbela.

Jacobaea foliis longis, integris & mucronatis. Morris. hist. 3. p. 110. sect. 7. t. 19. f. 22. Jacobea con hojas largas, enteras y terminadas en punta rígida.

Conyza palustris, serratifolia. C. B. P. 266. Conyza palustre, con hojas aserradas.

Jacobaea palustris, altissima, foliis serratis. Tourn. P. 485. Jacobea palustre, muy alta, con hojas aserradas.

Consolida palustris. Tabern. ic. 555. Consolida palustre.

Conyza aquatica, maxima, serrato folio. Thalharc. 11. ic. 13. R. Conyza aquatica, muy grande, con hoja aserrada.

α *Solidago palustris, altissima, incana & tomentosa, foliis longioribus serratis.* Amm. ruth. 220. Gmel. sib. 2. p. 161. Solidago palustre, muy alto, blanquecino y tomentoso; con hojas mas largas y aserradas. α

Cast. Senecio de lagunas.

Habita en lugares paludosos maritimos de Europa: en Aragon, Valencia y Galicia: en Cataluña y otras partes de España. 26

Varia con las hojas tomentosas en ambas partes.

Echa el tallo asurcado, vellosa y roxa: las hojas sin pecio-

ciolo , lanceoladas , crasas , vellosas por debaxo y aserradas. *Synops. pl. Aragon.* 120.

Nemo-
rensis.

38. *SENECIO corollis* *radiantibus octomis, foliis lanceolatis biserratis subtus villosis, caule ramoso.* Jacq. obs. 3. p. 15. t. 65. 66. & austr. t. 184.

Senecio de corolas con radio de ocho semiflosculos; hojas lanceoladas, dos veces aserradas, vellosas por debaxo; y tallo ramoso.

Senecio foliis ovato-lanceolatis, serratis, subtus hirsutis, floribus umbellatis. Hall. helv. n. 64.

Senecio de hojas entre ovadas y lanceoladas, aserradas, con pelo áspero por debaxo; y flores en umbela.

Virga-aurea seu Solidago Saracenica, latifolia, serrata. Bauh. hist. 2. p. 1063.

Virgaurea ó Solidago Saracenico, con hojas anchas y aserradas.

Pluk. 390. t. 235. f. 1. Hall.

Jacobaea nemorensis, latiore rigidior & hirsutifolia. Rupp. jen. 142.

Jacobea de bosques sombríos, con hoja mas ancha, mas rígida y con pelo áspero.

Cart. Senecio de bosques sombríos.

Habita en Alemania y Siberia. 24

Sa-
raceni-
cus.

39. *SENECIO corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis.* Murray prodr. p. 71. Jacq. austr. t. 186.

Senecio de corolas con radio; flores corimbosas; hojas lanceoladas, aserradas y algo lampiñas.

Solidago foliis lanceolatis serratis, floralibus pedunculis aequantibus. Roy. lugdb. 163.

Solidago con hojas lanceoladas, aserradas; y las florales iguales á los pedunculos.

Solidago caule simplici, corymbo terminali, pedunculis partialibus alternis nudis longitudine folii. Hort. cliff. 410.

Solidago con el tallo sencillo; corimbo terminal; pedunculos parciales alternos, desnudos y del largo de la hoja.

<i>Solidago Saracenica</i> .	X	Solidago Sarracénico.
Fuchs. hist. 728. Bauh. hist.	X	
2. p. 1062.	X	
<i>Virga-aurea angustifolia, serrata.</i>	X	Virgaurea de hoja angosta y aserrada.
C. B. P. 268.	X	
<i>Jacobæa subrotundo minus laciniato folio.</i>	X	Jacobeá con hoja casi redonda y menos laciniada.
C. B. P.	X	
131.	X	
<i>Jacobæa alpina, foliis longioribus, serratis.</i>	X	Jacobeá alpina, con hojas mas largas y aserradas.
Tourn.	X	
p. 485.	X	

Cast. Senecio Sarracénico.

Habita en lugares montuosos y de bosques sombríos de Suiza y Mompeller: en la Plazuela de las aguas de Sacedon, en la serranía de Cuenca, montes de Avila, Pirineos y en otras partes de España. 24

Se distingue por su traza; por las hojas anchas; por la magnitud y mayormente por la raíz rastrera.

Tiene muchos pedunculos axilares y en corimbo, del largo de las hojas; y las aserraduras de ellas muy pequeñas.

Doria.	40. SENECIO	corollis	X	Senecio de corolas con ra-
		radiantibus, floribus corym-	X	dio; flores corimbosas; ho-
		bosis, foliis subdecurrenti-	X	jas algo escurridas, desnu-
		bis nudis lanceolatis denti-	X	das, lanceoladas, con dien-
		culatis, superioribus sen-	X	tecitos, y las superiores gra-
		sim minoribus. Jacq. austr.	X	dualmente mas pequeñas.
	t. 185. Pall. it. 1. p. 200.		X	

<i>Solidago caule simplici,</i>	X	Solidago con el tallo sen-
<i>corymbo terminali, pedun-</i>	X	cillo; corimbo terminal; pe-
<i>culis terminalibus nudis,</i>	X	dunculos terminales y desnu-
<i>foliolo subjeeto brevissimo.</i>	X	dos; con la hojuela debaxo
Hort. cliff. 410.	X	de ellos muy corta.

<i>Virga-aurea major, seu</i>	X	Virgaurea mayor, ó Do-
Doria. C. B. P. 268.	X	ria.

<i>Alisma Monspeliensium,</i>	X	Alisma de los de Mompe-
<i>seu Doria. Bauh. hist. 2. p.</i>	X	ller, ó Doria.
1064.	X	

Jacobaea pratensis, *altis-* *Jacobea pratense*, muy
sima, *Limonii folio*. Tourn. alta, con hoja como la del
 p. 485. *Limonio*.

Cast. Senecio Doria.

Habita en las selvas de Oriente, de Austria y Alemania:
 en Texadilla de Segovia, en Castilla la vieja cerca de
 Salamanca, en Sierra-morena, en la Cartuxa del Pau-
 lar de Segovia, en los montes de Avila, de Galicia y
 Pirineos. 4

Vease la *Doria orientalis* con hoja como la del *Limonio*.

Dill. elth. 125. t. 105. f. 125.

Posee las *hojas* lisas en ambas partes: las *bracteas* setá-
 ceas y colocadas debaxo del caliz: las *hojas superiores*
del tallo menudas, á diferencia de las de la preceden-
 te, que son mayorcitas y que continuan hasta el co-
 rimbo. Es semejante á la *Cacalia Sarracenica*.

Sube á mas de la altura de un hombre; y las *hojas*
 las mas veces se hallan escurridas.

Doro-
 nicum. 41. *SENECIO corollis* *Senecio* de corolas con ra-
radiantibus, *caule indiviso* dio; tallo indiviso, casi de
subunifloro, *foliis indivisis* una flor; hojas indivisas,
serratis, *radicalibus ovatis*, aserradas, las radicales ao-
subtus villosis. Ger. prov. vadas, y por debaxo vello-
 196. t. 7. Jacq. austr. V. sas.
 app. t. 45.

Senecio foliis crassis, *Senecio* con hojas crasas
serratis, *imix petiolatis*, y aserradas, las de mas aba-
subrotundis, *caulinis lan-* xo pecioladas, casi redon-
ceolatis. Hall. helv. n. 67. das, y las del tallo lanceo-
 ladas.

Solidago Doronicum. Spec. *Solidago Doronico*.
 pl. 1. p. 880.

Doronicum foliis lanceo- *Doronic* de hojas lanceo-
latis, *alternis*, *dentatis*, *cau-* ladas, alternas y con dien-
linis amplexicaulibus, *cau-* tes, las del tallo amplexi-
le ramoso. Roy. lugdb. 160. caules; y tallo ramoso.

Doronicum longifolium, *Doronic* con pelo áspero,
hirsutie asperum. C. B. P. y hoja larga.
 185.

- Doronicum II, Austria-* *X* Doronico segundo, pri-
cum I. Clus. hist. 2. p. 17. mero de Austria.
- α Doronicum foliis oblongo-* *X* Doronico con hojas entre
lanceolatis, serratis. Monn. oblongas y lanceoladas, y
obs. 152. aserradas. *α*
- Doronicum integro* *Σ* *X* Doronico con hoja como
crasso Hieracii folio. Magn. la del Hieracio, entera y
monsp. 295. crasa.
- Jacobaea integro* *Σ* *X* Jacobea con hoja como la
so Hieracii folio. Tourn. p. del Hieracio, entera y cra-
486. sa.
- β Doronicum foliis lanceo-* *X* Doronico de hojas lanceo-
latis, denticulatis, subtus *X* ladas, con dientecitos, to-
tomentosis, caule uniflora. *X* mentosas por debaxo; y tal-
Roy. lugdb. 160. *X* llo de una flor. *β*
- Doronicum Helveticum,* *X* Doronico de Suiza, baxo
humile, crassis foliis *Σ* *X* y blanquecino, con hojas
incanum. C. B. P. 185. Prodr. *X* crasas.
- 97. Burs. X. 29.*
- χ Tussilago alpina, folio* *X* Tusilago de alpes, con
oblongo. C. B. P. 197. Prodr. *X* hoja oblonga. *χ*
- 101.*
- α Virga-aurea montana, ser-* *X* Virgaurea montana, aser-
rata, magno flore. C. B. P. *X* rada, con la flor grande. *α*
268. *X*

Cast. Senecio Doronico.

Habita en los montes Pirineos, en los de Mompeller, de Suiza, Austria é Italia: en los de Segura de Aragon, ácia las aguas medicinales, y en otras partes de España. *26*

Produce el *tallo* muy sencillo y vellosos, del largo de un palmo, ó palmo y medio: las *hojas radicales* entre ovales y oblongas, con peciolo, aserradas, algo obtusas, un poco crasas, vellosas por debaxo y de color garzo por encima: las del *tallo* pequeñas, lanceoladas y casi alesnadas: la *flor* terminal, las mas veces una sola y algo crasa.

Longi-
folius.

42. *SENECIO corollis* X Senecio de corolas con ra-
radiantibus, foliis lineari- X dio; hojas lineares, esparci-
bus sparsis, caule frutico- X das; y tallo fruticoso.
so. Berg. cap. 279.

Jacobæa Africana, folio X Jacobea de Africa, con
capillaceo, viridi. Herm. X hoja capilar y verde.
afr. 14.

Jacobæa Africana, fru- X Jacobea Africana, frutes-
tescens, Lavendulæ folio, X cente, con hoja como la del
latiore & angustiore. Comm. X Espliego, mas ancha, y mas
hort. 2. p. 141. t. 71. X angosta.

Jacobæa Æthyopica, La- X Jacobea de Etiopia, con
vendulæ folio. Breyn. cent. X hoja como la del Espliego.
t. 63.

Jacobæa Æthyopica, an- X Jacobea de Etiopia, de
gustissimis & prælongis X hojas muy angostas y largas,
foliis, rarius crenatis. Pluk. X con festones claros.
mant. 107. t. 421. f. 5.

Cast. Senecio de hoja larga.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Burm. f.*

Tiene las *hojas* lineares, sin orden, desnudas, largas y ásperas: y las *flores* en corimbo.

Acaso pertenece á esta especie el *Senecio de flor grande* Berg. cap. 280; pero posee las *hojas* mas dentadas; y las *flores* otro tanto mas grandes.

Byzan-
tinus.

43. *SENECIO corollis* X Senecio de corolas con ra-
radiantibus, foliis oblongis X dio; hojas oblongas, con
remotè dentatis spinoso-den- X dientes apartados y dienteci-
ticulatis supra nudis, cau- X tos espinosos, por encima des-
le herbaceo. X nudas; y tallo herbáceo.

Senecio foliis crenato- X Senecio con hojas entre
dentatis, inferioribus pin- X recortadas y dentadas, las
nato-lyratis, superioribus X inferiores entre pinnadas y
pinnatifidis. Roy. lugdb. X en forma de lira, y las su-
530. X periores hendidas al través.

Solidago Isatidis folio. X Solidago con hojas como
Rai. Suppl. p. 177. n. 46. X las del Glasto ó Pastél.
58?

394 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Jacobæa Sicula, caule rigido, ramoso, foliis ad marginem laciniatis, floribus parvis, luteis. Rai Suppl. p. 178. n. 49? Jacobea de Sicilia, con el tallo rígido y ramoso; hojas laciniadas por sus márgenes; flores pequeñas y amarillas.

Hieracium montanum, Conyzæ seu Dentariæ folio. Bocc. sic. Hieracio montano, con hoja como la de la Conyza ó de la Dentaria.

Cast. Senecio de Constantinopla.

Habita en Constantinopla. ♂

Su estatura es como la del *Senecio rígido*; aunque mucho mas angosto en todas sus partes. Posee el tallo del largo de quatro pies, rollizo, estriado, verde y salpicado de pelos blancos; con las ramas colocadas en la parte inferior y muy extendidas: las hojas lanceoladas, sin peciolo, que abrazan el tallo, revueltas, aserradas, con dientes agudos, y senos obtusos; verdes por encima, lustrosas y algo ásperas, venosas por debaxo, algo vellosas y tambien verdes: los rudimentos de las ramas que salen de cada axila de las hojas: los pedunculos terminales, rollizos, filiformes, larguissimos, lisos, estriados, y por debaxo salpicados de hojas indivisas, lineares, con aserraduras espinosas: los corimbos terminales, alternos y subdivididos: los cálices esfacelados por su ápice: las corolas amarillas, con ocho radios, ó semiflosculos aovados y casi con tres dientes. Su traza es como la de la *Serratula arvensis*.

Ha-
bita en
folius.

44. *SENECIO corollis radiantibus, foliis obovatis, carnis subdentatis, caule fruticoso*. Mill. dict. n. 14. Senecio de corolas con radio; hojas aovadas al revés, carnosas, algo dentadas; y tallo fruticoso.

Solidago foliis obverse ovatis, carnis crenatis, caule fruticoso, corymbo ramoso. Hort. cliff. 411. Solidago con hojas aovadas al revés, carnosas, recortadas; tallo fruticoso; y corimbo ramoso.

Doria Africana, arbores- *Doria Africana, arbores-*
cens, foliis crassis & suc- *cente, con hojas crasas y xu-*
culentis, Atriplicem refe- *gosas, parecidas á las del*
rentibus. Boerh. Dill. elth. *Armuelle.*
 124. t. 104. f. 124.

Cast. Senecio con hoja de Halimo.

Habita en Etiopia. h

Ilici- 45. *SENECIO corollis* *Senecio de corolas con ra-*
folius. radiantibus, foliis sagitta- *dio; hojas en forma de sae-*
tis amplexicaulibus denta- *ta, amplexicaules, dentadas;*
tis, caule fruticoso. Hort. *y tallo fruticoso.*
 cliff. 406. Berg. cap. 281.

Jacobæa Africana, fru- *Jacobea Africana, frutes-*
tescens, foliis incisís & *cente, con hojas cortadas y*
subtus cinereis. Comm. rar. *por debaxo cenicientas.*
 42. t. 42. Seb. mus. 1. t. 22.
 f. 4.

Cast. Senecio con hoja de Acebo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h

Ri- 46. *SENECIO corollis* *Senecio de corolas con ra-*
gidus. radiantibus, foliis amplexi- *dio; hojas amplexicaules,*
caulibus spathulatis repa- *en forma de espatula, on-*
dis erosis scabris, caule *deadas por su margen, roza-*
fruticoso. Hort. cliff. 406. *das, ásperas; y tallo fruti-*
 Mill. dict. n. 12. *coso.*

Jacobæa Africana, fru- *Jacobea Africana, frutes-*
tescens, foliis rigidis & *cente, de hojas rígidas y con*
hirsutis. Comm. hort. 2. p. *pelo áspero.*
 149. t. 75. Seb. 1. t. 22. f. 5.

Jacobæa Africana, ramo- *Jacobea Africana, muy*
sissima, foliis Senecionis *ramosa, con hojas como las*
pinguis, rigidis & lucenti- *del Senecio pingüe, rígida*
bus, subtus incanis. Rai. *y lustrosas; y por debaxo*
 Suppl. p. 179. *blanquecinas.*

Cast. Senecio rígido.

Habita en Etiopia. h

Tiene el tallo rígido, áspero y nada vistoso: las hojas rí-
 gi-

396 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

gidas, y por encima como untadas con aceyte, sin que sean lampiñas; por debaxo blanquecinas y algo vello-sas: las flores pequeñas, con el radio amarillo y de cinco petalos: y los flosculos apartados y enteros.

Po-
pulifo-
lius.

47. *SENECIO corollis* ~~X~~ Senecio de corolas con ra-
radiantibus, foliis ovatis ~~X~~ dio; hojas aovadas, en for-
spathulatis integris obtu- ~~X~~ ma de espatula, enteras, ob-
sis, adultioribus supra gla- ~~X~~ tusas, y las mas crecidas
bris, caule fruticoso. ~~X~~ lampiñas por encima; y ta-
llo fruticoso.

Jacobæa Africana, Po- ~~X~~ Jacobea Africana, con ho-
puli albæ foliis. Rai. Suppl. ~~X~~ jas como las del Alamo blan-
p. 177. ~~X~~ co.

Cast. Senecio con hoja de Alamo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Burm. h

Es planta toda vestida de lana blanca. Echa las hojas en-
tre casi redondas y aovadas, enterisimas, ó con uno ú
otro dientecito, lanudas, y que ultimamente quedan
desnudas por encima; con peciolos largos que abrazan
el tallo mediante su base ensanchada.

Ros-
marini-
folius.

48. *SENECIO corollis* ~~X~~ Senecio de corolas con ra-
radiantibus, foliis lineari- ~~X~~ dio; hojas lineares, revuel-
bus margine revolutis, cau- ~~X~~ tas por la margen; y tallo
le fruticoso. Suppl. p. 369. ~~X~~ fruticoso.

Cast. Senecio con hoja de Romero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. h

Es planta lampiña.

Angu-
latus.

49. *SENECIO corollis* ~~X~~ Senecio de corolas con ra-
radiantibus, foliis petiola- ~~X~~ dio; hojas con peciolo, ao-
tis ovatis dentato-angula- ~~X~~ vadas, entre dentadas y an-
tis glabris. Suppl. p. 369. ~~X~~ gulosas, y lampiñas.

Cast. Senecio angulado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Es planta entre las mas altas de este género; y tiene las
hojas algo carnosas y de color garzo.

Mari-
timus. 50. *SENECIO corollis* X Senecio de corolas con ra-
radiantibus, foliis amplexicaulibus ovatis denticulatis carnosus, caule herbaceo procumbente. X Suppl. p. 369. X tendido.
dio; hojas amplexicaules, aovadas, con dientecitos y carnosas; tallo herbáceo y

Cast. Senecio marítimo.

Habita en las playas del mar del Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Es toda casi carnosa; y varía con las *hojas* lanceoladas.

Sibi-
ricus. 51. *SENECIO corollis* X Senecio de corolas con
radiantibus quinque-radiis, foliis ellipticis laevibus. X Suppl. p. 370. X cinco radios ó semiflosculos; hojas elípticas y lisas.

Cast. Senecio de Siberia.

Habita en la Siberia. *Æ*

Echa el *tallo* derecho, del largo de dos pies y liso: pocas *hojas*, sentadas, elípticas y enterisimas, con el lomo blanquecino: las *flores* casi en corimbo y amarillas, con quince flosculos, poco mas ó menos, en el disco: el *caliz* esfacelado por su boca: y el *calicito de la base* con tres ó quatro escamas.

Margi-
natus. 52. *SENECIO corollis* X Senecio de corolas con ra-
radiantibus, foliis amplexicaulibus lanceolatis glabris subarticulatis marginatis, corymbo composito. X Suppl. p. 370. X dio; hojas que abrazan el tallo, lanceoladas, lampifias; casi articuladas, ribeteadas, y corimbo compuesto.

Cast. Senecio ribeteado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Lana-
tus. 53. *SENECIO corollis* X Senecio de corolas con ra-
radiantibus, foliis sessilibus utrinque lanatis dentatis, infimis ovatis, superioribus lanceolatis. X Suppl. p. 370. X dio; hojas sentadas, lanudas en ambas partes, dentadas, las de abaxo aovadas, y las superiores lanceoladas.

Cast. Senecio lanudo.

Ha-

398 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Cru- 54. SENECIO *corollis* X Senecio de corolas con ra-
 ciatus. *radiantibus, foliis lineari-* X dio; hojas lineares y por de-
bus subtus tomentosis, in- X baxo tomentosas, las infe-
rioribus cruciatis, supe- X riores cruzadas, y las supe-
rioribus integris. Suppl. p. X riores enteras.
 371. X

Cast. Senecio cruzado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Posee las *hojas* rígidas, terminadas en punta rígida, y ácia su ápice en ambas partes medio dentadas, con los dientes iguales á la hoja en su remate.

Ju- 55. SENECIO *frutico-* X Senecio fruticoso, con ho-
 niperi- *sus, foliis subulatis.* Suppl. X jas alesnadas.
 nus. p. 371. X

Cast. Senecio como Enebro.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Montin. f*

Es *arbuscito* algo rollizo, del largo de pie y medio, liso y ramoso en su extremo. Produce las *hojas* esparcidas y alesnadas, como las del *Enebro*; pero algo mas anchas, y que abrazan la mitad del tallo, del largo de una pulgada, revueltas por sus lados, lisas y terminadas en punta rígida: los *pedunculos* terminales, alargados, con quatro, ó cinco flores en su ápice, y sus piecечitos divergentes; y las *flores* amarillas, con el radio extendido.

Cordi- 56. SENECIO *corollis* X Senecio de corolas con ra-
 folius. *radiantibus, foliis cordatis* X dio; hojas de figura de cora-
dentatis, calycibus simpli- X zon, dentadas; y cálices
cissimis. Suppl. p. 372. X muy sencillos.

Cast. Senecio con hojas de corazon.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Sparrman.*

Arroja los *tallos* casi postrados, del largo de un pie, de la crasitud de un hilo grueso y algo ramosos por su base: las *hojas* alternas, con peciolo, de figura de corazon, algo obtusas, dentadas y lisas por ambas partes:
 el

el *pedunculo* terminal , alargado y con pocas flores : el *caliz* sencillo ó sin otro en su base : la *corola* amarilla : y el *radio* con el estigma hendido en dos partes y fértil.

Glasti-
folius.

57. *SENECIO corollis* \times *radiantibus* , *foliis amplexicaulis lanceolatis subdentatis levibus* . Suppl. p. 372. \times *radio* ; hojas amplexicaules , lanceoladas , casi dentadas y lisas.

Cast. Senecio con hoja de Pastél.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Echa los *tallos* derechos , del largo de dos pies , estriados y herbáceos : las *hojas* alternas , distantes , lanceoladas , con algun diente , lisas , mas ensanchadas por su base , amplexicaules y algo escurridas por las márgenes de la quilla : la *panoja* terminal : y el *radio* de la *corola* extendido y de color purpúreo.

Peucedani-
folius.

58. *SENECIO corollis* \times *nudis* , *foliis pinnatis filiformibus* . Suppl. p. 372. \times *radio* ; hojas pinnadas y filiformes.

Cast. Senecio con hoja de Peucedano.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Produce los *tallos* herbáceos , del largo de pie y medio , y estriados : las *hojas* alternas , distantes , lineares ó filiformes , del largo de un dedo , con nueve ó mas hojuelas apartadas : la *panoja* terminal , elevada en ramillete horizontal y compuesta , con las *ramas* que llevan las flores : y *éstas* amarillas.

1138. Género ASTER. * *Tourn. t. 274. Vail.*

A. G. 1720. Dill. elth. 36. f. 41.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun apifinado ; con las *escamas interiores* que sobresalen un poco ; y las *inferiores* extendidas.

COR. compuesta radiada ; con las *corolillas* hermafroditas , numerosas , en el disco ; y mas de diez *femeninas* liguladas , en el radio.

Pro-

400 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Propia de la hermafrodita : en forma de embudo ; con el *borde* hendido en cinco partes y extendido.

De la femenina : ligulada , lanceolada , y con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : *germen* oblongo : *estilo* filiforme , del largo de los estambres : con el *estigma* hendido en dos partes y extendido.

En las femeninas : *germen* oblongo : *estilo* filiforme , del largo del de la hermafrodita : con dos *estigmas* oblongos y revueltos.

PERIC. ninguno ; el *caliz* apenas mudado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : oblongas y aovadas ; con el *vilano* peloso.

En las femeninas : semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. desnudo y algo plano.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

ASTER. p. 481.

La flor es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos , y la corona de semiflosculos , sentados en embriones y comprendidos en un caliz escamoso : y los embriones pasan á semillas adornadas de vilano , y fixadas en el talamo ó receptaculo.

ESPECIES FRUTICOSAS.

Taxi- 1. ASTER *suffruticosus*, X Aster sufruticoso , con ho-
folius. *foliis decurrentibus subula* X jas escurridas , alesnadas,
tis canaliculatis ciliatis, flo- X acanaladas , pestañosas ; y
ribus terminalibus. Berg. X flores terminales.
cap. 286.

Aster fruticosus , fo- X Aster fruticoso , con ho-
liis decurrentibus subulatis X jas escurridas , alesnadas , ás-
marginis scabris , floribus X peras por su margen ; y flo-
terminalibus. Amœn. acad. X res terminales.

6. afr. 69. Spec. pl. 3. pag.
1225.

Cast.

Cast. Aster con hoja de Texo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Re- 2. ASTER *fruticosus, fo-* Aster fruticoso, con ho-
flexus. *liis ovatis subimbricatis re-* jas aovadas, casi apiñadas,
curvatis serrato-ciliatis, encorvadas ácia atrás, entre
floribus terminalibus. Amcén aserradas y pestañosas; y
acad. 6. afr. 68. Berg. cap. flores terminales.
258.

Aster Africanus, fru- Aster Africano, frutes-
tescens, splendentibus par- cente, con hojas relucientes,
vis & reflexis foliis. Comm. pequeñas y redobladas.
hort. 2. p. 51. t. 28. Rai.
Suppl. p. 159.

Cast. Aster redoblado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Arroja el tallo prolifero: las *hojas* amontonadas, algo
apiñadas, pegadas al tallo, sin peciolo, pequeñas y
lampiñas; las *inferiores* aserradas; y las *superiores*
pestañosas: las *flores* terminales, solitarias y sentadas;
con el *radio* de color de sangre.

Crini- 3. ASTER *fruticulosus,* Aster fruticuloso, con ho-
tus. *foliis ovato-oblongis acutis* jas entre aovadas y oblon-
subtus tomentosis, calyci- gas, agudas, tomentosas por
bus pilo terminatis. Amcén. debaxo; y cálices termina-
acad. 6. afr. 66. dos con pelo.

Cast. Aster guedejudo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Tiene las ramas menos ramosas: las *hojas* sin peciolo,
muy puntiagudas, con tomento blanco por debaxo y
ásperas en su margen: los *pedunculos* terminales, fo-
liosos y de una flor: las *escamas del caliz* que termi-
nan en un pelo de color pardo: y el *radio de la flor*
cerúleo.

Fru- 4. ASTER *fruticosus, fo-* Aster fruticoso, con ho-
ticulo- *liis linearibus punctatis, pe-* jas lineares y punteadas; pe-
sus. *dunculis unifloris nudis.* dunculos de una flor y sin
Hort. cliff. 409. hojuelas ó escamas.

Aster Hyssopifolius, Berg. X Aster con hoja como la
cap. 287. X del Hisopo.

Aster Africanus, frutescens, foliis angustis & te, con hojas angostas y las
plerumque conjunctis. Com. mas veces conjuntas.
hort. 2. p. 53. t. 27.

α *Aster maritimus*, fruticosus, *Hyssopifoliis confertis*, flore albo. Pluk. mant. Hisopo, amontonadas; y
29. t. 340. f. 19. X flor blanca. α

Cast. Aster fruticuloso.

Habita en lugares áridos del Cabo de Buena-esperanza. h

ESPECIES HERBACEAS, CON HOJAS ENTERAS,
Y PEDUNCULOS DESNUDOS.

Te- 5. ASTER foliis subfli- X Aster de hojas casi filifor-
nellus. formibus aculeato-ciliatis, X mes, con aguijones pestaño-
pedunculis nudis, calycibus X sos; pedunculos desnudos;
hemisphaericis aequalibus. X cálices hemisféricos é igua-
Jacq. obs. 4. p. 8. t. 88. X les.

Aster foliis subfiliformibus scabris, pedunculis nudis, calycibus hemisphaericis glabris. Amoen. acad. 5. X Aster con hojas casi fili-
afr. 67. Spec. pl. 3. p. 1225. X formes y ásperas; peduncu-
los desnudos; cálices hemis-
féricos y lampiños.

Aster parvus, *Æthiopicus*, *Chamæmeli floribus*, X Aster pequeño, de Etio-
Tamarisci Ægyptiaci foliis, X pia; con flores parecidas á
tenuissime denticulatis. X las de la Manzanilla; y hojas
Pluk. alm. 56. t. 271. f. 4. X como las del Taray de Egip-
to, con dientecitos muy del-
Rai. Suppl. p. 164. n. 84. X gados.

Cast. Aster tiernecito.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Tiene el tallo annuo, del largo de un xeme, rollizo, con
algun pelo y ramoso por arriba: las hojas esparcidas,
lineares, tiesas por su ápice, con aguijoncitos pestaño-
sos y puntitas por debaxo: las flores solitarias, termi-
nales, con pedunculo, é inclinadas antes de abrirse y
en la noche: el caliz casi igual: la corola amarilla en
el

el disco : el *radio* cerúleo y comunmente revuelto en la noche : el *vilano* sin estipite , blanco y con sus radios claros.

- Alpi-
nus. 6. *ASTER foliis spatulatis hirtis , radicalibus obtusis , caule simplicissimo unifloro*. Syst. veg. 633. Aster de hojas en forma de espatula , con pelo áspero ; y las radicales obtusas ; tallo muy sencillo y de una flor.
- Aster foliis lanceolatis hirtis , radicalibus obtusis , caule simplicissimo unifloro*. Spec. pl. 3. p. 1226. Jacq. Aster de hojas lanceoladas , con pelo áspero , y las radicales obtusas ; tallo muy sencillo y de una flor.
- austr. t. 88. Gmel. sib. 2. p. 173. n. 141. t. 73. f. 2.
- Aster foliis radicalibus petiolatis , ovatis , scabris , caule unifloro*. Hall. helv. n. 82. Aster de hojas radicales con peciolo , aovadas , asperas ; y tallo de una flor.
- Aster montanus , cæruleus , magno flore , foliis oblongis*. C. B. P. 267. Tourn. p. 481. Aster montano , con la flor cerúlea , grande ; y hojas oblongas.
- Aster VII , Austriacus* V. Clus. hist. 2. p. 15 ? Aster septimo , quinto de Austria.
- α *Aster atticus , alpinus , alter*. C. B. P. 267. Otro Aster attico , alpino. α
- Aster atticus cæruleus , alpinus*. C. B. P. 905. Aster attico alpino , con la flor cerúlea.
- β *Aster hirsutus , Austriacus , cæruleus , magno flore foliis subrotundis*. C. B. P. 267. Prodr. 124. Aster de Austria , con pelo áspero ; flor grande , de color cerúleo ; y hojas casi redondas. β

Cast. Aster alpino.

Habita en Austria , Valesia , Suiza y Mompeller: en Aragon , Cataluña , en los montes de Burgos , de Asturias y en otras partes de España. \mathcal{U}

Tiene el caliz igual.

Es planta casi del largo de un palmo ; con las hojas radicales , las mas veces , en forma de espatula y dos ó tres en el tallo. Se halla tambien de la altura de dos pulgadas. Gov. hort. p. 442.

404 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Sibiri- 7. ASTER *foliis lanceo-* Aster con hojas lanceola-
cus. *latis venosis scabris extimo-* das, venosas, ásperas, y aser-
serratis, caulibus striatis, radas por defuera; tallos es-
pedunculis tomentosis. Mill. triados; y pedunculos to-
dict. n. 37. mentosos.

Aster foliis ovatis, oblon- Aster con hojas aovadas,
gis, supra serratis, cauli- oblongas y aserradas por ar-
bis striatis, pedunculis riba; tallos estriados; pe-
unifloris umbellatis. Gmel. dunculos de una flor y en
sib. 2, p. 186. t. 80. f. 1. umbela.

Cast. Aster de Siberia.

Habita en la Siberia.

Tripo- 8. ASTER *foliis lanceo-* Aster con hojas lanceola-
lium. *latis integerrimis carnosis* das, enterisimas, carnosas y
glabris, ramis inæquatis, lampiñas; ramas desiguales;
floribus corymbosis. Gmel. y flores en corimbo.
sib. 2. p. 187. t. 80. f. 2.
Flor. dan. 615.

Aster maritimus, Tripo- Aster maritimo, llamado
lium dictus. Rai. hist. 270. Tripolio.

Tripolium majus, cæru- Tripolio mayor, con la
leum. C. B. P. 267. flor cerúlea.

Tripolium. Dod. pempt. Tripolio.
379.

Aster maritimus, palus- Aster maritimo, palustre,
tris, cæruleus, Salicis fo- con la flor cerúlea; y hoja
lio. Tourn. p. 481. como la del Sauce.

Cast. Aster Tripolio.

Habita en las playas maritimas de Europa, y en las lagu-
nas salobres de Siberia y Alemania: en las costas del
mar de Galicia y de Cataluña. 4

Amel- 9. ASTER *foliis lanceo-* Aster de hojas lanceola-
lus. *latis obtusis scabris triner-* das, obtusas, ásperas, con
viis integris, peduncu- tres nervios y enteras; pe-
lis nudiusculis corymbosis, dunculos desnuditos, en co-
squamis calycinis obtusis. rimbo; y escamas del caliz
Jacq. austr. t. 435. obtusas.

Aster foliis lanceolatis scabris semiamplexicaulibus subserratis, calycibus laxis, squamis lanceolatis. Aster con hojas lanceoladas, ásperas, que abrazan la mitad del tallo, algo aserradas; y cálices laxos, con sus escamas lanceoladas.
Hort. cliff. 407. Gmel. sib. 2. p. 285.

Aster caule folioso, foliis scabris, ciliatis, lanceolatis, obtusis, calycinis squamis ovatis, ciliatis. Hall. Aster con el tallo folioso; hojas ásperas, pestañosas, lanceoladas, obtusas; escamas del caliz aovadas y pestañosas.
helv. n. 83.

Aster atticus, cœruleus, vulgaris. C. B. P. 267. To- Aster attico, vulgar, con la flor cerúlea.
urn. p. 481.

Aster VIII, Italorum Fuchsii. Clus. hist. 2. p. 16. Aster octavo, llamado de los Italianos por Fuchsio.

Cast. Aster Amelo.

Habita en collados ásperos de la Europa austral: en el circuito de Barcelona y otras partes de España.

Divaricatus

10. *ASTER ramis divaricatis, foliis ovatis serratis, floralibus integerrimis obtusiusculis amplexicaulibus.* Gron. virg. 123. Mill. Aster con las ramas desparramadas; hojas aovadas, aserradas; las florales enterisimas, algo obtusas y que abrazan el tallo.
dict. n. 35.

Aster caule infirmo, foliis ovatis, acuminatis, integerrimis, pedunculis unifloris nudis, calycibus simplicibus. Gron. virg. 1. p. 99. Aster con el tallo debil; hojas aovadas, puntiagudas, enterisimas; pedunculos de una flor, desnudos; y cálices sencillos.

Aster Americanus, latifolius, albus, caule ad summum brachiato. Pluk. alm. 56. t. 79. f. 1. Aster Americano, de hoja ancha; flor blanca; y tallo con ramas opuestas en la sumidad.

Cast. Aster desparramado.

Habita en la Virginia. X

ESPECIES HERBACEAS, CON HOJAS ENTERAS,
Y PEDUNCULOS ESCAMOSOS.

Hys-
sop i-
folius. 11. ASTER *foliis linea-* X Aster con hojas lineares,
ribus integerrimis obliqua- X enterisimas, torcidas, agu-
tis acutis margine scabris, X das, ásperas por su margen;
pedunculis subnudis. X y pedunculos casi desnudos.

Cast. Aster con hoja de Hisopo.

Habita en la America septentrional. 24

Echa el tallo del largo de un pie y algo rígido; con rudimentos de ramas que salen de cada axila: las hojas entre lineares y lanceoladas, agudas en ambos extremos, enterisimas, verdes, del largo de una pulgada, entre verticales y dobladas ácia dentro: la panoja elevada en ramillete horizontal; y los pedunculos terminales, con dos ó tres hojas lineares: los cálices aovados y estrechamente apiñados: el radio de la corola de ocho petalos, de color de violeta: el disco elevado y verdoso: los estambres de color de ladrillo: y el pistilo amarillo.

Du-
mosus. 12. ASTER *foliis linea-* X Aster con hojas lineares y
ribus integerrimis, caule X enterisimas; tallo en pano-
paniculato, floribus termi- X ja; y flores terminales.
nalibus. Hort. cliff. 408.
Gron. virg. 123.

Aster *Novæ Angliæ, Li-* X Aster de la Nueva Ingla-
nariæ foliis, Chamæmeli flo- X terra, con hojas como las de
ribus. Herm. parad. 95. t. X la Linaria; y flores como las
95. X de la Manzanilla.

Aster *Americanus, mul-* X Aster Americano, de mu-
riflorus, flore albo Bellidis, X chas flores, blancas y como
disco luteo. Pluk. alm. 56. X las de la Margarita, con el
t. 78. f. 6. X disco amarillo.

Cast. Aster frondoso.

Habita en la America septentrional. 24

Tiene el tallo en panoja, muy ramoso; con las ramas filiformes: las hojas del tallo angostas y lanceoladas; y
las

las *de las ramas* lineares: los *pedunculos* filiformes, es-
triados, de una flor y salpicados de hojuelas muy an-
gostas: las *flores* pequeñas, con el caliz derecho, api-
ñado y laxo: el *radio* copioso y blanco: el *disco* ama-
rillo-roxo y con menos flosculos que en el radio.

Eri- 13. ASTER *foliis linea-* X Aster con hojas lineares y
coides *ribus integerrimis, caule* X enterisimas; tallo en panoja;
paniculato, pedunculis ra- X pedunculos racimosos; y pie-
cemosis, pedicellis foliosis. X cecitos foliosos.

Gron. virg. 124. Mill. dict.
n. 12.

Aster caule paniculato, X Aster con el tallo en pa-
floribus racemosis, calyci- X noja; flores racimosas; cáli-
bus patulis oblongis, foliis X ces extendidos, oblongos; y
subulato--linearibus. Roy. X hojas entre alesnadas y li-
lugdb. 168. X neares.

Aster Ericoides, dumo- X Aster frondoso, parecido
sus. Dill. elth. 40. t. 36. X al Brezo.
f. 40. X

Cast. Aster como Brezo.

Habita en la America septentrional. 24

Te- 14. ASTER *foliis subli-* X Aster con hojas casi linea-
nuifo- *nearibus integerrimis, pe-* X res, enterisimas; y pedun-
lius. *dunculis foliosis.* Mill. dict. X culos foliosos.
n. 14.

Aster Americanus, Bel- X Aster Americano, con ho-
vedere foliis, floribus ex X jas como las del Mirabel;
cæruleo albicantibus, spicis X flores entre cerúleas y blan-
longis. Pluk. alm. 56. t. 78. X quecinas; y espigas largas.
f. 5. X

Cast. Aster de hoja delgada.

Habita en la America septentrional. 24

Posee los tallos delgados, angulosos y lisos: las *hojas* al-
ternas, entre lineares y casi lanceoladas, enterisimas y
menos ásperas: el *tallo* algo ramoso: las *flores* termina-
les y solitarias: y los *pedunculos* salpicados de hojuelas
alesnadas y muy pequeñas.

Lina-
riae fo-
lius. 15. ASTER *foliis linea-
ribus integerrimis mucro-
natis scabris carinatis, pe-
dunculis foliosis.* Mill. dict.
n. 10. Aster con hojas lineares,
enterisimas, terminadas en
punta rígida, ásperas, aqui-
lladas; y pedunculos folio-
sos.

*Aster Americanus, fru-
tescens, Satureiæ foliis sca-
bris, floribus amplis satu-
rate violaceis.* Pluk. alm. 56.
t. 14. f. 7. Aster Americano, frutes-
cente, con hojas como las
de la Axedrea, ásperas; flo-
res anchas y de color de vio-
leta subido.

*Aster Marilandicus, Ros-
marini foliis angustioribus,
in caule crebris inordinatis,
floribus in summitate pau-
cis.* Rai. Suppl. p. 175. Aster de Marilandia, con
hojas como las del Romero,
mas angostas, puestas es-
pesas y sin orden en el tallo;
y pocas flores en la sumidad.

Cast. Aster con hoja de Linaria.

Habita en la America meridional. 2

Tiene los tallos de color que tira á purpúreo: las *hojas* li-
neares, verdes, muy ásperas, agudas, aquilladas y es-
parcidas ó sin orden: los *pedunculos* alternos y salpi-
cados de hojuelas muy pequeñas: pocas *flores* termina-
les y solitarias.

Lini-
folius. 16. ASTER *foliis linea-
ribus acutis integerrimis,
caule corymboso ramosissi-
mo.* Hort. cliff. 408. Gron.
virg. 123. Aster con hojas lineares,
agudas, enterisimas; tallo
en corimbo y muy ramoso.

*Aster Tripolii flore, an-
gustissimo & tenuissimo* del Tripolio; y hoja muy an-
folio. Moris. hist. 3. p. 121. Xgosta y muy delgada.

Cast. Aster con hoja de Lino.

Habita en la America septentrional. 2

Posee las *hojas* lanceoladas y adelgazadas gradualmente
ácia su ápice: y los *pedunculos* con escamas alesnadas
y muy pequeñas.

Acris.

17. *ASTER foliis lanceolato-linearibus strictis integerrimis planis, floribus corymbosis fastigiatis, pedunculis foliosis.* Pall. it. 1. p. 438.

Aster con hojas entre lanceoladas y lineares, apretadas y rígidas, enterisimas, planas; flores corimbosas y elevadas en ramillete horizontal; y pedunculos foliosos.

Aster (Ledifolius) foliis lanceolato-linearibus subcarnosis integerrimis planis, floribus corymbosis fastigiatis, pedunculis foliosis. Gou. hort. 442.

Aster (con hoja de Ledo) de hojas entre lanceoladas y lineares, algo carnosas, enterisimas y planas; flores corimbosas y levantadas en ramillete horizontal; y pedunculos foliosos.

Aster Tripolii flore. C. B. P. 267. Tourn. p. 481.

Aster con la flor como la del Tripolio.

Aster angustifolius, Tripolii flore. Barr. ic. 606.

Aster de hoja angosta; y flor como la del Tripolio.

Aster minor, Narbonensium, Tripolii flore, Linariæ folio. Lob. ic. 349.

Aster menor, de los de Narbona, con la flor como la del Tripolio; y hoja como la de la Linaria.

Cast. Aster acre.

Habita en Hungría y Mompeller: en los circuitos del Real Sitio del Pardo, y de Barcelona detras de Monjuí, y en otras partes de España.

Gmelino sib. it. 1. p. 172. trae una variedad de esta especie con la flor amarilla. R.

Con-
color.

18. *ASTER foliis ovatis sessilibus integerrimis, caule simplicissimo, racemo terminali.* Syst. veg. 633.

Aster con hojas aovadas, sin peciolo y enterisimas; tallo muy sencillo; y racimo terminal.

Aster caule simplicissimo, foliis oblongo-ovatis tomentosis sessilibus integerrimis, racemo terminali. Gron. virg. 123. Spec. pl. 3. p. 1228.

Aster con el tallo muy sencillo; hojas entre oblongas y aovadas, tomentosas, sin peciolo, enterisimas; y racimo terminal.

410 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Aster purpureus, non ramosus, foliis parvis rigidis, floribus concoloribus, seriatim ad caulem dispositis. Clayt. ibid. *Aster purpúreo, sin ramas, con hojas pequeñas y rígidas; flores de un mismo color y dispuestas por series en el tallo.*

Cast. Aster de un mismo color.

Habita en la Virginia. 24

Es planta toda tomentosa, señaladamente en las hojas y cálices: y echa el racimo sencillo, con los pedunculos cortisimos.

Rigidus.

19. ASTER *foliis linearibus alternis, floribus terminalibus solitariis.* Gron. *Aster con hojas lineares, alternas; flores terminales y solitarias.*

virg. 124.

Aster foliis parvis, rigidis, crebris, caule non ramoso, ligneo, infirmo, flore unico specioso, barbulis purpureis longis, flosculis in disco ferrugineis, calyce squamoso, tumido, rotundo. Clayt. ibid. *Aster con hojas pequeñas, rígidas, y espesas; tallo sin ramas, leñoso y descaecido; una sola flor, muy hermosa, con rádios purpúreos y largos; flosculos en el disco de color amarillo ferrugineo, y caliz escamoso, inflado y redondo.*

Cast. Aster rígido.

Habita en la Virginia. 24

Novæ Angliæ

20. ASTER *foliis lanceolatis alternis integerrimis semi-amplexicaulibus, floribus confertis terminalibus, caule hispido.* Hort. cliff. 408. Gron. virg. 124. Knorr. del. *Aster con hojas lanceoladas, alternas, enterisimas, y que abrazan la mitad del tallo; flores amontonadas, terminales; y tallo erizado.*

1. t. S. 2.

Aster Novæ Angliæ, altissimus, hirsutus, floribus amplis, purpureo-vio-laceis. Herm. parad. 98. t. 98. *Aster de la Nueva Inglaterra, muy alto, con pelo áspero; flores anchas, y de color entre purpúreo y violetado.*

Aster Novæ Angliæ, al- *X* *Aster de la Nueva Inglaterra, con pelo áspero; flores mucho mas grandes que todas, y de color entre purpúreo y violado.*
tissimus, hirsutus, flori- *X*
bus omnium maximis, pur- *X*
pureo-violaceis. Tourn. p. *X*
 482. *X*

Cast. Aster de la Nueva Inglaterra.

Habita en la Nueva Inglaterra. 24

Tiene el *tallo* de color pardo: los *pedunculos* cortísimos y que apenas se manifiestan entre las flores; con el *radio de la corola* cerúleo.

Sube á la altura de un hombre. Echa el *tallo* con pelo áspero y de color que tira á roxo: las *hojas* ondeadas y con un solo nervio: las *escamas del caliz* laxâs y extendidas. *Gov. hort. 443.*

Undulatus.

21. *ASTER foliis corda-* *X* *Aster con hojas de figura*
tis amplexicaulibus undula- *X* *de corazon, amplexicaules,*
tis subtus tomentosis, flo- *X* *ondeadas, y por debaxo to-*
ribus racemosis ascendentibus. *X* *mentosas; flores en racimo*
Hort. cliff. 408. Gron. *X* *y ascendentes.*
virg. 124. *X*

Aster Novæ Angliæ, pur- *X* *Aster de la Nueva Inglaterra, con la flor de color*
pureus, Virgæ-aureæ facie *X* *purpúreo; traza como la de*
& foliis undulatis. Herm. *X* *la Virgaurea; y hojas ondeadas.*
par. 96. t. 96. *X*

Cast. Aster ondeado.

Habita en la America septentrional. 24

Tiene las *hojas de los pedunculos* menudas y aovadas.

Grandiflorus.

22. *ASTER foliis ample-* *X* *Aster con hojas que abra-*
xicaulibus lingulatis inte- *X* *zan el tallo, en forma de*
gerrimis, ramis unifloris, *X* *lengueta y enterisimas; ra-*
calycibus squarrosis. Spec. *X* *mas de una flor; y cálices*
pl. 3. p. 1231. *X* *desparramados.*

412 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Aster caule corymboso, foliis lingulatis reflexis, floribus solitariis, calycibus squarrosis. Spec. pl. 3. p. 1231. Mill. dict. n. 15. ic. t. 282. Aster con el tallo corimboso; hojas en forma de lengüeta, redobladas; flores solitarias; y cálices desparados.

Aster grandiflorus, asper, squamis reflexis. Dill. elth. 41. t. 36. f. 41. Aster áspero, con la flor grande; y escamas redobladas.

Aster Virginianus, pyramidatus, Buglossi foliis, asperis, calycis squamulis foliaceis. Martin. cent. 19. t. 19. Aster de Virginia, en pirámide, con hojas como las de la Borraxa, ásperas; y escamitas del caliz como hojas.

Cast. Aster de flor grande.

Habita en la America septentrional. 2

Catesby fue el primero que introduxo esta especie en Europa.

ESPECIES HERBACEAS, CON HOJAS ASERRADAS,
Y PEDUNCULOS LISOS.

Cordifolius. 23. *ASTER foliis cordatis serratis petiolatis, caule corymboso, pedunculis aphyllis, calycibus laevibus.* Syst. veg. 634. Aster de hojas en forma de corazon, aserradas, con peciolo; tallo corimboso; pedunculos sin hojuelas; y cálices lisos.

Aster foliis oordatis serratis petiolatis, caule paniculato. Sp. pl. 3. p. 1229. Hort. cliff. 408. Aster de hojas en forma de corazon, aserradas, con peciolo; y tallo en panoja.

Aster latifolius, glaber, humilis, ramosissimus, flore parvo, caeruleo, foliis ad basin cordatis. Moris. hist. 3. p. 121. sect. 7. t. 22. f. 34. Aster lampiño, baxo, muy ramoso, con hojas anchas, y las de abaxo ó de la base de figura de corazon; flor pequeña y de color cerúleo.

Aster latifolius, autumnalis. Corn. canad. 64. t. 65. Aster de otoño, con hoja ancha.

Cast. Aster con hoja de corazon.

Habita en la America y Asia septentrional. 2

Arro-

Arroja el tallo algo liso , y mas ramoso por arriba : las *hojas radicales* de figura de corazon , agudamente aserradas y por debaxo algo pelosas : las *inferiores del tallo* aovadas , aserradas , con sus peciolos ribeteados ; y las *de mas arriba* entre de figura de espatula y lanceoladas , y amplexicaules : la *panoja* corimbosa : los *pedunculos* desnudos : los *cálices* apiñados y apretados : y el *radio* blanquecino , con doce petalos.

Puniceus.

24. *ASTER foliis semi-amplexicaulibus lanceolatis serratis scabris, pedunculis alternis subunifloris, calycibus discum superantibus.* Aster con hojas que abrazan la mitad del tallo , lanceoladas , aserradas y ásperas ; pedunculos alternos , casi de una flor ; y cálices mas altos que el disco.

Hort. cliff. 408.

Aster Americanus, latifolius, puniceis caulibus. Aster de America, con hoja ancha ; y tallos de color de granada.

Herm. lugdb. 649. t. 651.

Moris. hist. 3. p. 120.

Aster autumnalis, elegantior, flore cæruleo, minore. Aster de otoño , mas levantado , con la flor cerúlea y mas pequeña.

Tourn. p. 408.

Cast. Aster de color de granada ó roxo.

Habita en la America septentrional. 24

Annuus.

25. *ASTER foliis ovatis, inferioribus crenatis, caule corymboso, pedunculis nudis, calycibus hemisphaericis.* Aster con hojas aovadas , y las inferiores recortadas ; tallo corimboso ; pedunculos desnudos ; y cálices hemisféricos.

Hort. cliff. 409. Fl. dan. t. 486.

Aster annuus, ramosus, albus, latifolius, Canadensis. Aster del Canadá , ramoso y annuo , con la flor blanca ; y hoja ancha.

Moris. hist. 3. p. 122.

Tourn. p. 482.

Bellis ramosa, umbellifera. Margarita ramosa , con flores en umbela.

Corn. canad. 193. t. 194.

Cast. Aster annuo.

Habita en el Canadá y en Dinamarca. ☉

414 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Ver- 26. ASTER *foliis radi-* X Aster con las hojas radi-
nus. *calibus lanceolatis integer-* X cales lanceoladas, enterisi-
rimis obtusis, caule subnu- X mas y obtusas; tallo con al-
do filiformi subramoso, pe- X guna hoja, filiforme, algo
dunculis nudis. Gron. virg. X ramoso; y pedunculos des-
124. X nudos.

Aster palustris, foliis X Aster palustre, de hojas
Bellidis non serratis, bar- X como las de la Margarita,
bulis tenuibus albis, disco X enterisimas; flosculos del ra-
luteo, caule viridi, hirsuto, X dio delgados y blancos, con
erecto. Clayt. ibid. X el disco amarillo; tallo ver-
X de, con pelo áspero y dere-
X cho.

Cast. Aster de primavera.
Habita en la Virginia. ¶

ESPECIES HERBACEAS, CON HOJAS ASERRADAS, X PEDUNCULOS ESCAMOSOS.

Tata- 27. ASTER *foliis radica-* X Aster con las hojas radi-
ricus. *libus lanceolato-ovatis ser-* X cales entre lanceoladas y ao-
ratis scabris, caule pauci- X vadas, aserradas, ásperas;
floro. Suppl. p. 373. X y tallo de pocas flores.

Cast. Aster de Tartaria.

Habita en la Siberia. ¶

Produce las *hojas radicales* profundamente aserradas, es-
curridas en peciolo, grandes (*respecto de la planta*),
sin que tengan tres nervios, ni sean aserradas por su
ápice, ó base: el *tallo* áspero, casi al doble mas largo
que las hojas radicales; con pocas hojas y mas angos-
tas: cinco hasta ocho *flores* grandes (*respecto de la*
planta): el *pedunculo* con dos brácteas alternas, del-
gadas y enterisimas: el *caliz* algo apiñado y sin que
sus ápices sean de color purpúreo: y el *radio* cerúleo y
grande.

In-
dicus. 28. *ASTER foliis ovato-oblongis serratis, floralibus ovali-lanceolatis integerrimis, ramulis unifloris.* X Aster con hojas entre ovadas y oblongas, aserradas, las florales entre ovales y lanceoladas, enterisimas; y ramitas de una flor.

Aster Conyzoides, India Orientalis, ramosior, caulibus sparsis. Pluk. alm. 57. t. 149. f. 4. X Aster como Conyza, de India Oriental, mas ramoso, y con tallos esparcidos.

Cast. Aster de la India.

Habita en la China.

Lævis. 29. *ASTER foliis lanceolatis sessilibus lævibus subserratis, pedunculis foliosis subdivisis.* X Aster con hojas lanceoladas, sin peciolo, lisas, algo aserradas; pedunculos foliosos y subdivididos.

Cast. Aster liso.

Habita en la America septentrional. Kalm. 24

Arroja el tallo derecho, liso, angulado y angosto: las hojas alternas, apartadas, sin peciolo, algo aserradas en medio, entre anchas y lanceoladas, y muy lampiñas en ambas partes: la panoja menos ramosa: los pedunculos salpicados de hojuelas alesnedas y muy pequeñas: y el radio de la corola cerúleo.

Los pedunculos de una flor y larguissimos: las hojas amontonadas; las de arriba que abrazan la mitad del tallo, enterisimas y ásperas. Gov. hort. 443.

Mutabilis. 30. *ASTER foliis lanceolatis serratis, calycibus squarrosis, panicula subfastigiata.* Mill. dict. n. 33. X Aster con hojas lanceoladas, aserradas; cálices desparramados; y panoja casi elevada en ramillete horizontal.

Aster Novi Belgii, latifolius, paniculatus, floribus saturate violaceis. Herm. lugdb. 65. t. 67. Tourn. p. 482. X Aster de la Nueva Flándes, en panoja, y con flores de color violado subido.

416 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Aster cœruleus, Ameri-
canus, non fruticosus, se-
rotinus, angustifolius, hu-
milis, flore amplo floribun-
do. Pluk. alm. 56. t. 326. f. 1. rúleo.

Cast. Aster mudable.

Habita en la America septentrional. ¶

Tiene los cálices mas estrechamente apinados que los del *Aster de Tradescant*; y los radios de la corola de color purpúreo subido: el disco de las flores primeramente amarillo y despues purpúreo: las hojuelas de los pedunculos desparramadas y encorvadas ácia atrás; y las es-
camas inferiores del mismo caliz que no son mayores que las demas. Es planta muy corimbosa y mas baxa que el *Aster de la Nueva Flandes*.

Trades-
cant.
ti.

31. *ASTER foliis lanceo-
lato-linearibus medio serra-
tis, pedunculis foliosis, cau-
le racemoso, calycibus erec-
tis*. Hort. cliff. 408. Murray.
prodr. 181. Aster con hojas entre lan-
ceoladas y lineares, aserra-
das en medio; pedunculos
foliosos; tallo racimoso; y
cálices derechos.

Aster Virginianus, sero-
tinus, parvo albente flore. Park. theatr. 132. Aster de Virginia, tardío,
con la flor pequeña y blan-
quecina.

Aster Virginianus, ra-
mosissimus, serotinus, par-
vis floribus, albis, Trades-
canti. Moris. hist. 3. p. 121. Aster de Tradescant, de
Virginia, muy ramoso, tar-
dío, con flores pequeñas y
blancas.

Cast. Aster de Tradescant.

Habita en la Virginia. ¶

El radio de la corola primeramente es blanco y despues
purpúreo.

Novi
Belgii.

32. *ASTER foliis lanceo-
latis subserratis sessilibus,
caule paniculato, ramulis
unifloris solitariis, calyci-
bus squarrosis*. Hort. cliff. 408. Aster con hojas lanceola-
das, algo aserradas y sin pe-
ciolo; tallo en panoja; rami-
tas de una flor, solitarias;
y cálices desparramados.

As-

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 417

Aster Novæ Belgiæ, la. *Aster de la Nueva Flan-*
rifolius, umbellatus, floribus des, en umbela, con hoja
dilatè violaceis. Herm. lug. ancha; y flores de color vio-
 db. 66. t. 67. Tourn. p. 482. lado claro.

Cast. Aster de la Nueva Flandes.

Habita en la Virginia y Pensilvania. *h*

Tardi-
 florus. 33. *ASTER foliis spa-* Aster con hojas entre de
thulato-lanceolatis serratis figura de espatula y lanceo-
oblongis, basi flexuosis se ladas, aserradas, oblongas,
miamplexicaulibus, caulibus ondeadas por su base y que
prostratis, floribus termi- abrazan la mitad del tallo;
nalibus. Syst. veg. 635. tallos postrados; y flores
 terminales.

Aster foliis spathulato- Aster con hojas entre de
lanceolatis serratis obliquis figura de espatula y lanceo-
semiamplexicaulibus basi ladas, aserradas, obliquas,
flexuosis, caulibus prostra que abrazan la mitad del ta-
tis, floribus terminalibus. llo y ondeadas por su base;
 Spec. pl. 3. p. 1231. tallos postrados; y flores ter-
 minales.

Cast. Aster que florece tarde.

Habita en la America septentrional.

Produce los tallos del largo de dos pies, algo ramosos, lisos
 y comunmente postrados: las *hojas* mayorcitas, lisas,
 algo rígidas, aserradas en medio, que abrazan la mitad
 del tallo, entre de figura de espatula, y lanceoladas,
 con un pliegue en la margen sobre la base en ambas
 partes, y una de las dos márgenes escurrida por la ra-
 ma con una estria vellosa: las *axilas de las ramas*
 apartadas y de color que tira á purpúreo: las *flores* co-
 mo las del *Aster de la Nueva Flandes*, amarillas, con
 el radio mas angosto y de color de perla, ó entre casi
 violado y blanquecino, y algo recortado por su apice:
 las *hojuelas del caliz* apiñadas, con las inferiores mas
 largas: y los *pedunculos* con una hojuela. Florece muy
 de tarde en tarde; de suerte, que en el Jardin de Lin-
 neo, no floreció mas que una vez en diez y ocho años.
 Se diferencia del *Aster de la Nueva Flandes* por las
 ramas mas desparramadas, casi separadas por medio de

418 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

un nudo en su base y ondeadas; por las *hojas* al doble mayores, con dientes que sobresalen, y dobladas en ambas partes sobre su base.

- Miser. 34. *ASTER foliis serratis, ramorum integerrimis, floribus ovatis, disco radii longiore.* Mill. dict. n. 8. Aster con hojas aserradas, y las de las ramas enterisimas; flores aovadas y el disco mas largo que los radios.
- Aster Ericoides, Meliloti agrariae umbone.* Dill. elth. 40. t. 35. f. 39. Aster parecido al Brezo, con la copa de las flores como la del Meliloto agrario ó de campo.

Cast. Aster miserable.

Habita en la America septentrional. 24

Echa el tallo del largo de pie y medio, craso, verde y menos en panoja que en las demas especies: las *hojas del tallo* inclinadas y algo aserradas; las *de las ramas* lanceoladas y enterisimas: los *cálices* junto con el disco de la corola aovados, y apiñados con las hojuelas derechitas y del largo del radio: el *radio* blanco, cortísimo y miserable ó triste: el *disco* pequeño, muy convexo y pálido, con los estilos de color amarillo-roxo.

- Macro- 35. *ASTER foliis serratis, radicalibus trinerviatis, cordatis maximis, caulinis ovatis sessilibus.* phyl- Aster de hojas aserradas, y las radicales con tres nervios unidos detras de su base, de hechura de corazon, muy grandes; las del tallo aovadas y sin peciolo.

Aster Canadensis, foliis imis amplioribus, cordatis, serratis. Vaill. act. 583. Aster del Canadá, con las hojas de abaxo mas anchas, de figura de corazon y aserradas.

Cast. Aster de hoja larga.

Habita en la America septentrional. 24

Posee las *hojas radicales* grandes, con peciolo, de figura de corazon, aserradas y con tres nervios unidos detras de su base: las *de las ramas* tambien aserradas, aovadas, pequeñas y sin peciolo: los *pedunculos* amontonados en el remate y las mas veces hendidos en tres partes.

Chi-
neasis

36. ASTER *foliis ovatis* X Aster de hojas aovadas ,
angulatis dentatis petiola- X angulosas , dentadas , y con
tis , calycibus terminalibus X peciolo ; cálices terminales ,
patentibus foliosis . Hort. X extendidos y foliosos.
cliff. 407. Knorr. del. 1. t. S.

3. 4. 5.

Aster *Chenopodii folio* , X Aster annuo , con hoja co-
annuus , flore ingenti , spe- X mo la del Chênopodio ; flor
cioso . Dill. elth. 38. t. 34. X muy grande y muy hermo-
f. 38. X sa.

Cast. Aster de la China.

Habita en la China? ☉

La frutificacion se diferencia algun tanto de la de las de-
mas especies ; y la flor plena es muy grande y exce-
lente.

ESPECIE HERBACEA , CON HOJAS PINNADAS.

Auran-
tius.

37. ASTER *foliis pinna-* X Aster con hojas pinna-
tis . Hort. cliff. 407. Mill. X das.
dict. 31.

Aster *Americanus , foliis* X Aster de America , con
pinnatis & serratis , flori- X hojas pinnadas y aserradas ;
bus aurantiis . Houst. Mss. X y flores de color de naran-
cum figura. Amm. herb. 466. X ja.

Cast. Aster de color de naranja.

Habita en Vera-cruz. ☉

No se dió Linneo por bastante satisfecho de la observa-
cion de esta planta ; por ser su traza distinta de la de
las demas especies de este género.

420 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

1139. Género SOLIDAGO. * *Vaill. A. G.* 1720.

f. 5. 46. 18. *Virga-aurea. Tourn. t.* 275.

Vaill. A. G. 1720. *Doria. Dill.*

gen. 8. *elth.* 104. 105.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun oblongo y apifinado; con *escamas* oblongas, angostas, puntiagudas, rectas y arrimadas entre sí.

COR. *compuesta* radiada; con muchas *corolillas* hermafroditas, tubulosas, en el disco; y menos de diez (*comunmente cinco*) femeninas y liguladas, en el radio.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco partes y extendido.

De la femenina: ligulada, lanceolada y con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: *germen* oblongo: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con el *estigma* hendido en dos partes y extendido.

En las femeninas: *germen* oblongo: *estilo* filiforme, del largo del de la hermafrodita: con dos *estigmas* revueltos.

PERIC. ninguno: el *caliz* apenas mudado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: entre aovadas al revés y oblongas: con el *vilano* sencillo.

En las femeninas: muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. Algo plano y desnudo.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

VIRGA-AUREA. p. 483.

La *flor* es radiada ó cuyo disco consta de muchos *flosculos*, y la corona de *semiflosculos*, sentados en *embriones*, y comprendidos en el *caliz* escamoso: y los *embriones* pasan á *semilla* adornada de *vilano*. A estas notas
se

se añade la de las flores, que nacen en una serie en la sumidad de las ramas.

ESPECIES.

Sem-
pervi-
rens. 1. *SOLIDAGO foliis lanceolatis subcarnosis glaberrimis margine scabriusculis, panicula corymbosa.* Solidago con hojas lanceoladas, algo carnosas, muy lampiñas, un poco ásperas por su margen; y panoja corimbosa.

Solidago panicula corymbosa, racemis reflexis, floribus ascendentibus, foliis glaberrimis. Gron. virg. 97. Solidago con la panoja corimbosa; racimos redobladados; flores ascendentes; y hojas muy lampiñas.

Virga-aurea Novboracensis, glabra, caulibus rubentibus, foliis angustis, glabris. Herm. flor. 26. Virgaurea de la Nueva York, lampiña, con los tallos rojos; hojas angostas y lampiñas.

Virga-aurea Canadensis, foliis carnosis, non serratis, latioribus seu angustioribus. Moris. hist. 3. p. 124. sect. 7. t. 23. f. 15. Virgaurea del Canadá, con hojas carnosas, enterisimas, mas anchas ó mas angostas.

Virga-aurea seu Solidago procerior, Americana, caule multiplici. Pluk. alm. 389. t. 235. f. 5. Virgaurea ó Solidago de America, mas alto, y con muchos tallos.

Cast. Solidago siempre verde.

Habita en la Nueva York, y en el Canadá. 2

Echa el tallo roxo y de la altura de un hombre, con hojas lampiñas, algo carnosas, un poco ásperas por su margen y que persisten todo el invierno. Florece muy tarde, y el frio (en Upsal) comunmente sufoca sus flores.

Canadensis. 2. *SOLIDAGO paniculato-corymbosa, racemis recurvatis, floribus ascendentibus, foliis trinerviis subserratis scabris.* Hort. cliff. 409. Gron. virg. 97. Solidago entre en panoja y corimboso, con racimos encorvados ácia atrás; flores ascendentes; hojas con tres nervios, algo aserradas y ásperas.

Vir-

422 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Virga-aurea angustifolia, *Virgaurea* del Canadá, *panicula speciosa*, *Canadensis*. Pluk. alm. 389. t. 263. con hoja angosta; y panoja hermosa. f. 1. Moris. hist. 3. p. 125.

Virga-aurea angustifolia, *Virgaurea* exótica, con *cespitosa*, *exotica*. Barr. ic. hoja angosta; y que forma 784. *cesped*.

Cast. Solidago del Canadá.

Habita en la Virginia y en el Canadá. 2

Tiene las *hojas* angostas y lanceoladas, casi lampiñas y con aserraduras apenas manifestas.

Las *hojas* lanceoladas, que abrazan la mitad del tallo, con tres ó quatro aserraduras por arriba: y las *flores* pequeñas. *Gov. hort.* 444.

Altis-
sima.

3. *SOLIDAGO paniculato-corymbosa*, *racemis recurvis*, *floribus ascendentibus*, *foliis enerviis serratis*. *Hort. ups.* 259. *Mill. dict. n.* 8. *Solidago* entre en panoja y corimboso, con racimos encorvados ácia atrás; flores ascendentes; hojas sin nervios y aserradas.

Virga-aurea altissima, *serotina*, *panicula speciosa patula*. *Mart. cent.* 14. t. 14. *Virgaurea* muy alta, tardía, con la panoja hermosa y extendida.

Cast. Solidago altísimo.

Habita en la America septentrional. 2

La *traza* de esta especie es muy semejante á la de la precedente; aunque diversa en la magnitud, aserraduras y nervios de las hojas. La misma *traza* tambien manifesta que son de una propia especie y acaso *hibridas* las plantas siguientes; de suerte que apenas se halla diferencia entre ellas.

Virga-aurea Novæ Angliæ, *altissima*, *paniculis nonnumquam reflexis*. *Boerh. lugdb.* 1. pag. 97. *Virgaurea* de la Nueva Inglaterra, muy alta, con panojas alguna vez redobladas.

Virga-aurea Americana, *hirsuta*, *radice odorata*. *Dill. elth.* 410. t. 304. f. 391. *Virgaurea* de America, con pelo áspero; y raíz olorosa.

Vir-

Virga-aurea Novæ Angliæ, rugosis foliis crenatis. Dill. elth. 406. t. 308. f. 396. Virgaurea de la Nueva Inglaterra, con hojas rugosas y recortadas.

Virga-aurea Americana, aspera, foliis brevioribus serratis. Dill. elth. 311. t. 305. f. 392. Virgaurea de America, áspera, con hojas mas cortas y aserradas.

Virga-aurea Marilandica, spicis florum racemosis, foliis integris scabris. Mart. cent. 13. t. 13. Virgaurea de Marilandia, con espigas de las flores racimosas; hojas enteras y ásperas.

4. SOLIDAGO paniculata corymbosa, racemis recurvis ascendentibus, caule infernè ramoso floriferoque. Solidago con la panoja corimbosa, racimos encorvados ácia atrás y ascendentes; tallo que por abaxo lleva muchas ramas y flores.

Cast. Solidago con flores laterales.

Habita en la America septentrional. Kalm.

Es planta la mitad mas pequeña que la del *Solidago del Canadá*. Echa las hojas sin aserraduras, y mas blandas; pero señaladas, alguna vez, con uno ú otro diente: el tallo que por debaxo arroja ramas sencillas, poco mas cortas que él, corimbosas en su remate; sin que tenga rama alguna en medio, lo qual es singular en esta especie.

5. SOLIDAGO racemispicatis, foliis serratis, florum radio bicolore. Solidago con racimos espigados; hojas aserradas; y el radio de las flores de dos colores.

Aster Americanus, Virgæ-aureæ facie, flore minimo, albido, vix radiato. Vaill. act. 54. Aster de America, con traza de Virgaurea; flor muy pequeña, blanquecina y apenas radiada.

Virga-aurea flore albo, spicato. Pluk. alm. 389. t. 114. f. 8. Virgaurea con la flor blanca y espigada.

Cast. Solidago de dos colores.

Habita en la America septentrional. Royen.

Es

424 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Es distinto por los *racimos* densos ; y por las *flores* amarillas , con el *radio* blanco.

Lan- 6. SOLIDAGO *corymbis* X Solidago con corimbos
ceola- *terminalibus , foliis lineari-* X terminales ; hojas entre li-
ta. *lanceolatis integerrimis tri-* X neares y lanceoladas , ente-
nerviis. X risimas y de tres nervios.

Cast. Solidago lanceolado.

Habita en la America septentrional. Royen.

Tiene el *tallo* de la altura de cinco pies : las *hojas* largas y ásperas, señaladamente por su margen : los *calices* pequeños , aovados al revés y algo desparramados : y el *radio* de la *corola* chico.

Cæsia. 7. SOLIDAGO *panicula* X Solidago con la panoja
corymbosa , racemis supra X corimbosa ; racimos mas den-
densioribus , caule glabro X sos por arriba ; tallo lampiño
levi. Mill. dict. n. 21. X y liso.

Virga aurea Marilandica, X Virgaurea de Marilandia,
cæsia, glabra. Dill. elth. 414. X lampiña y de color verde
t. 307 f. 395. X azul.

Virga-aurea Marilandica, X Virgaurea de Marilandia,
foliis longis , angustis, acu- X con hojas largas , angostas y
tis , ramis seu virgulis flo- X agudas ; ramas ó varitas que
riferis è foliorum alis exeun- X llevan las flores que salen
tibus longa serie. Rai, Sup- X de las axilas en una larga
pl. p. 168. X serie.

Cast. Solidago de color verde azul.

Habita en la America septentrional. 2

Mexi- 8. SOLIDAGO *caule obli* X Solidago con el tallo obli-
cana. *quo , pedunculis erectis fo-* X quo ; pedunculos derechos,
liolatis ramosis , foliis lan- X con muchas hojuelas y ramo-
ceolatis integerrimis. Hort. X sos ; hojas lanceoladas y en-
cliff. 409. Roy. lugdb. 161. X terisimas.

Virga-aurea Mexicana, C. X Virgaurea de México,
B. P. 517. X

Virga-aurea Limonii folio, panicula uno versu disposita. Tourn. p. 484. Pluk. phyt. t. 235. f. 2? Dodart. act. 4. p. 219. t. 219. Virgaurea con hoja como la del Limonio ; y panoja con flores dispuestas en una serie.

Cast. Solidago Mexicano.
Habita en México ? 24

Flexi-
caulis. 9. SOLIDAGO caule flexuoso, foliis ovatis acuminatis serratis, racemis lateralibus simplicibus. Roy. lugdb. 161. Gron. virg. 123. Solidago con el tallo ondeado ; hojas aovadas , puntiagudas , aserradas ; racimos laterales y sencillos.

Virga-aurea montana, Scrophulariæ folio. Pluk. alm. 390. t. 235. f. 3. Moris. hist. 3. p. 124. Virgaurea montana, con hoja como la de la Escrofularia.

Virga-aurea Canadensis, Asterisci folio. Herm. parad. 244. t. 244. Virgaurea del Canadá, con hoja como la del Asterisco.

Virga-aurea Canadensis, folio subrotundo, serrato, glabro. Tourn. p. 485. Virgaurea del Canadá, con hoja casi redonda, aserrada y lampiña.

Cast. Solidago de tallo ondeado.
Habita en el Canadá.

Lati-
folia. 10. SOLIDAGO caule erecto, foliis ovatis acuminatis serratis, racemis lateralibus simplicibus. Kniph. cent. 4. n. 85. Solidago con el tallo derecho ; hojas aovadas , puntiagudas y aserradas ; racimos laterales y sencillos.

Virga-aurea latissimo folio, Canadensis, glabra. Pluk. alm. 389. t. 235. f. 4. Virgaurea del Canadá, lampiña, y con hoja muy ancha.

Cast. Solidago de hoja ancha.
Habita en el Canadá. 24

Es muy semejante al *Solidago de tallo ondeado* ; pero tiene el tallo recto y con ángulos agudos : las hojas aovadas , aserradas , lisas por encima y ásperas por debaxo:
los

426 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

los racimos que salen de las axilas y comunmente mas cortos que la hoja.

Virga-
aurea.

11. *SOLIDAGO caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis.* Mat. med. pag. 214. Flor. dan. t. 663. Knorr. del.

1. t. W. 11.

Solidago caule erecto, racemis alternis erectis. Hort. cliff. 409. Gmel. sib. 2. pag. 164.

Solidago caule anguloso, hirsuto, foliis ovato-lanceolatis, dentatis, racemis multifloris, spicatis. Hall. helv. n. 69.

Solidago floribus per caulem simplicem undique sparsis. Fl. lapp. 306.

Virga-aurea vulgaris, latifolia. Bauh. hist. 2. pag. 162. Tourn. p. 484.

Virga-aurea latifolia, serrata. C. B. P. 268. Tourn. p. 484.

Cast. *Solidago Virgaurea*, ó vara de oro.

Habita entre pastos secos de Europa : en Bustarviejo, en las viñas de Miraflores de la Sierra, en Aragon, Cataluña, en Castilla la vieja y otras muchas partes de España. 24

Tiene las hojas de mas arriba enterisimas.

PROPIED. Toda la planta es balsámica, vulneraria y diuretica; y se usa en el cálculo.

Mi-
nuta.

12. *SOLIDAGO caule simplicissimo, foliis caulinis integerrimis, pedunculis axillaribus unifloris.*

Vir-

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 427

Virga-aurea omnium minima , floribus maximis . Virgaurea mas pequeña que todas , con flores muy grandes.
Herm. parad. 245. t. 245.
Boerh. lugdb. 1. p. 97.

Virga-aurea montana, buncialis , pumila. Pluk. alm. 390. t. 235. f. 7. 8. Virgaurea montana , enana , y del largo de dos pulgadas.

Virga-aurea montana, minor . Barr. ic. 783. Bocc. mus. 169. t. 118. Virgaurea montana , menor.

Cast. Solidago menudo.

Habita en los Pirineos. 2

Rigida 13. *SOLIDAGO foliis caulinis ovatis scabris intergerrimis , ramis alternis fastigiatis, corymbis terminalibus.* Hort. cliff. 410. Solidago con las hojas del tallo aovadas , ásperas y enterisimas ; ramas alternas , elevadas en ramillete horizontal; y corimbos terminales.

Virga-aurea Novæ Angliæ , lato rigidoque folio. Herm. parad. 243. t. 243. Virgaurea de la Nueva Inglaterra , con hoja ancha y rígida.

Cast. Solidago rígido.

Habita en Pensilvania. 2

Tiene las hojas enterisimas.

Novæboracensis. 14. *SOLIDAGO foliis radicalibus ovato-oblongis petiolatis , caule nudisculo ramoso fastigiato.* Solidago de hojas radicales entre aovadas y oblongas, y con peciolo; tallo algo desnudo ó con pocas hojas, ramoso y elevado en ramillete horizontal.

Cast. Solidago de la Nueva Yorc.

Habita en la America septentrional. 2

Echa las hojas radicales como las del *Solidago Virgaurea* y muy ásperas : el tallo del largo de un pie , con tres ó quatro hojas mas pequeñas ; por arriba ramoso y levantado en ramillete horizontal : las flores solitarias , que terminan las ramas , grandes y amarillas.

1140. Género CINERARIA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun sencillo , y de muchas hojuelas iguales.

COR. compuesta radiada ; con numerosas corolillas hermafroditas é iguales, en el disco ; y femeninas liguladas, del número de las hojuelas del caliz , en el radio.

Propia de la hermafrodita : en forma de embudo ; con el borde hendido en cinco partes y derecho.

De la femenina : ligulada , lanceolada , y con dientecitos por su ápice.

ESTAMB. en las hermafroditas : filamentos cinco, filiformes y cortos : con la antera cilíndrica , tubulosa y hendida en cinco partes por su remate.

PIST. en las hermafroditas : germen oblongo : estilo filiforme , del largo de los estambres : con dos estigmas derechos.

En las femeninas : germen oblongo : estilo filiforme y corto : con dos estigmas oblongos , revueltos y algo obtusos.

PERIC. ninguno : el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : lineares , y de quatro ángulos : con el vilano peloso y abundante.

En las femeninas : muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. desnudo y algo plano.

OBS. La Cineraria purpúrea tiene el vilano plumoso.

ESPECIES.

Geisolia.

1. CINERARIA pedunculis ramosis, foliis reniformibus suborbiculatis sublobatis dentatis petiolatis. Cineraria con pedunculos ramosos ; hojas en forma de riñon , casi redondas , algo hendidas en lóbulos , dentadas y con peciolo.

Solidago foliis reniformibus suborbiculatis dentatis. Solidago con hojas en forma de riñon , casi redondas y dentadas.

Othonna Geifolia. Kniph. Othonna con hoja como la del Geo.

Ja-

Jacobæa Africana, *Hederæ terrestris folio*, *repens*. Comm. hort. 2. pag. 145. t. 73. *Jacobea Africana*, rástrea, con hoja como la de la Yedra terrestre.

Jacobæa Capensis, *Malvæ folio lanuginoso*. Seb. mus. 1. t. 22. f. 2. *Jacobea del Cabo de Buena-esperanza*, con hoja como la de la Malva y lanuginosa.

Cast. Cineraria con hoja de Geo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Cymbalaria. 2. CINERARIA *foliis ly-ratis, impari reniformi-denticulato*, *caulinis summis amplexicaulibus lobatis integerrimis*. Amœn. acad. 6. afr. 81. Cineraria de hojas en forma de lira, la impar de figura de riñon y con diente-citos, las de mas arriba del tallo amplexicaules, hendidas en lóbulos y enterisimas.

Aster flore luteo, *folio Cymbalariae*. Rai. Suppl. p. 158. *Aster* con la flor amarilla; y hoja como la de la Cimbalaria.

Aster Africanus, *minus, monanthos*, *luteus*, *foliolis angulosis*, *minimis*, *Aceris forma seu Cymbalariae*. Rai. Suppl. p. 161. *Aster* de Africa, muy pequeño, con una sola flor y amarilla; hojuelas muy pequeñas, angulosas y como las del Arce, ó de la Cimbalaria.

* *Jacobæa Afra*, *Geranii columbini folio*. Vaill. act. 570. *Jacobea* de Africa, con hoja como la del Geranio de palomas. *

Cast. Cineraria con hoja de Cimbalaria.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Burm.*

Sibirica. 3. CINERARIA *racemo simplici, foliis cordatis obtusis denticulatis levibus*, *caule simplicissimo monophyllo*. Cineraria con el racimo sencillo; hojas de hechura de corazon, obtusas, con dientecitos y lisas; tallo muy sencillo y con una hoja.

430 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Othonna foliis cordatis, *caule subnudo simplicissimo*. Hort. ups. 273. Hill. pl. 588. t. 14. Othonna con hojas de figura de corazon; tallo casi desnudo y muy sencillo.

Jacobæastrum Cacaliæ folio. Amm. ruth. 221. t. 24. Falsa-Jacobeia con hoja como la de la Cacalia.

Jacobæa Orientalis, *Cacaliæ folio*. Tourn. cor. 37. Jacobeia Oriental, con hoja como la de la Cacalia.

Jacobæoides Ari crenato folio. Vaill. act. 1730. pag. 30. Planta parecida á la Jacobeia, con hoja como la del Yaro, y recortada.

Solidago foliis cordatis, *subrotundis*, *dentatis*, *petiolatis*. Gmel. sib. 2. pag. 169. Solidago con hojas de figura de corazon, casi redondas, dentadas y con peciolo.

Cast. Cineraria de Siberia.

Habita en la Siberia, en Oriente y en los Pirineos? 2

Lleva el tallo indiviso, muy sencillo y de la altura de un hombre: las hojas del tallo con sus peciolos ensanchados por su base y amplexicaules: el caliz con dos bracteadas en su base, oblongas, de su longitud y que se marchitan.

Glauc.

4. CINERARIA *racemosa*, *simplici*, *foliis spathulato-cordatis integerrimis lævibus*, *caule simplicissimo*. Cineraria con el racimo sencillo; hojas entre de figura de espatula y de corazon, enterisimas, lisas; y tallo muy sencillo.

Solidago floribus spicatis, *foliis subcordatis*, *glaberrimis*, *glaucis*, *oblongè ellipticis amplexicaulibus*. Gmel. sib. 2. pag. 166. t. 74. Solidago con flores en espiga; hojas casi de figura de corazon, muy lampiñas, de color garzo, entre oblongas y elípticas, y que abrazan el tallo.

Cast. Cineraria de color garzo.

Habita en la Siberia. 2

Tiene las hojas algo carnosas; con los peciolos ribeteados y en forma de espatula: el tallo mas alto que el de la precedente: y el radio de la flor mas copioso.

Son-
chifo-
folia. 5. CINERARIA *foliis amplexicaulibus sinuatis difformibus*. Cineraria con hojas que abrazan el tallo, sinuosas y disformes.

Jacobæa Sonchifolio, flore purpureo, amplo, Africana. Breyn. prodr. 3. p. 31. t. 21. f. 1. Jacobea Africana, con hoja como la de la Cerraja; flor purpúrea y ancha.

Cast. Cineraria con hoja de Cerraja.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Pa-
lustris. 6. CINERARIA *floribus corymbosis, foliis lato-lanceolatis, dentato-sinuatis, caule villosis*. Flor. dan. t. 573. Pall. it. 1. pag. 45. Cineraria con flores corimbosas; hojas anchas, lanceoladas, entre dentadas y sinuosas; y tallo vellosos.

Othonna palustris. It. Scan. 241. 95. Flor. suec. 687. 778. Othonna palustre.

Solidago foliis inferioribus lanceolatis serrato-sinuatis, superioribus integris amplexicaulibus. Hort. cliff. 410. Gmel. sib. 2. pag. 158. t. 72. Solidago con las hojas inferiores lanceoladas, entre aserradas y sinuosas, las superiores enteras y que abrazan el tallo.

Jacobæa aquatica, elegantior, foliis magis dissectis. Moris. hist. 3. pag. 110. sect. 7. t. 19. f. 24. Jacobea aquatica, mas levantada, con hojas mas cortadas.

Conyza aquatica, laciniosa. C. B. P. 266. Conyza aquatica, laciniosa.

Cast. Cineraria palustre.

Habita en Europa entre cespedes aguanosos. 24

Las hojas cubren el tallo hasta las flores.

Alpina 7. CINERARIA *umbellata involuocrata, pedunculo communis nudiusculo, foliis oblongis villosis*. Pall. it. 2. pag. 28. Willich. illustr. n. 68. Cineraria con la umbelada adornada de involucre; pedunculo comun algo desnudo; hojas oblongas y vellosas.

- Cineraria* (cordifolia) foliis cordatis duplicato-dentatis subtus incanis, floribus corymbosis, pedunculis foliosis. Gou. illustr. p. 69. Jacq. austr. t. 176. *Cineraria* (con hoja de corazon) con hojas de hechura de corazon, dos veces dentadas y por debaxo blancuecinas; flores corimbosas; y pedunculos foliosos.
- Senecio* foliis cordato-lanceolatis, serratis. Hall. helv. n. 63. *Senecio* con hojas entre de figura de corazon y lanceoladas, y aserradas.
- Solidago alpina*, nuda. Jacq. vind. 287. *Solidago* alpino, desnudo.
- Jacobaea montana*, integro rotundo folio. Bocc. mus. 2. pag. 61. t. 49. Barr. ic. 145. *Jacobea* montana, con hoja entera y redonda.
- Jacobaea alpina*, foliis subrotundis, serratis. C. B. P. 131. Prodr. 70. t. 71. Tourn. urn. p. 485. *Jacobea* alpina, con hojas casi redondas y aserradas.
- Cineraria cordifolia, auriculata*. Jacq. austr. t. 177. *Cineraria* de hojas en forma de corazon, y con orejillas.
- Cineraria alata*. *Cineraria* alada. α
- Jacobaea alpina*, laciniosa, flore Buphthalmi. C. B. P. 131. *Jacobea* alpina, laciniosa, con flor como la del Buphtalmo.
- Cineraria crispa*. Jacq. austr. t. 178? R. *Cineraria* rizada.
- Jacobaea tertia*, latifolia prima. Clus. hist. 2. p. 23. *Jacobea* tercera, primera de hoja ancha.
- β *Cineraria integrifolia*. *Cineraria* de hoja entera. β
- Othonna foliis lanceolatis subdenticulatis villosis, floribus umbellatis*. Sp. pl. 1. pag. 925. Ger. prov. 205. *Othonna* de hojas lanceoladas, con algun dientecito, vellosas; y flores en umbela.
- Cineraria integrifolia, pratensis*. Jacq. aust. t. 180. *Cineraria* pratense, con hoja entera.

Senecio foliis imis petiolatis, cordatis, obiter dentatis, caulinis lingulatis, sessilibus. Hall. helv. n. 68. X
X Senecio con las hojas de abaxo pecioladas, de figura de corazon, con algun diente, las del tallo en forma de lengüeta y sin peciolo.

Jacobæa montana, lanuginosa, angustifolia, non laciniata. C. B. P. 131. Mo- X
X Jacobea montana, lanuginosa, de hoja angosta y sin lacinias.

ris. hist. 3. pag. 111. sect. 7. X
 t. 12. f. 28. Tourn. p. 486. X

Jacobæa montana, polyanthos, flore aureo, foliis longis & integris. Barr. ic. 260. X
X Jacobea montana, con muchas flores, de color de oro; hojas largas y enteras.

Solidago foliis lanceolatis, sessilibus, integris, denticulatis, floribus umbellatis, involucro setaceo. Gmel. sib. 2. p. 154. t. 71. X
X Solidago de hojas lanceoladas, sin peciolo, enteras y con dientecitos; flores en umbela, y con el involucro setáceo.

x *Cineraria Helenitis.* X Cineraria Helenite. x

Othonna foliis lanceolatis integris subdentatis villosis, floribus umbellatis. X
X Othonna con hojas lanceoladas, enteras, con algun diente, vellosas; y flores en umbela.

Conyza incana. C. B. P. 265. X
X Conyza blanquecina.

Aster incanus, Verbascifolio, villosus. Tourn. p. 482. X
X Aster blanquecino, velloso, y con hoja como la del Verbasco.

Conyza Helenitis, mellita, incana. Lob. ic. 347. Bauh. hist. 2. p. 1052. X
X Conyza Helenite ó como el Helenio, blanquecina y que despidе olor de miel.

Cast. Cineraria alpina.

Habita en los alpes de Suiza y de Austria: en los Pirineos, montes de Mompeller y de Siberia: en Galicia, en las cercas de los prados camino desde el lugar de Cebreira hasta el de Galiegos. 24

434 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Aurea. 8. CINERARIA *floribus* X Cineraria con flores co-
corymbosis, *foliis lanceola-* X rimbosas; hojas lanceoladas,
ris serratis subtilis tomento- X aserradas y por debaxo to-
sis. X mentosas.

Cast. Cineraria de color de oro.

Habita en la Siberia. 24

Su estatura es como la del *Senecio de lagunas*; pero tiene las flores al doble mayores, amarillas y con el radio ancho: los *piececitos* con algunas brácteas lineares: las hojas igualmente aserradas, tomentosas por debaxo, con vello poco manifesto por encima: y el tallo velloso.

Mari- 9. CINERARIA *floribus* X Cineraria de flores en pa-
tima. *paniculatis*, *foliis pinnati-* X noja; hojas hendidas al tra-
fidis tomentosis, *laciniis si-* X vés, tomentosas, con sus la-
nuatis, *caule frutescente.* X cinias sinuosas; y tallo fru-
Kniph. cent. 6. n. 68. X tescente.

Solidago foliis pinnatifi- X Solidago de hojas hendi-
dis, *laciniis sinuatis*, *co-* X das al través, con sus laci-
rymbis racemosis. Hort. cliff. X nias sinuosas; y corimbo
140. Gron. virg. orient. 277. X racimosos.

Jacobaea maritima. C. B. X Jacobea maritima.

P. 131. Tourn. p. 486.

Cineraria. Dod. pempt. X Cineraria.
642. X

Cast. Cineraria maritima.

Habita en las playas del mar Mediterráneo; y en las de España, entre las grietas de las peñas y en suelos gujarrosos. 7

Can- 10. CINERARIA *floribus* X Cineraria con flores en
densis. *paniculatis*, *foliis pinnati-* X panoja; hojas hendidas al
fidis subvillosis, *laciniis* X través, algo vellosas, con sus
sinuatis, *caule herbaceo.* X lacinias sinuosas; y tallo her-
X báceo.

Jacobaea maritima seu X Jacobea maritima, ó Cinc-
Cineraria latifolia. C. B. P. X raria de hoja ancha.
131. Prodr. 69. Tourn. 486. X

Cast. Cineraria del Canadá.

Habita en el Canadá. Kalm. 24

Parece que es producida de la especie antecedente ; pero tiene las *hojas* sin tomento y algo vellosas , señaladamente en su envés : el *radio de la corola* extendido y no revuelto : el *tallo* annuo y no perenne : y el *caliz* algo esfacelado por su ápice , lo que no se halla en aquella.

Lini-
folia. 11. CINERARIA *pedunculis unifloris , foliis sparsis , caule fruticoso.* Amoen. acad. 6. afr. 82. Cineraria con pedunculos de una flor ; hojas esparcidas ; y tallo fruticoso.

Cast. Cineraria con hoja de Lino.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Pur-
purata. 12. CINERARIA *caule subbifloro , foliis obovatis subtomentosis.* Cineraria con el tallo casi de dos flores ; hojas aovadas al revés y algo tomentosas.

Cast. Cineraria purpúrea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \mathcal{C}

Produce el *tallo* sencillo , herbáceo , del largo de un pie , tomentoso , asurcado por debaxo , y que por arriba termina en dos pedunculos larguissimos : las *hojas* alternas , amontonadas por debaxo , aovadas al revés con peciolo y pocas aserraduras ; dobladas por su margen , obtusas , vellosas por encima , tomentosas por debaxo y de la magnitud de las del *Chrysanthemo Leucanthemo* : dos *pedunculos* terminales , del largo del tallo , filiformes , tomentosos , derechos , y de una flor : las *flores* de la magnitud de las del *Amelo* , con el radio purpúreo : el *caliz* con pocas hojuelas , lanceoladas , casi iguales , mas cortas y vellosas : el *vilano* plumoso : y el *receptaculo* desnudo.

Amel-
loides. 13. CINERARIA *pedunculis unifloris , foliis oppositis ovatis nudis , caule suffruticoso.* Berg. cap. 290. Cineraria con pedunculos de una flor ; hojas opuestas , aovadas , desnudas ; y tallo sufruticoso.

436 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Solidago Africana, frutescens, cœrulea, Hypericifoliis, plerumque conjugatis. Vaill. aët. 564. X Solidago Africano, frutescente, con la flor cerúlea; hojas como las del Hypericon, y las mas veces conjugadas.

Aster caule ramoso, scabro, perenni, foliis ovatis sessilibus, pedunculis nudis, unifloris. Mill. dict. t. 76. f. 2. X Aster con el tallo ramoso, áspero y perenne; hojas aovadas, con peciolo; pedunculos desnudos y de una flor.

Cast. Cineraria como Amelo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Es muy parecida al *Amelo lyncite*; pero carece de pajas en el receptaculo; y varios *flosculos* abortan asi en el disco, como en el radio.

Tiene el radio de color cerúleo: las hojas con peciolo, entre aovadas y oblongas, verdes y no cenicientas.

Americana.

14. CINERARIA fruticosa, paniculis axillaribus, foliis alternis petiolatis lanceolatis serratis supra glabris subtus canis. Suppl. P. 373. X Cineraria fruticosa, con panojas axilares; hojas alternas, con peciolo, anchas y lanceoladas, aserradas, por encima lampiñas y por debaxo canas.

Cast. Cineraria de America.

Habita en la America meridional. *Mutis. h*

Es planta toda cubierta de una epiderme formada de lana muy delgada, la qual se separa facilmente, al modo que una membranita; y con ella blanquean las ramas, los peciolos, los pedunculos y la superficie inferior de las hojas. Arroja los tallos leñosos: las hojas venosas y de la consistencia de las siempre verdes: las panojas axilares: los *piececitos* con bracteas escamosas, y rara vez de dos flores: el caliz de muchas hojuelas iguales; de forma que parece ser de una sola pieza, y con algunas escamas irregulares en su base.

Alata. 15. CINERARIA caule X Cineraria con el tallo her-
herbaceo, foliis obovatis de- X báceo; hojas aovadas al re-
currentibus, floribus corym- X vés, escurridas; y flores co-
bosis. Suppl. p. 374. X rimbosas.

Cast. Cineraria alada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Echa el tallo derecho, poco ramoso, angulado, liso, y del largo de dos pies: las hojas aovadas al revés, enterisimas, lisas, del largo de una pulgada y escurridas: los pedunculos corimbosos, en la sumidad del tallo y sin hojuelas: el caliz partido en seis lacinias, aovado y liso: diez y seis flosculos, poco mas ó menos, de los quales algunos de la margen son femeninos y desnudos.

Elongata. 16. CINERARIA foliis X Cineraria con hojas casi
subcordatis erosis, pedun- X de figura de corazon, roza-
culis longissimis subulato- X das; y pedunculos larguissi-
squamosis. Suppl. p. 374. X mos, con escamas alesnadas.

Cast. Cineraria alargada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Produce el tallo derecho, ramoso, del largo de pie y medio, de color que tira á rubio y tomentoso en las ramificaciones: las hojas casi de figura de corazon, distantes, algo cortadas, desigualmente recortadas, desnudas, un poco obtusas, casi escurridas por su base, y del largo de una pulgada; con los peciolo de la longitud de las mismas hojas: los pedunculos terminales, larguissimos, salpicados de escamas alesnadas y con una flor: el caliz muy sencillo y dividido en doce hasta catorce lacinias lanceoladas, y tan largo como el disco: la corola amarilla y sin radio alguno.

Cacaloides. 17. CINERARIA foliis X Cineraria con hojas rolli-
teretibus oblongis carnosis, X zas, oblongas, y carnosas; pa-
panicula terminali elongata X noja terminal, alargada, de
pauciflora, pedunculis al- X pocas flores; y pedunculos
ternis. Suppl. p. 374. X alternos.

Cast. Cineraria como Cacalia.

438 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Es muy semejante á las especies de *Cacalia* en la carnosidad de la yerba.

Denticulata.

18. CINERARIA *foliis lanceolatis glabris denticulatis, floribus paniculatis.* Cineraria de hojas lanceoladas, lampifias, con dientecitos; y flores en panoja. Suppl. p. 375.

Cast. Cineraria con dientecitos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Tiene casi todas las *hojas* radicales y largas, sin que apenas se halle alguna en el tallo; menos unas pocas hojuelas en las ramificaciones.

Perfoliata.

19. CINERARIA *foliis ovatis cordatis amplexicaulis, pedunculis unifloris elongatis.* Cineraria con hojas aovadas, de figura de corazon y amplexicaules; pedunculos de una flor y alargados. Suppl. p. 375.

Cast. Cineraria perfoliada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Toda la *planta* es algo carnosas y de color garzo.

Capillacea.

20. CINERARIA *foliis pinnatis, foliolis capillaceis integris.* Cineraria de hojas pinnadas, con las hojuelas capilares y enteras.

Cast. Cineraria capilar.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Es muy semejante á la *Othonna Tagete*; pero posee las *hojas* profundamente divididas y mas delgadas.

Lineata.

21. CINERARIA *foliis lanceolatis subtus tomentosis apice serratis basi denticulatis.* Cineraria de hojas lanceoladas, tomentosas en su envés, aserradas por su ápice y con dientes en la base. Suppl. p. 375.

Cast. Cineraria rayada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Bladb. Thunb.*

Arroja el tallo herbáceo, del largo de un pie y aun mas, derecho, estriado y blanquecino: las *hojas* alternas, con peciolo muy corto, lanceoladas y rayadas en su ápice con

con algunas aserraduras ; de tres nervios por debaxo, tomentosas , blanquecinas y con algunos dientes en su base : la *panoja* decompuesta , enxuta y rígida , mucho mas larga que las hojas , blanquecina , y casi levantada en ramillete horizontal : los *cálices* pequeños : el *radio de la corola* amarillo : y el *vilano* al doble mas largo que el caliz.

Cordi-
folia.

22. CINERARIA *pani-* Cineraria con la panoja
cula pauciflora , foliis cau- de pocas flores ; hojas del ta-
linis petiolatis cordatis acu- llo pecioladas , de figura de
te serratis glabris , caule corazon , agudamente aser-
angulato. Suppl. p. 375. radas , lampiñas ; y tallo an-
gulado.

Cineraria cordifolia. Jacq. Cineraria con hoja de fi-
austr. v. 2. pag. 47. t. 176. gura de corazon.

Cast. Cineraria con hoja de corazon.

Habita en Austria. Jacquin.

Crispa

23. CINERARIA *flori-* Cineraria con flores en pa-
bus paniculatis , foliis cau- noja ; hojas del tallo entre
linis spathulato-oblongis de figura de espátula y oblon-
serratis obtusis amplexicau- gas , aserradas , obtusas , am-
libus basi dilatato-dentatis. plexícaules y con dientes an-
Suppl. p. 376. chos por su base.

Cast. Cineraria rizada.

Habita en Austria. Jacq.

Echa las *hojas radicales* grandes , de hechura de corazon, entre aovadas y redondeadas , con dientes y escurridas en un peciolo largo , alado y dentado : el *tallo* derecho y asurcado : las *hojas del tallo* en forma de espátula, amplexícaules y por su base con dientes ensanchados : los *pedunculos* y *cálices* vellosos.

Hasti-
folia.

24. CINERARIA *foliis* Cineraria de hojas en for-
hastatis , laciniis laterali- ma de alabarda , con sus la-
bus bifidis divaricatis. Sup- cinias laterales hendidas en
pl. p. 376. dos partes y divergentes.

Cast. Cineraria con hoja de alabarda.

Ha-

440 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Sparrman*.

Tiene el tallo derecho y mas largo de un xeme: las hojas alternas, con peciolo y partidas en tres lacinias; la del medio lanceolada, y señalada alguna vez con un dientecito en medio de ambos lados; las laterales divergentes, y hendidas en dos lóbulos tambien divergentes: los peciolos filiformes y mas anchos en su base: el pedunculo alargado y con escamas alesnadas: el caliz casi de diez hojuelas; y la flor amarilla.

1141. Género INULA. * Enula. *Cæsalp. Magnol.*

Helenium. Vaill. A. G. 1720. Moris.

Rai. Herm. Rivin.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun apifinado; con hojuelas laxás y extendidas; las exteriores mayores y de igual longitud.

COR. compuesta radiada y ancha; con las corolillas hermafroditas, iguales y muy numerosas, en el disco: femeninas liguladas, numerosas y amontonadas, en el radio.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo; con el borde hendido en cinco partes y derecho.

De la femenina: ligulada, linear y enterisima.

ESTAMB. en las hermafroditas: filamentos cinco, filiformes y cortos: con la antera cilindrica, y compuesta de cinco pequeñas, lineares y unidas entre sí, y cada una que por debaxo remata en dos cerdas rectas y del largo de los filamentos.

PIST. en las hermafroditas: germen largo: estilo filiforme, del largo de los estambres: con el estigma hendido en dos partes y derecho.

En las femeninas: germen largo: estilo filiforme, medio hendido en dos partes: con los estigmas derechos.

PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: lineares y de quatro ángulos: con el vilano sencillo y del largo de la semilla.

En las femeninas: semejantes á las de las hermafroditas.

RE-

RECEPT. desnudo y plano.

OBS. Las anteras que por debaxo terminan en diez cerdas, no solamente distinguen este género del Aster, sino tambien de todos los demas hasta aqui conocidos.

ESPECIES.

Hele-
nium. 1. *INULA foliis amplexicaulibus ovatis rugosis, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis.* Amœn. acad. 1. p. 410. Mat. med. p. 214. Flor. dan. t. 728. Inula con hojas amplexicaules, aovadas, rugosas, tomentosas por debaxo; y las escamas de los cálices aovadas.

Aster foliis ovatis rugosis amplexicaulibus, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis patulis. Hort. cliff. 407. Aster con hojas aovadas, rugosas, amplexicaules, tomentosas por debaxo; escamas de los cálices aovadas y extendidas.

Aster foliis ovato-lanceolatis, serratis, subtus tomentosis, calycinis ovato-lanceolatis, maximis. Hall. helv. n. 72. Aster con hojas entre aovadas y lanceoladas, aserradas, tomentosas por debaxo; las del caliz entre aovadas y lanceoladas, y muy grandes.

Helenium vulgare. C. B. P. 267. Helenio vulgar.

Helenium. Cam. epit. 35. Fuchs. hist. 242. Dod. pempt. 344. Helenio.

Aster omnium maximus, Helenio dictus. Tourn. p. 483. Aster mucho mayor que todos, llamado Helenio.

Cast. Inula Helenio. vulgo: Ala. Farm. Enula campana. Habita en Inglaterra, Flandes &c.: en Aragon, Cataluña, en Rasca-fria inmediato á la Cartuxa del Paular de Segovia, en la Serrania de Cuenca y otras partes de España. ¶

Tiene las *hojas radicales* lanceoladas, del largo de un pie y con dientecitos; y las *del tallo* que le abrazan la mitad: los *pedunculos* axilares y de una flor. Gov. hort. 444.

PROPIED. La raíz es aromática y mucilagínosa: alexitéria, expelente, expectorante, estomática y antelmíntica; y se usa con admirables efectos en la tos, en el asma humedo, hipocondría, cólica y en la sarna.

Odora. 2. *INULA foliis amplexicaulibus dentatis hirsutissimis, radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis, caule paucifloro.* Forsk. ægypt. cent. 5. pag. 150. Pall. it. 1. p. 154. Inula de hojas amplexicaules, con dientes y mucho pelo áspero, las radicales ovadas, las del tallo lanceoladas; y éste de pocas flores.

Aster luteus, radice odorata. C. B. P. 266. Tourn. p. 482. Aster con flor amarilla, y raíz olorosa.

Asteris altera species, Apula. Col. ecphr. 1. p. 251. t. 253. Otra especie de Aster, de Pulla.

Conyza altera, Apula. Moris. hist. 3. p. 113. sect. 7. t. 21. f. 6. Otra Conyza de Pulla.

Cast. Inula olorosa.

Habita en Italia, Provenza y Narbona: en las cercanías de la Villa de Olot de Cataluña, y en otros parages de los Pirineos.

Echa las hojas blandas; y las del tallo amplexicaules: y una ó dos flores con pedunculo.

Oculus Christi

3. *INULA foliis amplexicaulibus oblongis integris hirsutis, caule piloso corymboso.* Mill. dict. n. 7. Jacq. austr. t. 223. Inula de hojas amplexicaules, oblongas, enteras y con pelo áspero; tallo peloso y en corimbo.

Aster caule supernè ramoso ampliato, foliis lanceolatis amplexicaulibus integris, calycibus laxis terminalibus. Hort. cliff. 407. Aster con el tallo ramoso y ensanchado por arriba; hojas lanceoladas, que abrazan el tallo, enteras; cálices laxos y terminales.

Conyza Pannonica, lanu-
ginosa. C. B. P. 265. Moris.
hist. 3. pag. 113. sect. 7. t.
19. f. 1.

Conyza lanuginosa, de
Pannonia.

Aster Pannonicus, lanu-
ginosus, luteus. Tourn. p.
482.

Aster de Pannonia, lanu-
ginoso, y con flor amarilla.

Conyza tertia, Austria-
ca. Clus. hist. 2. pag. 20.

Conyza tercera, de Aus-
tria.

Cast. Inula ojo de Christo.

Habita en Austria: en la Cartuxa del Paular de Segovia,
en Bustarviejo, en Cataluña y otras muchas partes de
España. 24

Es planta toda cubierta de pelo áspero.

Britan-
nica.

4. *INULA foliis amplexi-*
caulibus lanceolatis dis-
tinctis serratis subtus vil-
losis, caule ramoso erecto
villosa. Flor. dan. t. 413.
Pall. it. 1. p. 370. Lepech.
it. 1. p. 208.

Inula con hojas amplexi-
caules, lanceoladas, distin-
tas ó separadas, aserradas,
y por debaxo vellosas; tallo
ramoso, derecho y velloso.

* *Conyzis affinis.* C. B. P.
265.

Planta parecida á las es-
pecies de *Conyza*. α

Conyza palustris, repens,
Britannica dicta. Moris.
hist. 3. pag. 113. sect. 7. t.
19. f. 8.

Conyza palustre, rastre-
ra, llamada de Bretaña.

Aster palustris, luteus,
folio longiori, lanuginoso.
Tourn. p. 483.

Aster palustre, con la flor
amarilla; hoja mas larga y
lanuginosa.

β *Conyza aquatica, Aste-*
ris flore aureo. C. B. P. 266.
Prodr. 124. Burs. XV. 41.

Conyza aquatica, con la
flor de Aster y de color de
oro. β

Aster pratensis, alpinus,
flore aureo. Tourn. p. 482.

Aster pratense, alpino,
con la flor de color de oro.

Cast. Inula de Bretaña.

Habita en Lusacia, Baviera, Escania y Siberia: en las
orillas del rio Guadiana, y en otros parages aguanosos
de España.

Tie-

444 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Tiene la traza como la de la *Inula disenterica*; pero el tallo mas alto y mas derecho: las hojas mas angostas y con aserraduras mas agudas.

La variedad β se diferencia solamente por el tallo vellosos; por las hojas tambien vellosas en su envés: y por los petalos del radio muy angostos.

Dysen-
terica.

5. *INULA foliis amplexicaulibus cordato-oblongis subtomentosis, caule villosopaniculato, squamis calycinis setaceis.* Amœn. acad. 1. pag. 410. Mat. med. 215. Flor. dan. t. 410.

Inula con hojas amplexicaules, entre de figura de corazon y oblongas, algo tomentosas; tallo vellosos, en panoja; y escamas del caliz setáceas.

Aster foliis amplexicaulibus, undulatis, subtomentosis. Hall. helv. n. 79.

Aster con hojas amplexicaules, ondeadas, y por debaxo tomentosas.

Aster foliis semiamplexicaulibus oblongis, caule paniculato hirsuto, floribus latis, squamis calycinis setaceis. Flor. suec. 694. 757. Dalib. paris. 260. Gmel. sib. 2. p. 180.

Aster con hojas que abrazan la mitad del tallo y oblongas; tallo en panoja, con pelo áspero; flores anchas; y escamas del caliz setáceas.

Aster pratensis, autumnalis, Conyzæ folio. It. gotl. 273. Tourn. p. 483.

Aster pratense, de otoño, con hoja como la de la *Conyza*.

Conyza media, Asteris flore luteo, seu tertia Dioscoridis. C. B. P. 265.

Conyza media, con la flor de *Aster* y amarilla; ó tercera de Dioscorides.

Conyza prima. Tabern. hist. 1243.

Conyza primera.

Calaminthæ tertium genus. Fuchs. hist. 436.

Género tercero de *Calaminta*.

Cast. *Inula disenterica*.

Habita en terrenos algo humedos de Europa: en los circuitos de Madrid; en Cataluña, Aragon, Castilla la vieja y en otras muchas partes de España. \mathcal{U}

Posee las escamas del caliz alesnadas, blandas, encorvadas ácia atrás y de color por su margen.

Las

Las *hojas* enterisimas, amplexicaules: y los *pedunculos* de una flor. *Gov. hort.* 445.

PROPIED. Las *hojas* y tallos se usan en la *sarna* y son admirables en la *disenteria*.

Undulata. 6. INULA *foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis undulatis.* Inula con *hojas amplexicaules*, entre de figura de *corazon* y *lanceoladas*, y ondeadas.

Helenium Ægyptiacum, *Helenio* de *Egipto*, de *tomentosum* & *incanum*, *Po-Lippio*, *tomentoso* y *blanquecino*, con *hoja* como la *del Polio*. 575.

Cast. Inula ondeada.

Habita en *Egipto*.

Atroja el *tallo* del largo de un *pie*, rollizo, derecho y algo *tomentoso*; con cinco *ramas* alternas, en varitas, apretadas y enxutas, y subdivididas por su remate: las *hojas* alternas, sentadas, amplexicaules, entre de figura de *corazon* y *lanceoladas*, ondeadas, sin aserraduras manifestas, blanquecinas en su envés, con lóbulos en su base y pegados ácia abaxo: los *pedunculos* terminales, de una flor y acompañados de algunas hojuelas: el *caliz* apañado, con escamas alesnadas y encorvadas por sus ápices: la *corola* amarilla: el *radio* mas corto, con los *petalos* lineares, numerosos, y con tres hasta cinco dientes; y el *disco* muy convexo. Las *flores* son de la magnitud de las de la *Matricaria*.

Indica. 7. INULA *foliis amplexicaulibus, cordato-lanceolatis serratis, pedunculis unifloris filiformibus, floribus globosis.* Inula con *hojas amplexicaules*, entre de figura de *corazon* y *lanceoladas*, aserradas; *pedunculos* de una flor, filiformes; y *flores* globosas.

Aster Conyzoides, *Indie* Aster como *Conyza*, de la *India Oriental*, mas *ramoso*, y con tallos esparcidos. *Pluk. alm.* 57. t. 149. f. 4.

Jacobæa perfoliata, folio \times Jacobea perfoliada, de longo, acuto, auriculato. \times hoja larga, aguda, y con Burm. zeyl. 124. t. 55. f. 2. \times orejillas.

Cast. Inula de las Indias.

Habita en la India Oriental. \odot

Es muy parecida á la *Inula pulicaria*; pero mayor, y mas enxuta y rígida. Echa las hojas algo ásperas, lanceoladas, agudas, desnudas por encima y algo tomentosas por debaxo: los pedunculos filiformes, mucho mas largos que la flor, y alguna vez adornados con una sola hojuela: las flores como las de la *Inula pulicaria*; pero con el radio mas largo: el caliz con menos pelo áspero: la corola amarilla; y el disco de color amarilloroxo.

Pulicaria.

8. *INULA foliis amplexicaulis undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis, radio brevissimo.* Inula de hojas amplexicaules y ondeadas; tallo prostrado; y flores casi globosas, con el radio cortísimo.

Flor. dan. t. 613. Blackw.

t. 103.

Aster foliis amplexicaulis, undulatis, hirsutis, radiis brevissimis. Hall. Aster de hojas amplexicaules, ondeadas, con pelo áspero; y rádios cortísimos.

Conyza major, flore parvo, globoso. C. B. P. 266.

Conyza mayor, con la flor pequeña y globosa.

Conyza minima. Dod. pempt. 52.

Conyza muy pequeña.

Aster palustris, parvo flore, globoso. Tourn. p. 483.

Aster palustre, con la flor pequeña y globosa.

* *Helenium palustre, annuum, Hyssopi foliis crispis.* Vaill. act. 575.

Helenio palustre, annuo, con hojas como las del Hisopo y rizadas. *

Aster palustris, fruticosus, minimus. Barr. ic. 369.

Aster palustre, fruticoso ó leñoso, y muy pequeño.

Conyza minor, exotica. C. B. P. 265.

Conyza menor, exótica.

Conyza minor, Hispanica X *Conyza menor*, de España, de las costas de Cádiz.
ex oris Gaditanis. Pluk. mant. 56. t. 384. f. 2.

Conyza media, crispa, X *Conyza media*, rizada, de lagunas, con la flor de nin-
lacustris, flore nullatenus X *radiato*. Rai. Suppl. p. 152. X *gun modo radiada*.

Cast. Inula pulicaria. vulgo: Yerba pulguera.

Habita en los caminos y plazas de la Europa templada: en el circuito de Madrid, en la Mancha, Aragon, Cataluña y en otras muchas partes de España. ☉

La variedad α es mayor y mas rígida, por cuyos caracteres no merece separarse.

Ara-
bica. 9. *INULA foliis oblongis* X *Inula* con hojas oblongas
sessilibus, pedunculis fili- X y sin peciolo; pedunculos fi-
formibus, calycibus cylin- X liformes; y cálices cilindri-
dricis. X cos.

Cast. Inula de Arabia.

Habita en la Arabia *Forsk*; y en la India. ☉

Es muy semejante á la *Inula pulicaria*, de la qual debe distinguirse con cuidado. Posee las *hojas* casi en forma de espatula, sin ser ondeadas, ni que abracen el tallo: los *cálices* cilindricos, y no globosos, con las escamas acercadas y no desparramadas: los *pedunculos* mas largos y las mas veces mellizos: el *radio de la corola* mas largo; y el *diseo* mas angosto.

Spiraei-
folia. 10. *INULA foliis subses-* X *Inula* con hojas casi sen-
silibus ovato-oblongis nudis X tadas, entre aovadas y oblon-
reticulatis confertis serru- X gas, desnudas, con venas en
latis, floribus terminalibus X redecilla, amontonadas y
subsessilibus. X aserradas; flores terminales
X y casi sin pedunculo.

Conyza media, Monspe- X *Conyza media*, con mu-
liensi affinis, multiflora. X chas flores, y parecida á la
Bauh. hist. 2. p. 1049. X de Mompeller.

Cast. Conyza con hoja de Espirea.

Habita en Italia.

Las flores apenas tienen pedunculo.

Squar- 11. INULA *foliis sessi-* Inula de hojas sentadas ,
rosa. *libus ovalibus lævibus reti-* ovales , lisas , con venas en
culato-venosis subcrenatis , redecilla , algo recorriadas ;
calyce squarroso. Mill. dict. y caliz desparramado.

n. 11. Gou. illustr. p. 68.

Aster Conyzoides , *odora-* Aster como Conyza , olo-
tus , *luteus*. Tourn. p. 483. roso , y con la flor amarilla.

Aster luteus , *latifolius* , Aster lampiño , con la flor
glaber , *foliis rigidis* & *mi-* amarilla ; hojas anchas , rí-
nutissime crenatis. Pluk. gidas y muy menudamente
alm. 37. t. 16. f. 1. recortadas.

Cast. Inula desparramada.

Habita en Italia y Mompeller. 2

Produce el tallo vellosa , estriado y las mas veces de una
flor: las hojas sentadas , un poco ásperas , y mas por su
margen, desnudas y casi aserradas : la flor grande , ter-
minal y sin pedunculo : el caliz con hojuelas ó esca-
mas lanceoladas y las exteriores mas grandes.

Sali- 12. INULA *foliis lanceo-* Inula con hojas lanceola-
cina. *latis recurvis serrato-sca-* das , encorvadas ácia atrás ,
bris , *ramis angulatis* , *flo-* aserradas y ásperas ; ramas
ribus inferioribus altiori- anguladas ; y flores inferior-
bus. Syst. veg. 637. res mas altas.

Aster foliis lanceolatis Aster con hojas lanceola-
amplexicaulibus serrato-ci- das , amplexicaules , entre
liatis glabris acuminatis re- aserradas y pestafiosas , lam-
curvis , *floribus solitariis* , piñas , puntiagudas , encor-
caule striato. Flor. suec. 696. vadas acia atrás ; flores soli-
759. Dalib. paris. 259. Gmel. tarias ; y tallo estriado.
sib. 2. p. 177. t. 77.

Aster foliis glabris , *ci-* Aster de hojas lampiñas ,
liatis , *venosis*. Hall. helv. pestafiosas y con venas.
n. 76.

Aster montanus , *luteus* , Aster montano , con la
Salicis glabro folio. C. B. P. flor amarilla ; hoja como la
266. Tourn. p. 483. del Sauce y lampiña.

Bubonium luteum I. Ta- Bubonio primero , con flor
bern. hist. 716. amarilla.

Cast. Inula con hoja de Sauce.

Habita en los prados húmedos de la Europa boreal : en la Alcarria , Asturias , Aragon , Cataluña y en otras partes de España. 24

Se diferencia de la *Inula con pelo áspero*, por el tallo lampiño , y arriba asurcado ó angulado ; por las hojas lampiñas y solamente ásperas en su margen.

Tiene el tallo del largo de un pie y rígido : las hojas amontonadas ; y las escamas del caliz laxâs. Gov. hort. 445.

Hirta. 13. *INULA foliis sessilibus lanceolatis recurvis subserrato-scabris, caule teretiusculo subpiloso, floribus inferioribus altioribus.* Jacq. *Inula con hojas sin peciolo, lanceoladas, encorvadas hacia atrás, algo aserradas y ásperas; tallo casi rollizo, un poco peloso; y flores inferiores mas altas.* Austr. t. 358. Pall. it. 1. p.

154. *Aster foliis ovatis, venosis, scabris, hirsutis.* Hall. *Aster de hojas aovadas, venosas, ásperas y con pelo áspero.* helv. n. 75.

Aster foliis lanceolatis sessilibus integerrimis, caulibus simplicibus unifloris, squamis calycinis subulatis. Dalib. paris. 259. *Aster con hojas lanceoladas, sin peciolo y enterisimas; tallos sencillos, de una flor; y escamas del caliz alesnadas.*

Aster luteus, hirsutus, Salicis folio. C. B. P. 266. *Aster de hoja como la del Sauce, con pelo áspero; y flor amarilla.*

Aster tertius, Pannonicus, Clusii, luteus, folio hirsuto Salicis. Bauh. hist. 2. p. 1047. *Aster tercero de Pannonia, de Clusio, de hoja como la del Sauce, con pelo áspero; y flor amarilla.*

Cast. Inula con pelo áspero.

Habita en la Siberia , Francia , Alemania y Ginebra : en los montes de Asturias , de Burgos y otros de España. 24

Tiene la traza como la de la *Inula con hoja de Sauce*; pero las hojas mas anchas, mas obtusas, con aserraduras apenas manifestas, venosas, y ásperas, señaladamente en la margen y quilla ó lomo : el tallo salpicado

450 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

de hojas y pelos algo rígidos , rollizo por todas partes y no asurcado ni angulado : y el *caliz* casi folioso.

Posee las *hojas* con pelusa áspera en ambas partes y de color casi rubio. *Syst. veg.* 638. Cotejense los sinónimos siguientes.

Aster Conyzoides , odoratus , luteus. Segui. ver. 2. pag. 211. Aster como Conyza , oloroso y con flor amarilla.

Aster luteus , *Cisti hirsutis* & *crenatis foliis* , de la Xara y recortadas, con summo caule ramoso , floribus amplis. Pluk. alm. 57. t. 78. f. 4. la sumidad ; y flores anchas y amarillas.

Aster luteo flore , aliis Conyzæ species. Cam. epit. 907. Aster con la flor amarilla, tenido por otros por especie de Conyza.

Cogida en Verona se diferencia por las *hojas* ovales y no lanceoladas, ni aserradas : y parece que el *caliz* indica ser una misma especie.

Ma- 14. INULA foliis sessilibus lanceolatis subserratis pilosis , pedunculis subunifloris subviscosis , foliis linearibus. Inula de hojas sin peciolo , lanceoladas, algo aserradas y pelosas ; pedunculos casi de una flor , un poco viscosos , y con hojuelas lineares.


Aster luteus , *Marianus* , *Saligneis brevioribus foliis* , con flor amarilla ; hojas como las del Sauce , mas cortas , con pelo áspero ; y ramoso en la sumidad del tallo. hirsutie pubescentibus , summo caule ramosus . Pluk. mant. 30. t. 340. f. 1.

Aster Carolinianus , pilosus , *Conyzæ cœruleæ foliis* , la Conyza cerúlea ; y flores floribus luteis , quasi umbellatim dispositis . Mill. amarillas , dispuestas casi en dict. t. 56. umbela.

Cas. Inula Mariana.

Habita en la America septentrional. 2

Es planta toda salpicada de pelos claros , blandos y blancos,



cos, señaladamente en el envés de las hojas. Posee las flores que terminan el tallo y casi en corimbo; pero con los pedunculos ó ramas, las mas veces, de una flor y salpicados de glandulas con piececito.

Germani-
ca.

15. *INULA foliis sessilibus lanceolatis recurvis scabris, floribus subfascicularis.* Jacq. austr. t. 134. Inula con hojas sin peciolo, lanceoladas, encorvadas ácia atrás, ásperas; y flores casi en hacedillo.

Aster foliis lanceolatis, amplexicaulibus, oris reflexis, ramis multifloris, calycibus oblongis, laxis. Gmel. sib. 2. p. 181. t. 78. f. 1. Aster con hojas lanceoladas, amplexicaules, y redobladas por sus orillas; ramas de muchas flores; cálices oblongos y laxos.

Conyzæ affinis Germanica. C. B. P. 266. Moris. hist. 3. sect. 7. t. 19. f. 26. Planta de Alemania, parecida á la Conyza.

Aster Thuringiacus, altissimus, latifolius, montanus, flore luteo, parvo. Hall. jen. 181. Aster de Turingia, altísimo, montano, con hoja ancha; flor amarilla y pequeña.

Cast. Inula de Alemania.

Habita en Misnia, Pannonia y Siberia. 2

Su traza es como la de la *Inula con hoja de Sauce*; pero tiene las flores cilindricas y amontonadas en corimbo en el remate del tallo.

Ensi-
folia.

16. *INULA foliis sessilibus linearibus acuminatis nervosis glabris sparsis, caule subunifloro.* Jacq. austr. t. 162. Inula con hojas sin peciolo, lineares, puntiagudas, nerviosas, lampiñas, esparcidas; y tallo casi de una flor.

Aster montanus, saxatilis, luteus, angusto, nervoso, acuto, & molli Plantaginis folio, multicaulis. Bocc. mus. 1. pag. 31. t. 18. Aster montano, saxátil, con muchos tallos; flor amarilla; hoja como la del Llantén, angosta, nerviosa, aguda y blanda.

Aster luteus, Linariæ rigidus, glabro folio. C. B. P. 267. Aster con flor amarilla; y hoja como la de la Linaria, rígida y lampiña.

Ff2

Cast.

Cast. Inula con hojas en forma de espada.

Habita en la Austria inferior.

Cri-
thmi-
folia. 17. INULA foliis linea-
ribus carnosis tricuspidatis. Scop. carn. ed. 2. n. 1066. sub Senecione. Inula de hojas lineares, carnosas y con tres puntas.

Aster flore terminali, foliis linearibus tricuspidatis. Hort. cliff. 409. Aster con la flor terminal; y hojas lineares con tres puntas.

Crithmum maritimum, flore Asteris attici. C. B. P. 288. Hinojo marítimo, con la flor como la del Aster attico.

Crithmum Chrysanthemum. Dod. pempt. 706. Hinojo marino, con la flor de color de oro.

Aster maritimus, folio tereti, crasso, tridentato. Tourn. p. 483. Aster marítimo, de hoja rolliza, crasa y con tres dientes.

Cast. Inula con hoja de Hinojo marino.

Habita en lugares marítimos de Inglaterra, Francia y Portugal: en los arenales del Mar de Barcelona, de Ayamonte y otros de España. 24

Pro-
vincia-
lis. 18. INULA foliis subser-
ratis subtus tomentosis, radicalibus petiolatis ovatis, caule erecto unifloro. Inula de hojas casi aserradas, por debaxo tomentosas, las radicales con peciolo, aovadas; tallo derecho y de una flor.

Inula caule folioso tomentoso unifloro, foliis radicalibus ovatis pinnatifidis integrisque, caulinis linearibus integerrimis. Gou. illustr. p. 168. R. Inula con el tallo folioso, tomentoso y de una flor; hojas radicales aovadas, hendidas al través y enteras, las del tallo lineares y enterísimas.

Solidago foliis tomentosis, ovatis & semipinnatis. Hall. helv. n. 70. sec. Gou. R. Solidago con hojas tomentosas, aovadas y medio pinnadas.

Jacobaea rotundifolia, incana. C. B. P. 131. Prodr. 69. Burs. VI. 127. Jacobea con hoja redonda y blanquecina.

Cast.

Cast. *Inula provincial.*

Habita en Provenza. 2

Echa la *raiz* con fibras fuertes: el *tallo* del largo de un pie, muy sencillo, derecho y veloso: las *hojas radicales* aovadas, con peciolo, obtusamente aserradas, vellosas por debaxo y algo obtusas; pocas en el *tallo*, lanceoladas, sin peciolo, menos aserradas, pelosas en su envés, y las de mas arriba lineares: la *flor* bastante grande y de color amarillo-roxo.

Haller refiere el sinónimo de *Gaspar Bauhino* al *Senecio doronico*.

Mon-
tana.

19. *INULA foliis lanceolatis hirsutis integerrimis, caule unifloro, calyce breviter imbricato.* Mill. dict. n. 6. *Inula* de hojas lanceoladas, con pelo áspero y enterisimas; tallo de una flor; y caliz corto y apiñado.

Aster foliis ellipticis, integerrimis, tomentosus, caule unifloro. Hall. helv. n. 81. *Aster* con hojas elípticas, enterisimas, tomentosas; y tallo de una flor.

Aster montanus, luteo, magno flore. Tourn. p. 482. *Aster* montano, con la flor grande y amarilla.

Aster atticus, luteus, montanus, villosus, magno flore. C. B. P. 267. Tourn. p. 482. *Aster* attico, montano, veloso, con la flor grande y amarilla.

Aster angustifolius, luteus. Bauh. hist. 3. p. 1046. *Aster* de hoja angosta; y flor amarilla.

Aster montanus, hirsutus. Lob. ic. 350. Hall. *Aster* montano, con pelo áspero.

Cast. *Inula montana.*

Habita en Viena y Mompeller: en la Serrania de Cuenca: en las aguas termales de Arnedillo: en el Piul de Rivas, en la Cartuxa de Mont-alegre de Barcelona y en otras partes de España. 2

Es *planta* con vello de color de nieve; y tiene el *caliz* y *estructura* muy semejantes á los *Asteres*.

Æ- 20. *INULA foliis spa-* X Inula con hojas en forma
tuans. *thulatis subius tomento-* X de espatula y tomentosas por
sis. † X debaxo.

Helenium Virgæ-pasto- X Helenio con hoja como la
ris folio, subius incano X de la Vara de pastor, blan-
mentos. Vaill. act. 573. X quecina y tomentosa por de-
X baxo.

Aster Primulæ-veris fo- X Aster con hojas como las
liis, semiflosculis tenuissi- X de la Primulaveris; y semi-
mis. Plum. spec. 10. ic. 41. X flosculos muy delgados.
f. 2. X

Cast. Inula que abrasa.

Habita en la America mas caliente.

Bi- 21. *INULA foliis decur-* X Inula de hojas escurridas,
frons. *rentibus oblongis denticu-* X oblongas y con dientecitos;
latis, floribus congestis ter- X flores amontonadas, termi-
minalibus subsessilibus. X nales y casi sin pedunculo.
Mill. dict. n. 10.

Conyza Pyrenaica, foliis X Conyza de Pirineos, con
Primulæ-veris. Herm. parad. X hojas como las de la Primu-
127. X laveris.

Conyza latifolia, viscosa, X Conyza de Provenza, vis-
suave olens, flore aureo, e X cosa, de olor suave, con ho-
Gallo Provincia. Tourn. p. X ja ancha; y flor de color de
455. Garid. aix. 125. t. 23. X oro.

Conyza præalta, caule X Conyza muy alta, oloroso
alato, odorata. Bocc. mus. 1. X sa, con el tallo alado.
p. 168. t. 121. Rai. Suppl.
p. 153. X

Cast. Inula de dos frentes.

Habita en Italia y Provenza: y en los Pirineos de Cata-
luña. ♂

Vease la *Conyza de dos frentes*, á la qual tienen algunos
Botánicos por la misma especie, aunque sin radio; pe-
ro ésta posee el tallo del largo de un pie, algo rígido y
corimboso: el olor fuerte como el del *Tanaceto*: y las
flores amarillas, con el radio corto.

Cœru-
lea.

22. *INULA foliis decur-* *Inula* con hojas escurri-
rentibus obovatis subserra- das, aovadas al revés, y al-
tis, caule suffruticoso, flo- go aserradas; tallo sufruti-
ribus sessilibus terminali- coso; flores sentadas y ter-
bus. minales.

Aster Poliifolius. Spec. pl. *Aster* con hoja como la
3. p. 1224. del Polío.

Inula cernua. Berg. cap. *Inula* cabizbaxa.
288.

Aster fruticosus, Afri- *Aster* fruticoso, Africano,
canus, foliis parvis Cha- con hojas como las del Châ-
mædryos, floribus cæruleis. medris, pequeñas; y flores
Rai. Suppl. p. 160. n. 29. cerúleas.

Cast. *Inula* cerúlea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Burm.* *h*

Tiene las anteras con cola: el radio cerúleo: las ramas
de una flor: el receptaculo en redecilla, con hoitos en
forma de panal: y su traza distinta del *Aster.* *Berg.*

Aro-
matica 23. *INULA foliis linea-* *Inula* con hojas lineares,
ribus integerrimis tomento- enterisimas, tomentosas, es-
sis sparsis, caule fruticoso. parcidas ó sin orden; y tallo
Amœn. acad. 6. afr. 71. fruticoso.

Aster frutescens, luteus, *Aster* de Mauritania, fru-
Mauritanicus. Pluk. alm. 58. tescente, y con la flor ama-
t. 326. f. 2. rilla.

Cast. *Inula* aromática.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Pini-
folia. 24. *INULA foliis subu-* *Inula* con hojas entre ales-
lato-linearibus triquetris nadas y lineares, de tres ca-
confertissimis, caule fruti- ras, muy amontonadas; y ta-
coso. Amœn. acad. 6. afr. 70. llo fruticoso.

Jacobæa Æthiopica, La- *Jacobea* de Etiopia, con
ricis folio. Breyn. cent. t. 64. hoja como la del Alerce.
Moris. hist. 3. sect. 7. t. 18.
f. 31.

Cast. *Inula* con hoja de Pino.

Habita en Etiopia. *h*

456 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Echa el tallo frutescente, del largo de medio pie y muy áspero por las cicatrices que dexan las hojas (*al modo que las del Abeto*); con ramas en verticilo: las hojas esparcidas, lineares, agudas, de tres caras y verdes: los pedunculos terminales, mas pequeños que las hojas y mas apartados: las flores casi sentadas: el caliz oblongo y apiñado, con escamas lineares: y el radio de la corola amarillo.

Fœtida. 25. *INULA foliis lanceolato-linearibus integerrimis, corymbis ramosis, radiis florum brevissimis.* Pall. Inula con hojas entre lanceoladas y lineares, enterísimas; corimbos ramosos; y radios de las flores cortísimos.
it. 1. p. 40.

Solidago foliis lanceolato-linearibus &c. Hort. cliff. Solidago con hojas entre lanceoladas y lineares &c.
410.

Conyza Melitensis, retusis foliis. Bocc. sic. 26. Conyza de Malta, con hojas terminadas en seno obtuso.
t. 13.

Pseudo-Helichrysum Melitense, retusis foliis, viridibus, flore luteo radiato. Falso-Helichryso de Malta, con hojas terminadas en seno obtuso, y verdes; flor radiada y amarilla.
Moris. hist. 3. p. 90.

Cast. Inula fetida.

Habita en Malta. ☉

Su traza es como la de la *Cineraria*; y se parece mucho al *Senecio fetido*.

1142. Género ARNICA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun mas corto que el radio de la corola y apiñado; con *hojuelas* lanceoladas, del largo del caliz y y derechas.

COR. compuesta radiada; con numerosísimas corolillas hermafroditas, en el disco; y cerca de veinte femeninas, en el radio.

Propia de la hermafrodita: tubulosa, derecha, hendida en cinco partes, é igual.

De

De la femenina : lanceolada , larguísima , con tres dientes y extendida.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco y cortísimos : con la *antera* cilíndrica.

En las femeninas : *filamentos* cinco , alesnados , derechos ; y sin *antera* alguna.

PIST. en las hermafroditas : *germen* oblongo : *estilo* sencillo , del largo de los estambres : con el *estigma* hendido en dos partes.

En las femeninas : muy semejante al de las hermafroditas.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : oblongas ; con el *vilano* peloso , veloso y largo.

En las femeninas : muy semejantes á las de las hermafroditas ; con el *vilano* peloso.

RECEPT. desnudo.

OBS. 1.^a Las corolillas del disco *las mas veces se hallan hendidas en tres lacinias , con la exterior al doble mas ancha.*

OBS. 2.^a En la Arnica montana no vieron Haller , ni Reichard *filamento alguno en el radio.*

OBS. 3.^a El caliz de muchas hojuelas , casi iguales y puestas en dos órdenes : la corola del disco *hendida en tres lacinias , con la una al doble mas larga : y cinco filamentos castrados en el radio.* Wern.

ESPECIES.

- Mon-
tana. 1. ARNICA *foliis ovatis* X Arnica con hojas aovadas,
integris , caulinis geminis X enteras , y las del tallo me-
oppositis. Mat. med. 215. X llizas y opuestas.
Flor. dan. t. 63. Blackw. t. X
595. Knorr. del. 2. t. A. 16. X
Arnica foliis conjugatis, X Arnica con hojas conjugadas,
ovatis , integerrimis. Hall. X aovadas y enterisimas.
helv. n. 90. X
Doronicum foliis caulinis X Doronico con las hojas del
oppositis. Flor. suec. 684. X tallo opuestas.
760. Gmel. sib. 2. p. 153. X

458 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Chrysanthemum latifolium. Dod. pempt. 263. Chrysanthemo de hoja ancha.

Doronicum Plantaginis folio, alterum C. B. P. 185. Tournefort. p. 487. Otro Doronico, con hoja como la del Llantén.

Doronicum Germanicum, foliis semper ex adverso nascentibus, villosis. Bauh. hist. 3. p. 19. Doronico de Alemania, con hojas vellosas, y que siempre nacen opuestas.

Alisma. Matthioli in Dioscor. 934. Alisma.

α *Arnica alpina*. Arnica alpina. α

Doronicum foliis lanceolatis. Flor. lapp. 305. Roy. lugdb. 160. Doronico con hojas lanceoladas.

Caltha alpina. Tabern. ic. 336. *Caltha alpina*.

Cast. *Arnica montana*. vulgo: Tabaco de montaña.

Habita en los montes alpinos y en los prados de la Europa mas fria: de Cataluña, Aragon, Navarra, de Castilla la vieja y otros de España. 2

No admite cultura, y rara vez se logra en los jardines.

La *Arnica alpina*, ó que se cria en los alpes, tiene las hojas muy angostas á diferencia de la que nace en los prados que las posee mas anchas y aovadas.

Carece de los cinco filamentos castrados en el radio, segun Haller y Reichard.

Produce el tallo algo rollizo, casi desnudo ó con pocas hojas, estriado por todas partes, con vello áspero, derecho, del largo de un pie, sencillo, ó subdividido; con dos (ó mas) ramas opuestas, sencillas, derechas, alargadas, de una flor, y con pocas hojas: muchas hojas radicales, entre aovadas y lanceoladas, algo obtusas, sentadas, ó adelgazadas en peciolo lineares, del largo de quatro dedos, enterisimas, con pestañas menudas en su margen, algo ásperas por encima, lampiñas por debaxo y con tres nervios; pocas en el tallo, mas pequeñas, sin peciolo y opuestas: las flores terminales, solitarias, pedunculadas y derechas: el caliz comun apiñado, con hojuelas puestas en una serie, entre lineares y lan-

lanceoladas, agudas, iguales, vellosas y derechas: la *corola compuesta* radiada: la *propia del radio* ligulada, lanceolada, tres veces mas larga que el caliz, extendida, con nervios longitudinales, paralelos, truncada por su ápice y con tres dientes: la *del disco* en forma de embudo, con el tubo cilindrico y vellosos; el *borde* tambien cilindrico, lampiño, hendido en cinco lacinias, revueltas, agudas y ásperas: cinco *filamentos* en los flosculos del disco, capilares y menudos; con la *antera* cilindrica, mas larga que la corolilla y hendida por su boca en cinco partes: cinco *filamentos* en los semiflosculos del radio, insertos en el tubo, esteriles ó sin antera: el *germen* en unas y otras alesnado, entre estriado y angulado longitudinalmente, áspero y coronado con el vilano: dos *estigmas* alesnados y revueltos espiralmente: las *semillas* de color pardo, semejantes al germen, coronadas con el *vilano* sencillo y blanquecino: y el *receptaculo* desnudo.

PROPIED. *Todas las partes de la planta, junto con las flores son repelentes, vulnerarias, narcoticas, vomitivas, purgantes, diureticas y emenagogas: se usan en la epilepsia, en la echîmosis y sangre grumosa, en las caidas de alto, en la perlesia y amaurosis ó gota serena.* Screber. in Lin. Mat. med. pag. 215.

La yerba reciente tiene el olor pesado: el sabor herbáceo, y hace estornudar: las hojas secas poseen el olor mas debil, se rompen facilmente, y estregadas entre las manos y olidas hacen tambien estornudar. Las hojas y flores son emeticas, diureticas, diaforeticas y emenagogas; y se usan en la perlesia.

OBS. La infusion en agua es rubicunda, de sabor herbáceo, y algo etíptico; y se vuelve negra con el Vitriolo de Marte.

Se persuaden algunos, que la Arnica resuelve la sangre grumosa, por cuyo motivo la llaman Panacéa de las caidas.

Se debe usar al principio en corta dosis y aumentarse poco á poco. Se toma comunmente una dracma en infusion en agua por la mañana y por la tarde; y segun las circunstancias lo permiten, se aumenta poco á poco hasta dos dracmas, ó media onza. Berg. mat. med. pag. 727.

El famoso *Enrique Joseph Collin* ha hecho muy bellas experiencias con las *flores de la Arnica*; y las alaba en la perlesia, despues de haber observado sus buenos efectos en veinte y ocho paraliticos. Funda su virtud para la gota serena, en la observacion de nueve curas que hizo felizmente con ellas; advirtiendole que en el último de la curacion sobrevinieron en los ojos dolores muy fuertes. Afirma tambien, que son antiespasmodicas, por haberlo experimentado en siete casos. Cree que estas flores abren los vasos del cerebro obstruidos, disolviendo la materia recogida en ellos; y que obran tambien por cierta virtud especifica en el sensorio comun y en los nervios. Mueven la orina y sudor en los mas, y muchas veces curan sin alguna evacuacion sensible. En el tiempo en que las flores hacen su operacion, se experimentan comunmente incentivos venereos, dolores lancinantes, ó que abrasan, los quales pronostican buenos efectos. En el principio de la cura, las mas veces sienten los enfermos alguna molestia en la region epigastrica y tal vez vomitan. Si el paciente es pletorico y tiene los humores espesos, deben preceder remedios evacuantes, antiflogisticos y refrigerantes, conservandose siempre el vientre laxo; por lo que se han de interpolar remedios laxantes. *Collin. obs. 4. pag. 5. & seq.*

Allioni en su *Flora Pedemontana*, tom. 1. p. 204. refiere haber curado á un hombre viejo paralitico de un lado, con el uso de las *flores de la Arnica*, en espacio de tres meses: y á otro de edad de cinquenta años, balbuciente y que tenia la boca torcida, en espacio de un mes.

Geofroy en el artículo del *Doronico* trata tambien del *Doronico Salutifero* ó de la *Arnica*; y despues de haber explicado los nombres y caractéres de esta planta, describe sus virtudes en la forma siguiente: La yerba con sus flores es sudorifica, diuretica y alguna vez vomitiva. Cocida con cerveza, ó infundida en vino, ó agua se propina idoneamente contra la sangre grumosa y coagulada, y es de tanta eficacia y virtud, que en las *Ephemerides de Alemania* se predica por *Panacéa de las caidas*. La dosis es de un pugilo; y hasta dos, para las personas robustas. Luego de haberse tomado, segun dice *Febrio* en las *citadas Ephemerides*, obra con tanto impetu en el lugar afecto, que penetra lo mas interior de la sangre grumosa, cau-

sando alli dolores grandes ; y alguna vez mucha dificultad de respirar , señaladamente quando el mal es inveterado y contumaz , y se haya tomado demasiada dosis ; cuyos accidentes se mitigan en breve tiempo , ó por el vomito espontáneo , ó por el fluxo abundante de orina , ó por medio de la sangria , si la necesidad lo pide ; restituyéndose la salud y las fuerzas ; pero donde no hay alguna manifesta lesion , alli tampoco se experimenta dolor alguno por haber tomado este remedio. La *raiz* es de sabor amargo , acre y aromatica. Es diuretica , y provoca el menstuo , cocida en vino. Las *flores* se cuecen en legia para el dolor de cabeza y volver el pelo de color amarillo-roxo : y los *polvos de las flores , hojas y raiz* son excelentes errhinos. *Geoffr. mat. med. de veget. exot. tom. 1. p. 208.*

El mismo *Febrio en las citadas Ephemerides* confirma con muchos experimentos los buenos efectos de esta planta , en las caidas : y el *R. P. Fr. Isidoro de Saracha*, Monge Benedictino, Boticario y Botánico muy benemerito , en el Monasterio de Santo Domingo de Silos , ha experimentado repetidas veces los mismos en los dolores y demas afectos provenidos de caidas , ó de haber hecho algun esfuerzo extraordinario ; no solo con el cocimiento tomado interiormente , sino que tambien aplicado sobre las partes ofendidas. (1)

Pilose-
loides.

2. *ARNICA foliis interrimis ellipticis villosis , scapo unifloro aphylo lanato , calyce radium æquante.* Arnica con hojas enterisimmas , elípticas y vellosas ; escapo de una flor , sin hojas , lanudo ; y caliz igual al radio. *Amœn. acad. 6. afr. 73.*

As-

(1) Los elementos de esta planta son muy activos ; y atendiendo al temperamento de este clima , se debe proceder con mucha discrecion en el uso de ella. La dosis de una dracma será excesiva , segun la edad y complexion que tenga el enfermo : asi pues , el metodo mas seguro consistirá en empezar el uso de los tallos y hojas , ó de las flores , por quince granos en los de edad de quatro hasta diez años : por veinte y quatro granos en los de diez hasta veinte ; y por treinta y seis granos en los de mayor edad. Se infundirán en seis onzas de agua al modo que el *Té* , y de esta infusion se tomará la mitad por la mañana en ayunas , y la otra por la tarde ; pudiendose aumentar gradualmente la dosis de la yerba , ó de las flores á medida de los efectos que se vayan experimentando.

Aster Æthiopicus, Pilo- Aster de Etiopia, con tra-
sellæ facie, tomento copioso. za de Pelosilla y tomento
Rai. Suppl. p. 165. n. 95. copioso.

Cast. Arnica como Pelosilla.

Habita en Etiopia.

Scor- 3. ARNICA foliis alter- Arnica con hojas alternas
pioides nis, serratis. Jacq. vind. y aserradas.
152. Austr. t. 349.

Arnica foliis alternis, Arnica de hojas alternas,
argute serratis, radicali- con aserraduras agudas, y
bus petiolatis. Hall. helv. las radicales pecioladas.
n. 89.

Doronicum Austriacum, Doronico tercero, de Aus-
tertium. Clus. pann. 520. tria.
521. Blackw. t. 503. Hall.

Doronicum radice Scor- Doronico con la raiz pa-
pui brachiata. C. B. P. 184. recida al Alacran, y dividi-
Tourn. p. 487. da en ramas gruesas.

Doronicum brachiata ra- Doronico de raiz dividida
dice. Dalech. hist. 1203. Lob. en ramas gruesas.
ic. 649.

α *Doronicum radice dolci.* Doronico con la raiz dul-
C. B. P. 184. ce. α

Cast. Arnica escorpioide.

Habita en los montes subalpinos humedos de Suiza y de
Austria. 24

Varía con las hojas que se acercan á la figura de corazon
y casi enterisimas.

Mari- 4. ARNICA foliis lan- Arnica con hojas lanceo-
tima. ceolatis, inferioribus serra- ladas, y las inferiores aserra-
tis, caule folioso multiflo- das; tallo folioso y de mu-
ro. † chas flores.

Aster seu potius Helle- Aster ó mas bien Helenio
nium maritimum, frutico- maritimo, fruticoso, con el
sum, caule crasso, foliis tallo craso; y hojas casi co-
fere Helenii officinalis. Gmel. mo las del Helenio oficial.
sib. 2. p. 175.

Cast.

Cast. Arnica maritima.

Habita en Kamtschatka y en la America septentrional.

Cro-
sea. 5. ARNICA *foliis ovatis* Arnica de hojas aovadas ,
repando-denticulatis subtus ondeadas por su margen, con
tomentosis. Mill. dict. n. 3. dientecitos , y por debaxo
tomentosas.

Gerbera foliis planis , Gerbera con hojas planas,
dentatis , flore purpureo. dentadas ; y flor purpúrea.
Burm. afr. 157. t. 56. f. 2.

Doronici forte species pu- Especie acaso de Doroni-
mila , Auriculæ Ursi folio co, enana, con hoja como la
glabro , flore saturate cro- de Oreja de Oso, lampiña ;
ceo. Pluk. mant. 65. t. 343. y flor de color subido de aza-
f. 4. fran.

Carlina foliis latis , ad Carlina de hojas anchas ,
oras spinis dentatis , flore dentadas con espinas por sus
aureo. Burm. afr. 154. t. 55. orillas; y flor de color de oro.

Cast. Arnica de color de azafran.

Habita en Etiopia. 24

Tiene la cabeza de la raíz lanuda : las hojas radicales ,
pecioladas , ovales , rígidas , por encima lampiñas , en-
tre aserradas y dentadas : los escapos desnudos , de una
flor , y salpicados de brácteas claras y lineares : y el ra-
dio de la flor con estambres. Se halla tambien con algu-
nas hojas de figura de corazon.

Ger-
bera. 6. ARNICA *foliis pinna-* Arnica de hojas hendidas
tifidis , lobis rotundatis. al través , con sus lóbulos
redondeados.

Gerbera foliis ex radice Gerbera con hojas de la
oblongis , excavatis , sinuo- raíz oblongas , excavadas ,
sis , subtus lanugine rufa sinuosas y por debaxo vello-
villosis. Burm. afr. 155. t. sas , con pelusa rubia.
56. f. 1.

Aster Africanus , monan- Aster de Africa , con una
thos , Scolopendriæ folio, flo- flor, amarilla; y hoja como la
re luteo. Rai. Suppl. p. 161. de la Escolopendria ó Dora-
dilla.

464 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Doronicum Africanum, X Doronico Africano, con
folio Asplenii. Buxb. cent. 5. X hoja como la de la Doradi-
 p. 12. f. 24. X lla.

Scolopendriæ seu Asple- Planta de Etiopia, con
nii facie planta Æthiopica, traza de Doradilla, vellosa
summis pinnis acuminatis, X con pelusa como seda, de
sericea lanugine ex rufo X color entre rubio y candido;
candicante villosa. Pluk. X y las hojuelas de mas arriba
 alm. 336. t. 313. f. 5. X puntiagudas.

Cast. Arnica Gerbera.

Habita on Etiopia.

Posee las *hojas* con sus lóbulos apiñados ácia atrás, y to-
 mentosas por debaxo, mientras se hallan tiernas: el *esca-*
po desnudo y de una flor: el *caliz* apiñado: y el *radio*
de la corola de color amarillo y que por debaxo tira al
 de purpúreo.

Coro- 7. ARNICA *foliis pinna-* X Arnica de hojas pinnadas,
 no pi- *tis, laciniis linearibus*. X con sus lacinias lineares.
 folia.

Cast. Arnica con hoja de Coronopo.

Habita en Etiopia.

Es muy semejante á la precedente.

Japo- 8. ARNICA *caulescens*, X Arnica que arroja tallos,
 nica. *pubescens, foliis pinnatifi-* X vellosa, de hojas hendidas
dis, foliolis subpedatifidis X al través, con sus hojuelas
incisis dentatis, panicula X casi hendidas en ramitas, cor-
terminali. Suppl. p. 376. X tadas, dentadas; y la panoja
 X terminal.

Cast. Arnica del Japon.

Habita en el Japon. Thunb.

Echa el *tallo* vellosa y debil: las *hojas* en el tallo, alter-
 nas, pecioladas, hendidas al través, con sus lacinias
 cortadas, encorvadas ácia atrás, y hendidas profunda-
 mente en la margen superior al modo que una hoja ra-
 mosa; y las restantes hojuelas entre dentadas y aserra-
 das, y algo ásperas: los *peciolos* ensanchados, ample-
 xicaules y acanalados: el *pedunculo* terminal y de mu-
 chas flores: las *flores* amarillas y dispuestas casi en pa-
 noja.

1143. Género DORONICUM. * *Tourn. t. 277.*

Vaill. A. G. 1720. f. 14. 41. Bellidiastrum.

Michel. 29.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun con veinte *hojuelas*, poco mas ó menos, entre lanceoladas y alesnadas, iguales, derechas, colocadas en dos series y comunmente del largo del radio de la corola.

COR. *compuesta* radiada; con numerosas *corolillas* hermafroditas, y tubulosas, en el disco; y femeninas liguladas, del número de las hojas del caliz, en el radio.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco partes y extendido.

De la femenina: ligulada, lanceolada y con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortisimos: con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: *germen* oblongo: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con el *estigma* escotado.

En las femeninas: *germen* oblongo: *estilo* filiforme, y del largo del de la hermafrodita: con dos *estigmas* redoblados.

PERIC. ninguno: el *caliz* ligeramente cerrado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: aovadas al revés, comprimidas y asurcadas; con el *vilano* peloso.

En las femeninas: aovadas al revés, asurcadas, algo comprimidas; y sin *vilano*.

RECEPT. desnudo y plano.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 487.

La *flor* es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos, y la corona de semiflosculos sentados en embriones, y comprendidos en el caliz que es en forma de

466 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

bacia y hendido en muchas partes. Los embriones pasan á semillas adornadas de vilano, y fixadas en el talamo ó receptaculo.

ESPECIES.

- Par-
dalian-
ches.
1. *DORONICUM foliis* X Doronico de hojas en for-
cordatis obtusis denticula- X ma de corazon, obtusas y
tis, radicalibus periolatis, X con dientecitos, las radica-
caulinis amplexicaulibus. X les pecioladas, y las del ta-
Muhl. dict. t. 128. Jacq. austr. llo que le abrazan.
t. 350.
- Doronicum foliis corda-* X Doronico con las hojas de
tis, obtusis, imis longe pe- X hechura de corazon, obtu-
tiolatis, superioribus am- X sas, las de abaxo con el pe-
plexicaulibus. Hall. helv. n. ciolo largo, y las superiores
88. amplexicaules.
- Doronicum foliis auricu-* X Doronico de hojas con ore-
latis, subdentatis, denti- X jillas, y algunos dientes
bus glandulosis, calyce sul- X glandulosos; y caliz asurca-
cato. Scop. carn. 1. pag. 378. do.
ed. 2. n. 1085.
- Doronicum maximum, fo-* X Doronico muy grande,
liis caulem amplexantibus. X con hojas que abrazan el ta-
C. B. P. 185. Cam. epit. llo.
823. Tourn. p. 488.
- Doronicum VII, Austria* X Doronico septimo, terce-
cum tertium. Clus. hist. 2. ro de Austria.
p. 19.
- Doronicum radice Scor-* X Doronico con la raiz se-
pia. C. B. P. 184. Tourn. p. mejante al Alacran. α
487.
- Doronicum latifolium.* X Doronico con hoja an-
Clus. hist. 2. p. 16. cha.
- Aconitum pardalianches.* X Aconito pardalianchês ó
Dod. pempt. pag. 433. mata lobos.

Cast. Doronico pardalianchês.

Habita en los montes subalpinos y humedos de Suiza, Pannonia, Valesia y Alemania: en los de Aragon, Cataluña, Castilla la vieja, Vizcaya, de Burgos y otros de España. 4

Tie-

Tiene las *semillas del radio* desnudas: y el *tallo* ramoso.

Plantaginaceum

2. *DORONICUM foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alternis.* Hort. cliff. *Doronico de hojas aovadas, agudas, con algundiente; y ramas alternas.*

411.

Doronicum Plantaginis *Doronico con hoja como folio.* C. B. P. 184. Tourn. la del Llantén.

p. 487.

Doronicum minus, officinarum. Dalech. hist. 1202. *Doronico menor, de las oficinas.*

α *Doronicum Plantaginis* *Doronico de Portugal, folio, Lusitanicum.* Tourn. con hoja como la dei Llantén. α
p. 488.

Cast. *Doronico como Llantén.*

Habita en Portugal, en Francia y Alemania: en los Pirineos de Cataluña, en Jaca y Vizcaya; y otras partes de España. 2

Posee el *tallo* ramoso: y las *hojas* muy lampiñas y amplexicaules.

Belidias-trum.

3. *DORONICUM scapo nudo simplicissimo unifloro.* Hort. cliff. 500. Jacq. vind. *Doronico con el escapo desnudo, muy sencillo, y de una flor.*
285. Austr. t. 400.

Arnica caule nudo, unifloro, foliis ovato-lanceolatis, serratis. Hall. helv. *Arnica con el tallo desnudo, de una flor; hojas entre aovadas y lanceoladas, y aserradas.*
n. 92.

Bellidiastrum alpinum, foliis brevioribus hirsutis, caule palmari, flore albo. Mich. gen. 32. t. 29. *Falsa-Belis alpina, de hojas mas cortas, con pelo áspero; tallo del largo de un palmo; y flor blanca.*

Bellis sylvestris media, caule carens. C. B. P. 201. *Belis silvestre, media, que carece de tallo.*
Tourn. p. 490.

Bellis media. Clus. hist. 2. *Belis media.*
p. 44. Cam. epit. 654. Hall. opusc. 174.

α *Bellis caule pedali seu bipedali, nudo, foliis magnis, latis, floribus rubris.* Belis con el tallo del largo de uno ó dos pies y desnudo; hojas grandes, anchas; y flores roxas y blancas. *α*
Mentz. pug. t. 8.

Cast. Doronico Falsa-Belis.

Habita en lugares sombríos de los montes de Suiza, de Italia y del Tiról: en los de Asturias, Navarra y Castilla la vieja. *2*

Echa las semillas del radio con vilano.

1144. Género PERDICIUM. † Trixis. *Brown.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun oblongo y apiñado; con hojuelas lanceoladas; y las interiores casi mas largas que la corola.

COR. compuesta apiñada y radiada; con las corolillas hermafroditas, en el disco; y femeninas, en el radio.

Propia de la hermafrodita: tubulosa, medio hendida en dos labios; el interior partido en dos lacinias, puntiagudo é igual; el exterior medio hendido en tres lacinias, lineares, é iguales.

De la femenina: linear, ligulada, con tres dientes y otros dos por dentro en la base.

ESTAMB. en las hermafroditas: filamentos cinco y cortos: con la antera cilindrica, tubulosa y de cinco dientes.

PIST. en las hermafroditas: germen pequeño: estilo sencillo: con el estigma hendido en dos partes y obtuso.

En las femeninas: germen pequeño: estilo medio hendido en dos partes: con los estigmas obtusos.

PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. aovadas al revés; con el vilano capilar, sin estipite, del largo del caliz, copiosisimo y elevado en ramillete horizontal.

RECEPT. desnudo.

OBS. La flor parece que tiene la corola semiflosculosa, aunque verdaderamente es radiada.

El Perdicio semiflosculoso subministra este carácter del género muy distinto.

El

El Perdicio radiado conviene con los flosculos bilabiados, aunque en su traza es del todo diferente.

El Perdicio del Brasil tiene las flores casi radiadas: los flosculos en el disco y en el radio bilabiados y hermafroditos. R.

ESPECIES.

Semi-flosculare. 1. *PERDICIUM flore semi-flosculoso, scapo unifloro* Perdicio con la flor semi-flosculosa; escapo de una flor y desnudo. *Amoen. acad. 6. afr. 72.*

Cast. Perdicio semiflosculoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *¶*

Su estatura es como la del *Leontodon*; y las corolillas son medias entre las de las flores semiflosculosas y radiadas.

Radiare. 2. *PERDICIUM floribus subradiatis, calyce exteriori tetraphyllo, caule fruticoso.* Perdicio con flores casi radiadas; caliz exterior de quatro hojuelas; y tallo fruticoso.

Inula Trixis. *Amoen. acad.* *Inula Trixis.*

5. p. 406.

Trixis frutescens, foliis nitidis, ovatis, dentatis, floribus comosis. *Brown.* Trixis frutescente, de hojas lustrosas, aovadas, dentadas; y flores en penacho. *jam. 312. t. 33. f. 1.*

Cast. Perdicio radiado.

Habita en la Jamaica. *¶*

La traza de las flores es como la de la *Inula* ó de la *Conyza*. Estas dos especies se diferencian enteramente en su traza y apenas son afines; pero la singular y ligera division de las corolillas en las lacinias exteriores, casi como en el *Elephantopo*, dió motivo á *Linneo* para unir las hasta que se exâminen ambas con mas primor.

Brasilense. 3. *PERDICIUM floribus subradiatis, calycibus simplicibus, caule herbaceo.* Perdicio con flores casi radiadas; cálices sencillos; y tallo herbáceo.

Cast. Perdicio del Brasil.

Ha-

Habita en el Brasil. Arduino. 2.

Produce las *hojas radicales* entre lanceoladas y aovadas, ondeadas por su margen y con dientes, viscosas y algo vellosas: las del *tallo* alternas, sin peciolo, lanceoladas, angostas y con algun diente: muchas *flores* en la sumidad del tallo, desnudas, semejantes á la de la *Arnica montana*, con pedunculos propios, alargados y con una ó dos hojuelas: el *caliz* de doce hasta diez y seis escamas ú hojuelas, lanceoladas, obtusas é iguales: la *corola* amarilla: los *flosculos en el disco y en el radio* de dos labios y hermafroditos.

Ma-
gella-
nicum.

4. PERDICIUM *foliis runcinatis, caule diphyllis* Perdicio de hojas runci-
nadas; tallo con dos hojue-
simplici unifloro. Suppl. 376. las, sencillo y de una flor.

Cast. Perdicio de Magallanes.

Habita en Tierra del fuego. Back.

Es *planta* pequeñita y hermosa. Tiene muchas *hojas radicales*, pequeñas, entre runcinadas y hendidas al través, con su lomo pestafioso, por lo que se hallan ásperas: el *tallo* muy sencillo, tomentoso, con dos hojuelas alternas y aserradas: la *flor* blanca y radiada.

1145. Género HELENIUM. * Heleniastrum.

Vaill. A. G. 1720.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* sencillo, de una pieza, extendido, partido en muchas *hojuelas* (*cerca de veinte*), y gradualmente adelgazadas.

COR. *compuesta* radiada; con las *corolillas* hermafroditas, y numerosas, en el disco; y las femeninas del número de las lacinias del caliz, en el radio.

Propia de la hermafrodita: tubulosa, mas corta que el caliz y con cinco dientes.

De la femenina: ligulada, mas ancha ácia afuera, hendida por su ápice en tres partes y mas larga que el caliz.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares
y

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 471

y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : *germen* oblongo : *estilo* filiforme, del largo de los estambres : con el *estigma* hendido en dos partes.

En las femeninas : *germen* oblongo : *estilo* cortísimo : con el *estigma* hendido en dos partes.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : aovadas al revés y anguladas : el *vilano* con su calicito pequeño y de cinco dientes.

En las femeninas : semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPR. desnudo y convexo : con *pajas* del caliz que solamente separan las florecitas del radio.

ESPECIE.

Au-
tum-
nale. 1. HELENIUM foliis serratis. X Helenio con hojas aserradas.

Helenium foliis decurrentibus. Hort. cliff. 418. X Helenio con hojas escurridas.

Gron. virg. 126.

Chrysanthemum Americanum, perenne, caule alato, folio angustato, glabro. X Chrysantemo de America, perenne, con el tallo alado ; hoja angostada y lampiña.

Moris. hist. 3. p. 24. sect. 6. t. 6. f. 74.

Aster Floridanus, aureus, caule alato. Pluk. X Aster de la Florida, con la flor de color de oro ; y el tallo alado.

Aster luteus, alatus. X Aster con la flor amarilla ; y tallo alado.

Corn. canad. 52. t. 63.

Cast. Helenio de otoño.

Habita en lugares algo humedos de la America septentrional. 24

Se halla una variedad con pelo áspero, cuyo carácter apenas basta para distinguirla.

Miller en su Diccionario trae otra especie con hojas enterisimas.

472 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

1146. Género BELLIS. * *Tourn. t. 280. Vaill.*

A. G. 1720. f. 16. 20. Bellis Leucanthemum.

Mich. gen. 29.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun hemisférico y derecho ; con diez hasta veinte hojuelas, colocadas en dos series, lanceoladas, é iguales.

COR. compuesta radiada ; con las corolillas hermafroditas, tubulosas, y numerosas, en el disco ; y las femeninas liguladas, y en mayor número que las hojuelas del caliz, en el radio.

Propia de la hermafrodita : en forma de embudo y hendida en cinco partes.

De la femenina : ligulada, lanceolada, y casi con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas : filamentos cinco, capilares y cortisimos : con la antera cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : germen aovado : estilo sencillito : con el estigma escotado.

En las femeninas : germen aovado : estilo filiforme : con dos estigmas extendidos.

PERIC. ninguno : el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : aovadas al revés, comprimidas y sin vilano.

En las femeninas : semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. desnudo y cónico.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 490.

La flor es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos, y la corona de semiflosculos, sentados en embriones, y comprendidos en el caliz sencillito y hendido en muchas partes : y los embriones pasan á semillas fixadas comunmente en el talamo piramidal.

ESPECIES.

Perennis.

1. *BELLIS scapo nudo.* X Belis ó Margarita con el
Flor. dan. t. 503. Blackw. X escapo desnudo.
t. 200. Knorr. del. t. M.

Bellis scapo nudo unifloro. Hort. cliff. 418. X Belis con el escapo desnudo y de una flor.

Bellis scapo nudo simplicissimo unifloro, foliis spatulatis. Gou. hort. 447. X Belis con el escapo desnudo, muy sencillo, de una flor; y hojas en forma de espátula.

Bellis sylvestris, minor. X Belis silvestre, menor.

C. B. P. 267. Tourn. p. 491.

Bellis sylvestris. Dod. X Belis silvestre.

pempt. 265.

α *Bellis hortensis.*

Belis hortense. α

Bellis hortensis, flore pleno. C. B. P. 261. Kniph. X Belis hortense, con la flor plena.

cent. 1. t. 10.

β *Bellis hortensis, flore albo, bullato.* Tourn. p. 491. X Belis hortense, con la flor blanca y ampollosa. β

χ *Bellis hortensis, rubra, flore multiplici, fistuloso.* X Belis hortense, con la flor roxa, multiplicada y fistulosa. χ

Tourn. p. 491. Blackw. t. 530.

δ *Bellis hortensis, prolifera.* C. B. P. 262. Tourn. p. 491. X Belis hortense, prolifera. δ

Cast. Belis ó Margarita perenne.

Habita entre pastos abrigados de Europa: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña y en las mas provincias de España. 24

Annual.

2. *BELLIS caule subflososo.* X Belis con el tallo algo flososo.

Bellis caule ramoso multifloro, pedunculis longissimis unifloris. Gou. illustr. X Belis con el tallo ramoso, de muchas flores; pedunculos larguissimos y de una flor.
p. 69. R.

Bel-

474 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Bellis minima, pratensis, X Belis muy pequeña, pra-
caule folioso. Bocc. mus. 2. tense, con el tallo folioso.
p. 96. t. 35.

Bellis maritima, foliis X Belis maritima, con hojas
Agerati. C. B. P. 261. Prodr. como las del Agerato.
121. Burs. XIV. 70.

Bellis hortensis, pediculo X Belis hortense, con el pe-
folioso. C. B. P. 262. Prodr. dunculo folioso.
121.

Bellis Leucanthemum, an- X Belis Leucanthemo, de Ita-
nuum, Italicum. Mich. gen. lia, annua.
34.

Cast. Belis annua.

Habita en Sicilia y Mompeller: en los montes de Avila,
de la Cartuxa del Paular de Segovia y en Sierra-more-
na. ☉

1147. Género BELLIIUM. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun con muchas hojuelas, iguales y en forma de
navecilla.

Cor. compuesta radiada; con diez ó doce corolillas, en el
radio; y muchas hermafroditas, en el disco.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo, hen-
dida en quatro partes y derecha.

De la femenina: elíptica, ligulada y escotada.

ESTAMB. en las hermafroditas: filamentos quatro y cortos:
con la antera cilíndrica.

PIST. en las hermafroditas: germen cónico inverso: estilo
filiforme: con el estigma hendido en dos partes y
oblongo.

En las femeninas: germen cónico inverso: estilo cortí-
simo: con el estigma hendido en dos partes y me-
nudo.

PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: de figura cónica inversa, con
una corona pajosa, de ocho hojuelas, redondeada; y
el vilano con ocho aristas sencillas.

En las femeninas: muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. desnudo y cónico.

ESPECIES.

- | | | |
|------------------------|--|--|
| Bel-
lidoi-
des. | 1. BELLIUM <i>scapis nudis filiformibus.</i>
<i>Bellis</i> (Droseræfolia) <i>stolonibus reptantibus, scapis unifloris, foliis spathulatis.</i>
Gov. illustr. p. 69.
<i>Bellis annua, minima.</i>
Triumph. obs. 82. t. 82. Tourn. p. 491.
<i>Bellis maritima, minima, Roris-Solisfolio, pyrenaica.</i>
Bocc. mus. 149. Rai. Suppl. p. 222.
<i>Bellis foliis parvis, floribus albis, alpina.</i> Mentz. pug. t. 8? | Belio con escapos desnudos y filiformes.
Belis (con hoja de Drosera) con vástagos rastreros; escapos de una flor; y hojas en forma de espátula.
Belis annua, y muy pequeña.
Belis maritima, de pirineos, muy pequeña, con hoja como la de la planta llamada Rocio del Sol.
Belis alpina, con hojas pequeñas; y flores blancas. |
|------------------------|--|--|

Cast. Belio como Belis.

Habita en lugares aridos, cultivados en otro tiempo, de Roma y de otras partes de Italia: y abunda en lugares maritimos herbosos de las Islas Baleares. Gov. ☉

Su traza es como la de la *Belis*; pero muy diversa en el vilano. Tiene las *hojas radicales* aovadas al revés, enterisimas, derechitas, ásperas por encima y mas cortas que el peciolo: los *vástagos* filiformes, que echan raíces por su remate, y llevan hojas y flores: los *escapos* filiformes, rollizos, mas largos que las hojas, de una flor, y cabizbaxa antes de abrirse: el *caliz* con diez hojuelas, lanceoladas, algo ásperas y paralelas: la *corola* con radios blancos, ovales, escotados; y el *disco* amarillo, con las corolillas hendidas en quatro partes: las *semillas* algo pelosas: el *vilano* de ocho pajas, casi redondas, y de ocho cerdas mas largas y alternas.

- | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|
| Minu-
tem. | 2. BELLIUM <i>caule folioso capillari.</i> | Belio con el tallo folioso y capilar. |
|---------------|---|---------------------------------------|

Pec-

476 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Pectis (minuta) *foliis ovatis petiolaris*. Spec. pl. 3. p. 1250. Schreb. nov. act. ups. v. 1. pag. 81. t. 5. f. 2.

Bellis Cretica, fontana, *omnium minima*. Tourn. cor. 37. Vaill. act. 547.

Pectis (menuda) de hojas aovadas y con peciolo.

Belis de Creta, fontana y mucho mas pequeña que todas.

Cast. Belio menudo.

Habita en las fuentes del Oriente. ☉

Es planta menudísima, toda lisa y ascendente, con pelos claros los cuales se manifiestan por medio del microscopio. Echa el tallo del largo de una pulgada: las hojas aovadas al revés, enterisimas, lisas, y mas cortas que los peciolos: uno ó dos pedunculos terminales, de la longitud de toda la planta, capilares y de una flor: y el caliz de la magnitud de la semilla de la Berza.

1148. Género TAGETES. * Tourn. t. 278. Vaill.

A. G. 1720. 43. 15. Dill. elth. 280. 279.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun muy sencillo, de una pieza, tubuloso, oblongo, de cinco lados y con cinco dientes.

COR. compuesta radiada; con muchas corolillas hermafroditas y tubulosas, en el disco elevado; y cinco femeninas liguladas, en el radio.

Propia de las hermafroditas: tubulosa, derecha, mas larga que el caliz, y medio hendida en cinco lacinias lineares y vellosas ácia adentro.

De las femeninas: ligulada, mas larga que la de las hermafroditas, casi iguales en la longitud y latitud, muy obtusa, mas angosta ácia su tubo; tomentosa y persistente.

ESTAMB. en las hermafroditas: filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la antera cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: germen oblongo: estilo filiforme y del largo de los estambres: con el estigma hendido en dos partes, tenue y redoblado.

En las femeninas: germen oblongo: estilo filiforme, del

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 477

del largo del de la hermafrodita: con el *stigma* hendido en dos partes, tenue y redoblado.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: lineares, comprimidas, y pocas mas cortas que el caliz: con el *vilano* de cinco aristas derechas, puntiagudas y desiguales.

En las femeninas: semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. desnudo, pequeño y plano.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 488.

La flor es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos, hendidos en muchas partes, y la corona de semiflosculos, sentados en embriones, y comprehendidos en el caliz de una pieza y tubuloso. Los embriones pasan á semillas anguladas, y adornadas de una cabezuela foliosa y fixadas en el talamo. Se hallan tambien muchas flores de flosculos fistulosos.

ESPECIES.

- | | | |
|--|---|--|
| <i>Patula.</i> | 1. TAGETES caule subdiviso patulo. Hort. cliff. | Tagetes con el tallo subdividido y extendido. |
| 418. Knorr. del. 1. t. S. 7. | <i>Tanacetum Africanum, seu flos Africanus, minor.</i> | Tanaceto de Africa, ó flor Africana, menor. |
| C. B. P. 133. | <i>Tagetes Indicus, minor, simplici flore sive Caryophyllus Indicus, sive flos Africanus.</i> Bauh. hist. 3. p. | Tagetes de Indias, menor, con la flor sencilla: ó Clave-llina de Indias, ó flor de Africa. |
| 98. Tourn. p. 488. | <i>Flos Africanus.</i> Dod. | Flor de Africa. |
| pempt. 255. | <i>Tagetes Indicus, minor, multiplicato flore.</i> Bauh. | Tagetes de Indias, menor, con la flor multiplicada. α |
| α hist. 3. pag. 99. Tourn. p. 488. Knorr. del. 1. t. S. 8. | | |

478 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Tagetes minor, *flore fulvo*, *maculato*. Dill. elth. 273. t. 279. f. 361. *Tagetes menor*, con la flor de color leonado y manchada.

Cast. *Tagetes* extendida.

Habita en México. ☉

Tiene las *hojuelas* terminadas en un hilo, aserradas, y entre lineares y lanceoladas: los *pedunculos* encrasados por su ápice y fistulosos: y los *cálices* de figura de trompo.

Erecta 2. *TAGETES caule simpliciter erecto*, *pedunculis nudis unifloris*. Hort. cliff. 418. Knorr. del. 1. t. S. 6. a. *Tagetes* con el tallo sencillo y derecho; pedunculos desnudos y de una flor.

Tanacetum Africanum, *major*, *simplici flore*. C. B. P. 133. *Tanaceto Africano*, mayor, con la flor sencilla.

Tagetes maximus, rectus, flore simplici, ex luteo pallido. Bauh. hist. 3. p. 100. Tourn. p. 488. *Tagetes* muy grande, recta, con la flor sencilla y de color amarillo palido.

Caryophyllus Indicus. Cam. epit. 406. *Clavellina de Indias*.

α *Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato*. Bauh. hist. 3. p. 100. Tourn. p. 488. Knorr. del. 1. t. S. 6. *Tagetes* muy grande, recta, con la flor muy grande y multiplicada. α

β *Tagetes Mexicanus, flore fistuloso, simplici*. Col. ecphr. 2. p. 47. t. 46. f. 1. *Tagetes* de México, con la flor fistulosa y sencilla. β

Tagetes Mexicanus, alter, polyanthos, fistuloso flore. Col. ecphr. 2. p. 48. t. 46. *Otro Tagetes de México*, con muchas flores fistulosas.

Cast. *Tagetes* derecha.

Habita en México. ☉

Posee tambien las *hojas* terminadas en un hilo.

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 479

3. TAGETES *caule simpliciter recto, pedunculis squamosis multifloris*. Hort. cliff. Mill. dict. n. 3. Tagetes con el tallo sencillo y recto; pedunculos escamosos y de muchas flores.
419. *Tagetes multiflora*, multinuto flore, albicante. Dill. elth. 374. t. 280. f. 362. Tagetes de muchas flores, menudas y blanquecinas.

Cast. Tagetes menuda.

Habita en el Chile. ☉

1149. Género LEYSERA. † Asteropterus.

Vaill. 1720.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. comun aovado, y apiñado; con escamas obtusas, cóncavas y escariosas.
- COR. compuesta radiada; con muchas corolillas hermafroditas y tubulosas, en el disco; y muchas femeninas liguladas, en el radio.
- Propia de la hermafrodita: en forma de embudo, hendida en cinco partes y derecha.
- De la femenina: ligulada, lanceolada y entera.
- ESTAMB. en las hermafroditas: filamentos cinco, capilares y cortísimos: con la antera cilíndrica y tubulosa.
- PIST. en las hermafroditas: germen pequeño: estilo filiforme: con el estigma escotado.
- En las femeninas: germen pequeño: estilo filiforme y corto: con el estigma hendido en dos partes.
- PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.
- SEM. en las hermafroditas: oblongas; con el vilano plumoso, de cinco cerdas y largo, dentro del qual se halla una corona pajosa y cortísima.
- En las femeninas: muy semejantes á las de las hermafroditas: y el vilano con una corona solamente pajosa y sin plumas.
- RECEPT. desnudo. Las pajas del radio solamente separan los flosculos.

ESPECIES.

- Gna-
phalo-
des. 1. LEYSERA *foliis spar* X Leysera con hojas esparci-
sis, floribus pedunculatis. X das, y flores pedunculadas.
Amen. acad. 6. afr. 74.
Asteropterus luteus, La- X Asteroptero con la flor
ricis foliis lanuginosis. Vaill. X amarilla; hojas como las del
act. 585. X Alerce y lanuginosas.
Aster Æthiopicus, Stæ- X Aster de Etiopia, con ho-
chadis foliis, flore aureo. X jas como las del Cantueso;
Herm. lugdb. 66. t. 71. t. 14. X y flor amarilla.
f. 3. Seb. mus. 2. t. 66. f. 6. X

Cast. Leysera como Gnaphalio.

Habita en Etiopia. $\frac{1}{2}$

Arroja el tallo prolifero: las *hojas* esparcidas, filiformes, vellosas, blanquecinas y salpicadas de cerdas cortisimas que llevan glandulas: los *pedunculos* terminales, solitarios y de color purpúreo: los *cálices* de hechura de trompo, con todas las escamas escariosas: todas las *se-millas* coronadas con un ribete membranoso; pero las del *disco* con vilano: el *receptaculo* en el radio pajoso y desnudo en el disco. Roy.

- Calli-
cornia. 2. LEYSERA *foliis tri-* X Leysera con hojas dispues-
fariis, floribus subsessili- X tas en tres órdenes; y flores
bus. X casi sentadas.
Callicornia (Gnaphalodes) X Callocornea (como *Gna-*
ramis unifloris, floribus X *phalio*) con ramas de una
subsessilibus, foliis lineari- X flor; flores casi sentadas; y
bus. Burm. prodr. 24. Pluk. X hojas lineares.
phyt. t. 350. f. 4. X

Cast. Leysera Callocornea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

- Pa-
leacea. 3. LEYSERA *foliis tri-* X Leysera con hojas de tres
quetris, apice callosis, re- X caras, callosas por su ápice
curvatis. Syst. veg. 641. X y encorvadas ácia atras.
Roy. X

Ley-

Leysera ericoides. Berg. \times \times *Leysera* como Brezo.
cap. 294.

Cast. *Leysera* pajosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Echa las *hojas* cercadas de pelos claros, y asurcadas interiormente con un surco tomentoso: el *receptaculo* todo con pajas casi del largo de las flores: y toda la *corona de las semillas* membranosa, sin que haya alguna con vilano.

1150. Género ZINNIA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* entre aovado y cilindrico, liso y apifiado; con muchas *escamas* obtusas, derechas y persistentes.

COR. *compuesta* radiada; con muchas *corolillas* hermafroditas, en el disco elevado; y cinco hasta diez femeninas, en el radio.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo, hendida en cinco partes y vellosa por dentro.

De la femenina: ligulada, casi redonda, terminada en seno obtuso, mas alta que el disco y persistente.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco y cortisimos: con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: *germen* oblongo, con dos aristas y la una mas larga: *estilo* filiforme, medio hendido en dos partes: con dos *estigmas* derechos y obtusos.

En las femeninas: *germen* oblongo, de tres caras y sin arista: *estilo* capilar y medio hendido en dos partes: con dos *estigmas* encorvados ácia atrás.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: oblongas, entre de quatro lados y de dos filos: el *vilano* con dos puntas y la una con arista.

En las femeninas: sin arista, y coronadas con el petalo persistente.

RECEPT. con *pajas* á manera de lengüeta, acanaladas, del largo del caliz y que se caen facilmente.

E S P E C I E S.

- Pauci-
flora. 1. *ZINNIA floribus sessilibus*. Syst. veg. 641. Zinnia con las flores sentadas.
Zinnia caule villosa. Reich. in nov. act. A. N. C. v. 6. p. 173. R. Zinnia con el tallo vellosos.
Verbesina foliis oppositis, ovatis, acutis, integerrimis, scabris. Act. petrop. 1763. p. 325. t. 13. Verbesina con hojas opuestas, aovadas, agudas, enterisimas y ásperas.
Chrysogonum foliis sessilibus amplexicaulibus, calycibus sessilibus squamosis. Spec. pl. 1. p. 320. Chrysogono con hojas sentadas, amplexicaules; cálices sin pedunculo y escamosos.
Bidens calyce oblongo, seminibus radii corolla non decidua coronatis. Mill. dict. t. 64. Bidente con el caliz oblongo; y semillas del radio coronadas con la corola persistente.
Rudbeckia foliis oppositis. Zinn. goett. 409. t. 1. Rudbeckia con las hojas opuestas.

Cast. Zinnia de pocas flores.

Habita en el Perú. ☉

Produce el tallo rollizo, derecho y compuesto: las hojas opuestas, sin peciolo, amplexicaules, entre de figura de corazon y lanceoladas, lampiñas, casi con tres nervios, enterisimas y ásperas por su margen: el caliz terminal, sentado, solitario, lampiño y cilindrico: la corola amarilla y persistente: los ramos que salen de las axilas de las hojas apartadas de la flor, semejantes al tallo, y mas altos.

- Multi-
flora. 2. *ZINNIA floribus pedunculatis*. Linn. dec. 23. t. 12. Kniph. cent. 12. n. 100. Zinnia de flores con pedunculo.
Zinnia ramis villosis, numerosis, lateralibus primarium superantibus. Jacq. obs. 2. p. 19. t. 40. Zinnia con ramas vellosas, numerosas, y las laterales que superan á la principal.

Zin-

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 483

Zinnia caule piloso. Nov. \times *Zinnia* con el tallo pelo-
act. A. N. C. VI. p. 173. R. \times so.

Cast. *Zinnia* de muchas flores.

Habita en la Luisiana. \odot

Tiene el tallo con pelo áspero: las hojas pecioladas: y el
radio roxo: y varía con éste de color amarillo. R.

1151. Género PECTIS.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun cilindrico; con cinco hojuelas lanceoladas,
obtusas y casi iguales.

COR. compuesta radiada; con seis corolillas, poco mas 6
menos, hermafroditas; y cinco femeninas, en el radio.

Propia de las hermafroditas: en forma de embudo y
hendida en cinco partes.

De la femenina: ligulada, aovada y mas corta que el
caliz.

ESTAMB. en las hermafroditas: filamentos cinco, y cortos:
con la antera cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: germen linear: estilo filifor-
me: con el estigma hendido en dos partes.

En las femeninas: germen linear: estilo filiforme: con
dos estigmas revueltos.

PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: lineares; y el vilano con aris-
tas.

En las femeninas: muy semejantes á las de las herma-
froditas.

RECEPT. desnudo.

ESPECIES.

Cilia-
ris.

1. PECTIS foliis lineari- \times *Pectis* con hojas lineares
bus ciliatis. Amœn. acad. \times y pestafiosas.

5. p. 407.

Jacobæa Salicis foliis, \times *Jacobea* con hojas como
ad margines villosis. Plum. \times las del Sauce, y vellosas por
spec. 10. ic. 151. f. 2. \times sus margenes.

Cast. *Pectis* pestafiosa.

Habita en America. \odot

484 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Punctata.

2. PECTIS foliis linearibus integerrimis subtus punctatis. Jacq. amer. 216. t. 128. Pectis con hojas lineares, enterisimas, y punteadas por debaxo.

Chondrilla foliis angustis & ad oras punctatis. Plum. spec. 10. ic. 86. f. 1. Chondrilla con hojas angostas, y punteadas por sus orillas.

Cast. Pectis punteada.

Habita en America.

Lini-folia.

3. PECTIS foliis linearibus integerrimis utrinque levibus. Amon. acad. 5. p. 407. Pectis con hojas lineares, enterisimas, y lisas en ambas partes.

Tagetes minor, caule subdiviso, diffuso, foliis linearibus integris. Brown. jam. 319. Tagetes menor, con el tallo subdividido, difuso; hojas lineares y enteras.

Hieracium fruticosum, angustissimis Gramineis foliis, capitulis parvis. Sloan. jam. 123. hist. 1. p. 255. t. 149. f. 3. Hieracio fruticoso, con hojas como las de la Grama, muy angostas; y cabezuelas pequeñas.

Cast. Pectis con hoja de Lino.

Habita en la America. ☉

1152. Género CHRYSANTHEMUM. * Tourn. t. 280.

Leucanthemum Tourn. Bellidioides Vaill. A. G.

1720. f. 17. 23. 31.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun hemisférico y apifado; con escamas estrechamente apretadas unas encima de otras; las interiores gradualmente mayores; y las de mas adentro terminadas en una escama escariosa.

COR. compuesta radiada; con numerosas corolillas hermafroditas y tubulosas, en el disco; y mas de doce femeninas, en el radio.

Pro-

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 485

Propia de la hermatrodita : en forma de embudo , hendida en cinco partes , extendida y del largo del caliz.

De la femenina : ligulada , oblonga y con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica , tubulosa y casi mas corta que la corola.

PIST. en las hermafroditas : *germen* aovado : *estilo* filiforme , mas largo que los estambres : con dos *estigmas* revueltos.

En las femeninas : *germen* aovado : *estilo* filiforme , igual al de las hermafroditas : con dos *estigmas* obtusos y revueltos.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : oblongas ; y sin *vilano*.

En las femeninas : muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. desnudo , punteado y convexô.

OBS. *El Leucanthemo* de Tourn. *tiene las corolillas femeninas lanceoladas ; y las membranas del caliz angostas.*

El Chrysanthemo de Tourn. *posee las corolillas femeninas entre aovadas y truncadas ; y las membranas del caliz aovadas.*

El Chrysanthemo flosculoso carece de radio.

El Chrysanthemo Leucanthemo lleva las semillas negras con estrias blancas : la cabezuela amarilla , cilíndrica y hueca. R.

El Chrysanthemo Balsamina echa el caliz casi como el de la Achílea y sin vilano. R.

El Chrysanthemo de Micó tiene las semillas con una corona membranosa. R.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

CHRYSANTHEMUM. p. 491.

La flor es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos , y la corona de semiflosculos , sentados en embriones , comprehendidos en un caliz hemisférico y escamoso. Los embriones pasan á semillas angulosas ó estriadas , ó tenues y agudas.

LEUCANTHEMUM. p. 492.

Es un género de planta diverso del *Chrysanthemo*, solamente por el color de los semiflosculos, que es cándido.

ESPECIES CON LOS SEMIFLOSCULOS Ó RADIOS BLANCOS.

Frutes
cens.

1. *CHRYSANTHEMUM* X *Chrysanthemo fruticoso*,
fruticosum, *foliis carnosis* X de hojas carnosas, lineares,
linearibus pinnatis dentatis X pinnadas, con dientes, y
apice trifidis. Syst. veg. 641. X hendidas en tres partes por
 su ápice.

Leucanthemum Canariense, *sapore Pyrethri*. Walth. X *Leucanthemo de Canarias*,
 hort. 31. t. 24. X con el sabor de Pelitre.

Bellis Canariensis, *frutescens*, *foliis crassis*, *Pyrethri sapore*. Rai. Suppl. X *Belis de Canarias*, frutes-
 p. 221. X cente, con hojas crasas y de
 sabor de Pelitre.

Bupthalmum Canariense, *Leucanthemum*, *Cotula* X *Buphtalmo de Canarias*,
fœtidæ crassioribus foliis. X con flor blanca; y hojas co-
 Piuk. alm. 73. t. 272. f. 6. X mo las de la *Cotula* fétida;
 pero mas crasas.

Cast. Chrysanthemo frutescente.

Habita en las Islas Canarias. $\frac{h}{2}$

Sero-
tinum.

2. *CHRYSANTHEMUM* X *Chrysanthemo con hojas*
foliis lanceolatis superne X lanceoladas, aserradas por
serratis utrinque acuminatis. Hort. cliff. 416. Jacq. X arriba, y aguzadas en am-
 bas partes.
 obs. 4. p. 8. t. 90.

Aster foliis profunde den- X *Aster ramoso*, con hojas
tatis & quasi laciniatis, ra- X profundamente dentadas, y
mosus. Rai. Suppl. p. 162. X casi laciniadas.

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 487

Bellis major, radice re-
 pente, foliis latioribus, ser-
 ratis. Moris. hist. 3. p. 29.
 sect. 6. t. 9. f. 11. Rai. hist.
 351.

Bellis Americana, fru-
 tescent, ramosa. Rai. hist.
 1865.

Bellis Americana, proce-
 rior, serotina, ramosa, flo-
 re amplissimo. Pluk. alm.
 65. t. 17. f. 2.

Cast. Chrysanthemo tardío.

Habita acaso en la America septentrional? y florece tar-
 de. 26

Ar-
 tum. 3. CHRYSANTHEMUM
*foliis omnibus cuneiformi-
 oblongis incis, carnosiss.*
 Jacq. vind. 151.

Bellis alpina, major, fo-
 lio rigido. C. B. P. 261.
 Prodr. 120.

Leucanthemum alpinum,
 majus, rigido folio. Tourn.
 p. 492.

Bellis alpina, major, fo-
 liis angustis rigidis. Bauh.
 hist. 3. p. 115.

Bellis alpina, minor, fo-
 lio non rigido. Bauh. hist. 3.
 p. 115.

Bellis montana, major,
 folio acuto. C. B. P. 261.
 Prodr. 121.

*Leucanthemum monta-
 num*, majus, folio acuto.
 Tourn. p. 492.

Cast. Chrysanthemo negro.

Habita en prados de los montes de Suiza y Austria : de
 los

488 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

los de Asturias, de Alcarria, Castilla la vieja y de otros de España. 26

Tiene las *hojas radicales* en forma de cuña y hendidas en lóbulos por su ápice : las del *tallo* lanceoladas y aserradas : el *tallo* de una flor : y el *caliz* negro por sus márgenes. *Haller* une esta especie con el *Chrysanthemo Leucanthemo*.

Alpini-
num.

4. CHRYSANTHEMUM

*foliis cuneiformibus pinna-
tifidis , laciniis integris ,
caulibus unifloris.* Ger. prov.
206. Gov. illustr. p. 70.

*Pyrethrum caule uniflo-
ro , foliis glaucis , petiola-
tis palmatis.* Hall. helv. n.
96.

*Chrysanthemum pallidum ,
minimis imisque foliis inci-
sis.* Barr. ic. 421. Gov. R.

*Chamæmelum montanum ,
incanum Absinthioides , Ita-
licum.* Barr. ic. 457. Gov. R.

Chamæmelum alpinum .
C. B. P. 136.

*Leucanthemum alpinum ,
tenuifolium .* Clus. hist. 1.
p. 335. Barr. ic. 458. f. 3.

Chrysanthemo de hojas en forma de cuña , hendidas al través , con sus lacinias enteras ; y tallos de una flor.

Pelitre con el tallo de una flor ; hojas de color garzo , con peciolo y palmeadas.

Chrysanthemo pálido , con hojas muy pequeñas , y las de mas abaxo cortadas.

Manzanilla montana , de Italia , blanquecina , y parecida al Axenjo.

Manzanilla de los alpes.

Leucanthemo alpino , con hoja delgada.

Cast. Chrysanthemo alpino.

Habita en las aguas picantes de los alpes de Suiza.

Echa los *tallos* con renuevos : las *hojas* pecioladas , hendidas el través , y las mas veces con siete lacinias , enteras , agudas y apartadas : los *tallos* terminales , muy sencillos , del largo de un xeme , y de una flor , con tres ó quatro hojas lineares , las mas veces indivisas y señaladamente las superiores : y las *escamas del caliz* negras y escariosas.

CHRY-

Leu-
canthe-
mun.

5. CHRYSANTHEMUM

foliis amplexicaulibus oblongis, supernè serratis, infernè dentatis. Hort. cliff.

416.

Matricaria foliis radicalibus petiolatis, ovatis, crenatis, caulinis amplexicaulibus dentatis. H. ll. helv. n.

98. multas habet varietates.

Matricaria foliis simplicibus, amplexicaulibus, receptaculis convexis. Scop.

carn. 1. p. 373. n. 1. ed. 2.

n. 1041.

Bellis sylvestris, caule folioso, major. C. B. P. 261.

Bellis major. Dod. pempt.

265. Bauh. hist. 3. p. 114.

Fuchs. hist. 148. Cam. epit.

635.

Leucanthemum vulgare.

Tourn. p. 492.

Bellis montana, folio obtuso, crenato. C. B. P. 261.

Prodr. 121. Barr. ic. 458. f. 2.

Leucanthemum vulgare, caule villis canescente. To-

urn. p. 492.

Chrysanthemo con hojas amplexicaules, oblongas, por arriba aserradas y por debajo dentadas.

Matricaria con las hojas radicales pecioladas, aovadas, recortadas, las del tallo amplexicaules y dentadas.

Matricaria con hojas sencillas, amplexicaules; y receptáculos convexos.

Belis silvestre, mayor, con el tallo folioso.

Belis mayor.

Leucanthemo vulgar.

Belis montana, con hoja obtusa y recortada. α

Leucanthemo vulgar, de tallo blanquecino con pelillos. β

Cast. Chrysanthemo Leucanthemo. Farm. Bellis pratensis.

Habita en los prados de Europa: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña, Alcarria y en otras muchas partes de España entre los sembrados. 2

Tiene las semillas negras, con estrias blancas: la cabezuela amarilla, cilíndrica y hueca.

Las hojas radicales comunmente en forma de espátula, aserradas por su ápice; y las del tallo entre aserradas y dentadas en ambas partes.

PROPIED. La yerba es algo acre y penetrante, diuretica y vulneraria: se usa en la tisis, en el asma y en la tiña.

CHRY-

Mon-
tanum. 6. CHRYSANTHEMUM X Chrysanthemo con las ho-
foliis imis spathulato-lan- jas de abaxo entre de figura
ceolatis serratis, summis de espátula y lanceoladas,
linearibus. Jacq. obs. 4. p. aserradas, y las de mas arriba
 9. t. 91. lineares.

Leucanthemum monta- Leucanthemo montano,
num, minus. Tourn. p. 492. menor.

Bellis montana, minor. Belis montana, menor.
 Bauh. hist. 3. p. 115.

Cast. Chrysanthemo montano.

Habita en Mompeller y en Tubinga de Silesia: en Ara-
 gon: en los montes de Asturias y otros de España.

Gerardo reputa esta especie por variedad de la prece-
 dente.

Tiene los *pedunculos* largos, de una flor y desnudos.

Gra-
mini-
folium. 7. CHRYSANTHEMUM X Chrysanthemo con hojas
foliis linearibus subinteg- lineares, casi enterisimas; y
rimis, caule simplicissimo. tallo muy sencillo.
 Jacq. obs. 4. t. 92.

Chrysanthemum foliis ra- Chrysanthemo con las ho-
dicalibus oblongis dentatis, jas radicales oblongas, den-
caulinis linearibus integer- tadas, las del tallo lineares
rimis. Gou. illustr. p. 70. R. y enterisimas.

Leucanthemum gramineo Leucanthemo con hoja co-
folio. Tourn. p. 493. mo de Grama.

Bellis montana, grami- Belis montana, con hojas
neis foliis. Magn. monsp. gramineas.
 291. hort. 31. t. 31.

Cast. Chrysanthemo con hoja de Grama.

Habita en Mompeller. 24

Mons-
pelien-
se. 8. CHRYSANTHEMUM X Chrysanthemo con las ho-
foliis imis palmatis, foliolis jas de abaxo palmeadas; y
linearibus pinnatifidis. Jacq. sus hojuelas lineares y hien-
 obs. 4. p. 10. t. 93. didas al través.

Bellis montana, major, Belis montana, mayor,
foliis Chrysanthemi Cretici con hojas como las del Chry-
angustioribus. Magn. monsp. santhemo de Creta y mas an-
 306. gostas.

Leu-

Leucanthemum monta- ~~X~~ *Leucanthemo montano*,
num, foliis Chrysanthemi. ~~X~~ con hojas como las del Chry-
 Tourn. p. 492. ~~X~~ *santhemo.*

Cast. Chrysanthemo de Mompeller.

Habita en Mompeller. 2

Balsa-
 mita.

9. CHRYSANTHEMUM ~~X~~ *Chrysanthemo de hojas ac-*
foliis ovatis oblongis serra- ~~X~~ *vadas, oblongas, aserradas,*
tis auriculatis. ~~X~~ Jacq. obs. 4. ~~X~~ y con orejillas.
 p. 8. t. 89.

Leucanthemum Orientale, ~~X~~ *Leucanthemo Oriental,*
Costi hortensis folio. ~~X~~ Tourn. ~~X~~ con hoja como la del Costo
 cor. 37. ~~X~~ *hortense.*

Bellidioides Balsamitæ ~~X~~ *Planta como Belis, con*
majoris folio, facie & odo- ~~X~~ *hoja, traza y olor de Balsa-*
re. ~~X~~ Vaill. act. 550. ~~X~~ *mita mayor.*

Cast. Chrysanthemo Balsamita.

Habita en Oriente. 2

Es muy semejante al *Tanaceto Balsamita*; pero tiene las
 flores radiadas: el tallo casi angulado y ramoso: las
 hojas entre lanceoladas y aovadas, algo obtusas, aser-
 radas, casi tomentosas, pecioladas y con una orejilla
 pequeña en ambas partes: la flor como la del *Aster*
annuo; el caliz casi como el de la *Achilea*: la corola
 amarilla, con el radio blanco: y la semilla carece de
 vilano.

Inodo-
 rum.

10. CHRYSANTHEMUM ~~X~~ *Chrysanthemo con hojas*
foliis pinnatis multifidis, ~~X~~ *pinnadas, hendidas en mu-*
caule ramoso diffuso. ~~X~~ Flor. ~~X~~ *chas partes; tallo ramoso y*
 dan. t. 696. ~~X~~ *difuso.*

Matricaria inodora, re- ~~X~~ *Matricaria sin olor, con*
ceptaculis hemisfericis, ra- ~~X~~ *receptaculos hemisféricos;*
diis patentibus, seminibus ~~X~~ *radios extendidos; semillas*
coronato-marginatis, squa- ~~X~~ *coronadas con ribete; y es-*
mis calycinis margine obso- ~~X~~ *camas del caliz desfiguradas*
letis. ~~X~~ Flor. suec. 2. n. 765. ~~X~~ *en su margen.*

492 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Chamæmelum inodorum, *Chrysanthemo* sin olor, *annuum*, *humilius*, *foliis* annuo y mas baxo, con ho-
obscurè virentibus. Moris. jas de color verde obscuro.
hist. 3. p. 36. Rai. angl. 3.
p. 186.

Chamæmelum inodorum, *Manzanilla* sin olor, ó *Cotula non fætida*. Bauh. *Cotula* que no es fetida.
hist. 3. p. 120.

Cast. Chrysanthemo sin olor.

Habita entre cascajales de Europa y de Suecia. ☉

Achil-
leæ.

11. *CHRYSANTHEMUM* *Chrysanthemo* de hojas
foliis bipinnatis, *pinnis* dos veces pinnadas, con las
imbricatis, *caule stricto* hojuelas apinadas; tallo apre-
multifloro. Syst. veg. 642. tado y rígido, y con muchas
flores.

Parthenium foliis tenuis- *Parthenio* con hojas muy
simis, *Achilleæ cæsuris*. delgadas, y sus cortaduras
Mich. gen. 34. t. 29. como las de la Achílea.

Cast. Chrysanthemo Achílea.

Habita en Italia. ♀

Arroja el tallo derecho, algo angulado, del largo de un pie y con muchas flores: las *hojas* como las de la *Milenrama*; pero ocho veces mayores, salpicadas de puntitos eminentes poco manifestos, con pelos blancos y claros por debaxo y terminadas en una puntita blanquecina.

Co-
r y m-
bosum

12. *CHRYSANTHEMUM* *Chrysanthemo* con hojas
foliis pinnatis inciso-serra- pinnadas, entre cortadas y
tis, *caule multifloro*. Gmel. aserradas; y tallo de muchas
sib. 2. p. 204. n. 171. Jacq. flores.
austr. t. 379.

Pyrethrum foliis pinna- *Pelitre* de hojas pinnadas,
tis, *pinnis semipinnatis* con hojuelas medio pinna-
acute dentatis, *floribus um-* das, agudamente dentadas;
bellatis. Hall. helv. n. 95. y flores en umbela.

Tanacetum montanum, *Tanaceto* montano, sin
inodorum, *minore flore*. C. olor, y con la flor mas peque-
B. P. 132. Barr. ic. 786. ña.

Ta-

Tanacetum Leucanthemum. Tabern. hist. 379. Tanaceto de flor blanca.

Tanacetum inodorum II. Clus. pann. 551. Hall. R. Tanaceto segundo, sin olor.

Bellis montana, minor, *Tanacetum folio*. Pluk. alm. 66. t. 82. f. 1. Haller. Belis montana, menor, con hoja como la del Tanaceto.

Matricaria Tanacetum folio, flore minore, semine umbilicato. Tourn. p. 494. Matricaria de hoja como la del Tanaceto; flor mas pequeña; y semilla con ombligo.

α *Tanacetum inodorum, flore majore*. C. B. P. 132. Tanaceto sin olor, con la flor mas grande. α

Tanacetum inodorum I. Clus. pann. 550. Hall. Tanaceto primero, sin olor.

Tanacetum latifolium, inodorum, magno Bellidis flore. Barr. ic. 781. Hall. R. Tanaceto sin olor, de hoja ancha; y flor grande como la de la Belis.

Cast. Chrysanthemo corimboso.

Habita en lugares montuosos de Bohemia, Suiza y Siberia: en Aragon, Cataluña, Castilla la vieja y en otras muchas partes de España. 24

ESPECIES CON LOS SEMIFLOSCULOS Ó RADIOS AMARILLOS.

Pin-
natifi-
dum. 13. CHRYSANTHEMUM *Chrysanthemo fruticoso, fruticosum, foliis simplicibus oblongis pinnatifidis, y hendidas al través, con sus pinnis serratis*. Suppl. p. 377. lacinias aserradas.

Cast. Chrysanthemo hendido al través.

Habita en las peñas altísimas, cerca de los arroyos de la Isla de la Madera. Masson. h

Es semejante al *Chrysanthemo de Indias*, tanto que parece variedad suya; pero tiene las hojas oblongas, no aovadas, y casi quatro veces mayores, del modo que los demas vegetables en aquellas Islas, que en todas sus partes son mayores.

In- 14. CHRYSANTHEMUM X Chrysanthemum con hojas
dicum. *foliis simplicibus ovatis sin-* sencillas, aovadas, sinuosas,
uatis angulatis serratis anguladas, aserradas y agu-
acutis. das.

Matricaria Sinensis, mi- Matricaria de la China,
nore flore, petalis & um- con la flor mas pequeña; pe-
bone echro-leucis. Pluk. talos y disco de color ama-
Amalthi. 142. t. 430. f. 2. rillo-blanco.

Matricaria Sinensis. Matricaria de la China.
Rumph. amb. 5. p. 259. t.
91. f. 1.

Tsietti-pu. Rheed. mal. Tsietti-pu.
10. p..... t. 44.

Chrysanthemum Made- Chrysanthemum de Madras-
raspatanum, Oxyacantha patan, con hojas como las
foliis cæsiis, ad marginem de la Oxyacantha ó espino
spinosus, calyce argenteo. majuelo, de color verde-azul,
Pluk. alm. 101. t. 160. f. 6. espinosas en su margen; y
caliz de color de plata. α

Matricaria Indica, latio- Matricaria de Indias, con
re folio, flore pleno. Moris. hoja ancha; y flor plena.
hist. 3. p. 33.

Matricaria Sinensis, flo- Matricaria de la China,
re monstroso. Vaill. act. 1720. con la flor monstruosa.
p. 368. Flor. zeyl. 421.

Cast. Chrysanthemum de Indias.

Habita en la India,

Arcti- 15. CHRYSANTHEMUM X Chrysanthemum con hojas
cum. *foliis simplicibus cuneifor-* sencillas, en forma de cuña,
mibus subpalmatis multifi- casi palmeadas, hendidas en
dis obtusis. Pall. it. 3. p. muchas partes y obtusas.
318.

Pyrethrum foliis longe Pelitre de hojas con pecio-
petiolatis, palmatis, supra lo largo, palmeadas, ensan-
dilatatis, ultimis laciniis chadas por arriba, y sus ul-
trilobis. Gmel. sib. 2. p. 203. timas lacinias hendidas en
t. 84. lóbulos.

Cast. Chrysanthemum arctico.

Habita en la America septentrional y en Kamtschatca.

Echa

Echa los *tallos* debiles, difusos, herbáceos y por debaxo ramosos: las *hojas* con peciolos largos, algo carnosas, lisas, en forma de cufia, hendidas en tres lóbulos, entre sinuosas y anguladas, y obtusas: las *flores* terminales, solitarias, y de la magnitud de las del *Chrysanthemo coronario*; con el *pedunculo* algo vellosos.

Pecti- 16. CHRYSANTHEMUM X Chrysanthemo con hojas
natum. foliis pinnatis linearibus X pinnadas, lineares, parale-
parallelis acutis integerrimis, X las, agudas, enterisimas;
pedunculis solitariis X pedunculos solitarios y de
unifloris. X una flor.

Leucanthemum fruticans, X Leucanthemo fruticoso,
pinnatis, superioribus Qua- X con hojas pinnadas, las su-
moclit foliis, imis vermicu- X periores como las del Qua-
latis & torosis. Barr. ic. 422. X moclit, las de mas abaxo co-
X mo gusanillos y con conve-
X xidades.

Chamæmelum montanum, X Manzanilla montana, de
incanum absinthioides, Ita- X Italia, blanquecina, y pare-
licum. Barr. ic. 457? repræ- X cida al Axenjo.
sentat florem & habitum. X

Cast. Chrysanthemo como peyne.

Habita en España y en Italia. ¶

Tiene los *tallos* cortísimos, algo crasos, postrados y rastro-
teros: las *hojas* pinnadas, pequeñas (como las del *Tanaceto frutescente*) y vellosas: el *pedunculo* mas alto,
con una ú otra hoja alesnada en su base: y la *flor* de
color amarillo-roxo.

Haller atribuye el sinónimo de *Barrelier* al *Chrysanthemo alpino*. R.

Sege- 17. CHRYSANTHEMUM X Chrysanthemo con hojas
tum. foliis amplexicaulibus, su- X amplexicaules, por arriba
perne laciniatis, inferne X laciniadas, y por debaxo en-
dentato-serratis. Hort. cliff. X tre dentadas y aserradas.
416. Dalib. paris. 261. X

Chrysanthemum segetum. X Chrysanthemo de sembra-
Clus. hist. 1. p. 334. X dos.

Chry.

496 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Chrysanthemum segetum, *vulgare*, *glaucum*. Moris. hist. 3. p. 15. sect. 6. t. 4. f. 1. Chrysanthemo de sembrados, vulgar y de color garzo.

Bellis lutea, *foliis profunde incisis*, *major*. C. B. P. 262. Belis mayor, con la flor amarilla, y hojas profundamente cortadas.

Cast. Chrysanthemo de sembrados.

Habita entre los sembrados de Scania, Alemania, Flandes, Inglaterra y Francia: en los circuitos de Madrid y otras muchas partes de España. ☉

Myconi. 18. CHRYSANTHEMUM *foliis lingulatis obtusis serratis*, *calycinis squamis æqualibus*. Jacq. obs. 4. p. 10. t. 94. Chrysanthemo con hojas en forma de lengueta, obtusas, aserradas; y escamas del caliz iguales.

Chrysanthemum Myconi. Dalech. hist. 873. t. 873. Chrysanthemo del Doctor Micó.

Chrysanthemum latifolium. Bauh. hist. 3. p. 105. Tourn. p. 492. Chrysanthemo de hoja ancha.

Bellis lutea, *foliis subrotundis*. C. B. P. 262. Belis con la flor amarilla; y hojas casi redondas.

Cast. Chrysanthemo de Micó.

Habita entre los sembrados de Portugal y de Italia: en Cataluña, en la Alcarria, montes de Burgos y otras partes de España. ☉

Es muy semejante á la antecedente; pero tiene el tallo derecho, liso y algo rollizo: las *hojas* mas anchas ácia afuera, obtusas, lisas, que abrazan la mitad del tallo y obtusamente aserradas: el *pedunculo* terminal, estriado, sin que por su ápice sea mas grueso: el *caliz* con escamas escariosas en su remate: la *corola* de color amarillo subido: el *radio* corto, con tres dientes; y la *corona de las semillas* membranosa.

Itali-
cum. 19. CHRYSANTHEMUM X Chrysanthemo con hojas
foliis bipinnatis serratis, dos veces pinnadas, aserra-
florum radiis longitudine das ; radios de las flores del
disci , caule procumbente. largo del disco ; y tallo ten-
X dido.

Cast. Chrysanthemo de Italia.

Habita en Italia. *Arduino.*

Es muy semejante al *Chrysanthemo Milenrama* ; pero tie-
ne el tallo mas ramoso , mas derecho y de muchas flo-
res : el radio de la flor blanquecino y del largo del
disco.

Mil-
lefolia-
tum. 20. CHRYSANTHEMUM X Chrysanthemo con hojas
foliis bipinnatis dentatis, dos veces pinnadas, denta-
caule decumbente , corollæ das ; tallo tendido ; y radios
radiis disco brevioribus. de la corola mas cortos que
Syst. veg. 643. el disco.

Anthemis (Millefolia) fo- Anthemis (*Milenrama*)
liis bipinnatis , laciniis li- de hojas dos veces pinnadas,
nearibus integris , peduncu- con sus lacinias lineares y
lis nudis longissimis. Spec. enteras ; pedunculos desnu-
pl. 3. p. 1263. Roy. lugdb. dos y larguissimos.
271.

Pyrethrum foliis incanis, Pelitre con hojas blanque-
triplicato-pinnatis , tomen- cinas , tres veces pinnadas y
tosis. Hall. goett. 393. R. tomentosas.

Anthemis foliis pinnatis, Anthemis de hojas pinna-
foliolis lineari-lanceolatis das ; hojuelas entre lineares
basi sursum auctis. Mill. ic. y lanceoladas , y arriba de
6. t. 9. su base acompañadas con
X otras.

Pyrethrum foliis dupli- Pelitre de hojas dos veces
cato-pinnatis , pinnulis inci- pinnadas , con hojuelas cor-
sis , pedunculis unifloris, tadas , pedunculos de una
caule procumbente . Gmel. flor ; y tallo tendido.
sib. 2. p. 207. t. 86. f. 1. 2. X

Cast. Chrysanthemo Milenrama.

Habita en la Siberia.

Tiene el disco enteramente sin pajas ; y se diferencia del
Chrysanthemo dos veces pinnado , por el diametro de

498 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

las corolas del disco que no excede á la longitud del caliz ; pues aquel goza el disco dos veces mas ancho. Es parecido al *Chrysanthemo de Italia*.

- Bipinnatum. 21. *CHRYSANTHEMUM* *Chrysanthemo con hojas*
foliis bipinnatis serratis vil- dos veces pinnadas , aserra-
losis , radiis disco breviori- das y vellosas ; y los radios
bus. mas cortos que el disco.
Pyrethrum foliis duplica- Pelitre de hojas dos veces
to-pinnatis , pinnulis inci- pinnadas , con las hojuelas
sis , pedunculis unifloris . cortadas ; y pedunculos de
 Gmel. sib. 2. p. 205. t. 85. una flor.
 f. 1.

Cast. *Chrysanthemo* dos veces pinnado.

Habita en la Siberia. 26

Su traza es como la de la *Anthemis de tintes*. Posee las hojas dos veces pinnadas , casi como las del *Tanaceto* : las hojuelas casi lanceoladas y con pelo áspero : los pedunculos axilares , desnudos , de una flor , vellosos y del largo de las hojas : las flores amarillas ; y el radio mucho mas corto que el disco.

- Coronarum. 22. *CHRYSANTHEMUM* *Chrysanthemo con hojas*
foliis pinnatis incisissimis ex- pinnadas , cortadas y mas
trorsum latioribus . Hort. anchas ácia afuera.
 cliff. 416. Kniph. cent. 1. t.
 14.
Matricaria foliis ample- *Matricaria de hojas am-*
xicaulibus , pinnatis , pin- plexicaules , pinnadas , con
nis semipinnatis , acutè den- las hojuelas medio pinnadas ,
tatis , semiflosculis latissi- agudamente dentadas ; y se-
mis . Hall. helv. n. 99. miflosculos muy anchos.
Chrysanthemum foliis *Chrysanthemo con hojas*
Matricariæ . C. B. P. 134. como las de la *Matricaria*.
 Tourn. p. 491.

Chrysanthemum majus , *Chrysanthemo mayor , con*
folio profundius laciniato , hoja mas profundamente la-
magno flore . C. B. P. 134. ciniada ; y flor grande.

Chry-

Chrysanthemum Creticum. X Chrysanthemo de Creta.
 Clus. hist. 1. p. 334. Moris. X
 hist. 3. p. 16. sect. 6. t. 4. X
 f. 2. 3. X

Cast. Chrysanthemo coronario.

Habita en Creta , en Sicilia y Suiza. ☉

Flos- 23. CHRYSANTHEMUM X Chrysanthemo con todos
 culo- *flosculis omnibus uniformi-* los flosculos uniformes y her-
 sum. *bus hermafroditis.* Hort. cliff. X mafroditos.

417. Roy. lugdb. 174.

Tanacetum foliis inte- Tanaceto con hojas ente-
gris , rigidis , dentatis , sca- ras , rígidas , dentadas; y es-
po unifloro. Hall. goett. 370. X capo de una flor.

Bellis major , spinosa , pe- Belis mayor , con hojas es-
talis carens , seu nuda. Mo- pinosas , y que carece de pe-
 ris. hist. 3. p. 29. sect. 6. t. talos ó desnuda.
 9. f. 16.

Bellis spinosa , foliis Age- Belis espinosa , con hojas
rati. C. B. P. 262. X como las del Agerato.

Bellis spinosa. Alp. exot. Belis espinosa.
 327. t. 326.

* *Cotula (grandis) caule* Cotula (grande) con el
simplici erecto , foliis lan- tallo sencillo y derecho; ho-
ceolatis dentatis. Spec. pl. 3. X jas lanceoladas y dentadas, X
 p. 1257. Jacq. obs. 4. p. 4.
 t. 81. X

Cast. Chrysanthemo flosculoso.

Habita en Africa y en Creta. ♀

Produce los *flosculos* hendidos en cinco partes: el *tallo* sencillo , derecho , del largo de pie y medio , angulado y de color que tira á purpúreo : las *ramas superiores* alargadas y de una flor ; las *inferiores* estériles y foliosas : las *hojas* amplexicaules , en forma de espátula , entre dentadas y agudamente aserradas.

Está siempre verde. Tiene las *hojas* aovadas al revés , entre sinuosas y algo rígidas : la *flor* terminal y solitaria. *Syst. veg.* 643.

Echa el *tallo* sufruticoso , tendido y siempre verde : las *hojas* aovadas al revés , adelgazadas en peciolos , entre si-

500 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

nuosas y dentadas , y algo rígidas : las *flores* pequeñas, terminales y solitarias. *Gov. hort.* 459.

La variedad *x* arroja el *tallo* del largo de tres pies , muy sencillo , con pelo áspero ácia su base y estriado : la *flor* terminal , amarilla , y al doble mayor que la del *Chrysanthemo Leuchanthemo* : las *escamas del caliz* algo membranosas por su ápice : el *receptaculo* desnudo : y la *corona de la semilla* es una escama que sale del lado exterior del germen. Otra *planta* semejante á esta remitió el *Doctor Allioni* á *Linneo* ; pero mas pequeña , ramosa , y con las *hojas* mas dentadas. *Sp. pl. loco citato.*

1153. Género MATRICARIA. * *Tourn. t.* 231.

Vaill. A. G. 1720.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* hemisférico ; con *escamas* lineares , apiñadas, casi iguales, y sin que sean escariosas.

COR. *compuesta* radiada ; con numerosas *corolillas* hermafroditas y tubulosas , en el disco hemisférico ; y muchas femeninas, en el radio.

Propia de la hermafrodita : en forma de embudo , hendida en cinco partes y extendida.

De la femenina : oblonga y con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco , capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : *germen* oblongo y desnudo : *estilo* filiforme y del largo de los estambres : con el *estigma* hendido en dos partes y extendido.

En las femeninas : *germen* desnudo : *estilo* filiforme y casi del largo del de la hermafrodita : con dos *estigmas* revueltos.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : oblongas ; y sin *vilano*.

En las femeninas : muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. desnudo y convexo.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 493.

La flor comunmente es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos , y la corona de semiflosculos, sentados en el embrion , y comprehendidos en el caliz esférico y escamoso. Los embriones pasan á semillas oblongas y fixadas en el talamo. A estas notas se añaden las de las flores , que nacen casi en hacedillo , y la de las hojas cortadas en muchas partes y como por conjugaciones.

ESPECIES.

Par-
t h e -
nium. 1. *MATRICARIA foliis* Matricaria de hojas com-
compositis planis , foliolis puestas y planas, con las
ovatis incisís , pedunculis hojuelas aovadas , cortadas;
ramosis. Hort. cliff. 416. Fl. y pedunculos ramosos.
dan. t. 674. Mat. med. 217.

Matricaria foliis pinna- Matricaria de hojas pinna-
tis , pinnis semipinnatis, das, con las hojuelas medio
laciniis obtusis , floribus pinnadas, y sus lacinias ob-
umbellatis . Hall. helv. n. tusas; y flores en umbela.
100.

Matricaria vulgaris seu Matricaria vulgar , ó sati-
sativa. C. B. P. 133. Tourn. va.
p. 493.

Matricaria. Dod. pempt. Matricaria.
35. Blackw. t. 192.

Cast. Matricaria partenio.

Habita en lugares cultivados y entre cascajales de Euro-
pa : en Aragon , Cataluña , Castilla la vieja , Galicia y
en otras muchas partes de España. 24 ♂

Tiene el caliz escarioso , como el del *Chrysanthemo*. Va-
ría con hojas rizadas ; flores plenas y el disco desnudo
ó sin semiflosculos. Hall.

Posee los pedunculos corimbosos : las hojas casi dos veces
pinnadas , con peciolo : y las escamas del caliz aquilla-
das. Gov. hort. 450.

PROPIED. Las hojas y flores son olorosas y amargas : ano-
dinas , tónicas , estomáticas , emenagogas y abuyen-
tan la leche : se usan con admirables efectos en la
pa-

pasion iliaca de los niños , en la cólica , en la xaqueca y en el histerico.

Mari-
tima.

2. **MATRICARIA** *receptaculis hemisphericis, foliis bipinnatis subcarnosis, supra convexis, subtus carinatis.* Mill. dict. n. 2. Matricaria con los receptaculos hemisféricos ; hojas dos veces pinnadas , algo carnosas , por encima convexas y por debaxo aquilladas.

Chamæmelum maritimum, perenne, humilius, foliis brevioribus, crassis, obs- cure virentibus. Rai. angl 3. p. 186. t. 7. f. 1. it. Westrogoth. 148. Manzanilla maritima , perenne , mas baxa , con hojas mas cortas , crasas y de color verde obscuro.

Cast. Matricaria maritima.

Habita en las playas del mar de la Europa septentrional.

Sua-
ve o-
lens.

3. **MATRICARIA** *receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus.* Gmel. sib. 2. p. 200. Matricaria con los receptaculos cónicos ; radios doblados ; semillas desnudas ; y escamas del caliz iguales en la margen.

Matricaria Leucanthemos, annua, suave olens, Chamæmeli folio, ovariis albicantibus. Vaill. paris. 1720. Matricaria annua , con la flor blanca , de olor suave , hoja como la de la Manzanilla y los gérmenes blanquecinos.

Cast. Matricaria de olor suave.

Habita en la Europa. ☉

Cha-
momil-
la.

4. **MATRICARIA** *receptaculis conicis, radiis patentibus, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus.* Gmel. sib. 2. p. 200. Blackw. t. 298. Mat. med. 217. Matricaria con los receptaculos cónicos ; radios extendidos ; semillas desnudas ; y escamas del caliz iguales en la margen.

Matricaria foliis capillaribus, duplicato-pinnatis, pinnis lanceolatis, bifidis trifidisque. Hall. helv. n. 101. Matricaria de hojas capilares, dos veces pinnadas, con las hojuelas ó lacinias lanceoladas, y hendidas en dos y en tres partes.

Matricaria foliis supra-decompositis setaceis, pedunculis solitariis. Hort. cliff. 415. Roy. lugdb. 173. Matricaria con hojas sobredecompuestas, setáceas; y pedunculos solitarios.

Chamæmelum vulgare, seu *Leucanthemum Dioscoridis*. C. B. P. 135. Tourn. p. 494. Manzanilla vulgar, ó Leucanthemo de Dioscorides.

Anthemis vulgaris. Lob. ic. 770. Anthemis vulgar.

Cast. *Matricaria* Manzanilla. **Farm.** *Chamæmelum vulgare*.

Habita en los sembrados y terrenos cultivados de Europa: en Cataluña y otras partes de España. ☉

PROPIED. La yerba y flores son amargas, olorosas y emolientes: se usan en la terciana, cardialgia, cólica, vómito de las preñadas, en el cálculo y en la disuria.

Ar-
gentea 5. **MATRICARIA** *foliis bipinnatis*, pedunculis solitariis. Hort. cliff. 415. Roy. lugdb. 163. Matricaria con hojas dos veces pinnadas; y pedunculos solitarios.

Matricaria monoleucanthemos, foliis argenteis, plerumque conjugatis. Vaill. act. 1720. p. 369. Matricaria con una sola flor blanca; hojas de color de plata y las mas veces conjugadas.

Chamæmelum Orientale, incanum, *Millefolii folio*. Tourn. cor. 37. Manzanilla Oriental, blancuecina; con hoja como la del Milenrama.

Cast. *Matricaria* de color de plata.

Habita en Oriente.

Aste-
roides. 6. **MATRICARIA** *foliis lanceolatis integris glabris* obliquis. Matricaria con hojas lanceoladas, enteras, lampiñas y obliquas.

Ma-

504 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Matricaria foliis simpli- X *Matricaria* con hojas sen-
cibus lineari-lanceolatis ses- X cillas , entre lineares y lan-
silibus , pedunculis unifor- X ceoladas , sin peciolo ; y pe-
mibus. Mill. act. angl. 1765. X dunculos uniformes.
 p. 94.

Aster Americanus , flore X *Aster* de America , con la
albo , folio Lactucæ purpu- X flor blanca ; y hoja como la
reæ. Rai. Suppl. p. 160. X de la Lechuga purpúrea.

Cast. *Matricaria* como *Aster*.

Habita en Pensilvania. *Bartram.* 24

Es planta con la flor semejante á la del *Aster annuo* , y las hojas como las de la *Lechuga escarola*. Produce el tallo derecho , del largo de dos pies , apretado y rígido , liso , casi anguloso y algo estriado : las hojas alternas , apartadas , sin peciolo , lanceoladas , lisas , dobladas por su base y ásperas en la margen : la panoja mas clara , algo rígida y con pedunculos de una flor : el caliz casi plano , apiñado con escamas casi iguales , alesnadas y del largo del disco : el disco de la corola hemisfétrico y amarillo : el radio linear , entero , y de color entre encarnado y blanco : las semillas comprimidas y coronadas con un ribete de cinco dientes : el receptáculo desnudo y hemisfétrico.

1154. Género COTULA. * *Vaill. A. G.* 1719. f. 3.

15. 21. *Anantocyclus.* *Vaill. A. G.* 1719.

f. 5. 24. *Dill. elth.* 23. f. 25. 26.

Lancisia. *Pont. diss.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun convexó , y dividido en diez y seis partes , poco mas ó menos , aovadas , de las quales las ocho se hallan exteriores , y de ellas las inferiores casi son mayores que las interiores.

COR. compuesta del largo del caliz y algo convexá ; con numerosas corollas hermafroditas , en el disco ; y mas de veinte femeninas , en el ámbito.

Propia en las hermafroditas : tubulosa , hendida en cuatro

tro partes, desigual, con la lacinia de mas afuera mayor.

De las femeninas: casi ninguna.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* quatro, muy pequeños: con la *antera* tubulosa, y del largo de la corollilla.

PIST. en las hermafroditas: *germen* aovado al revés: *estilo* filiforme: con dos *estigmas* obtusos.

En las femeninas: *germen* aovado al revés, comprimido, de dos filos y mayor: *estilo* filiforme y del largo del de las hermafroditas: con dos *estigmas* sencillos.

PERIC. ninguno: el *caliz* persistente y sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: menores, entre aovadas y de tres lados, con el ángulo interior desfigurado; y el *vilano* ribeteado.

En las femeninas: mayores, de figura de corazon, por una parte planas y por la otra gibosas, y ceñidas con un ribete obtuso: con el *vilano* ribeteado.

RECEPT. casi desnudo, y plano.

Obs. En algunas especies, las flores se hallan flosculosas, y en otras radiadas. R.

La Cotula del Cabo de Buena-esperanza tiene el caliz apiñado, y algo escarioso. R.

ESPECIES.

- An-
themo-
ides.
1. COTULA *foliis pin-*X Cotula con hojas entre
nato-multifidis dilatatis, X pinnadas y hendidas en mu-
floribus flosculosis. Murray. X chas partes, ensanchadas; y
prodr. 230. X flores flosculosas.
- Ananthocyclus Chamæ-*X Ananthocyclo con hoja co-
meli folio. Vaill. Dill. elth. X mo la de la Manzanilla.
26. t. 23. f. 25.
- Chrysanthemum exoti-*X Chrysanthemo exótico,
cum, perpusillum, nudum, X muy pequeño y desnudo,
foliis Coronopi. Pluk. alm. X con hoja como la del Coro-
101. t. 274. figura ultima. X nopo.

506 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

α *Artemisia* (Nilotica) fo-
liis bipinnatis, caule erec-
tiusculo, pedunculis solita-
riis unifloris nudis filifor-
mibus longitudine foliorum.
 Spec. pl. 3. p. 1188. Amœ-
 nit. acad. 4. p. 289.

Artemisa (del Nilo) con
 hojas dos veces pinnadas;
 tallo derecho; pedunculos
 solitarios, de una flor, des-
 nudos, filiformes, y del lar-
 go de las hojas. α

Cast. *Cotula* como *Anthemis*.

Habita en la Isla de Santa Helena y en España: y la va-
 riedad α en Egipto.

Echa el tallo peloso: las *hojas* hendidas al través: los *pe-*
dunculos largos, solitarios y de una flor: la *flor* globo-
 sa, cabizbaxa y amarilla: el *caliz* sin ser apiñado: y el
receptaculo desnudo.

Aurea. 2. *COTULA foliis pin-*
nato-setaceis multifidis, flo-
ribus flosculosis cernuis.

Cotula con hojas entre
 pinnadas y setáceas, hendi-
 das en muchas partes; flores
 flosculosas y cabizbaxas.

Cotula foliis pinnatim se-
taceis, caulibus procumben-
tibus. Loeß. it. 163.

Cotula con hojas pinnadas
 y setáceas; y tallos tendi-
 dos.

Chamæmelum aureum,
peregrinum, capite sine fo-
liis. Bauh. hist. 3. pag. 119.

Manzanilla peregrina, con
 la cabezuela de color de oro
 y sin hojas.

Chamæmelum luteum, ca-
pitulo aphylo. C. B. B. 135.

Manzanilla con la cabe-
 zuela amarilla y sin hojas.

Tourn. p. 494. secundum
 Loeß.

Cast. *Cotula aurea. vulgo:* Manzanilla fina.

Habita en la Europa austral: dentro y en el circuito de
 Madrid y en otras partes de España. ○

Tiene las *flores* sin pajas: y los *flosculos* hendidos en qua-
 tro partes.

Echa la *raiz* blanca, sencilla y con algunas fibras: mu-
 chos *tallos* que salen de la raiz, tendidos, algo rollizos,
 del largo de un dedo ó de un xeme, con ramitas cor-
 tas: las *hojas radicales* esparcidas en cerco, pinnadas,
 con las hojuelas setáceas y ramosas, divididas en dos ó
 tres, cortas y lampiñas: las del *tallo* alternas, sentadas

y muy semejantes á las radicales: las *flores* casi globosas, que terminan el tallo y las ramas.

PROPIED. Son las mismas que las de la Manzanilla Romana.

Stricta 3. COTULA foliis pin-
natifidis planis nudis punc-
tatis, caule erecto stricto,
floribus radiatis. Cotula con hojas hendidas
al través, planas, desnudas,
punteadas; tallo derecho,
apretado y rígido; y flores
radiadas.

Lidbeckia pectinata. Berg. Lidbeckia como peyne.
cap. 306. t. 5. f. 9.

Cast. Cotula apretada y rígida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Arroja el tallo herbáceo, del largo de cinco pies, derecho, algo anguloso, liso (como toda la planta) y cubierto como de un rocío de color verde-azul: las hojas alternas, sin peciolo, lanceoladas, hendidas al través, desnudas, y salpicadas de pelos vagos, y de puntitos amontonados y excavados, señaladamente por debaxo: los pedunculos terminales, casi sin hojuelas y de una flor: el caliz de muchas hojuelas iguales, lanceoladas, puntiagudas y pestañosas; con las corolillas del disco hendidas en quatro partes.

Coro-
nopi-
folia. 4. COTULA foliis lan-
ceolato-linearibus amplexi-
caulibus dentatis, floribus
flosculosis. Oeder. dan. t. 341. Cotula con hojas entre
lanceoladas y lineares, am-
plexicaules, dentadas; y flo-
res flosculosas.

Cotula foliis lanceolato-
linearibus amplexicaulibus
pinnatifidis. Spec. pl. 3. p.
1257. Hort. cliff. 417. Cotula con hojas entre
lanceoladas y lineares, am-
plexicaules y hendidas al tra-
vés.

Ananthocyclus Coronopi-
folio. Vaill. Dill. elth. 27. t.
23. f. 26. Ananthocyclo con hoja co-
mo la del Coronopo.

Chrysanthemum exoticum,
minus, capite aphylo, Cha-
mæmeli nudi facie. Breyn.
cent. 156. t. 76. Chrysanthemo exótico,
menor, con la cabeza sin ho-
juelas; y traza como la de la
Manzanilla desnuda.

Bel-

508 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Bellis annua, capite apbyl-
lo, luteo, Coronopi folio,
caulibus procumbentibus.
Herm. lugdb. 86. Moris. hist.
3. p. 30. sect. 6. t. 6. f. ulti-
ma.

Belis annua, con la cabe-
za sin hojuelas y amarilla;
hoja como la del Coronopo;
y tallos tendidos.

Cast. Cotula con hoja de Coronopo.

Habita en Etiopia y en lugares inundados de Frisa, cer-
ca de Emden, segun Moehringio. ☉

Vis-
cosa.

5. COTULA foliis lyra-
to-pinnatis, floribus radia-
tis. Hort. cliff. 417.

Cotula con hojas entre lí-
radas y pinnadas; y flores
radiadas.

Jacobæa Americana, odo-
rata, viscosa, florum ra-
diis brevissimis, albis. Houst.
mss.

Jacobebe de America, olo-
rosa y viscosa, con los ra-
dios de las flores cortísimos
y blancos.

Cast. Cotula viscosa.

Habita en Vera-cruz.

Tur-
binata.

6. COTULA receptaculis
subtus inflatis turbinatis,
floribus radiatis. Hort. cliff.
417. Roy. lugdb. 163.

Cotula con los receptacu-
los inflados por debaxo, có-
nicos-inversos; y flores ra-
diadas.

*Chamæmelum Æthiopi-
cum*, lanuginosum. Breyn.
cent. 148. t. 73. Moris. hist.
3. p. 36. sect. 6. t. 12. f. 14.

Manzanilla de Etiopia,
lanuginosa.

Cast. Cotula de hechura de trompo.

Habita en Etiopia. ☉

Posee el receptaculo de figura de trompo, fistuloso, en
cuya margen se hallan sentadas las hojuelas del caliz,
menudas é iguales: el radio de la corola cortísimo, ao-
vado, blanco y por debaxo encarnado.

Tana-
getifo-
lia.

7. *COTULA foliis tri-
pinnatis, lacinulis acutis, caule erecto, floribus flos-
culosis corymbosis.* Berg. Cotula de hojas tres veces
pinnadas, con sus lacinias
pequeñas y agudas; tallo
derecho; flores flosculosas y
cap. 242. obs. 1. en corimbo.

*Millefolium camphora-
rum, aureum, Monomopa-
tense.* Pluk. mant. 130. t. Milenrama de Monomopa-
tan, de olor alcanforado,
y con la flor de color de
430. f. 7. oro.

Cast. Cotula con hoja de Tanaceto.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Los flosculos del disco se hallan hendidos en quatro par-
tes, y apenas tiene alguno femenino.

Ver-
besina.

8. *COTULA foliis oppo-
sitis trinerviis cordatis cre-
natis, floribus radiatis pe-
dunculatis binis.* Cotula de hojas opuestas,
con tres nervios, de figura
de corazon y recortadas; flo-
res radiadas, con peduncu-
lo y de dos en dos.

*Cotula foliis oppositis
cordatis crenatis trinerviis.* Cotula de hojas opuestas,
en forma de corazon, recor-
tadas y con tres nervios.
Spec. pl. 3. p. 1258. Amœn.
acad. 5. p. 407.

*Tanacetum herbaceum,
erectum, foliis cordatis, cre-
natis, oppositis, capitulis
paucioribus, remotis, ter-
minalibus.* Brown. jam. 316. Tanaceto herbáceo, dere-
cho, con hojas de figura de
corazon, recortadas y opues-
tas; con menos cabezuelas,
apartadas y terminales.

*Chrysanthemum sylvati-
cum, repens, minus, Cha-
medrys folio, flore luteo,
nudo, semine rostrato.* Sloan. Chrysanthemo de selvas,
rastrero y menor, con hoja
como la del Châmedris; flor
amarilla, desnuda; y simien-
te con pico.
jam. 126. hist. 1. p. 262. t.
155. f. 2.

Cast. Cotula verbesina.

Habita en la Jamaica.

Duda Linneo que esta especie sea de este género natural.

Tiene las *hojas* opuestas, con peciolo, aovadas ó de he-
chura de corazon y obtusamente aserradas: el *caliz* de
muchas hojuelas, sencillo y aovado: el *pistilo* mas largo
que

510 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

que la corolilla : y las *semillas* con dos cerdas de color. Faltaron los demas caractéres para determinar el género natural.

Pyre-
thraria

9. COTULA *foliis oppositis ovatis crenatis petiolatis, pedunculis unifloris.* Cotula de hojas opuestas, aovadas, recortadas, con petiolos ; y pedunculos de una flor.
Mant. 1. p. 116.

Cast. Cotula de Pelitre.

Habita en la America.

Arroja el tallo herbáceo y ahorquillado : las *hojas* opuestas, recortadas, aovadas, algo obtusas y delgadas : los *pedunculos* terminales, y que salen de la horquilladura del tallo, mas largos que las hojas y de una flor : ésta exâctamente aovada y blanca ; con las *corolillas* hendidas en quatro partes ; y las *pajas del receptaculo* del largo de la flor.

Spilan-
thus.

10. COTULA *foliis oppositis lanceolatis, integerrimis trinerviis.* Cotula de hojas opuestas, lanceoladas, enterisimas y con tres nervios.
Mant. 1. p. 116.

Spilanthus (urens) *foliis integerrimis.* Jacq. amer. Espilanto (que abrasa ó pica mucho) con hojas enterisimas,
214. t. 120. f. 1,

Santolina Pyrethri *sapore, humifusa.* Plum. spec. Santolina con sabor de Pelitre, y tendida por el suelo.
10.

Ceratocephalus *foliis lanceolatis, serratis, sapore fervido.* Vaill. act. 600. n. 5. Ceratocephalo con hojas lanceoladas, aserradas, y de sabor muy picante ó que abrasa.

Cast. Cotula Espilanto.

Habita en los arenales maritimos de Cartagena de Indias.

Ca-
pensis.

11. COTULA *foliis pinnatis subcarnosis teretibus, infimis subbipinnatis, floribus radiatis.* Cotula de hojas pinnadas, casi carnosas y algo rollizas, con las de mas abaxo casi dos veces pinnadas ; y flores radiadas.
Cha-

Chamæmelum Africanum, Manzanilla de Africa, *annuum, petalis florum brevibus magisque sparsis*. Rai. flores cortos y mas esparcidos. Suppl. p. 224.

Cast. Cotula del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Su *traza* es como la de la *Manzanilla*. Posee muchos *tallos* ramosísimos, difusos, del largo de un xeme, rollizos y un poco lisos: las *hojas* sencillamente pinnadas, casi carnosas, desnudas, sin puntitos, y su lomo algo complanado, con dientes cilíndricos, y por su ápice de color que tira á purpúreo obscuro: las *hojas de mas abajo* con dientes laterales y hendidos al través: los *pedunculos* terminales, larguitos, estriados y de una flor: el *caliz* apiñado y algo escarioso: las *corolillas del radio* apartadas, con algun piececito, rayadas, neutras y blancas: los *flosculos del disco* hendidos en quatro partes: el *disco* convexo y amarillo: y el *receptaculo* medio aovado.

Quinquelobis. 12. COTULA *caulibus erectis, foliis quinquelobis subtomentosis*. Suppl. p. 377. Cotula con los tallos derechos; hojas hendidas en cinco lóbulos y algo tomentosas.

Cast. Cotula de cinco lóbulos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Back.*

Echa los *tallos* derechos, sencillos y algo vellosos: las *hojas* pecioladas, alternas, hendidas en cinco lóbulos, canas por debaxo y algo tomentosas, con sus lóbulos medio aovados, iguales y terminados en punta rígida: uno ú otro *pedunculo* largo, con una *bráctea* lanceolada, pequeña, de una flor y derecho: la *flor* de la magnitud de la *Matricaria*: el *caliz* con escamas iguales y vellosas.

Concuerta mucho en la *flor* con la *Cotula* apretada y rígida; de forma que parece podrian constituir un género separado.

Se-
ricea. 13. COTULA *foliis su-* X Cotula con hojas sobrede-
pradecompositis tomentosis X compuestas, tomentosas y li-
linearibus. Suppl. p. 377. X neares.

Cast. Cotula como seda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 26

Produce los tallos herbáceos, cortos, tomentosos, sencillos, tendidos y blancos: las hojas pecioladas, sobredecompuestas, parecidas á las del *Axenjo*, lineares, tomentosas, blancas y con vello como seda: los *escapos* terminales, solitarios, larguísimos y desnudos: las *flores* solitarias: el *caliz* hemisférico, con las escamas casi iguales, obtusas por su ápice y escariosas: la *corola* flosculosa, mas corta que el caliz y amarilla.

Pilu-
lifera. 14. COTULA *foliis bi-* X Cotula con hojas dos ve-
pinnatis, capitulis globosis, X ces pinnadas; cabezuelas
caule erecto. Suppl. p. 378. X globosas; y tallo derecho.

Cast. Cotula de bolillas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Tiene el tallo derecho: la *panoja* casi levantada en ramillete horizontal: las hojas con dos pares de hojuelas opuestas y como las del *Tanaceto*: las *cabezuelas* globosas, sin radio: y los *flosculos* hendidos en quatro partes.

Um-
bellata 15. COTULA *foliis lan-* X Cotula de hojas lanceola-
ceolatis hirsutis, caule erecto, X das, con pelo áspero; tallo
floribus umbellatis. Sup- X derecho; y flores en umbe-
pl. p. 378. X la.

Cast. Cotula umbelada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back.

Produce los tallos derechos, rollizos, con pelo áspero, y del largo de pie y medio: las hojas alternas, como las de la *Protea plateada*, mas amontonadas, mas angostas y lanceoladas, con pelo áspero en ambas partes y casi del largo de un dedo: la *umbela* terminal y con cinco flores: los *pedunculos* de una flor, con pelo áspero, y con algunas escamas alternas y casi foliosas: el *caliz* algo apiñado y veloso, con las escamas de mas adentro

tro mas altas que el disco, alesnadas, lisas por dentro y de color: la *corola* sin radio, con el disco hemisférico: las *corolillas* en forma de campana y hendidas en quatro partes: las *simientes* deprimidas, aovadas al revés, y coronadas con un ribete desfigurado y casi hendido en tres lóbulos: y el *receptaculo* desnudo.

1155. Género ANACYCLUS. * Santolinoides. Vaill.

A. G. 1719. Mich. gen. 31. Cotula.

Tourn. t. 282.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun hemisférico y apiñado; con *escamas* numerosas, aovadas, planas y agudas.

COR. compuesta radiada; con las *corolillas* hermafroditas y numerosas, en el disco; cinco hasta diez femeninas, en el ambito, y casi mas altas que el disco.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco partes y extendido.

De la femenina: *tubo* comprimido; con el *borde* aovado y entero.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: *germen* oblongo y comprimido: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con el *estigma* hendido en dos partes.

En las femeninas: *germen* oblongo, y adornado de una membrana en ambas partes: *estilo* filiforme y del largo de la corolilla: con dos *estigmas* delgados y redoblados.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: oblongas, comprimidas; y sin *vilano*.

En las femeninas: oblongas y adornadas en ambas partes de una ala muy ancha, membranosa y escotada por su ápice; y sin *vilano*.

RECEPT. con *pajas* obtusas y con puntita.

OBS. El Anacyclo Oriental tiene el receptaculo desnudo, por lo que algunos dudan que sea de este género.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

COTULA. p. 495.

La flor unas veces es flosculosa y otras radiada, 6 cuyo disco se compone de muchos flosculos, y la corona (si la hay) de semiflosculos, sentados en embriones y comprendidos en un caliz comunmente escamoso: y los embriones pasan despues á semillas, planas, en forma de corazon y casi aladas.

ESPECIES.

Cre- 1. ANACYCLUS *foliis* X Anacyclo de hojas decom-
ticus. *decompositis linearibus, la-* X puestas, lineares, con sus
ciniis divisis planis. Hort. X laciniis divididas y planas.
cliff. 417. Roy. lugdb. 171. X

Cotula Cretica, minima, X Cotula de Creta, muy pe-
Chamæmeli folio, capite in- X queña, con hoja como la de
flexo. Tourn. cor. 37. X la Manzanilla; y cabezuela
doblada ácia adentro.

Santolinoides annua, pro- X Planta como Santolina,
cumbens, Chamæmeli folio. X annua, tendida, y con hoja
Vaill. act. 372. X como la de la Manzanilla.

Cast. Anacyclo de Creta.

Habita en Creta. ☉

Orien- 2. ANACYCLUS *foliis* X Anacyclo con hojas com-
talis. *compositis setaceis acutis* X puestas, setáceas, agudas y
rectis. Hort. cliff. 417. Roy. X rectas.
lugdb. 171. X

Chamæmelum Orientale, X Manzanilla Oriental, con
foliis pinnatis. Tourn. cor. X hojas pinnadas.
37. Boerh. lugdb. 1. p. 110. X
t. 110. X

Cast. Anacyclo Oriental.

Habita en Oriente. ☉ 24

Au- 3. *ANACYCLUS foliis* X Anacyclo de hojas dos ve-
reus. *bipinnatis teretiusculis in* X ces pinnadas , algo rollizas,
canis excavato-punctatis. X blanquecinas y con puntitos
excavados.

Chamæmelum luteum, ca- X Manzanilla con la cabe-
pitate apbyllo. C. B. P. 135. X zuela amarilla y sin hojuelas.

Chamæmelum aureum, pe- X Manzanilla peregrina, con
regrinum, capite sine fo- X la cabezuela de color de oro
liis. Bauh. hist. 3. p. 119. X y sin hojas.

Anthemis Chrysanthemum X Anthemis llamada Chry-
Herbariorum. Lob. ic. 771. X santhemo de los Botánicos.

Cast. Anacyclo aureo.

Habita en la Europa austral y en Oriente. ☉ 26

Arroja muchos tallos , del largo de un xeme , derechos , algo estriados , blanquecinos , y con pelillos poco manifiestos : las hojas dos veces pinnadas , casi rollizas , lineares , algo blanquecinas , y con pelillos echados : las hojuelas extendidas , con puntitos excavados y terminadas en puntita rígida ; y las de abaxo que abrazan el tallo : la hoja de mas arriba sencillamente pinnada : los pedunculos terminales , solitarios , del largo del tallo , con una flor , sin hojuelas y algo vellosos : el caliz hemisférico , velloso , apifinado , con escamas escariosas y mas obscuras por su ápice : el disco de la corola medio aovado : los flosculos del disco hendidos en cinco partes : los del ámbito muchos , femeninos , pequeños y sin borde : el receptaculo cónico , con pajas lanceoladas , cóncavas y amarillas.

Los sinónimos de Gaspar , y de Juan Bauhino puestos en la *Cotula aurea* , acaso pertenecen mas bien á esta especie?

Valen- 4. *ANACYCLUS foliis* X Anacyclo de hojas decom-
tinus. *decompositis linearibus, la-* X puestas , lineares , con sus
ciniis divisis teretiusculis X lacinias divididas , algo ro-
acutis, floribus flosculosis. X llizas , agudas ; y flores flos-
Hort. cliff. 417. Roy. lugdb. culosas.

171.

Chrysanthemum Valenti- X Chrysanthemo de Valen-
num. Clus. hist. 1. p. 333. X cia.

Kk 2

Buph.

516 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Bupthalmum lanuginosum, *foliis Millefolii*. C. B. P. 135. *Bupthalmum lanuginoso*, con hojas como las del Mil-enrama.

Bupthalmum tenuifolium *similis*. Bauh. hist. 3. p. 121. Planta semejante al Bupthalmum de hoja delgada.

Chamæmelum tenuifolium, *flore bullato aureo*. Barr. rar. 1095. t. 450 ? Manzanilla de hoja delgada, con la flor en cabeza grande y de color de oro.

Cast. Anacyclo Valentino.

Habita entre los sembrados y caminos del Reyno de Valencia. ○

Vease la *Anthemis valentina*, la qual tiene el caliz menos escarioso ; y acaso es sola variedad de esta especie.

1156. Género ANTHEMIS. * *Chamæmelum*. Tourn.

t. 281. Vaill. A. G. 1720. f. 31. 33. 17.

Anthemis. Mich. gen. 30. *Bupthalmum*.

Tourn. t. 282.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun hemisférico, con escamas lineares y casi iguales.

COR. compuesta radiada ; con corolillas hermafroditas, tubulosas y numerosas, en el disco convexo ; y mas de cinco femeninas, en el radio.

Propia de la hermafrodita : en forma de embudo, con cinco dientes y derecha.

De la femenina ; ligulada, lanceolada, y alguna vez con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas : filamentos cinco, capilares y cortísimos : con la antera cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : germen oblongo : estilo filiforme y del largo de los estambres : con dos estigmas redoblados.

En las femeninas : germen oblongo : estilo filiforme, y del largo del de la hermafrodita : con dos estigmas revueltos.

PERIC. ninguno : el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM.

FL. HERM. EN EL DISC. Y FEM. EN EL RAD. 517

SEM. en las hermafroditas : oblongas ; y sin vilano.

En las femeninas : muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. pajoso y cónico.

CARACTERES GÉNERICOS DE TOURNEFORT.

CHAMÆMELUM. p. 494.

La flor, las mas veces, es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos, y la corona de semiflosculos, sentados en embriones y comprendidos en el caliz escamoso : y los embriones pasan á semillas prendidas en el talamo ó receptaculo. A estas notas se añaden la de las hojas divididas en lacinias muy delgadas, y la de la traza de toda la planta.

BUPHTHALMUM. p. 495.

La flor es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos separados entre sí por medio de una hojuela ó paja, y la corona de semiflosculos, sentados en embriones y comprendidos en el caliz escamoso : y los embriones pasan á semillas delgadas y angulosas. A estas notas se añade la traza de toda la planta.

ESPECIES CON EL RADIO BLANCO.

- Cota. 1. *ANTHEMIS florum* Anthemis con las pajas de
paleis rigidis pungentibus. las flores rígidas y que pun-
Roy. lugdb. 172. zan.
Anthemis Italica, arven- Anthemis de Italia, ar-
sis, annua, major, vulgatis- vense, annua, mayor y muy
sima, flore maximo, disco vulgar, con la flor muy gran-
pungente. Mich. gen. 32. de ; y el disco que punza.
Chamæmelum annuum, Manzanilla annua, ramo-
ramosum, Cotula fetida flo- sa, con flores como las de la
ribus amplioribus, capitulis Cotula fetida, mas anchas ;
spinosis. Moris. hist. 3. p. y cabezuelas espinosas.
36. sect. 6. t. 8. f. 11. pro.
12. Till. pis. 38. t. 19.

518 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Bellis montana, Tanacetifolia, caule singulari, annua. Pluk. alm. 65. t. 17. f. 5. Belis montana, annua, con hojas como las del Tanaceto; y un solo tallo.

Cast. Anthemis Cota.

Habita entre los sembrados de Italia.

Tiene los *pedunculos* algo encrasados por arriba: el *caliz* apretado, con escamas que apenas se manifiestan y negruzcas por su ápice: el *disco de la flor fructífera* hemisférico, con el caliz plano y de la magnitud de una ciruela.

Altísima.

2. ANTHEMIS erecta, *foliis pinnatis, pinnarum basibus denticulo reflexo asperis.* Anthemis derecha, con hojas pinnadas; y las bases de las hojuelas ásperas con un dientecito redoblado.

Anthemis erecta, foliorum apicibus subspinosis. Spec. pl. 3. p. 1259. Anthemis derecha, con los ápices de las hojas algo espinosos.

Chamæmelo affine, Bupthalmum Italicum, segetum, altissimum. Bauh. hist. 3. p. 120. Buphthalgo de Italia, muy alto, que nace entre los sembrados y semejante á la Manzanilla.

Chamæmelum Leucanthemum, Hispanicum, magno flore. C. B. P. 135. Prodr. 70. Manzanilla Leucanthemo ó de flor blanca, de España, con la flor grande.

Chamæmelum Leucanthemum, Hispanicum, minus. C. B. P. 136. Prodr. 70. Tourn. p. 494. Manzanilla Leucanthemo, menor, de España. α

Cast. Anthemis altísima.

Habita entre los sembrados de Italia y Narbona: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. ☉

Se levanta mas alta que las mieses, aunque alguna vez se halla tendida. Echa el *tallo* de muchas flores y estriado: los *pedunculos* algo encrasados por arriba: los *cálizes* lampiños y alguna vez con pelo áspero: las *pajas* anchas, casi truncadas, terminadas en una cerda, algo rígidas y del largo del caliz.

Las

Las *hojas* pinnadas , con las *hojuelas* entre dentadas y hendidas al través , y un diente redoblado por debaxo en la base de las *hojuelas*.

Mari-
tima.

3. *ANTHEMIS foliis pin-*
natis dentatis carnosis nu-
dis punctatis, caule pros-
trato, calycibus subtomen-
tosis. Mill. dict. n. 6.

Anthemis maritima, an-
nua, odorata, praecox, flore
albo, caule purpurascente.
Mich. gen. 33. Till. pis. t.
19. f. 3.

Matricaria maritima. C.
B. P. 134.

Chamæmelum maritimum.
Bauh. hist. 3. p. 122. Da-
lech. lugdb. 1394. Tourn. p.
494.

Anthemis de hojas pinna-
das , con dientes , cárnosas ,
desnudas y punteadas ; tallo
postrado ; y cálices algo to-
mentosos.

Anthemis maritima , an-
nua , olorosa y temprana ,
con la flor blanca ; y el tallo
de color que tira á purpú-
reo.

Matricaria maritima.

Manzanilla maritima.

Cast. Anthemis maritima.

Habita en Mompeller y en Italia. 26

Produce los *tallos* postrados y muy desparramados , lisos y de color que tira á purpúreo : las *hojas* pinnadas , desnudas , cortadas , salpicadas de puntos excavados , con muchos dientes ácia su base , y debaxo de ella con una linea elevada , transversal y de color que tira á purpúreo : los *pedunculos* terminales , solitarios , algo estriados , vellosos y por arriba mas gruesos : y las *flores* que tienen el olor como el de la *Matricaria partenio*.

To-
mento-
sa.

4. *ANTHEMIS foliis pin-*
natifidis obtusis planis, pe-
dunculis hirsutis foliosis,
calycibus tomentos. Hort.
cliff. 415. Roy. lugdb. 172.

Chamæmelum Coronopi
folio, tomentosum. Vaill.
act. 1720. p. 412.

Anthemis de hojas hendi-
das al través , obtusas y pla-
nas ; pedunculos con pelo
áspero , foliosos ; y cálices
tomentosos.

Manzanilla tomentosa , y
con hoja como la del Coro-
nopo.

Cha-

Chamæmelum maritimum, Manzanilla maritima, blan-
incanum, folio *Absinthii*, quecina, con hoja como la
 crasso. Boerh. lugdb. 1. p. del Axenjo y crasa.
 110.

Cast. *Anthemis tomentosa*.

Habita en lugares marítimos de Grecia, y de Mompe-
 ller? 26

Tiene las dos *lacinias exteriores de la corola* mayores :
 los tallos del largo de un pie y de una flor : y las *hojas*
 con tomento como seda.

Mixta. 5. *ANTHEMIS foliis sim-* Anthemis con hojas senci-
plicibus dentato-laciniatis. llas, y entre dentadas y la-
 Mill. dict. n. 8. Gov. illustr. ciniadas.
 p. 71.

Anthemis maritima, la- Anthemis maritima, lanu-
nuginosa, annua, foliis ginosa, annua, con hojas
crassis, *Pyrethri sapore*, crasas y de sabor como el
semiflosculis albis, juxta del Pelitre ; semiflosculos
discum luteis. Mich. gen. blancos, y junto al disco
 32. t. 32. f. 1. amarillos.

Chamæmelum annuum, Manzanilla annua, ramo-
ramosum, *Coronopi folio*, sa, con hoja como la del Co-
flore mixto. Moris. hist. 3. ronopo ; y flor mixta ó de
 p. 36. sect. 6. t. 18. f. 15. varios colores.

Chamæmelum Lusitani- Manzanilla de Portugal,
cum, *latifolium*, seu Coro- con hoja ancha, ó como la
nopi folio. Breyn. cent. 149. del Coronopo.
 t. 74.

Bellis pumila, *crenata*, Belis enana, parecida al
Agerati æmula, *crenis bi-* Agerato, recortada, con sus
cornibus asperiusculis. Pluk. festones como dos cuerneci-
 alm. 65. t. 17. f. 4. tos y algo ásperos.

Cast. *Anthemis mixta*.

Habita en Italia y Francia : en los circuitos de Madrid y
 en otras partes de España. ☉

No tiene las *hojas* compuestas, sino laciniadas ; y el *radio*
de la flor es blanco ; pero amarillo en su base.

Alpina 6. *ANTHEMIS foliis dentato-pinnatis linearibus integerrimis, caule villosounifloro, petalis ovatis, paleis sphacelatis*. Amœnit. acad. 4. p. 330. Pall. it. 3. p. 34. Jacq. austr. VI. app. t. 30. Anthemis con hojas entre dentadas y pinnadas, lineares y enterisimas; tallo velloso, de una flor; petalos aovados; y pajas esfaceladas.

Chamæmelum alpinum, saxatile, perenne, flore albo, singulari, calyce nigricante. Till. pis. 39. t. 19. f. 1. Segui. ver. 3. p. 282. Manzanilla alpina, saxátil, perenne, con una sola flor, blanca; y caliz negruzco.

Cast. Anthemis alpina.

Habita en los alpes del Tirol, de Baldo y Turinga. Gmel. tub. pag. 262. ¶

Vease la *Anthemis fruticosa*, con hojas lineares y carnosas. Ger. prov. 209. t. 8.

Chia. 7. *ANTHEMIS foliis pinatifidis laciniatis, pedunculis nudis subvillosis*. Hort. cliff. 415. Roy. lugdb. 172. Anthemis con hojas hendidas al través y laciniadas; pedunculos desnudos y algo vellosos.

Chamæmelum Chium, verum, folio crassiore, flore magno. Tourn. cor. 37. Hall. goett. 391. Zinn. goett. 413. Manzanilla de Chão, que nace en la primavera, con hoja mas crasa; y flor grande.

Cast. Anthemis de Chão.

Habita en la Isla de Chão.

No-bilis. 8. *ANTHEMIS foliis pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis*. Mat. med. p. 217. Blackw. t. 526. Anthemis con hojas entre pinnadas y decompuestas? lineares, agudas y algo vellosas.

Anthemis foliis pinnato-decompositis, laciniis setaceis. Hort. cliff. 415. Roy. lugdb. 172. Anthemis con hojas entre pinnadas y decompuestas, con sus lacinias setáceas.

Matricaria receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. Flor. suec. 701. Dalib. paris. 262.

Matricaria con los receptáculos cónicos; radios doblados; semillas desnudas; y escamas del caliz iguales en la margen ó sin membranas en su ápice.

Chamæmelum nobile seu Leucanthemum odoratius. C. B. P. 135. Tourn. p. 494.

Manzanilla noble, ó Leucanthemo mas oloroso.

Chamæmelum odoratum. Dod. pempt. 270.

Manzanilla olorosa.

Chamæmelum nobile, flore multiplici. C. B. P. 135. Tourn. p. 494.

Manzanilla noble, con la flor multiplicada.

Chamæmelum romanum, flore multiplici. Cam. epit. 646.

Manzanilla romana, con la flor multiplicada.

Cast. Anthemis nobile. vulgo: Manzanilla de Botica. Farm. Chamomilla romana.

Habita entre pastos abrigados de Europa: en Aragon, Cataluña y otras partes de España, entre los sembrados; y abunda en años lluviosos. ☉

Varia con la flor desnuda ó sin radios.

PROPIED. La yerba y flores son amargas y de olor suave, balsamicas, paregoricas, antiespasmódicas, emenagogas y carminativas: se usan en la nephritis, terciana y cólica; en la cólica de las paridas, en el histerico y cálculo.

Arvensis. 9. *ANTHEMIS receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus coronat-marginatis.* Flor. suec. 704. 768. Dalib. paris. 263.

Anthemis con los receptáculos cónicos; pajas setáceas; y semillas coronadas con ribete.

Anthemis arvensis. It. scan. 177.

Anthemis arvensis.

Chamæmelum foliis glabris, duplicato-pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, semine lævi. Hall. helv. n. 103. Manzanilla de hojas lam-
piñas, dos veces pinnadas,
con el nervio ó lomo folia-
ceo; hojuelas ó lacinias lan-
ceoladas; y semilla lisa.

Cotula non fætida. Bauh. hist. 3. p. 120. Cotula que no es fetida.

Chamæmelum inodorum. C. B. P. 135. Tourn. p. 494. Manzanilla sin olor.

Cast. *Anthemis arvense*.

Habita entre los sembrados de Europa: en los circuitos de Madrid, en el Real Sitio de Aranjuez, en Soro-luzon, Cataluña, Aragon y en otras muchas partes de España. ♂

Es planta blanquecina; con el tallo difuso: y las pajas del receptaculo lanceoladas.

Cotula 10. *ANTHEMIS receptaculis conicis*, paleis setaceis, seminibus nudis. Mat. med. p. 218. Pall. it. 1. p. 46. Blackw. t. 67. Anthemis con los recepta-
culos cónicos; pajas setá-
ceas; y semillas desnudas.

Anthemis foliis pinnatodecompositis, laciniis linearibus, caulibus diffusis, radice annua. Roy. lugdb. 172. Anthemis de hojas entre
pinnadas y decompuestas,
con sus lacinias lineares; ta-
llos difusos; y raíz annua.

Chamæmelum foliis glabris, duplicato-pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, semine exasperato. Hall. helv. n. 104. Manzanilla de hojas lam-
piñas, dos veces pinnadas,
con el nervio ó lomo folia-
ceo; hojuelas lanceoladas; y
semilla muy áspera.

Chamæmelum fætidum. C. B. P. 135. Tourn. p. 494. Manzanilla fetida.

Chamæmelum fætidum seu Cotula fætida. Bauh. hist. 3. p. 36. Manzanilla fetida, ó Co-
tula fetida.

Cast. *Anthemis Cotula*.

Habita entre cascajales de Europa: en los circuitos de
Ma-

524 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Madrid, en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. ☉

Posee las *pajas del receptaculo* muy menudas: y varia
1.^o con las flores plenas: 2.^o con las flores sin radio:
3.^o y con las flores semiflosculosas y fistulosas. R.

PROPIED. La yerba y flores son fetidas y amargas, anodinas, expelentes y repelentes: se usan en la epilepsia, en la hidropesia, escrofulas y asma; y son admirables en el histerico.

Montana.

11. *ANTHEMIS foliis pinnato-multifidis planis, laciniis linearibus acutis trifidis, pedunculo longissimo.* Anthemis de hojas entre pinnadas y hendidas en muchas partes, y planas, con sus lacinias lineares, agudas, hendidas en otras tres; y pedunculo larguísimo.
Hort. cliff. 415. Roy. lugdb. 172.

Anthemis foliis pinnatis, pinnis integerrimis pinnatifidisque, pedunculis longis erectis unifloris. Anthemis de hojas pinnadas, con hojuelas enterísimas y hendidas al través; pedunculos largos, derechos y de una flor.
Gov. illustr. p. 71. R.

Anthemis fruticosa, foliolis linearibus, carnosis, pedunculis longis, erectis, nudis, unifloris. Anthemis fruticosa, con hojuelas lineares y carnosas; pedunculos largos, derechos, desnudos y de una flor.
Ger. prov. 209. t. 8. Gov. R.

Absinthium montanum, Chamæmeli flore magno. Axenjo montano, con la flor como la de la Manzanilla y grande.
B. P. 140. Bauh. hist. 1. p. 184.

Chamæmelum alpinum, Abrotani folio. Manzanilla alpina, con hoja como la del Abrotano.
Vaill. act. 591. Tourn. p. 494.

Absinthium montanum, Abrotani femine flore. Axenjo montano, con la flor como la del Abrotano hembra.
Col. phytob. 1. p. 117. t. 33.

Bellis incana, Chrysanthemi Cretici folio. Belis blanquécina, con hoja como la del Chrysanthemo de Creta.
Bocc. mus. 2. p. 136. t. 98.

Cast. Anthemis montana.

Ha-

Habita en Italia y Suiza : en los Pirineos, y en Segura de Aragon ácia las aguas medicinales.

Tiene las *hojas* pinnadas y las *hojuelas* con dientes : los tallos por arriba desnudos y estriados. *Sinops. pl. Aragon.* 124.

Pyre- 12. *ANTHEMIS caulibus* X Anthemis con los tallos
thrum. *simplicibus unifloris decum-* X sencillos, de una flor, y ten-
bentibus, foliis pinnato- X didos ; hojas entre pinnadas
multifidis. Mat. med. 218. X y hendidas en muchas par-
Hort. cliff. 414. Mill. dict. X tes.

n.9. ic. t. 38. Blackw. t. 390. X
Chamæmelum specioso X Manzanilla con la flor her-
flore, radice longa fervida. X mosa ; raíz larga y de sabor
Shaw. afr. 138. X muy picante.

Pyrethrum flore Bellidis. X Pelitre con la flor como la
C. B. P. 148. X de la Belis.

Cast. Anthemis Pelitre. *Farm.* Pyrethrum.

Habita en Arabia, Siria, Creta y Pulla : en Alemania, Bohemia, Mompeller y en los montes Apeninos, como tambien en el Reyno de Tanger. 2

Echa muchos tallos postrados, comunmente de una flor, y rara vez ramosos: el *radio de la flor* blanco y por debaxo purpúreo : la *raíz* crasa y de sabor picante.

PROPIED. La raíz es acre y penetrantisima, incindente y errina: excita la saliva, y se usa en el dolor de muelas y en la perlesia de la lengua.

ESPECIES CON EL RADIO DE LA FLOR
DE COLOR AMARILLO.

Ameri- 13. *ANTHEMIS foliis* X Anthemis de hojas opues-
cana L. *oppositis petiolatis ovatis* X tas, con peciolo, aovadas,
serratis trinerviis, recepta- X aserradas, con tres nervios ;
culo conico. Suppl. p. 378. X y receptaculo cónico.

Cast. Anthemis Americana 1.^a

Habita en la America meridional. *Mutis.*

Produce los tallos derechos, algo vellosos y sencillos: las *hojas* lampiñas y de dos colores: el *pedunculo* terminal, velloso, encrasado y de una flor : ésta con el radio y dis.

526 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

disco de color amarillo; el *radio* con cinco semiflosculos entre aovados y oblongos, obtusos y enteros; el *disco* elevado, pajoso y con los flosculos hendidos en cinco partes: las *semillas del radio y del disco* aovadas al revés, algo rollizas, verrugosas y sin vilano.

Americana II. 14. *ANTHEMIS foliis triternatis, pedunculis terminalibus ramo brevioribus.* Anthemis con hojas triternadas; pedunculos terminales, y mas cortos que la rama.

Cast. Anthemis Americana 2.^a

Habita en la America.

Valentina. 15. *ANTHEMIS caule ramoso, foliis pubescentibus tripinnatis setaceis, calycibus villosis pedunculatis.* Hort. cliff. 414. Mill. dict. n. 10. Anthemis de tallo ramoso; hojas vellosas, tres veces pinnadas, setáceas, con pelillos y pedunculadas.

Bupthalmum Cotulæ folio. C. B. P. 134. Bupthálmo con hoja como la de la Cotula.

Cotula flore luteo, radiato. Tourn. p. 495. Cotula con la flor amarilla y radiada.

Bupthalmum tenuifolium, folio fere Millefolii. Bauh. hist. 3. p. 124. Bupthálmo con hoja delgada, y casi como la del Milenrama.

Bupthalmum Creticum, Cotulæ facie. Breyn. cent. 150. t. 75. Bupthálmo de Creta, con traza como la de la Cotula.

Bupthalmum alterum, Ponæ. Dalech. hist. 853. Otro Bupthálmo, de Pona.

* *Bupthalmum flore luteo subtus purpurascente.* C. B. P. 134. Bupthálmo con la flor amarilla y que tira á color purpúreo por debaxo. *

Bupthalmum flore purpurascente. Cam. epit. 652. Bupthálmo con la flor de color que tira á purpúreo.

Bupthalmum Narbonense. Clus. hist. 2. p. 332. Bupthálmo de Narbona.

β *Chamæmelum fœtidum*, X Manzanilla fetida, mari-
marinum. Vaill. act. 589. X tima. β
 Bauh. hist. 3. p. 121.

Cast. Anthemis Valentina.

Habita en la Francia Narbonense: en los circuitos de Madrid, y es comun en muchos terrenos de España. ☉

Es muy parecida al *Anaciclo valentino*. Arroja el tallo difuso, de color que tira á purpúreo: los *pedunculos* encrasados por arriba: las *escamas del caliz* vellosas; pero las de mas adentro escariosas, recortadas y lampiñas.

La variedad α que nace en aguas muertas de Mompeller, tiene el *radio* por debaxo de color de sangre.

En esta especie halló el hijo de Linneo las *corolillas* con arista.

Re- 16. ANTHEMIS *foliis* X Anthemis con hojas sen-
 panda. *simplicibus ovato-lanceola-* X cillas, entre aovadas y lan-
tis, repando-crenatis. X ceoladas, ondeadas por su
 X margen y recortadas.

Chrysanthemum Lusita- X Chrysanthemo de Portu-
nicum, Agerati folio. Tourn. X gal, con hoja como la del
 p. 492. X Agerato.

Chrysanthemum parvum X Chrysanthemo pequeño ó
seu Bellis lutea, parva, la- X Belis pequeña, con la flor
rifolia. Bauh. hist. 3. p. 105. X amarilla; y hoja ancha.

Cast. Anthemis ondeada.

Habita en Portugal y en España.

Produce los tallos algo sencillos y derechos: las *hojas* entre aovadas y oblongas, pecioladas, alternas, obtusas y algo vellosas: las *flores* terminales, casi solitarias y globosas: el *caliz* menos apiñado: el *radio* angosto: el *disco* convexô y de color amarillo-roxo: las *semillas* de quatro lados, y coronadas con quatro escamas, de las quales las dos terminan en cerdas.

Tinc-
toria.

17. *ANTHEMIS foliis* X *Anthemis* con hojas dos
bipinnatis serratis subtus X veces pinnadas, aserradas,
tomentosis, caule corymbo- X tomentosas por debaxo; y
so. Pall. it. 1. p. 62. Blackw. X tallo corimboso.
 t. 439. Flor. dan. t. 741.

Chamæmelum foliis hir- X Manzanilla de hojas con
sutis, pinnatis, pinnulis X pelo áspero, pinnadas, y
simplicibus lanceolatis. Hall. X sus hojuelas sencillas y lan-
 helv. n. 105. X ceoladas.

Bupthalmum caule ra- X Bupthhalmo de tallo ra-
moso, foliis pinnatifidis, X moso; hojas hendidas al tra-
laciniis linearibus dentatis X vés, con sus lacinias linea-
serratis, floribus peduncu- X res, dentadas, aserradas; y
latis. Hort. cliff. 414. Roy. X flores con pedunculo.
 lugdb. 171.

Bupthalmum Tanaceti X Bupthhalmo con hojas se-
minoris foliis. C. B. P. 134. X mejantes á las del Tanaceto
 Tourn. p. 495. X menor.

Chrysanthemum foliis Ta- X Chrysanthemo con hojas
naceti. Loesel. prus. 47. t. 9. X como las del Tanaceto.

Chrysanthemum flore au- X Chrysanthemo de Italia,
reo, Italicum. Barr. ic. 465. X con la flor de color de oro.
 466.

α *Anthemis Triumphetti.* X *Anthemis* de Triunfetto. α
 Leers. herb. n. 668. X

Bupthalmum alpinum, X Bupthhalmo alpino, con
flore candido. Triumph. obs. X la flor candida.
 79. t. 80.

Bellis alpina, Parthenii X *Belis* alpina, mas levan-
foliis, elatior. Pluk. alm. 66. X tada, con hojas como las del
 t. 17. f. 6. X Partenio.

Cast. Anthemis de tintes.

Habita en prados secos y abrigados de Suecia y Alema-
 ña: en los caminos de la Villa de Berga en Cataluña,
 en los Pirineos y en el lugar de Llu Condado de Cer-
 deña, en los montes de Avina y otras partes de Espa-
 ña. 26

La variedad α se diferencia por la flor blanca, y en su
 base amarilla, quando esta perfectamente abierta; y
 por las escamas interiores del caliz pestañosas.

AN-

Ara-
bica.

18. *ANTHEMIS caule decomposito, calycibus ramiferis*. Hort. cliff. 413. t. 1. llevan ramas.

24. Roy. lugdb. 170. Mill. dict. n. 12.

Asteriscus annuus, trianthophorus Kraftas Arabicus dictus. Shaw. afr. 58. t. 36. f. 58. Asterisco annuo, que lleva tres flores, llamado Kraftas por los Arabes.

Cast. Anthemis Arabiga.

Habita en Arabia. ☉

Produce un solo tallo derecho, del largo de un palmo, estriado y terminado en una flor: las hojas alternas, apartadas, lineares, con algunas lacinias, señaladamente ácia sus remates, divididas en tres ó cinco partes, y las mas puestas baxo de la base de la misma flor, y que casi constituyen la base del caliz, extendidas y colocadas en cerco. Entre las hojas florales y el caliz nacen dos, tres, quatro ó cinco ramas mas largas que el tallo principal, vestidas de hojas en la misma forma que aquel, y terminadas en una flor; produciendo nuevas ramas; y extendiendose despues esta planta se echa y desparrama. Tiene el caliz algo redondo y apiñado, con escamas casi aovadas y por arriba membranosas: el receptaculo cónico y pajoso: el radio de la corola de color amarillo roxo, con corolillas liguladas y femeninas; el disco convexo, con corolillas hermafroditas, en forma de embudo y de color tambien amarillo-roxo: y las semillas sin vilano.

1157. Género ACHILLEA. * Vaill. A. G. 1720.

f. 2. 10. 36. Millefolium Tourn. 284.

Ptarmica Tourn. 283.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun aovado y apiñado; con escamas aovadas, agudas y arrimadas entre sí.

COR. compuesta radiada; con las corolillas hermafroditas,

TOM. VI.

Ll

tu-

530 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

tubulosas, en el disco; y cinco hasta diez femeninas, en el radio.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo, hendida en cinco partes y extendida.

De la femenina: ligulada, de figura de corazon al revés, extendida y hendida en tres lacinias, con la intermedia mas pequeña.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PEST. en las hermafroditas: *germen* pequeño: *estilo* filiforme y del largo de los estambres: con el *estigma* obtuso y escotado.

En las femeninas: *germen* pequeño: *estilo* filiforme y del largo del de las hermafroditas: con dos *estigmas* obtusos y redoblados.

PERIC. ninguno: el *caliz* apenas mudado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: aovadas y adornadas de un flusco; y sin *vilano*.

En las femeninas: semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. elevado; con *pajas* lanceoladas y del largo de los flosculos.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

MILLEFOLIUM. p. 495.

La *flor* es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos, y la corona de semiflosculos, sentados en embriones, y comprendidos en un caliz escamoso y casi cilíndrico: y los embriones pasan á semillas delgadas. A estas notas se añaden la de las hojas cortadas delgadamente, y la de las flores que nacen en hacecillos densos.

PTARMICA. p. 496.

La *flor* es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos, y la corona de semiflosculos, sentados en embriones, y comprendidos en el caliz escamoso: y los embriones pasan á semillas delgadas. A estas notas se añaden las de las hojas, ó con dientecitos, ó divididas en lacinias anchas y diferentes de las del Millefolio ó Milenrama.

ESPECIES CON LAS COROLAS DE COLOR AMARILLO-ROJO.

Santo-
lina.

1. *ACHILLEA foliis setaceis dentatis, denticulis subintegris subulatis reflexis.* Hort. cliff. 412. Achílea de hojas setáceas, con dientecitos, casi enteros, alesnados y redoblados.

Achillea lutea, tomentosa, Santolinæ folio. Vaill. act. 1720. p. 417. Achílea tomentosa, con la flor amarilla; y hoja como la de la Santolina.

Ptarmica Orientalis, Santolinæ folio, flore majore. Tourn. cor. 37. Ptarmica Oriental, con hoja como la de la Santolina; y flor mas grande.

Cast. Achílea Santolina.

Habita en Oriente. ¶

Tiene los tallitos del largo de medio pie.

Agera-
tum.

2. *ACHILLEA foliis lanceolatis obtusis, acute serratis.* Mat. med. 219. Hort. cliff. 413. Mill. dict. n. 8. ic. t. 10. Blackw. t. 300. Achílea con hojas lanceoladas, obtusas y agudamente aserradas.

Ageratum foliis serratis. C. B. P. 221. Agerato con hojas aserradas.

Ptarmica lutea, suaveolens. Tourn. p. 479. Ptarmica de flor amarilla y olor suave.

Balsamita minor. Dod. pempt. 295. Moris. hist. 3. p. 38. sect. 6. t. f. 2. Balsamita menor.

Ageratum plerisque, Herba Julia quibusdam. Bauh. hist. 3. p. 142. Agerato, llamado asi por los mas Botánicos, y por algunos Yerba Julia.

Cast. Achílea Agerato. ¶

Habita en la Francia Narbonense y en la Toscana: en los circuitos de Madrid, en tierras de Toledo, en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. ¶

PROPIED. La yerba y flores son amargas y de olor suave: corroborantes, desopilativas y antelminticas: y se usan en las ulceras.

532 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Fal- cata. 3. *ACHILLEA foliis linearibus dentatis obtusis planis, denticulis crenatis.* Achílea de hojas lineares, obtusas, planas; y con diente- citos recortados.
Hort. cliff. 412. Roy. lugdb. 176.

Achillea incana, Santolina foliis, plerumque falcatis, asperis, flore sulphureo. Achílea blanquecina, con hojas como las de la Santolina, las mas veces arqueadas, ásperas; y flor de color de azufre.

Cast. Achílea arqueada.
Habita en Oriente. 24

To- mento- sa. 4. *ACHILLEA foliis pinnatis hirsutis, pinnis linearibus dentatis.* Achílea de hojas pinnadas, con pelo áspero; ho- juelas lineares y dentadas.
Gmel. it. 1. p. 137. t. 25. f. 2.

Achillea foliis linearibus pinnatifidis pubescentibus, foliolis tripartitis transversalibus, media productiore. Achílea con hojas lineares, hendidas al través y ve- llosas; hojuelas divididas en tres laciniás transversales y la del medio mas alargada.
Hort. cliff. 413. Roy. lugdb. 175.

Achillea foliis hirsutis, pinnatis, pinnis æqualibus, pinnatis, pinnulis integris & trifidis, floribus luteis umbellatis. Achílea de hojas con pelo áspero, pinnadas, y sus ho- juelas iguales, tambien pin- nadas, con sus laciniás ú ho- juelas enteras y hendidas en tres partes; flores amarillas y en umbela.
Hall. helv. n. 106.

Millefolium tomentosum, luteum. Milenrama tomentoso, con la flor amarilla.
C. B. P. 140. Bauh. hist. 3. t. 138. Tourn. p. 496.

Stratiotes Millefolia, flavo flore. Estratiote Milenrama, con la flor de color amarillo-roxo.
Clus. hist. 1. p. 330.

Cast. Achílea tomentosa.

Habita en la Francia Narbonense, en Valesia y Tartaria: en la Alcarria, montes de Burgos, en el Reyno de Murcia y otras partes de España. 24

ACHIL-

Pubes-
cens.

5. *ACHILLEA foliis pinnatis, foliolis lanceolatis incisiss serratis subtus lanigeris.* Hort. cliff. 413. Roy. lugdb. 175.

Achílea de hojas pinnadas, con hojuelas lanceoladas, cortadas, aserradas y que por debaxo llevan lana.

Ptarmica Orientalis, foliis Tanacetii, incanis, semiflosculis florum pallide luteis. Tourn. cor. 37.

Ptarmica Oriental, con hojas como las del Tanaceto, blanquecinas; y semiflosculos de las flores de color amarillo-palido.

Matricaria tomentosa incana, Achilleæ folio, flore aureo. Vaill. aſ. 1722. p. 286.

Matricaria tomentosa y blanquecina, con hoja como la de la Achílea; y flor de color de oro.

Cast. Achílea vellosa.

Habita en Oriente. 24

Abro-
tanifo-
lia.

6. *ACHILLEA foliis pinnatis supradecompositis, laciniis linearibus distantibus.* Roy. lugdb. 175. Mill. dict. n. 5.

Achílea de hojas pinnadas y sobredecompuestas, con sus lacinias lineares y distantes.

Millefolium Orientale, altissimum, luteum, Abrotani folio. Tourn. cor. 37.

Milenrama Oriental, muy alta, con la flor amarilla; y hoja como la del Abrotano.

Cast. Achílea con hoja de Abrotano.

Habita en Oriente.

Bipin-
nata.

7. *ACHILLEA foliis bipinnatis tomentosis, foliolis ovatis integris.* Hort. cliff. 413. Roy. lugdb. 176.

Achílea de hojas dos veces pinnadas y tomentosas, con hojuelas aovadas y enteras.

Cast. Achílea dos veces pinnada.

Habita en Oriente. 24

Ægyptiaca.

8. *ACHILLEA foliis pinnatis, foliolis obtusis lanceolatis serrato-dentatis*. Achilea de hojas pinnadas, con hojuelas obtusas, lanceoladas, entre aserradas y dentadas.

Hort. cliff. 413. Roy. lugdb. 175.

Ptarmica incana, pinnulis cristatis. Tourn. cor. 37. it. 1. p. 228. t. 87. Ptarmica blanquecina, con sus hojuelas crestadas.

Absinthium Sanctonicum, Ægyptiacum. C. B. P. 136. Axenjo Santonico, de Egipto.

Absinthium Ægyptiacum. Dod. pempt. 25. Axenjo de Egipto.

Cast. Achilea de Egipto.

Habita en Egipto, y en Oriente cerca de Astracan. Gmel. it. 2. p. 178. 26

ESPECIES CON LOS RADIOS DE LA COROLA BLANCOS.

Macrophylla

9. *ACHILLEA foliis pinnatis planis inciso-serratis, extimis majoribus coadunatis*. Mill. dict. n. 11. Achilea con hojas pinnadas, planas, entre cortadas y aserradas, y las (hojuelas) de mas afuera mayores y coadunadas.

Achillea foliis pinnatis, planis, inciso-serratis, extremis confluentibus. Hall. helv. n. 115. Achilea con hojas pinnadas, planas, entre cortadas y aserradas, y las (hojuelas) ultimas confluentes.

Dracunculus alpinus, foliis Scabiosæ. C. B. P. 98. prodr. 39. Dragoncillo de alpes, con hojas como las de la Escabiosa.

Ptarmica alpina, Matricarie foliis. Triumf. obs. 83. t. 23. Bocc. mus. 2. p. 150. Ptarmica alpina, con hojuelas como las de la Matricaria.

t. 110. Barr. rar. 1119. t. 991.

Cast. Achilea de hoja larga.

Habita en los alpes de Suiza y de Italia.

Tiene las hojas de la magnitud de las del *Tanaceto*: el tallo algo vellosa y del largo de tres pies: y las flores co-

como las de la *Ptarmica*; con las *escamas del caliz* negras por su margen.

Impatiens.

10. *ACHILLEA foliis pinnatis, pinnis distantibus lineari-lanceolatis, basi sursum acutis.* Roy. lugdb. 176. Achílea de hojas pinnadas, con hojuelas distantes, entre lineares y lanceoladas, y por arriba de su base agudas.

Achillea foliis pinnatis, pinnis longis acutis, inferioribus sursum dente acutis, glaberrimis. Gmel. sib. 2. p. 197. t. 83. f. 1. Achílea de hojas pinnadas, con las hojuelas largas, agudas, y las inferiores con un diente por arriba, y muy lampiñas.

Cast. Achílea impaciente.

Habita en la Siberia.

Echa las flores blancas: y las hojuelas muy apartadas.

Clavennæ

11. *ACHILLEA foliis laciniatis planis obtusis tomentosis.* Scop. carn. 2. n. 1093. Jacq. austr. t. 76. Achílea con hojas laciniadas, planas, obtusas y tomentosas.

Achillea foliis sinuato-laciniatis planis villosis nitidis obtusis. Hort. cliff. 412. Achílea con hojas entre sinuosas y laciniadas, planas, vellosas, relucientes y obtusas.

Achillea foliis tomentosis, longe petiolatis, palmatis. Hall. helv. n. 114. Achílea de hojas tomentosas, con el peciolo largo y palmeadas.

Absinthium alpinum, umbelliferum, latifolium. C. B. P. 139. Axenjo alpino, umbelifero, y de hoja ancha.

Ptarmica incana, humilis, foliis laciniatis, Absinthii æmulis. Tourn. p. 496. Ptarmica blanquecina, baja, con hojas laciniadas y semejantes á las del Axenjo.

Absinthium alpinum, umbelliferum. Clus. hist. 1. p. 340. Axenjo alpino, con flores en umbela.

Dracunculus argenteus. Moris. hist. 3. p. 40. sect. 6. t. 10. f. 5. Dragoncillo de color de plata.

Cast.

536 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Achílea de Clavenna.

Habita en los montes ásperos de Austria, de Pannonia y Carintia. ¶

Ptar- 12. ACHILLEA foliis Achílea con hojas lanceo-
mica. lanceolatis acuminatis ar- ladas, puntiagudas y aguda-
gute serratis. Mat. med. 219. mente aserradas.
Flor. dan. t. 643.

Achillea foliis linearibus, Achílea con hojas linea-
lanceolatis, acutissime ser- res, lanceoladas y muy agu-
ratis.. Hall. helv. n. 117. damente aserradas.

Dracunculus pratensis, Dragoncillo pratense, con
serrato folio. C. B. P. 98. hoja aserrada.

Ptarmica vulgaris. Clus. Ptarmica vulgar.
hist. 2. p. 12. Blackw. t. 276.

Ptarmica vulgaris, folio Ptarmica vulgar, con ho-
longo, serrato, flore albo. ja larga, aserrada; y flor
Bauh. hist. 3. p. 147. Tourn. blanca.
p. 496.

Draco sylvestris, sive Dragon silvestre, ó Ptar-
Ptarmica. Dod. pempt. 710. mica.

Cast. Achílea Ptarmica.

Habita en la Europa templada: en las faldas de los Piri-
neos de Cataluña y en otras partes de España. ¶

PROPIED. La raíz, yerba y flores son acres y sin olor: ex-
citan la saliva, hacen estornudar, son vulnerarias y
se usan en el dolor de muelas.

Al- 13. ACHILLEA foliis Achílea de hojas lanceo-
pina. lanceolatis dentato-serratis, ladas, entre dentadas y aser-
denticulis tenuissime serra- radas; y los dientecitos con
tis. Hort. cliff. 413. Pall. it. aserraduras muy delgadas.
3. p. 34.

Achillea foliis semipin- Achílea de hojas medio
natis, pinnulis minutissime pinnadas, y con las hojuelas
serratis. Gmel. sib. 2. p. muy menudamente aserra-
196. Hall. helv. n. 116. das.

Achillea foliis pinnatifidis, laciniis dentatis, umbella conferta. Gou. illustr. p. 71. R. Achílea de hojas hendidas al través, con sus lacinias ú hojuelas dentadas; y umbella amontonada.

Ptarmica alpina, foliis profundè incisis. Tourn. p. 497. Ptarmica alpina, con hojas profundamente cortadas.

Ptarmica alpina, incanisserratis foliis. Herm. lugdb. p. 694. Ptarmica alpina, con hojas blanquecinas y aserradas.

Cast. Ptarmica alpina.

Habita en los alpes de Siberia y de Suiza. 2l

Acaso el lugar habrá podido formar esta variedad de la precedente?

Atrata. 14. *ACHILLEA foliis pinnulis pectinatis integrisculis, pedunculis villosis.* Jacq. vind. 157. austr. t. 77. Scop. carn. ed. 2. n. 1094. Achílea de hojas con sus hojuelas en forma de peyne, algo enteras; y pedunculos vellosos.

Achillea foliis glabris, pinnatis, pinnis simplicibus & multifidis. Hall. helv. n. 111. Achílea de hojas lampiñas, pinnadas, con hojuelas sencillas y hendidas en muchas partes.

Chamæmelum alpinum, saxatile, perenne, flore albo, singulari, calyce nigricante. Till. pis. t. 19. Hall. R. co. Manzanilla alpina, saxátil, perenne, con una sola flor, blanca; y caliz negruzco.

Matricaria alpina, Chamæmeli foliis. C. B. P. 134. Matricaria alpina, con hojas como las de la Manzanilla.

Parthenium alpinum. Clus. hist. 1. p. 336. Partenio alpino.

Cast. Achílea negra.

Habita en los montes ásperos y humedos de Suiza, Vallesia y Austria. 2l

Tiene las margenes del caliz negras y esfaceladas: y las hojas, alguna vez, dos veces pinnadas.

538 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Nana. 15. *ACHILLEA foliis pinnatis dentatis hirsutissimis, floribus glomerato-umbellatis*. Mill. dict. n. 12. Achílea de hojas pinnadas, con dientes y mucho pelo áspero; flores entre conglobadas y en umbela.

Achillea foliis tomentosis, pinnatis, pinnis simplicibus & incisís. Hall. helv. 2. n. 113. Achílea de hojas tomentosas y pinnadas, con las hojuelas sencillas y cortadas.

Achillea foliis pinnatis, lanugine obductis, floribus albis, umbellatis. Hall. helv. 713. Allion. pedem. 3. t. 2. f. 3. Achílea con hojas pinnadas y cubiertas de pelusa; flores blancas y en umbela.

Millefolium alpinum, incanum, flore specioso. Bauh. hist. 3. p. 138. Moris. hist. 3. p. 39. sect. 6. t. 11. f. 11. Milenrama de alpes, blanquecino, y con la flor muy hermosa.

Rai. hist. 347. Tourn. p. 496. *Millefolium alpinum, tomentosum, odoratum, nanum*. Bocc. mus. 2. p. 166. t. 120. Milenrama alpino, tomentoso, oloroso y enano.

Cast. Achílea enana.

Habita en los alpes de Suiza y de Valesia: en Aragon, Cataluña, Vizcaya y en otras partes de España.

Es planta pequeña: y las pajas entre los flosculos amarillos del disco son negras por su ápice.

PROPIED. Su cocimiento bebido se tiene por remedio muy especial en la pleuritide ó dolor de costado.

Magna 16. *ACHILLEA foliis bipinnatis subpilis, laciniis linearibus dentatis, auriculis decussatis*. Achílea de hojas dos veces pinnadas, algo pelosas, con sus lacinias lineares, dentadas y con orejillas cruzadas.

Millefolium maximum, umbella alba. C. B. P. 140. Prodr. 72. Milenrama muy grande, con la umbela blanca.

Cast. Achílea grande.

Habita en la Europa austral. 24

Es

Es muy semejante á la *Achilea Milenrama*; pero al doble mayor. Arroja el tallo saipicado de pelos claros: las hojas semejantès á las del *Milenrama*, pero mayores y con dos orejillas en su base; la una *inferior* debaxo de la hoja; y la otra *superior* que sobresale por encima del lomo, al modo que en la *Athamanta libanotide*.

- Mille-
folium 17. *ACHILLEA foliis bi-* X Achílea de hojas dos ve-
pinnatis nudis, laciniis li- X ces pinnadas y desnudas,
nearibus dentatis, caulibus X con sus lacinias lineares,
superne surcatis. Hort. cliff. X dentadas; y tallos asurcados
413. Flor. dan. t. 737. Mat. X por arriba.
med. 219.
- Achillea foliis pinnatis,* X Achílea de hojas pinna-
pinnis semipinnatis, incis- X das, con sus hojuelas medio
& integris. Hall. helv. n. X pinnadas, cortadas y ente-
108. X ras.
- Millefolium vulgare, al-* X Milenrama vulgar, con la
bum. C. B. P. 140. Tourn. p. X flor blanca.
496. Blackw. t. 18.
- α *Achillea Tanaceti folio,* X Achílea con hoja como la
flore purpureo. Vaill. act. X del Tanaceto; y flor purpú-
593. X rea. α
- Millefolium purpureum,* X Milenrama mayor, con la
majus. C. B. P. 140. Tourn. X flor purpúrea.
p. 496.
- β *Millefolium alpinum.* X Milenrama alpino. β
Clus. pann. 562. Haller. R. X

Cast. Achílea Milenrama.

Habita en prados y pastos de Europa: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña, Castilla la vieja, Alcarria y en otras muchas partes de España. 26

PROPIED. La yerba y flores son amargas, narcóticas, tónicas, astringentes y vulnerarias: y se usan en la hipochondria, en las almorranas, en la hemotisis y en las heridas.

540 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

No- 18. ACHILLEA foliis bi- Achílea con hojas dos ve-
bilis. pinnatis, inferioribus nudis ces pinnadas, las inferiores
planis, superioribus obtusis desnudas y planas, las supe-
tomentosis, corymbis conve- riores obtusas y tomentosas;
xis confertissimis. Mill. corimbos convexos y muy
dict. n. 13. amontonados.

Millefolium nobile. Tragi. Milenrama noble.
hist. 476. Tourn. p. 496.

Tanacetum minus, album, Tanaceto menor, con la
odore camphoræ. C. B. P. flor blanca y olor de alcan-
132. for.

Cast. Achílea noble.

Habita en la Tartaria, en Alemania, Bohemia y Francia
Narbonense: en Aragon, Cataluña, y en otras varias
partes de España. 2

Tiene las hojas dos veces pinnadas, obtusas y tomentosas;
pero las florales de las ramas mas altas sencillas, me-
dio pinnadas, enterisimas, tomentosas y obtusas: los
corimbos densamente amontonados: los tallos rollizos y
sin surcos: y el radio de la flor que ultimamente se re-
dobla; de suerte que queda escondido.

Odo- 19. ACHILLEA foliis bi- Achílea con hojas dos ve-
rata. pinnatis ovalibus nudiuscu- ces pinnadas, ovales, algo
lis, corymbis fastigiatis desnudas; corimbos elevados
confertis. Pall. it. 1. p. 379. en ramillete horizontal y
amontonados.

Achillea pinnis æqualibus, Achílea con hojuelas igua-
confertis, tomentosis, pin- les, amontonadas, tomento-
nulis capillariter divisis. sas, y sus lacinias divididas
Hall. helv. ed. 1. pag. 716. como en cabellos.

Sauv. monsp. 267.

Millefolium minimum, Milenrama de España,
crispum, flore albo, Hispa- muy pequeño, rizado y con
nicum. Barr. rar. 1116. t. la flor blanca.
992.

Millefolium odoratum, Milenrama menor, y olo-
minus, Monspeliensium. roso, de los de Mompeller.
Magn. monsp. 177. Tourn.
p. 496.

Cast.

Cast. Achílea olorosa.

Habita en Narbona y Suiza: en los sotos y laderas de San Bernardino, de Cantarranas, de la Puente-verde y en otros parages del circuito de Madrid. 24

Echa las *hojas* dos veces pinnadas, con las hojuelas distintas, enterisimas y agudas: y el *tallo* poco mas alto de quatro dedos.

Gerardo tiene á esta especie por variedad de la *Achílea* noble: y Haller la une con la *Achílea* Milenrama.

Cre-
tica.

20. ACHILLEA foliis linearibus, pinnis subrotundis retrorsum imbricatis, caule tomentoso. Achílea de hojas lineares, con hojuelas casi redondas, apiñadas ácia atrás; y tallo tomentoso.

Millefolium incanum, Creticum. C. B. P. 130. Milenrama de Creta, blanquecino.
prodr. 72.

Millefolium Creticum. Milenrama de Creta.

Bauh. hist. 3. p. 139.

Ptarmica Cretica, frutescens, Santolinæ facie. Ptarmica de Creta, frutescente, con traza de Santolina.
Tourn. p. 497.

Cast. Achílea de Creta.

Habita en Creta. 24

Su traza es como la de la *Achílea* Milenrama. Posee el tallo tomentoso: las *hojas* lineares, algo tomentosas, apiñadas ácia atrás, con hojuelas en forma de riñon, y por arriba apiñadas en quatro órdenes: y las *flores* blancas.

1158. Género TRIDAX. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun cilindrico y apiñado; con *escamas* entre aovadas y oblongas, algo agudas y derechas.

COR. compuesta radiada; con las *corolillas* hermafroditas, tubulosas, en el disco; y femeninas, en el radio.

Propia de las hermafroditas: en forma de embudo, con cinco dientes y derecha.

De

542 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

De las femeninas: ligulada, partida en tres *lacinias* iguales; y la del *medio* mas angosta.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: *germen* oblongo: *estilo* setáceo, del largo de los estambres: con el *estigma* obtuso.

En las femeninas: *germen* oblongo: *estilo* filiforme, del largo de la corolilla: con el *estigma* obtuso.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: oblongas; con el *vilano* de muchos radios, sencillo y poco mas largo que el *caliz*.

En las femeninas: muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. plano: con *pajas* lanceoladas y mas cortas que la semilla.

ESPECIE.

1. TRIDAX. Hort. cliff. X Tridax.

Pro.
cum.
bens.

418.

Aster Americanus, *procumbens*, *foliis laciniatis* & *hirsutis*. Houst. mss.

X Aster Americano, tendido, de hojas laciniadas y con pelo áspero.

Cast. Tridax tendido.

Habita en Vera-cruz.

1159. Género AMELLUS. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun apiñado y casi redondo.

COR. compuesta radiada; con muchas *corolillas* hermafroditas, en el disco; y muchas femeninas, en el radio.

Propia de la hermafrodita: tubulosa y hendida en cinco partes.

De la femenina: ligulada, laxâ, y con dos ó tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortos: con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST.

PIST. en las hermafroditas : *germen* aovado al revés : *estilo* filiforme y del largo de los estambres : con dos *stigmas* filiformes.

En las femeninas : muy semejante al de las hermafroditas.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : aovadas al revés ; con el *vilano* peloso.

En las femeninas : muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. pajoso.

ESPECIES.

Lychni
tis.

I. AMELLUS *foliis oppositis lanceolatis obtusis tomentosis, pedunculis unifloris.* Mill. dict. n. 1. Berg. cap. 298.

Amelo con hojas opuestas, lanceoladas, obtusas, tomentosas ; y pedunculos de una flor.

Buphthalmum foliis oppositis lanceolato-linearibus obtusis integerrimis, calycibus subrotundis. Hort. cliff. 415.

Buphthalmo con hojas opuestas, entre lanceoladas y lineares, obtusas, enterisimas ; y cálices casi redondos.

Verbesina Asteroides. Spec. pl. 1. p. 902.

Verbesina como Aster.

Chrysanthemum Africanum, Leucii foliis, Asteris flore caeruleo. Breyn. prodr. 3. t. 15. f. 2.

Chrysanthemo de Africa, con hojas como las del Leucocoyo ó Alheli ; flor como la del Aster y de color cerúleo.

Cast. Amelo Lychnitide.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \bar{h}

Echa el tallo rollizo : las *hojas* sentadas, algo ásperas y blanquecinas : los *pedunculos* terminales, con una ú otra hojuela y de una flor : el *caliz* apiñado : la *flor* como la del *Aster* ; con el *radio* de color de violeta ; y el *disco* amarillo : el *vilano* vellosa, sencilla y con pocos radios.

544 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Um-
bella-
tus.

2. AMELLUS? *foliis oppositis triplinerviis subtus tomentosis, floribus umbellatis*. Amœn. acad. 5. p. 407. Amelo? de hojas opuestas, con tres nervios unidos mas arriba de la base, tomentosas por debaxo; y flores en umbela.

Solidago villosa, incana, foliis ovatis, oppositis, caule assurgente subnudo tripartito, floribus subumbellatis. Brown. jam. 320. t. 33. f. 2. Solidago velloso, blanquecino, con hojas aovadas y opuestas; tallo levantado, algo desnudo, dividido en tres partes; y flores en umbela.

Cast. Amelo umbelado.

Habita en la Jamaica. 24

Tiene las *pajas* que distinguen los flosculos, setáceas por su ápice.

1160. Género ECLIPTA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun de muchas *hojuelas* lanceoladas, casi iguales y puestas en dos órdenes.

COR. compuesta radiada; con las *corolillas* del radio muy copiosas y femeninas; y las del disco hermafroditas.

Propia de la hermafrodita: tubulosa, hendida en quatro partes, derecha y harinosa por defuera.

De la femenina: muy angosta y ligulada.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* quatro y cortísimos: con la *antera* cilindrica.

PIST. en las hermafroditas: *germen* oblongo: *estilo* mediocre: con el *estigma* hendido en dos partes y extendido.

En las femeninas: *germen* de tres lados: *estilo* mediocre: con el *estigma* hendido en dos partes y extendido.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: oblongas, comprimidas, recortaditas, obtusas y mochas.

En las femeninas: de tres lados, oblongas, recortaditas, obtusas y mochas.

RECEPT. algo plano; y con *pajas* muy angostas.

ESPECIES.

Erecta. 1. *ECLIPTA caule erecto, foliis basi deflexis sessilibus*. Rumph. amb. 6. t. 18. f. 1. Eclipta con el tallo derecho; hojas dobladas por su base y sentadas.

Verbesina (alba) foliis lanceolatis serratis sessilibus. Spec. pl. ed. 3. p. 1272. Hort. cliff. 500. Gron. virg. 128. Verbesina (blanca) con hojas lanceoladas, aserradas y sin peciolo.

Cotula alba. Syst. nat. 2. p. 564. Murray prodr. p. 225. Cotula blanca.

Eupatoriophalacron Balsaminæ folio, flore albo discoide. Vaill. act. 597. Dill. elth. 138. t. 113. f. 137. Eupatorio calvo ó de semilla sin vilano, con hoja como la de la Balsamita; flor blanca y sin radio.

Scabiosa Conyzoides, Americana, latifolia, capitulis & floribus albis, parvis. Pluk. alm. 335. t. 109. f. 1. Moris. hist. 3. p. 47. sect. 6. t. 13. f. 16. Escabiosa como Conyza, de America, con hoja ancha; cabezuelas y flores blancas y pequeñas.

Cast. Eclipta derecha.

Habita en la Virginia y en Surinam. ♂

Tiene la yerba semejante á la de la *Coreopsis bidente*: las hojas sin peciolo, lanceoladas, aserradas, con tres nervios unidos mas arriba de su base y apartadas por pares: las flores que salen alternadamente de las axilas, mellizas y con el pedunculo largo.

Prostrata. 2. *ECLIPTA caule prostrato, foliis subundulatis subperiolatis*. Eclipta con el tallo prostrado; hojas algo ondeadas, y casi sin peciolo.

Verbesina (prostrata) foliis lanceolatis serratis, floribus alternis geminis subsessilibus. Spec. pl. 3. p. 1272. Mill. dict. n. 4. Verbesina (prostrada) con hojas lanceoladas, aserradas; flores alternas, mellizas y casi sentadas.

546 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Cotula prostrata*. Syst. nat. 2. p. 564. *Cotula postrada*.
Planta Coreopsidi affinis. Zinn. comm. goett. tom. 3. t. 11. *Planta parecida al Coreopsis*.
Eupatoriophalacron Menthæ arvensis folio. Vail. act. 598. Dill. elth. 139. t. 113. f. 138. *Eupatorio calvo ó de semilla sin vilano, con hoja como la de la Menta ó Yerbabuena arvense*.
Chrysanthemum Madagascatanum, Menthæ arvensis folio & facie, floribus bigemellis ad alas, pediculis curvis. Pluk. alm. 100. t. 118. f. 5. *Chrysanthemo de Madagascatan, con hoja y traza como las de la Menta arvense; flores dos veces mellizas, en las axilas; y pedunculos cortos*.

Cast. Eclipta postrada.

Habita en la India.

Posee las *semillas* sin arista, y con puntitas dispuestas en quatro órdenes: el *caliz* sencillo: las *corolas* blancas; con *anteras* de color pardo: las *flores* alternadamente mellizas y con el pedunculo muy corto.

- Punc- 3. ECLIPTA caule erecto punctato, foliis planis.* *Eclipta con el tallo derecho, punteado; y hojas planas.*
Bellis (ramosa) caule ramoso. *Belis (ramosa) con el tallo ramoso.* Jacq. amer. 216. t. 129.

Cast. Eclipta punteada.

Habita en lugares inundados de la Isla de Santo Domingo y de la Martinica. ☉

Es semejante á la especie primera; pero tiene el *tallo* salpicado de puntitos blancos.

- Lati- 4. ECLIPTA caule erecto, foliis ovatis petiolatis.* *Eclipta con el tallo derecho; hojas aovadas y pecioladas.* Suppl. p. 368.

Cast. Eclipta de hoja ancha.

Habita en la India Oriental. ☉

Produce el *tallo* del largo de dos pies, derecho, rollizo, eri-

erizado, con ramas opuestas en forma de aspa y ultimamente compuesto: las *hojas* opuestas, pecioladas, aovadas, puntiagudas, con tres nervios, rugosas, aserradas y con vello áspero: las *flores* terminales, solitarias, con el pedunculo muy corto, blancas y de la magnitud de las de la *Sigesbeckia*: los *frutos* en la horquilladura de las ramas: el *caliz* casi de ocho hojuelas, apretado y del largo de la flor: el *radio de la corola* corto, como el de la *Achílea*, con petalos casi hendidos en tres partes: el *disco* con quatro flosculos, hendidos en cinco ó seis lacinias: las *anteras* negras: los *estigmas* encorvados ácia atrás: las *semillas* oblongas, casi de tres lados y sin vilano: el *receptaculo* con pajas y del largo de las semillas.

1161. Género SIGESBECKIA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun exterior* de cinco *hojuelas*, lineares, rollizas, muy extendidas, mas largas que la flor y persistentes.

Interior casi de cinco ángulos; con muchas *hojuelas* aovadas, cóncavas, obtusas é iguales.

COR. *compuesta* medio radiada; con muchas *corolillas* hermafroditas, en el disco; y cinco ó menos, en el radio, puestas á un lado solamente de la flor.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo, mas larga que el caliz y con cinco dientes.

De la femenina: ligulada, ancha, cortísima y con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: *germen* oblongo, encorvado, de la magnitud (*de la longitud?*) del caliz: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con el *estigma* hendido en dos partes.

En las femeninas: *germen* oblongo, encorvado y de la magnitud (*de la longitud?*) del caliz: *estilo* filiforme, del largo del de la hermafrodita: con el *estigma* hendido en dos partes.

548 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : oblongas , de quatro lados obtusos , mas gruesas por arriba , obtusas , desnudas y sin vilano.

En las femeninas : muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. con *pajas* muy parecidas á las escamas del caliz , cóncavas , que por una parte envuelven las semillas y que se caen facilmente.

ONS. La *Sigesbeckia Occidental* tiene la corola con un solo radio : el receptaculo desnudo : y las semillas con el vilano de dos pajas en ambos lados. R.

ESPECIES.

Orientalis.

I. SIGESBECKIA *petiolis sessilibus, calycibus exterioribus linearibus majoribus patentibus*. Kniph. cent. 2. n. 87. Sigesbeckia con los peciolos sentados; cálices exteriores lineares, mayores y extendidos.

Sigesbeckia. Hort. cliff. Sigesbeckia.

412. t. 23.

Bidenti similis, foliis latissimis serratis. Buxb. cent. 3. p. 29. t. 52. Planta parecida al Bidente, con hojas muy anchas y aserradas.

Cichorio affinis Lapsana Sinica, Menthastris foliis, calyce fimbriato, hispido. Pluk. amalth. 58. t. 380. f. 2. Lapsana de la China, semejante á la Achicoria, con hoja como la del Mentastro; caliz hendido en flecos y erizado.

Cast. Sigesbeckia Oriental.

Habita en las aldeas de la China, y de Media. 26

Es del largo de dos pies y muy ramosa. Echa las *hojas* escurridas en peciolo, casi de figura de corazon y con dientes desiguales : las *bracteas* en forma de espátula y erizadas con glandulas : los *flosculos* de color amarillo y hendidos en cinco partes : y los *semiflosculos* mas largos y hendidos en tres lacinias.

Occi-
denta-
lis.

2. SIGESBECKIA *petio-
lis decurrentibus, calycibus
nudis*. Gron. virg. 128.

Sigesbeckia con los pecio-
los escurridos; y cálices des-
nudos.

*Verbesina foliis ovatis,
petiolatis decurrentibus op-
positis, flosculis radiorum
solitariis*. Gron. virg. 1. p.

Verbesina de hojas aova-
das, con peciolo, escurri-
das, opuestas; y flosculos de
los radios solitarios.

179.

*Eupatoriophalacron folio
trinervi Scrophulariae, cau-
le alato*. Vaill. act. 598.

Eupatorio de semillas sin
vilano; hoja como la de la
Escrofularia, con tres ner-
vios; y tallo alado.

Cast. Sigesbeckia Occidental.

Habita en la Virginia.

Arroja el tallo apietado y rígido: las hojas opuestas, en-
tre lanceoladas y aovadas, con tres nervios unidos por
arriba de la base, aserradas, algo tomentosas por de-
baxo, escurridas en ambas partes del tallo, formando
quatro ángulos membranosos: los *pedunculos* terminales
y opuestos en forma de aspa: el *caliz* oblongo: el *re-
ceptaculo* desnudo: la *corola* radiada con un solo petá-
lo, ligulado y hendido por su ápice en dos partes: y las
semillas con un vilano de dos pajas en ambos lados.
Acaso es del género *Milleria*?

1162. Género VERBESINA. * Eupatoriophalacron

Dill. elth. 113. Vaill. A. G. 1719.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun con *hojuelas* oblongas, entre acanaladas y
cóncavas, derechas, las mas veces iguales y puestas
en dos series.

COR. compuesta radiada; con muchas *corolillas* hermafro-
ditas, en el disco; y cerca de cinco femeninas, en
el radio.

Propia de la hermafrodita: en forma de embudo, con
cinco dientes y derecha.

De la femenina: ligulada, hendida en tres partes (ó
ancha, sencilla y muy angosta).

Es-

550 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en la hermafrodita: *germen* algo oblongo: *estilo* filiforme, y del largo de los estambres: con dos *estigmas* redoblados.

En las femeninas: del mismo modo que en las hermafroditas.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: gruesecitas y anguladas: con el *vilano* con arista.

En las femeninas: muy semejantes á las de las hermafroditas.

RECEPT. pajoso.

OBs. La Verbesina como *Calendula* tiene el caliz sencillo y de cinco hojuelas.

La Verbesina de dos flores posee las semillas mochas.

ESPECIES.

- Alata.** 1. *VERBESINA foliis alternis decurrentibus undulatis obtusis.* Hort. cliff. 411. X Verbesina con hojas alternas, escurridas, ondeadas y obtusas.
- Cannabina Indica, foliis integris, alato caule.* Magn. hort. 40. t. 40. X Cannabina de Indias con hojas enteras, y tallo alado.
- Chrysanthemum Curassavicum, alato caule, floribus aurantiis.* Herm. par. 125. t. 125. X Chrysanthemo de Curassao, con el tallo alado; y flores de color de naranja.
- Chrysanthemum Americanum, caule alato, flore aphylo globoso, aurantio, foliis Bacharidis.* Comm. hort. 1. p. 5. t. 3. X Chrysanthemo de América, con el tallo alado; flor sin hojuelas, globosa, de color de naranja; y hojas como las de la Bacara.
- Chrysanthemum Americanum, bidens, alatum, flore parvo aurantiaco.* Pluk. alm. 1co. t. 84. f. 3. X Chrysanthemo de América, alado, de semilla con dos dientes; flor pequeña, y de color de naranja.

Chry-

Chrysanthemum Conyzoi X Chrysanthemo como Co-
des, *Curassavicum*, *Abro-* nyza, de Curasao, con la
tani feminae flore aurantio. X flor como la del Abrotano
Volk. norib. 106. t. 106. X hembra, y de color de na-
ranja.

Bidens Indica Hieracii X Bidente de Indias, con
folio, alato caule. Tourn. p. X hoja como la del Hieracio; y
462. X tallo alado.

Cast. Verbesina alada.

Habita en Curasao y en Surinam. 2f

Se diferencia mucho de las demas especies en su traza y
y estructura; y acaso es de propio género.

Se halla siempre verde; y tiene el tallo del largo de un pie
y de color rubio obscuro: las hojas aovadas: los pedun-
culos larguissimos y vellosos: las escamas del caliz igua-
les y lineares: las corolas de color de azafran: las se-
millas con dos dientes, y el uno mas largo y ganchoso.
Gov. hort. 454.

Chi- 2. VERBESINA foliis al- X Verbesina de hojas alter-
nensis. ternis petiolatis ovato-lan- X nas, con peciolo, entre aovadas y lanceoladas, y aser-
ceolatis serratis. X vadas y lanceoladas, y aser-
X radas.

Cast. Verbesina de la China.

Habita en la China. Osbeck. 2f

Produce el tallo sencillo, rollizo y algo tomentoso; con las
ramas tambien sencillas, y que salen de las axilas su-
periores de las hojas: las hojas entre aovadas y oblon-
gas, casi tomentosas, algo obtusas, pecioladas, al-
ternas, con aserraduras y dientes obtusos: las flo-
res terminales, solitarias y con pedunculo: el caliz he-
misférico, apinado y tomentoso: la corola amarilla:
muchos flosculos en el radio, lanceolados, y enteros;
copiosos en el disco y separados por medio de pajas: y
las semillas coronadas con un ribete y quatro cerdas li-
sas.

552 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Virgini-
nica.

3. VERBESINA *foliis alternis lanceolatis petiolatis, nas, lanceoladas, con pediculis corymbosis. Gron. ciolo; y flores corimbosas. virg. 138.*

Cast. Verbesina de la Virginia.

Habita en la Virginia.

La-
venia.

4. VERBESINA *foliis oppositis ovatis trinerviis glabris petiolatis, seminibus tricoribus. Flor. zeyl. 310.* Verbesina con hojas opuestas, aovadas, de tres nervios, lampiñas, pecioladas; y semillas con tres astitas.

Eupatoriophalacrum Scrophulariæ folio trinervi. Vaill. act. 598. Eupatorio con la semilla desnuda; hoja como la de la Escrofularia y de tres nervios.

Eupatoriophalacron Scrophulariæ aquaticæ foliis oppositis. Burm. zeyl. 94. t. 42. Eupatorio con la semilla desnuda; hojas como las de la Escrofularia aquatica y opuestas.

Putumba. Rheed. mal. 10. p. 125. t. 63. Putumba.

Chrysanthemum aquaticum, Scrophulariæ folio, Lavenia dictum. Suppl. p. 217. Chrysanthemo aquatico, llamado Lavenia, con hoja como la de la Escrofularia.

Cast. Verbesina Lavenia.

Habita en Zeylan.

Biflora

5. VERBESINA *foliis oppositis oblongo-ovatis triplinerviis acuminatis serratis, pedunculis geminis bifloris.* Verbesina con hojas opuestas, entre oblongas y aovadas, de tres nervios unidos mas arriba de la base, puntiagudas, aserradas; pedunculos mellizos y de dos flores.

Eclipta. Rumph. amb. 6. p. 43. t. 13. f. 1. Eclipta.

Valliamanga-nari. Rheed. malab. 10. t. 79. Valliamanga-nari.

Cast. Verbesina de dos flores.

Ha-

Habita en la India.

Tiene la estatura como la de la *Sigesbeckia* : las *hojas* opuestas , pecioladas , con aserraduras agudas , entre aovadas y oblongas , y algo asperas : las *ramas* tambien opuestas : el *pedunculo terminal* mas corto que las *hojas* , y de dos flores : los *pedunculos axilares* mellizos en ambas partes , de dos flores y con una de sus *hojuelas* opuesta al *piececito* : las *flores* amarillas : las *semillas* gibosas , de tres caras y mochas. Es semejante á la *Verbesina Lavenia*.

Calendulacea.

6. VERBESINA *foliis oppositis lanceolatis obtusiusculis, pedunculis longis unifloris, calycibus simplicibus.* Flor. zeyl. 311. Verbesina con hojas opuestas , lanceoladas , algo obtusas ; pedunculos largos , de una flor ; y cálices sencillos.

Caltha flore solitario, exilis foliorum longissimo pedunculo prodeunte. Burm. zeyl. 52. t. 22. f. 1. Caltha con la flor solitaria que sale de las axilas de las hojas , con el pedunculo larguísimo.

Pee-Caioni. Rheed. mal. 10. p. 83. t. 42. Pee-Caioni.

Cast. Verbesina como Calendula.

Habita en Zeylan.

Posee las *semillas* casi mochas , coronadas con un ribete cortísimo y de quatro dientes : y el *caliz* de cinco *hojuelas*.

Nodiflora.

7. VERBESINA *foliis oppositis ovatis serratis, calycibus oblongis sessilibus caulinis lateralibus.* Amœn. aca. 4. p. 290. Mill. dict. n. 7. Verbesina con hojas opuestas , aovadas y aserradas ; cálices oblongos , sentados , y los que están en el tallo laterales.

Bidens nodiflora, folio Tetrhait. Dill. elth. 53. t. 45. f. 53. Bidente que florece en los nudos , y con hojas como las del Tetrahit.

554 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Chrysanthemum Conyzoides, nodiflorum, semine ros-trato bidente. Sloan. jam. 126. hist. 1. p. 262. t. 154. *Chrysanthemo como Conyza*, que florece en los nudos, y de semilla con pico de dos dientes.

Cast. Verbesina que florece en los nudos.

Habita en tierra de los Caribes. ☉

Tiene las *semillas del disco* con dos aristas : las del *radio* mochas , y su margen dentada y pestafiosa.

Fruticosa.

8. VERBESINA *foliis oppositis ovatis serratis petiolatis, caule fruticoso*. Mill. dict. n. 9. Verbesina de hojas opuestas, aovadas, aserradas, con peciolo ; y tallo fruticoso.

Bidens foliis ovatis serratis petiolatis, caule fruticoso. Hort. cliff. 391. Bidente de hojas aovadas, aserradas , con peciolo ; y tallo fruticoso.

Bidens frutescens, Illic folio, flore luteo. Plum. spec. 10. ic. 52. Bidente fruticoso, con hoja como la del Acebo ; y flor amarilla.

Cast. Verbesina fruticosa.

Habita en la America meridional. ♀

Posee las *semillas* anchas y como las del *Coreopsis*.

Mu- tica.

9. VERBESINA *foliis trifido-laciniatis serratis, caule repente*. Mill. dict. n. 8. Verbesina con hojas entre hendidas en tres partes y laciniadas , aserradas ; y tallo rastrero.

Anthemis Americana. Spec. pl. 1. p. 895. Anthemis de America.

Bidens Apii folio. Amœn. acad. 5. p. 405. Bidente con hoja como la del Apio.

Bupthalam foliis triter-natis, pedunculis terminalibus ramo longioribus. Hort. cliff. 414. Bupthalamo con hojas triter-nadas ; pedunculos terminales y mas largos que la rama.

Chrysanthemum palustre, X *Chrysanthemo palustre*,
minimum, repens, Apii fo- X muy pequeño y rastrero, con
lio. Sloan. jam. 126. hist. 1. X hoja como la del Apio.
 p. 263. t. 155. f. 1. Rai. Sup- X
 pl. 315. X

Chrysanthemum humile, X *Chrysanthemo baxo*, con
Ranunculi folio. Plum. spec. X hoja como la del Ranunculo.
 10. ic. 86. f. 2. X

Cast. Verbesina mocha.

Habita en la America meridional. ☉

Tiene las *semillas* mochas: y el *caliz* como el del *Bi-*
dente.

Bos-
 valle. 10. VERBESINA *foliis* X *Verbesina* con hojas hen-
multifido-capillaribus, cau- X didas en muchas partes y ca-
libus prostratis, flosculis X pilares; tallos postrados;
senis, femineo unico. X flosculos de seis en seis y
 X uno solo femenino.

Cast. Verbesina de Bosval.

Habita en la India. *Kœnig.*

Produce los *tallos* postrados, del largo de medio pie, al-
 go ramosos y herbáceos: las *hojas* alternas, con pecio-
 lo, hendidas en muchas laciniás capilares como las del
Abrotano y desnudas: las *flores* casi solitarias y con el
 pedunculo corto: el *caliz* oblongo, con cinco ó seis
 flosculos, cilindrico, de otras tantas hojuelas, elípti-
 cas, mochas y por su margen escariosas: las *corolas*
 hendidas en quatro partes; pero con una sola femenina,
 ligulada y separada por medio de una *paja* lanceolada,
 lampiña y lustrosa: las *semillas* oblongas, comprimi-
 das y con dos aristas. Es *planta* comestible y agradable
 por el olor y sabor que tiene de *hinojo*.

556 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

1163. Género BUPHTHALMUM. * Asteriscus. Tourn.

t. 283. Vaill. A. G. 1720. Dill. elth. 38. f. 44.

Asteroides. Tourn. t. 487. Vaill. A. G.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun vario en diversas especies , y apifinado.

COR. compuesta radiada ; con numerosas corolillas hermafroditas , que constituyen el disco plano ; y mas de diez femeninas , en el radio.

Propia de la hermafrodita : en forma de embudo ; con el borde hendido en cinco partes y extendido.

De la femenina : ligulada , mas larga , extendida y con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas : filamentos cinco , capilares y cortisimos : con la antera tubulosa y cilindrica.

PIST. en la hermafrodita : germen aovado y comprimido : estilo filiforme y del largo de los estambres : con el estigma gruesecito y sencillo.

En las femeninas : germen de dos filos : estilo filiforme , del largo del de las hermafroditas : con dos estigmas oblongos.

PERIC. ninguno : el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : oblongas , y coronadas con un ribete cortado y hendido en muchas partes.

En las femeninas : comprimidas , coronadas con un ribete semejante al de las hermafroditas.

RECEPT. pajoso y convexô.

OBS. El Buphthalmo maritimo tiene tambien el estigma hermafroditico ó castrado y hendido en dos partes.

Vilich. R.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

ASTERISCUS. p. 497.

La flor es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos ; y la corona de muchos semiflosculos sentados en embriones y comprendidos en el caliz estrellado, mas alto que la flor : y los embriones pasan á semillas planas y ribeteadas.

ASTEROIDES. COR. 51.

La flor es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos; y la corona de semiflosculos, sentados en los embriones y comprendidos en el caliz escamoso: y los embriones pasan á semillas comunmente oblongas.

ESPECIES LLAMADAS ASTERISCO DE TOURN.

- Salici-
folium.
1. BUPHTHALMUM fo-
liis oppositis lanceolatis, petiolis bidentatis, caule fruticoso. Hort. cliff. 415. Gron. virg. 127.
- Asteriscus frutescens, Leucoii foliis sericeis & incanis. Dill. elth. 44. t. 28. f. 44.
- Corona Solis frutescens, Lychnidis folio carnosio, flore luteo. Plum. spec. 10. ic. 107. f. 1.
- Chrysanthemum ex Insulis Caribæis, Leucoii incanis & sericeis foliis crassis. Pluk. alm. 102. t. 115. f. 4. Moris. hist. 3. p. 25. Rai. Suppl. p. 211.
- Chrysanthemum fruticosum, maritimum, foliis glaucis oblongis, flore luteo. Sloan. jam. 125. hist. 1. p. 260. Catesb. car. 1. p. 93. t. 93.
- Bupthhalmo con hojas opuestas y lanceoladas; peciolos con dos dientes; y tallo fruticoso.
- Asterisco frutescente, de hojas como las del Leucoio, con vello como seda y blanquecinas.
- Corona del Sol frutescente, con hoja como la del Lichnide, carnosa; y flor amarilla.
- Chrysanthemo de las Islas Caribes, con hojas como las del Leucoio, blanquecinas, vellosas como seda y crasas.
- Chrysanthemo fruticoso, maritimo, con hojas de color garzo, oblongas; y flor amarilla.

Cast. Bupthhalmo frutescente.

Habita en la Jamaica y en la Virginia. $\frac{1}{2}$

Posee las hojas venosas por encima, y lisas por debaxo; las del tallo con dos dientes alesnados; y las de las ramas sin ellos.

BUPH-

Ar- 2. BUPHTHALMUM fo- Buphthalmo con hojas
bores- liis oppositis lanceolatis opuestas, lanceoladas, to-
cens. utrinque tomentosis edentu- mentosas en ambas partes,
lis integerrimis, caule fru enterisimas; y tallo frutico-
ricos. Mill. dict. n. 9. so.

Asteriscus frutescens, Asterisco frutescente, con
Leucoii foliis viridibus & hojas como las del Leucoio,
splendentibus. Dill. eith. 43. verdes y resplandecientes.
t. 38. f. 43.

Chrysanthemum Bermu Chrysanthemo de la Ber-
dense, folio rigido, viridi. muda, con hoja rígida y
Moris. hist. 3. p. 25. verde.

Corona Solis frutescens, Corona del Sol frutescen-
Laureole folio, flore luteo. te, con hoja como la de la
Plum. spec. 10. t. 106. f. 2. Laureola; y flor amarilla.

Cast. Buphthalmo arborescente.

Habita en la America. *h*

Spino- 3. BUPHTHALMUM ca- Buphthalmo de cálices
sum. lycibus acutè foliosis, foliis con hojuelas agudas; ho-
alternis lanceolatis ample- jas alternas, lanceoladas,
xicaulibus integerrimis, cau- amplexicaules, enterisimas;
le herbaceo. Hort. cliff. 414. y tallo herbáceo.
Blackw. t. 272.

Aster luteus, foliis ad Aster amarillo, con las
florem rigidis. C. B. P. 266. hojas cerca de la flor rígi-
das.

Aster legitimus Clusii Otro Aster legitimo de
alter, seu spinosus luteus. Clusio, ó espinoso, con la
Barr. ic. 551. flor amarilla.

Asteriscus annus foliis Asterisco annuo, con las
ad florem rigidis. Tourn. hojas cerca de la flor rígidas.
p. 497.

Cast. Buphthalmo espinoso. En Aragon le llaman Cebadi-
lla; porque hace estornudar.

Habita en las márgenes de los campos de Narbona, Ita-
lia y Oriente: en los circuitos de Madrid, en Aragon,
Cataluña, Alcarria, en las dos Castillas y otras mu-
chas partes de España. ○

Tiene muchos petalos en el radio y muy delgados; y el
es-

estigma de la flor hermafrodítica hendido en dos partes: el tallo rígido, lanudo y casi del largo de un pie: las hojas vellosas: las *hojuelas inferiores del caliz* mas anchas, mas altas que el radio, de tres nervios y rígidas.

Aqua-
ticum.

4. BUPHTHALMUM ca-
lycibus obtusè foliosis ses-
silibus axillaribus, foliis
alternis oblongis obtusis,
caule herbaceo. Hort. cliff. Bupthhalmo de cálices
con hojuelas obtusas, sen-
tados, axilares; hojas al-
ternas, oblongas, obtusas; y
tallo herbáceo.

414. Roy. lugdb. 170.

Asteriscus annuus, Lu-
sitanicus, odoratus. Boerh. Asterisco annuo y oloroso,
de Portugal.

Seb. thes. 1. p. 47. t. 29. f. 7.

Chrysanthemum Conyzoi-
des, Lusitanicum. Breyn. Chrysanthemo como Co-
nyza, de Portugal.

cent. 157. t. 77.

Asteriscus aquaticus,
annuus, patulus. Tourn. p. Asterisco aquático, an-
nuo, y extendido.

498.

Aster annuus, attico lu-
teo similis, foliis ad florem
mollibus. Bot. monsp. 32. Aster annuo, semejante al
Aster attico, con la flor ama-
rilla; y hojas cerca de la flor
blandas.

Cast. Bupthhalmo aquático.

Habita en Creta, Marsella y Portugal: en Extremadura,
en las faldas de los montes de Sierra-morena y en otras
partes de España. ☉

Echa el tallo ahorquillado: y las flores sentadas en la di-
vision del mismo tallo.

Mari-
tinum.

5. BUPHTHALMUM ca-
lycibus obtuse foliosis pe-
dunculatis, foliis alternis
spatulatis, caule herbaceo. Bupthhalmo de cálices
con hojuelas obtusas, pe-
dunculados; hojas alternas,
en forma de espátula; y ta-
llo herbáceo.

Hort. cliff. 414. Mill. dict.
n. 6.

Aster supinus, lignosus,
Siculus, Conyzæ odore. Boc. Aster de Sicilia, echado
y leñoso, con olor como el
de la Conyza.

mus. 2. p. 161. t. 129.

As-

560 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Aster supinus*, *luteus*, *Massilioticus*. Batt. ic. 1151. do, y con la flor amarilla.
Aster secundus, *supinus*. Clus. hist. 2. p. 13. Aster segundo, echado.
Aster luteus, *supinus*. C. B. P. 267. Aster echado, y con la flor amarilla.
Asteriscus maritimus, *perennis* (& *annuus*) *patulus*. Tourn. p. 498. Asterisco marítimo, perenne (y *annuo*) y extendido.

Cast. Bupthhalmo marítimo.

Habita en las playas del mar Mediterráneo: en la Real Casa de Campo, en Castilla la vieja y otras muchas partes de España. ¶

Tiene el estigma de la flor hermafrodítica hendido en dos partes. Villich.

- Du- 6. BUPHTHALMUM fo- Bupthhalmo con hojas al-
rum. *liis alternis lanceolatis in-* ternas, lanceoladas, enteri-
tegerrimis, caule suffruti- simas; y tallo sufruticoso.
coso.

Chrysanthemum Africanum, *Asteris facie*, imo *flore non folioso, capitulis duris*. Pluk. alm. 101. t. 21. Chrysanthemo de Africa, con traza de Aster, sin hojas debaxo de la flor; y con carezuelas duras.
f. 3.

Cast. Bupthhalmo duro.

Habita en el Cabo de Buena-espejanza. ¶

- Seri- 7. BUPHTHALMUM fo- Bupthhalmo de hojas opues-
ceum. *liis oppositis approximatis-* tas, muy acercadas, entre de
simis spathulato-oblongis figura de espátula y obion-
sericeis, calycinis squamis gas, con vello como seda;
setaceis hirsutis, caule ar- escamas del caliz como cer-
boreo. Suppl. p. 379. das ásperas; y tallo arboreo.

Ioriada. Teneriff.

Ioriada: llamada así por los de Tenerife.

Cast. Bupthhalmo como seda.

Habita en Tenerife. Masson. ¶

Echa las ramas gruesas, leñosas, y cubiertas con las ci-

catrices que dexan las hojas: las *ramas* vestidas de hojas entre de figura de espatula y oblongas , enterisimas y sin dientes ; con pelos blancos , apretados , muy blandos y como seda : las *flores* terminales, mayores y amarillas: el *caliz* con pelo áspero ; y las *escamas inferiores* mas largas y lineares.

ESPECIES LLAMADAS ASTEROIDEA Ó COMO ASTER.

Salici-
folium.

8. BUPHTHALMUM fo-
liis alternis lanceolatis sub-
serratis villosis , calycibus
nudis , caule herbaceo. Hort.
cliff. 414. Jacq. austr. t. 370.
Pall. it. p. 184.

Bupthhalmo con hojas al-
ternas , lanceoladas , algo
aserradas y velosas ; cálices
desnudos ó sin hojuelas por
debaxo ; y tallo herbáceo.

Bupththalmum foliis hir-
sutis , imis petiolatis , ovatis ,
superioribus amplexicauli-
bus , lanceolatis , rariter
dentatis. Hall. helv. n. 118.

Bupthhalmo de hojas con
pelo aspero , las de abaxo pe-
tioladas y aovadas , las su-
periores amplexicaules , lan-
ceoladas , y con dientes cla-
ros.

Aster luteus , major , fo-
liis Succisæ. C. B. P. 266.

Aster mayor , con la flor
amarilla ; y hojas como las
de la Succisa.

Aster tertius , Austria-
cus primus. Clus. hist. 2.
p. 13.

Aster tercero , primero de
Austria.

Asteroides hirsuta. Mich.
flor. 12. t. 3. 4.

Planta como Aster , con
pelo áspero.

Conyza major , altera.
Thal. herc. 21. t. 2.

Otra Conyza mayor.

Cast. Bupthhalmo con hoja de Sauce.

Habita en las faldas de los montes de Austria , Stiria,
Suiza , Lusacia ; y de Mompeller. 24

Es muy parecida á la especie siguiente.

Gran- 9. BUPHTHALMUM fo- Buphthalmo de hojas al-
di flo- liis alternis lanceolatis sub- ternas, lanceoladas, con al-
rum. denticulatis glabris, caly- gun dientecito y lampiñas;
cibus nudis, caule herbaceo. cálices desnudos ó sin hojue-
las por debaxo; y tallo her-
Hort. cliff. 415. báceo.

Asteroides alpina, *Salicis folio*. Tourn. cor. 50. Mi- Planta alpina, como As-
ch. flor. 12. t. 5. ter; y con hoja como la del
Sauce.

Aster luteus, *angustifolius*. C. B. P. 266. Aster con la flor amarilla;
y hoja angosta.

Chrysanthemum perenne, *minus*, *Salicis glabro folio*, *ramosum*. Moris. hist. 3. p. Chrysanthemo ramoso,
perenne, menor, con hoja
como la del Sauce y lampi-
21. sect. 6. t. 7. f. 52. ña.

Cast. Buphthalmo de flor grande.

Habita en los montes de Austria, de Italia y de Mompe-
ller. 2

Es muy semejante á la *Inula con hoja de Sauce*; pero tie-
ne el *caliz* con dos órdenes solamente de hojuelas, co-
mo en la especie antecedente: el *vilano* formado de un
ribete pestafioso: y el *caliz* igual.

Govan en sus illustr. p. 71. une esta especie con la ante-
cedente.

Spe- 10. BUPHTHALMUM Buphthalmo con hojas al-
cios- *foliis alternis amplexicaulibus ovatis nudis serratis* ternas, amplexicaules, ao-
simum *subciliatis, caule unifloro.* vadas, desnudas, aserradas,
algo pestafiosas; y tallo de
una flor.

Buphtalmum caule erecto, *unifloro*, *foliis amplexicaulibus dentatis, inferioribus ovatis obtusis, superioribus lanceolatis, acutis.* Buphthalmo con el tallo
derecho y de una flor; hojas
amplexicaules y dentadas,
las inferiores aovadas, obtu-
sas, y las superiores lanceo-
ladas y agudas.

Asteroides Orientalis, *Petasitidis folio*, *flore maximo*. Tourn. corol. p. 51. Planta Oriental, como As-
ter, con hoja parecida á la
de la Sombrerera; y flor muy
grande.

Cast.

Cast. Bupthhalmo muy hermoso.

Habita en los montes de Brixin en el Tiról. 24

La planta que describe Schreber en las *Centurias* tab. 6. parece muy semejante á esta ; pero esta tiene las *hojas* mas profundamente aserradas.

Produce la *raiz* fusiforme y como si fuese tuberosa : el *tallo* del largo de dos pies , liso y con lineas blancas muy delgadas , envaynado por debaxo con los peciolos , y por arriba en los pedunculos un poco ramoso : las *hojas* alternas , casi de figura de corazon , agudas , entre aserradas y dentadas , compactas , algo pestafiosas y con venas en redecilla : los *peciolos* ensanchados por su base , algo membranosos y amplexicaules : los *pedunculos* casi de tres caras : el *caliz comun* apifinado , con hojuelas aovadas , obtusas y grandes : la *corola* con los semiflosculos del radio femeninos , amarillos , ligulados , dos veces plegados y con dos ó tres dientes ; y los *flosculos del disco* hermafroditos masculinos , ó sea con anteras y sin estigma , tubulosos , hendidos en quatro partes , derechos , con piececito y quatro estambres de color obscuro , con las *anteras* unidas : el *pistilo de los semiflosculos del radio* con el germen aovado ; y dos *estilos* filiformes : las *floreccitas del disco* sin germen alguno : su *estilo* cilindrico , obtuso , amarillo y vellosos : la *semilla de las floreccitas del radio* aovada , membranosa y algo cóncava ; y ninguna en las *floreccitas del disco* : el *receptaculo* hemisférico ; y con *pajas* de color obscuro. Doct. Zoega. Acaso es especie de *Silphio* ?

Helian-
tho-
des.

II. BUPHTHALMUM

foliis oppositis ovatis serratis triplinerviis , calycibus trifloris , caule herbaceo . Bupthhalmo de hojas opuestas , aovadas , aserradas , con tres nervios unidos mas arriba de su base ; cálices foliosos ; y tallo herbáceo.

Hort. ups. 264. *Helianthus foliis ovatis , acumínatis , serratis , pedunculis longissimis .* Heliantho con hojas aovadas , puntiagudas , aserradas ; y pedunculos larguissimos. Gron. virg. 127.

564 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Corona Solis, Caroliniana, Corona del Sol, de la Ca-
parvis floribus, *folio tri-* rolina, con flores pequeñas;
nervi, amplo, aspero, pedi- hoja de tres nervios, ancha,
culo alato. Mart. cent. 20. áspera; y peciolo alado.
 t. 20.

Chrysanthemum Scrophu- Chrysanthemo de Ameri-
lariæ folio, *Americanum.* ca, con hoja como la de la
 Pluk. alm. 99. t. 22. f. 1. Escrofularia.

Chrysanthemum Virgi- Chrysanthemo de Virgi-
nianum, *foliis glabris*, nia, con hojas lampiñas, y
Scrophulariæ vulgaris æmu- semejantes á las de la Escro-
lis. Moris. hist. 3. p. 24. fularia vulgar.
 sect. 6. t. 3. f. 69. Rai. Suppl.
 p. 211.

Cast. Bupphthalmo como Heliantho.

Habita en la America septentrional. 24

Tiene alguna vez las *hojas* de mas arriba mas cortas por
 un lado de su base; y se asemeja mucho al *Helianthe-*
mo.

Vease la *Leysera pajosa.*

1164. Género UNXIA. Suppl. p. 56.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* casi redondo; y de cinco *hojuelas* aova-
 das.

COR. *compuesta* con el radio desfigurado.

Cinco *fiosculos* en el disco, masculinos, en forma de
 embudo y hendidos en cinco partes.

Cinco *semifiosculos* en el radio, aovados y pequeños.

ESTAMB. en las flores masculinas como en las demas de es-
 ta clase.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* sencillo: con el *estigma* hen-
 dido en dos partes.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. aovadas, duras y desnudas ó sin vilano.

RECEPT. desnudo.

ESPECIE.

Camphora-
ta. 1. UNXIA. Suppl. p. 368. X Unxia.
Camphertplant. Surinam. X Camphertplant : llamada
X asi por los de Surinam.

Cast. Unxia alcanforada.

Habita en lugares arenosos de Surinam. Dalberg.

Arroja el tallo herbáceo, filiforme, ahorquillado y del largo de dos pies : las hojas opuestas en las divisiones del tallo , sin peciolo , lanceoladas , de cinco nervios , con pelo y blandas : las flores solitarias , que salen de la division del tallo , con el pedunculo corto ; y de la magnitud de un guisante : el radio de la corola extendido y pequeño : y el olor de la planta pesado ó como de alcanfor.

El cocimiento en agua , tomado interiormente , es excelente sudorifico y de grande virtud en el dolor de las caderas : y la yerba seca , aplicada exteriormente , facilita la transpiracion.

1165. Género MUTISIA. Suppl. p. 57.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun oblongo , cilindrico y apiñado ; con escamas lanceoladas ; y las interiores mas largas.

COR. compuesta radiada.

Los flosculos del disco tres veces mas en número que los del radio , tubulosos y hendidos en tres lacinias ; con la exterior lanceolada , y las interiores lineares.

Los flosculos del radio ocho , entre ovals y oblongos , enteros , y con su uña linear.

ESTAMB. de los flosculos del disco : filamentos cinco y lineares : la antera cilindrica , mas larga que el flosculo , y con cerdas alargadas en su base.

Los del radio : ninguno ; dos rudimentos solamente de filamentos.

PIST. en los flosculos del disco : germen corto : estilo filiforme : con el estigma sencillo.

En los del radio : germen corto : estilo filiforme : con dos estigmas setáceos.

PE-

566 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

PERIC. ninguno.

SEM. algo oblongas ; con el vilano plumoso.

RECEPT. desnudo.

Fue dedicado este género al Doct. D. Joseph Celestino Mutis , natural de Cadiz , y excelente Botánico , quien prepara una bellissima historia de las plantas de America ; y señaladamente de las palmas.

ESPECIE.

Cle- 1. MUTISIA. Suppl. p. $\frac{X}{X}$ Mutisia.
malis . 373.

Cast. Mutisia Clematide.

Habita en la Nueva Granada. Doct. Mutis. $\frac{X}{X}$

Es planta trepadora como la *Clematide* , y quando tierna se halla toda tomentosa. Echa el tallo fruticoso , estriado , largo , ramoso y voluble : las hojas alternas , remotas , pinnadas y con el lomo que termina en zarzillo : las hojuelas entre oblongas y aovadas , casi sin peciolo , alternas , ú opuestas , de siete en siete , muy tomentosas por debaxo y que con el tiempo se vuelven lisas por encima : las estipulas de dos en dos , aovadas y muchas pequenas : los pedunculos axilares , solitarios , de una flor y tomentosos , con una ú otra bractea , alesnada y pequena : la flor de la magnitud y figura de un clavel mayor : el caliz tomentoso : la corola purpúrea y del largo del radio del mismo caliz.

ORDEN III.

POLYGAMIA FRUSTRANEA. DE LAS MISMAS FLORES QUE TIENEN
LOS FLOSCULOS HERMAFRODITOS
EN EL DISCO, Y NEUTROS Ó
ESTERILES EN EL RADIO.

1166. Género HELIANTHUS. * Corona Solis.

Vaill. A. G. 1720. f. 12. 45. Tourn.

t. 279. Dill. elth. 94.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun apiñado, algo desparramado y extendido ;
con *escamas* oblongas, algo anchas por su base, y
que se abren en sus ápices por todas partes.

COR. *compuesta* radiada; con las *corolillas* muy numero-
sas, hermafroditas, en el disco; y menos en número,
femeninas, y mucho mas largas, en el radio.

Propia de las hermafroditas: cilíndrica, mas corta que
el caliz comun, ventricosa en su base, redondeada y
deprimida; con el *borde* de cinco dientes, agudos y
extendidos.

De las femeninas: ligulada, lanceolada, enterisima y
muy larga.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, encorva-
dos, insertos debaxo del ventriculo de la corolilla y
del largo del tubo: con la *antera* cilíndrica y tubu-
losa.

PIST. en las hermafroditas: *germen* oblongo: *estilo* filiforme y de la longitud de la corolilla: con el *estigma*
dividido en dos partes y redoblado.

En las femeninas: *germen* muy pequeño: *estilo* ningun-
no: y *estigma* tampoco ninguno.

PERIC. el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: oblongas, obtusas, de quatro
lados, comprimidas en los dos opuestos y las *inte-
riores* mas angostas; con el *vilano* de dos aristas lan-
ceoladas y que se caen facilmente.

En

568 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

En las femeninas: ninguna.

RECEPT. grande, plano; con *pajas* lanceoladas, agudas, las quales de dos en dos separan una sola semilla y que se caen facilmente.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

CORONA SOLIS. p. 489.

La flor es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos, y la corona de semiflosculos, sentados en embriones, separados por medio de hojuelas apañadas entre sí y comprendidos en el caliz escamoso: y los embriones pasan á semillas acompañadas de dos hojuelas.

ESPECIES.

An- nuo.	1. HELIANTHUS foliis	X	Heliantho con todas las
	omnibus cordatis trinerva-	X	hojas de hechura de corazon,
	tis, pedunculis incrassatis,	X	de tres nervios que se unen
	floribus cernuis. Knorr. del.	X	detrás de la base; peduncu-
	1. t. S. 1.	X	los incrasados; y flores ca-
		X	bizbaxas.
	Helenium Indicum, ma-	X	Helenio de Indias, muy
	ximum. C. B. P. 276.	X	grande.
	Herba maxima. Dod.	X	Yerba muy grande.
	pempt. 264.	X	
	Chrysis. Reneal. spec. 84.	X	Chrysis.
	t. 83.	X	
	Corona Solis maxima.	X	Corona del Sol muy gran-
	Tourn. p. 488.	X	de.

Cast. Heliantho annuo. vulgo: Girasol.

Habita en el Perú y en México. ☉

Llamase vulgarmente *Girasol*, porque creen algunos que la flor sigue el movimiento del Sol, lo qual es incierto.

Las semillas tostadas despiden el olor de café; y su infusion al modo que la del Té es bebida agradable.

In-
dicus.

2. *HELIANTHUS foliis omnibus cordatis trinervatis, pedunculis æqualibus, calycibus foliosis.* Heliantho con todas las hojas de figura de corazon, y de tres nervios unidos detras de su base; pedunculos iguales; y cálices foliosos.

*Corona Solis minor, ter-
tia.* Tabern. hist. 1147. Corona del Sol menor, tercera.

Cast. Heliantho de Indias.

Habita y se cultiva en Egipto. ☉

Acaso es sola variedad constante del *Heliantho annuo*; pero echa las *hojas* convexas por la haz superior y de color mas verde obscuro: los *pedunculos* de igual crasitud; por lo que las *flores* se hallan menos cabizbaxas: las *escamas del caliz*, á excepcion de la serie de mas adentro, alargadas en hojuelas con peciolo y pendulas.

Multi-
florus.

3. *HELIANTHUS foliis inferioribus cordatis trinervatis, superioribus ovatis.* Heliantho con las hojas inferiores en forma de corazon, de tres nervios unidos detras de su base, y las superiores aovadas.

Helianthus radice tereti inflexa, perenni. Hort. cliff. 419. Heliantho con la raiz rolliza, doblada y perenne.

Helenium Indicum, ramosum. C. B. P. 277. Helenio de Indias, ramoso.

Corona Solis, ramosa. Tourn. p. 488. Corona del Sol, ramosa.

Corona Solis, minor, femina. Tabern. ic. 764. Corona del Sol, menor y femenina.

Chrysanthemum Americanum, majus, perenne, floribus Solis foliis & floribus. Moris. hist. 3. p. 23. Pluk. phyt. t. 159. f. 2. Chrysanthemo de America, mayor, perenne, con las hojas y flores como las de la flor del Sol.

Cast. Heliantho de muchas flores.

Habita en la Virginia. ♀

Posee el *tallo* y *pedunculos* ásperos: las *hojas* entre de figura de corazon y aovadas: y los *cálices* floxamente apiñados con quarenta hasta cinquenta escamas.

HE-

570 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Tuber-
osus.

4. *HELIANTHUS foliis ovato-cordatis triplinerviis*. Jacq. hort. t. 161. Giseck. ic. fasc. 1. t. 19. Heliantho de hojas entre aovadas y de figura de corazon, con tres nervios unidos mas arriba de su base.

Helianthus radice tuberosa. Hort. cliff. 419. Heliantho con la raiz tuberosa.

Helenium Indicum, tuberosum. C. B. P. 277. Helenio de Indias, con la raiz tuberosa.

Chrysanthemum latifolium, Brasilianum. C. B. Prodr. 70. Chrysanthemo del Brasil, con hoja ancha.

Flos Solis Farnesianus. Col. ecphr. 2. p. 11. t. 13. Flor del Sol Farnesiana.

Corona Solis parvo flore, tuberosa radice. Tourn. p. 489. Corona del Sol, con la flor pequeña; y raiz tuberosa.

Cast. Heliantho tuberoso. vulgo: Patacas.

Habita en el Brasil. 2/

Las raices se comen asadas entre las cenizas y mezcladas con los guisados.

Deca-
peta-
lus.

5. *HELIANTHUS caule infernè lævi, foliis lanceolato-cordatis triplinerviis, radiis decapetalis, pedunculis scabris*. Mill. dict. n. 10. Heliantho con el tallo liso por debaxo; hojas entre lanceoladas y de figura de corazon, con tres nervios unidos mas arriba de su base; radios de diez petalos; y pedunculos ásperos.

Cast. Heliantho de diez petalos.

Habita en el Canadá. Kalm.

Es muy semejante al *Heliantho de muchas flores*. Tiene el tallo que apenas sube á la altura de un hombre y áspero; pero liso por debaxo: las hojas opuestas y por su base pestafiosas: el caliz con veinte escamas desparrahadas y erizadas.

Fron- 6. *HELIANTHUS calyc-* Heliantho con los cálices
dosus. *cibus squarrosis undulatis* desparramados, ondeados y
frondosis, radiis octopeta- frondosos; radios de ocho pe-
lis, foliis ovatis, caule in- talos; hojas aovadas; y tallo
fernè glabro. Amœn. acad. lampiño por debaxo.
4. p. 290.

Cast. Heliantho frondoso.

Habita en el Canadá.

Es semejante al *Heliantho* de diez petalos; y tiene el ta-
llo áspero por debaxo. *Syst. veg.* 650.

Stru- 7. *HELIANTHUS radice* Heliantho con la raíz fusi-
mosus. *fusiforme.* Hort. cliff. 420. forme.

Chrysanthemum Canaden- Chrysanthemo del Cana-
se, latifolium, elatius. Bocc. dá, mas levantado y con ho-
sic. 52. t. 27. f. 4. ja ancha.

Chrysanthemum Canaden- Chrysanthemo del Cana-
se, strumosum vulgo. Herm. dá, llamado vulgarmente es-
lugdb. 143. Moris. hist. 3. trumoso, ó de lamparones?
p. 23.

Cast. Heliantho estrumoso ó con hinchazones.

Habita en el Canadá.

Los que adquieran esta especie viva, podrán determinarla
por la estructura de la yerba.

Acaso es variedad del *Heliantho agigantado*? *Pluk.*
alm. 99.

Gigan- 8. *HELIANTHUS foliis* Heliantho con hojas alter-
teus. *alternis lanceolatis scabris* nas, lanceoladas, ásperas, y
basi ciliatis, caule stricto por su base pestañosas; tallo-
scabro. Mill. dict. n. 5. apretado y áspero.
Kniph. cent. 9. n. 45.

Chrysanthemum Virgi- Chrysanthemo de Virgi-
nianum, elatius, angustifo- nia, mas levantado, verde,
lium, viride. Moris. hist. 3. y de hoja angosta.
p. 24. sect. 6. t. 7. f. 66.

α *Chrysanthemum Virgi-* Chrysanthemo de Virgi-
nianum, elatius, angustifo- nia, mas levantado, de hoja
lium, caule hirsuto, viridi. angosta; tallo con pelo áspe-
Pluk. alm. 99. t. 159. f. 5. ro y verde. α

Cast.

572 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Heliantho agigantado.

Habita en la Virginia y en el Canadá. 24

Arroja el tallo de la altura de diez pies, verde y erizado, ó áspero: las *hojas* lanceoladas, aserradas, ásperas en ambas partes, alternas y con peciolo pestañoso: los *pedunculos* erizados: las *flores* con el radio, las mas veces, de veinte petalos hendidos en dos partes: las *dos hojas primeras de las ramas* opuestas, por lo que parece que las del tallo están adornadas de dos estipulas: y las *flores* que de noche se hallan mas inclinadas.

Altis-
simus.

9. HELIANTHUS *foliis alternis latiuscule lanceolatis scabris, petiolis ciliatis, caule stricto glabro.* Jacq. hort. t. 160. R. Heliantho con hojas alternas, algo anchas, lanceoladas y ásperas; peciolo pestañoso; tallo apretado y lampiño.

Chrysanthemum Virginianum, altissimum, puniceis caulibus. Moris. hist. 3. p. 24. sect. 6. t. 7. f. 67. Chrysanthemo de Virginia, muy alto, con tallos de color de flor de granado.

Cast. Heliantho altísimo.

Habita en Pensilvania. 24

Es muy semejante á la precedente especie, en la estructura y altitud; pero ésta tiene las *hojas* con tres nervios unidos mas arriba de su base, pecioladas, mas anchas, y casi entre aovadas y lanceoladas: el *tallo* no solamente todo liso, sino tambien de color que tira á purpúreo: los *cálices* menos abundantes de hojuelas y mas cortas: el *radio*, las mas veces, con diez y seis petalos: las *pajas* verdes; pero en la precedente negruzcas, por lo que en aquella el *disco* antes de abrirse se repara negro y en esta verde.

Lævis.

10. HELIANTHUS *foliis oppositis trinerviis lanceolatis serratis lævibus, caule pedunculisque glabris.* Gron. virg. 129. Heliantho de hojas opuestas, con tres nervios, lanceoladas, aserradas, lisas; tallo y pedunculos lampiños.

Cast. Heliantho liso.

Habita en la Virginia.

Arro-

Arroja el tallo de la altura de un hombre, lampiño, algo obscuro y empañado como de un rocío de color garzo: los peciolo lisos: las *hojas del tallo* opuestas, lanceoladas, aserradas y mas enteras por su base, de tres nervios y con el peciolo corto: las de las *ramas* alternas, las mas veces enterisimas y muy lampiñas: los *pedunculos* lisos: las *hojuelas del caliz* alesnadas, lisas, extendidas y poco mas cortas que el disco: y el *radio*, las mas veces, con trece semiflosculos.

An-
gu
sti-
folius. 11. HELIANTHUS *foliis* X Heliantho con hojas alter-
alternis, linearibus. Gron. nas y lineares.
virg. 129. Syst. veg. 650.

Flos Solis, Marianus, foliis alternis, angustissimis, scabris. Pet. mus, 103. X Flor del Sol, de la Isla Mariana, con hojas alternas, muy angostas y ásperas.

Cast. Heliantho de hoja angosta.

Habita en la Virginia.

Produce el tallo de color que tira á purpúreo y del largo de pie y medio: las *hojas* lineares, puntiagudas, ásperas, revueltas por su margen y por debaxo palidas: el disco de la corola de color obscuro: y los *petalos del radio* de color amarillo subido, y escotados.

Diva-
ricatus 12. HELIANTHUS *foliis* X Heliantho de hojas opues-
oppositis sessilibus ovato- tas, sentadas, entre aovadas
oblongis trinerviis, panicu- y oblongas, con tres ner-
la dichotoma. Mill. dict. vios; y panoja ahorquilla-
n. 6. da.

Chrysanthemum Virgi- Chrysanthemo de Virgi-
nianum, repens, foliis as- nia, rastrero, con hojas ás-
peris, binatim sessilibus, peras, sentadas de dos en dos
acuminatis. Moris. hist. 3. y puntiagudas.
p. 22. sect. 6. t. 7. f. 66.
mala.

Cast. Heliantho desparramado.

Habita en la America septentrional. 24

Arroja el tallo casi de la altura de un hombre, muy liso por arriba, con pelos ásperos esparcidos y de color purpúreo, y como empañado de un rocío de color garzo: las

flo-

574 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

flores en panoja , con ramas divididas en dos ó tres partes , de color amarillo-roxo , con pedunculos algo ásperos y el intermedio sencillo.

Atro-
rubens 13. *HELIANTHUS foliis oppositis spathulatis crenatis triplinerviis scabris, squamis calycinis erectis longitudine disci.* Gron. Heliantho de hojas opuestas , en forma de espatula , recortadas , con tres nervios unidos mas arriba de su base y ásperas; escamas del caliz derechas y del largo del disco.

Corona Solis minor, disco atro-rubente. Dill. elth. 111. t. 94. f. 110. Corona del Sol , menor , con el disco entre negro y roxo.

Corona Solis, Caroliniana, parvis floribus, folio triner- vi, amplo, aspero, pediculo alato. Mart. cent. 20. t. 20. Corona del Sol , de la Carolina , con flores pequeñas ; hoja de tres nervios , ancha, áspera y su piececito alado.

Cast. Heliantho entre negro y roxo.

Habita en la Virginia y en la Carolina. ♂

Su *estatura y traza* son como las de la *Rudbeckia* ; pero el *vilano de las semillas* tiene dos aristas.

El *caliz* se halla con una ú otra escama mas larga que las demas.

1167. Cénero RUDBECKIA. * Obeliscotheca. Vaill.

A. G. 1720. f. 44. *Dill. elth.* 218.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun con dos órdenes de *escamas* planas, algo agudas , cortas y seis en cada orden.

COR. compuesta radiada ; con las *corolillas* hermafroditas, numerosas , en el disco cónico ; y doce , poco mas ó menos , femeninas , muy largas , en el radio.

Propia de la hermafrodita : entre tubulosa y en forma de embudo ; con el *borde* hendido en cinco dientes.

De la femenina : ligulada , lanceolada , con dos ó tres dientes , plana y pendula.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco , capilares y

y muy cortos : con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : *germen* de quatro lados : *estilo* filiforme y de la longitud de la corolilla : con el *estigma* dividido en tres partes y revuelto.

En las femeninas : *germen* muy pequeño : sin *estilo* ni *estigma*.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : oblongas : con *vilano* formado de un ribete membranoso y de quatro dientes.

En las femeninas : ninguna.

RECEPT. cónico , mas largo que el *caliz* comun : con *pajas* de la longitud de las semillas , derechas , entre acanaladas y cóncavas , y que se caen facilmente.

E S P E C I E S .

Laciniata. 1. *RUDBECKIA foliis compositis laciniatis.* Hort. cliff. 430. Gron. virg. 129. Rudbeckia con hojas compuestas y laciniadas.

Chrysanthemum Americanum, perenne, foliis divisis, dilutius virentibus, majus. Moris. hist. 3. p. 22. sect. 6. t. 6. f. 53. & 54. Chrysanthemo de America, mayor, perenne, con las hojas divididas y de color verde mas claro.

Doronicum Americanum, laciniato folio. C. B. P. 516. Doronico de America, con hoja laciniada.

Aconitum helianthemum, Canadense. Cor. canad. 178. t. 179. Aconito helianthemo, del Canadá.

Cast. Rudbeckia laciniada.

Habita en la Virginia y en el Canadá. 2

Triloba. 2. *RUDBECKIA foliis spathulatis, inferioribus trilobis, superioribus indivisis.* Hort. ups. 269. Rudbeckia con hojas en forma de espatula, las inferiores hendidas en tres lóbulos, y las superiores indivisas.

Rudbeckia foliis trilobis. Gron. virg. 130. Rudbeckia con hojas hendidas en tres lóbulos.

Chry-

576 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Chrysanthemum cannabium, *Virginianum*, *hirsutum*, *disco magno*, *petalis aureis radiato*. Pluk. alm. 100. t. 22. f. 2. Chrysanthemo de Virginia, como cañamo, con pelo áspero; y el disco grande, radiado con petalos de color de oro.

Chrysanthemum annuum, *majus*, *Virginianum*, *foliis laciniatis* & *hirsutis*, *umbone nigricante*. Moris. hist. 3. p. 19. n. 37. Chrysanthemo annuo, mayor, de Virginia, de hojas laciniadas, con pelo áspero; y el disco de la flor negruzco.

Cast. Rudbeckia de tres lóbulos.

Habita en la Virginia. ♂

Echa el tallo en panoja y con muchas flores.

Hirta. 3. RUDBECKIA *foliis indivisis spathulato-ovatis triplinerviis*, *radii petalis emarginatis*. Gron. virg. 131. Knorr. del. 1. t. F. 1. Rudbekia con hojas indivisas, entre de figura de espatula y aovadas, de tres nervios unidos mas arriba de la base; y petalos del radio escotados.

Obeliscotheca integrifolia, *radio aureo*, *umbone atro-rubente*. Dill. elth. 295. t. 218. f. 285. Obeliscotheca con hoja entera; radio de color de oro; y disco entre negro y purpúreo.

Chrysanthemum Helenii, *folio*, *umbone floris grandiusculo prominente*. Pluk. alm. 99. t. 242. f. 2. Moris. hist. 3. p. 23. Rai. Suppl. p. 210. Chrysanthemo con hoja como la del Helenio; disco de la flor grandecito y que sobresale.

Cast. Rudbeckia erizada.

Habita en la Virginia y en el Canadá. ☉ 24

Tiene el radio amarillo: y el tallo sencillo, con una ú otra flor.

Se halla con los tallitos rígidos y casi del largo de dos pies: y varía con las hojas escurridas. Gov. hort. 456.

Pur-
purea.

4. *RUDBECKIA foliis lanceolato-ovatis alternis indivisis, radii petalis bifidis.* Gron. virg. 130. Mill. dict. n. 2. ic. t. 224. f. 1. Rudbeckia con hojas entre lanceoladas y aovadas, alternas, indivisas; y petalos del radio hendidos en dos partes.

Chrysanthemum Americanum, Doronici folio, flore Persici coloris, umbone magno, prominente, ex atro purpureo viridi & aureo fulgente. Pluk. alm. 99. t. 21. f. 1. Catesb. car. 2. p. 59. t. 59. Chrysanthemo de America, con hoja como la del Doronico; flor de color de Persico; con el disco grande, que sobresale, de color entre negro y purpúreo, verde y de oro resplandeciente.

Dracunculus Virginianus, latifolius, petalis florum longissimis, purpurascens. Moris. hist. 3. p. 42. sect. 6. t. 9. f. 1. Rai. Suppl. p. 218. Dragoncillo de Virginia, con hoja ancha; petalos de las flores larguissimos, y de color que tira á purpúreo.

Cast. Rudbeckia purpúrea.

Habita en la Virginia y en la Carolina.

Posee el radio de color purpúreo y que cuelga.

Oppo-
sita-
lia.

5. *RUDBECKIA foliis oppositis lanceolato-ovatis serratis, radii petalis bifidis.* Gron. virg. 131. Rudbeckia con hojas opuestas, entre lanceoladas y aovadas, aserradas; y petalos del radio hendidos en dos partes.

Cast. Rudbeckia con hojas opuestas.

Habita en la Virginia.

Tiene el caliz cortísimo, con sus hojuelas aovadas: el radio de color amarillo-roxo y larguísimo: el disco convexo y de color tambien amarillo-roxo.

Angu-
stifolia.

6. *RUDBECKIA foliis oppositis linearibus, integerrimis.* Rudbeckia con hojas opuestas, lineares y enterisimas.

578 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Coreopsis foliis lineari- ~~X~~ *Coreopsis* con hojas lineares y enterisimas.
bus, integerrimis. Gron. ~~X~~
 virg. 181. Mill. dict. n. 7. ~~X~~
 ic. t. 224. f. 2. ~~X~~

Cast. Rudbeckia de hoja angosta.

Habita en la Virginia. 24

Arroja la flor con el radio amarillo, largo y de doce petalos: las *escamas exteriores del caliz* alesnadas y extendidas; las *interiores* obtusas y apretadas: el *disco de la flor* entre negro y roxo; con las *corolillas* ventricosas en su base: y las *semillas* mochas ó sin arista.

1168. Género COREOPSIS. * Ceratocephaloides

Vaill. A. G. 1720.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun ó sencillo y casi apiñado, ó duplicado: el *exterior* las mas veces con ocho hojuelas toscas ó poco formadas y puestas en cerco; el *interior* con otras tantas, mayores, membranosas y de color.

COR. *compuesta* radiada; con numerosas *corolillas* hermafroditas, en el disco; y ocho femeninas, en el radio. *Propia* de la hermafrodita: tubulosa y con cinco dientes. De la femenina: ligulada, de quatro dientes, extendida y grande.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas: *germen* comprimido: *estilo* filiforme y de la longitud de los estambres: con el *estigma* hendido en dos partes, agudo y delgado.

En las femeninas: *germen* semejante al de las hermafroditas: sin *estilo* ni *estigma* alguno.

PERIC. ninguno: el *caliz* apenas mudado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: redondas, convexas por una parte, y por la otra cóncavas, con una eminencia transversal en su ápice y base, y ceñidas con un ribete membranoso que tiene dos astitas en su remate.

En las femeninas: ninguna.

RECEPT. pajoso.

ESPECIES.

Verticillata. 1. COREOPSIS foliis decompositis pinnatis, linearibus. Mill. dict. n. 3. Fabric. lineares. helmst. p. 142.

Cereopsis foliis verticillatis, linearibus, multifidis. Gron. virg. 131. Coreopsis con hojas verticiladas, lineares, y hendidas en muchas partes.

Ceratocephalus Delphinii foliis. Vaill. act. 1720, Ehret. pict. t. 9. f. 1. Ceratocephalo (planta de cabezuelas con asittas) con hojas como las del Delphinio.

Chrysanthemum Marianum, Scabiosae tenuissime divisis foliis, ad intervalla confertis. Pluk. mant. 48, t. 344. f. 4. Chrysanthemo de la Isla Mariana, con hojas como las de la Escabiosa, divididas muy delgadamente, y amontonadas á interválos.

Cast. Coreopsis verticilado.

Habita en la Virginia. ♂

Tiene el caliz como el de la Bidente; con su calicito de la base extendido: y las hojas las mas veces en verticilo.

Coronata. 2. COREOPSIS foliis pinnatis serratis lineatis glabris. Coreopsis con hojas pinnadas, aserradas, rayadas y lampiñas.

Ceratocephalus foliis pentapteris acutis, flore radiato. Vaill. act. 601. Ceratocephalo de hojas con cinco alas ú hojuelas, agudas; y flor radiada.

Bidens pentaphylla, flore radiato. Plum. spec. 10. ic. 53. f. 2. Bidente de cinco hojuelas, con la flor radiada.

Cast. Coreopsis coronada.

Habita en la Virginia. ☉

Es planta muy semejante á la Bidente frondosa; pero posee las flores como las del Coreopsis verticilada, con el radio grande, de ocho petalos, estriado y oval.

580 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Leu- 3. COREOPSIS foliis pin-
cantha natis serratis, radio florum
diversicolore. Amoen. acad.
4. p. 291.

Bidens Americana, trifolia, *Leucanthemi* flore. Tourn. p. 462.

Cast. Coreopsis de flor blanca.

Habita en America. ☉

La flor es radiada, con traza como la del *Leucanthemo*; y la planta tiene la traza como la de la precedente.

Posee las hojas de tres ó de cinco en rama, con sus hojuelas aovadas. Gov. hort. 457.

Chry- 4. COREOPSIS foliis ter-
santha natis ovato-oblongis serratis, radio florum concolore.

Bidens Americana, triphylla, *Angelicae* folio, flore radiato. Plum. spec. 10. ic. 53. f. 1. Tourn. p. 462.

Cast. Coreopsis con la flor de color de oro.

Habita en la America.

Es variedad de la antecedente.

Tri- 5. COREOPSIS foliis sub-
teris ternatis integerrimis. Gron. virg. 131.

Chrysanthemum Virginianum, folio acutius, lævi, trifoliato seu *Anagyridis* folio. Moris. hist. 3. p. 21. sect. 6. t. 3. f. 44. Rai. Suppl. p. 215.

Cast. Coreopsis de tres alas ó de tres hojuelas.

Habita en lugares sombríos y algo húmedos de la Virginia. ♀

Echa las mas *hojas* de tres en rama , y las mas veces tambien en el tallo casi pinnadas : el *caliz* como el del *Bidente* ; con el *calicito de la base* extendido.

Sube á la altura de un hombre. Tiene los *pedunculos* en-
crasados por arriba : y las *hojas de mas arriba* opuestas
y muy sencillas. Gov. hort. 457.

Alba. 6. COREOPSIS *foliis* Coreopsis de hojas casi de
subternatis cuneatis serratis. tres en rama , con las hojue-
las en forma de cuña y aser-
radas.

Coreopsis scandens , foliis serratis , ternato-pinnatis , receptaculo nudo . Brown. Coreopsis trepadora , con
jam. 321. en rama y pinnadas ; y re-
ceptaculo desnudo.

Chrysanthemum Americanum , Ciceris folio glabro , Chrysanthemo de Ameri-
Bellidis majoris flore. Herm. ca , con hoja como la del
par. 124. t. 124. *flore albo.* Garbanzo , lampiña ; y flor
Pluk. alm. 101. t. 160. f. 3. parecida á la de la Margari-
ta mayor.

Cast. Coreopsis blanca.

Habita en la Isla de Santa Cruz. 24

Rep- 7. COREOPSIS *foliis ser-* Coreopsis con hojas aser-
tans. *ratis ovatis , summis ternatis , caule repente.* Amoen. radas , aovadas ; las de mas
acad. 5. p. 407. arriba de tres en rama ; y
tallo rastrero.

Verbesina foliis inferioribus simplicibus , oppositis , Verbesina con las hojas
superioribus pinnato-ternatis. Brown. inferiores sencillas , opues-
jam. 319. tas , y las superiores entre
pinnadas y de tres en rama.

Chrysanthemum trifoliatum , scandens , flore luteo , Chrysanthemo trepador ,
semine longo , rostrato , bidente. Sloan. jam. 125. hist. con hojas de tres en rama ;
1. p. 261. t. 154. f. 2. 3. flor amarilla ; simiente larga
y con pico de dos dientes.

Cast. Coreopsis rastrera.

Habita en la America.

Es planta grande ; y posee el *caliz* como el del *Bidente* ;
con

582 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

con el calicito de la base extendido ; y las semillas con arista.

Auriculata. 8. COREOPSIS *foliis integerrimis ovatis, inferioribus ternatis*. Gron. virg. Coreopsis con hojas enterisimas, aovadas, y las inferiores de tres en rama.

131.

Chrysanthemum hirsutum, Virginianum, auriculato Dulcamaræ folio, octopetalon. Pluk. alm. 101. t. 83. f. 5. & t. 242. f. 4. Rai. Suppl. p. 212. Chrysanthemo de Virginia, con pelo áspero; hoja como la de la Dulcamara, con orejillas; y de ocho petalos.

Chrysanthemum Virginianum, trifoliatum, humilium, obtusioribus foliis hirsutis. Moris. hist. 3. p. 20. sect. 6. t. 3. f. 45. Chrysanthemo de Virginia, mas baxo, de hojas con pelo áspero, de tres en rama, y mas obtusas.

Cast. Coreopsis con orejillas.

Habita en la Virginia.

Lanceolata. 9. COREOPSIS *foliis lanceolatis integerrimis ciliatis*. Mill. dict. n. 2. Coreopsis con hojas lanceoladas, enterisimas y pestañosas.

Bidens Succisæ folio, radio amplo, laciniato. Dill. elth. 55. t. 48. f. 56. Bidente con hoja como la de la Succisa; radio ancho y laciniado.

Bidens Caroliniana, florum radiis latissimis, insigniter dentatis, semine alato per maturitatem convoluto. Mart. cent. 26. t. 26. Bidente de la Carolina, con los radios de las flores muy anchos, notablemente dentados; semilla alada y que madurandose se enrosca.

Cast. Coreopsis lanceolada.

Habita en la Carolina. ♂

Bidens. 10. COREOPSIS *foliis lanceolatis serratis oppositis amplexicaulibus*. Kniph. cent. 12. n. 34. Coreopsis con hojas lanceoladas, aserradas, opuestas y que abrazan el tallo.

Chry-

Chrysanthemum aquaticum, *bidens*, *folio non diviso*, *flore aureis petalis undique radiato*. Moris. hist. 3. p. 17. sect. 6. t. 5. f. 25. *Chrysanthemo aquatico*, de semilla con dos dientes; hoja indivisa; y flor radiada por todas partes con petalos de color de oro.

Eupatorium Cannabinum, *Chrysanthemum*. Barr. ic. 1209. *Eupatorio Cannabino*, con la flor de color de oro.

Cast. *Coreopsis bidente*.

Habita en los fosos de Europa y de Pensilvania. ☉

Segun Haller y otros autores, esta especie es variedad de *Bidente cabizbaxo*; pero si sus caracteres son constantes, debe permanecer en este género.

Alter-
nifolia.

11. *COREOPSIS foliis lanceolatis serratis alternis petiolatis decurrentibus*. *Coreopsis* de hojas lanceoladas, aserradas, alternas, con peciolo y escurridas. Hort. ups. 270. Jacq. hort. t. 110.

Chrysanthemum Virginianum, *alato caule*, *bidens*, *altissimum*, *folio aspero*, *flore minore serotino*. Moris. hist. 3. p. 25. sect. 6. t. 7. f. 75. & 76. *Chrysanthemo de Virginia*, muy alto, con la semilla de dos dientes; tallo alado; hoja áspera; flor mas pequeña y tardía.

Chrysanthemum Virginianum, *caule alato*, *ramosus*, *flore minore*. Pluk. alm. 100. t. 159. f. 3. *Chrysanthemo de Virginia*, ramoso, con el tallo alado; y flor mas pequeña.

Cast. *Coreopsis* de hojas alternas.

Habita en la Virginia y en el Canadá. ♀

Tiene las *hojas inferiores* de tres en tres, ó de quatro en quatro; y las *superiores* alternas y escurridas.

Excede á la altura de un hombre; y sus *flores* son casi racimosas.

Baccifera.

12. *COREOPSIS foliis ovatis serratis, seminibus bacciformibus*. Suppl. p. 380. *Coreopsis* con hojas aovadas, aserradas; y semillas en forma de baya.

Cast.

584 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Coreopsis de bayas.

Habita en Surinam. *Dalberg.*

Arroja el tallo del largo de ocho pies , herbáceo y derecho : las *hojas* opuestas , con peciolo , aovadas , aserradas y de tres nervios : las mas veces tres *flores* en los remates , con pedunculo , y mas pequeñas que las de la *Rudbeckia* : el *caliz* con diez y seis hojuelas , anchas y alisnadas , encorvadas ácia atrás y de la longitud del disco : el *radio de la corola* neutro , amarillo , con tres dientes y mas largo que el disco : el *disco* flosculoso y hermafrodito : las *bayas* desnudas , algo globosas , con una semilla de quatro lados , negra y sin *vilano* : el *receptaculo* pajoso y convexo. El *caliz* pasa con el fruto á ser globoso , y se asemeja en la figura al fruto de la *Zarza-mora* , con sus granitos reducidos á baya y globosos.

1169. Género OSMITES. † Bellidiastrum.

Vaill. A. G. 1720.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun giboso y apiñado ; con las *hojuelas* de mas adentro aumentadas en su ápice ó con una escamita.

COR. compuesta radiada ; con muchas *corolillas* hermafroditas , en el disco ; y femeninas , en el radio.

Propia de la hermafrodita : tubulosa , y hendida en cinco partes.

De la femenina : ligulada y entera.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco , cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : *germen* oblongo : *estilo* filiforme , y de la longitud de la corolilla : con el *estigma* hendido en dos partes.

En las femeninas : *germen* mas pequeño : *estilo* filiforme , y de la longitud de la corolilla : con el *estigma* desfigurado.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : oblongas y casi sin *vilano* ; ó ribeteadas con el *vilano* desfigurado y casi pajoso.

En

En las femeninas: rudimentos de ellas que las mas veces abortan.

RECEPT. pajoso.

OBS. Los cálices de la Osmite Falsa-Belis y de la Calicina son escariosos. R.

ESPECIES.

- Bel- 1. OSMITES *foliis linea-* X Osmite con hojas linea-
lidia- *ribus tomentosis, calycibus* X res, tomentosas; y calices
trum. *scariosis.* X escariosos.
Anthemis suffruticosa, X Anthemis sufruticosa, con
foliis linearibus triquetris X hojas lineares, de tres caras,
tomentosis indivisis, flori- X tomentosas, indivisas; y flo-
bus sessilibus. Amœn. acad. X res sentadas.
4. p. 330.
Bellis frutescens, Afri- X Belis frutescente, Africa-
cana, camphorata. Rai. Sup- X na, con olor de alcanfor.
pl. p. 221.
Bellidiastrum subhirsu- X Falsa-Belis con algun pe-
tum, Linifolium. Vaill. act. X lo áspero; y hoja como la
588. X del Lino.

Cast. Osmite Falsa-Belis.

Habita en Etiopia. \hbar

- Cam- 2. OSMITES *foliis lan-* X Osmite de hojas lanceola-
phori- *ceolatis subserratis basi* X das, algo aserradas, y con
na. *dentatis.* Amœn. acad. 6. X dientes en su base.
afr. 78.
Bellis camphorifera, Afri- X Belis de Africa, aquatica
cana, aquatica, flore albo. X que lleva alcanfor, con la
Seb. mus. 1. p. 143. t. 90. X flor blanca.
f. 2.
* *Anthemis (leucantha) cau-* X Anthemis (de flor blanca)
le suffruticoso, foliis sub- X con el tallo sufruticoso; ho-
lanceolatis dentatis acutis X jas casi lanceoladas, con
indivisis. Spec. pl. ed. 3. p. X dientes, agudas, é indivi-
2161. Amœn. acad. 6. afr. X sas. α
75. X

Cast. Osmite alcanforina.

Ha-

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Echa los tallos muy sencillos y de una flor con pedunculo: las *hojas* lanceoladas, como las del *Chrysanthemo leucanthemo*, entre dentadas y aserradas, desnudas y gradualmente mas pequeñas ácia la sumidad.

Asteriscoides.

3. OSMITES *foliis lanceolatis punctatis, calycibus foliosis*. Amoen. acad. 6. foliosos. afr. 79. Berg. cap. 305.

Leucanthemum fruticosum, foliis crassis. Burm. con hojas crasas. afr. 161. t. 58. f. 1.

Bellis frutescens, Africana, camphorata. Rai. Suppl. p. 221. Belis frutescente, Africana, con olor de alcanfor.

Bellis aquatica, camphorata, umbellata, frutescens. Seb. mus. 1. t. 16. f. 4. Belis frutescente, aquatica, alcanforada, con flores en umbela.

Cast. Osmite como Asterisco.

Habita en lugares húmedos del Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Tiene el tallo fruticoso, craso y con cicatrices: las *hojas* lineares y aserradas por su ápice.

Calicina.

4. OSMITES *foliis lanceolatis nudis, calycibus scariosis*. Suppl. p. 380. Osmite con hojas lanceoladas, desnudas; y cálices escariosos.

Cast. Osmite calicina.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.* \hbar

Produce el tallo fruticoso, derecho y prolifero, sin ser encrasado; con las *ramas* un poco vellosas: las *hojas* esparcidas ó sin orden, derechas, angostas, lanceoladas, desnudas, ó algo vellosas, estriadas y por debaxo nerviosas: las *flores* terminales, solitarias y sentadas: el *caliz* escarioso, con las escamas interiores lanceoladas y de la longitud del disco de la corola; de suerte que parece radiado: y la *corola* amarilla.

1170. Género GORTERIA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun de una pieza y apinado ; con *escamas* espinosas , y las interiores gradualmente mas largas , rectas , setáceas y rígidas.

COR. *compuesta* radiada ; con muchas *corolillas* hermafroditas , en el disco ; y femeninas mas claras , en el radio.

Propia de la hermafrodita : en forma de embudo y hendida en cinco partes.

De la femenina : ligulada y lanceolada.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco y cortos ; con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditas : *germen* vellosa : *estilo* filiforme , del largo de la corolilla : con el *estigma* hendido en dos partes.

En las femeninas : *germen* desfigurado : y sin *estilo* ni *estigma*.

PERIC. el *caliz* caedizo y sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : casi redondas ; con el *vilano* peloso.

En las femeninas : ninguna.

RECEPT. desnudo.

ESPECIES.

Personada

1. GORTERIA *foliis lanceolatis integris sinuatis-que , caule erecto , floribus pedunculatis.* Berg. cap. 300. Gorteria con hojas lanceoladas , enteras y sinuosas ; tallo derecho ; y flores pedunculadas.

Carduus Æthiopicus , pusillus , Pilosellæ foliis , incanis , hispidis , Personæ capitulis. Pluk. phyt. t. 273. f. 6. Cardo de Etiopia , muy pequeño , con hojas como las de la Pelosilla , blanquecinas , erizadas ; y cabezuelas como las de la Personada.

Jacea minor , Hieracii folis , capite spinoso , Hispanica. Barr. ic. t. 160. R. Yacea menor , de España , con hoja como la del Hieracio ; y cabezuela espinosa.

Cast. Gorteria personada.

Ha-

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Las *semillas* arrojan la raíz por el caliz que se cae con ellas ; por lo que este se halla en la base de la misma raíz. Echa los *tallos* del largo de un xeme, poco ramosos, algo rollizos y pelosos : las *hojas* alternas , angostas, lanceoladas , sin peciolo , erizadas y con tomento blanco por debaxo ; y las mayores las mas veces con dos hendeduras profundas en ambos lados : los *cálices* terminales , aovados , de una pieza , apifiados , con escamas erizadas y terminadas en punta rígida ; cuyas puntas interiores son gradualmente mas largas , rectas , setáceas , rígidas y que apenas hieren : el *radio* de color amarillo ; pero cerúleo en la base y en su envés.

Ri-
gens.

2. GORTERIA *scapis* X Gorteria con escapos de
unifloris , *foliis lanceolatis* X una flor ; hojas lanceoladas,
pinnatifidis , *caule depresso* . X hendidas al través ; y tallo
Amoen. acad. 6. afr. 80. X deprimido.

Schreb. in nov. act. ups. 1. X

p. 89. Berg. cap. 304. X

Arctotis ramis decurren- X Arctotis con ramas escur-
tibus , *foliis lineari-lanceo-* X ridas ; hojas entre lineares y
latis rigidis , *subtus argen-* X lanceoladas , rígidas , y por
teis . Mill. ic. t. 49. X debaxo de color de plata.

Arctotheca foliis rigidis , X Arctoteca con hojas rígi-
leviter dissectis . Vaill. act. X das y ligeramente cortadas.
1728. n. 9. X

Anemonospermus foliis X Planta con semilla de
rigidis , *tenuiter divisis* , X Anemone , de hojas rígidas,
subtus incanis , *flore aureo* X delgadamente divididas, blan-
umbone nigricante . Rai. X quecinas por debaxo ; flor
Suppl. p. 182. X de color de oro y su disco
X negruzco.

Cast. Gorteria yerta.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Squar-
rosa.

3. GORTERIA *foliis lanceolatis decurrentibus adnatis ciliato-spinulosis floribus sessilibus*. Amœn. acad. 6. afr. 77. Berg. cap. 301. Gorteria de hojas lanceoladas, escurridas, pegadas ó apretadas al tallo, con espinitas pestañosas; y flores sentadas.

Xeranthemum caulibus frutescentibus provolutis, foliis ciliatis hirsutis. Spec. pl. 1. p. 859. Xeranthemo con los tallos frutescentes, muy revueltos; hojas pestañosas y con pelo áspero.

Aster Africanus, frutescens, splendentibus parvis reflexis foliis. Comm. hort. 2. p. 55. t. 28. Aster de Africa, frutescente, con hojas relucientes, pequeñas y redobladas.

Cast. Gorteria desparramada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Arroja el tallo fruticoso, prolifero y vellosos: las ramas que salen de la base del tallo: las hojas casi aglutinadas ó pegadas por su base, encorvadas ácia atrás, apiñadas ácia abaxo, espinosas por su ápice, y pestañosas con tres ó quatro espinitas en ambos lados. El caliz terminal, sentado, desparramado, con sus hojuelas encorvadas ácia atrás y semejantes á las del tallo: y el radio de la flor amarillo.

Setosa

4. GORTERIA *foliis lanceolatis decurrentibus adnatis ciliato-spinosis, floribus terminalibus pedunculatis*. Gorteria de hojas lanceoladas, escurridas, pegadas al tallo, con espinas pestañosas; flores terminales y pedunculadas.

Cast. Gorteria cerdosa.

Habita en las peñas marítimas del Cabo de Buena-esperanza. *h*

Tiene el tallo fruticoso; con las ramas alternas: las hojas lanceoladas, aglutinadas ó pegadas por su base, encorvadas ácia atrás, apartadas, con tres espinas setáceas en ambos lados y una sola en el ápice: las flores que terminan las ramas, con pedunculo y amarillas; y el radio de color de violeta por debaxo.

Cilia-
ris.

5. GORTERIA *foliis imbricatis bifariam ciliatis*, Gorteria de hojas apifiadas, con dos órdenes de pesti-
ciliis exterioribus spinaque terminali reflexis. tas; las pestañas exte-
res, y la espina terminal re-
dobladadas.

Carlina foliis imbricatis, oblongis, reticulatis & in aculeum aduncum desinen- Carlina de hojas apifiadas,
tibus. Burm. afr. 151. t. 54. aguijoncito ganchoso.
f. 1.

Aculeosa Æthiopica, Atractylidis facie. Pluk. chos aguijones, y con traza
amalt. 51. t. 354. f. 3. como la del Atractil.

Cast. Gorteria pestañosa.

Habita en Etiopia. *h*

Las hojas cubren al tallo con un artificio admirable de la naturaleza.

Aste-
roides.

6. GORTERIA *foliis ellipticis, serraturis setaceis.* Gorteria de hojas elipti-
cas, con aserraduras setá-
ceas,
Suppl. p. 381.

Cast. Gorteria como Aster.

Hubita en el Cabo de Buena-esperanza. Jacq. *h*

Es arbusto con ramas tomentosas y blancas. Posee las ho-
jas elípticas, como las del *Aligustre*, agudas, alter-
nas, pecioladas, lisas, con tomento cano por debaxo,
y seis ó siete aserraduras apartadas y setáceas en su
ápice: las flores terminales, casi solitarias, con el pe-
dunculo mas largo que ellas: el caliz de muchas ho-
juelas puestas en dos órdenes, y el interior poco mas
pequeño, lanceoladas, espinosas por su ápice, sin aser-
raduras, pero pestañas con cinco ó seis ceidas en am-
bos lados, algo rígidas y mucho mas cortas que la mis-
ma hojuela: la corola amarilla: el radio de muchos pe-
talos y al doble mas largos que el caliz: el disco convexo,
con las lacinas de los flosculos lineares: las semillas
vellosas: y la corona ó vilano de ellas estrellado con
muchas hojuelas.

Her- 7. GORTERIA *foliis cau-* X Gorteria con las hojas del
 bacea. *linis amplexicaulibus cilia-* X tallo amplexicaules y pesta-
tis, radicalibus inermibus X ñosas; las radicales inermes
subtus villosis. Suppl. p. X y por debaxo vellosas.
 381. X

Cast. Gorteria herbácea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Bladh.* 24

Echa el tallo casi del largo de un pie, herbáceo, liso y algo ramoso: las *hojas radicales* anchas, lanceoladas, con peciolo, enterisimas, algo obtusas, sin espinas y vellosas por debaxo: las del tallo alternas, amplexicaules, de figura de corazon, agudas y con espinitas pestafiosas; y las *superiores* gradualmente mas cortas: las *flores* terminales y sentadas: el *caliz* parecido al de la *Alcachofa*; pero apenas mas grande que una ciruela, apiñado, liso por su margen, espinoso en su ápice y recto.

His- 8. GORTERIA *foliis* X Gorteria de hojas oblon-
 pida. *oblongis ciliato-spinosis* X gas, con espinas pestafiosas,
erectis glabris, calycibus X derechas, lampiñas; cálices
integris spina terminatis. X enteros y terminados en una
 Suppl. p. 381. X espina.

Cast. Gorteria erizada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.* 7

Es planta fruticosa y grande.

Spi- 9. GORTERIA *foliis* X Gorteria de hojas oblon-
 nosa. *oblongis sessilibus dentato-* X gas, sentadas, con dientes
spinosis patentibus glabris, X espinosos, extendidas y lam-
calycibus ciliato-spinosis X piñas; cálices con espinas
floribus erectis. Suppl. p. 381. X pestafiosas; y flores dere-
 X chas.

Cast. Gorteria espinosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Cer- 10. *GORTERIA foliis* X Gorteria de hojas oblon-
nua. *oblongis amplexicaulibus* X gas , amplexicaules , con
dentato spinosis patentibus X dientes espinosos , extendi-
glabris , calycibus ciliato- X das y lampiñas ; cálices en-
serratis , floribus cernuis. X tre pestañosos y aserrados ;
Suppl. p. 382. X y flores cabizbaxas.

Cast. Gorteria cabizbaxa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

La base del caliz es singular quando las semillas están maduras ; porque se parece al fruto del *Medicago*.

Uoi- 11. *GORTERIA caulibus* X Gorteria con los tallos de
flora. *unifloris depressis , foliis* X una flor , y deprimidos ; ho-
lanceolatis indivisis subius X jas lanceoladas , indivisas y
tomentosis. Suppl. p. 382. X por debaxo tomentosas.

Cast. Gorteria de una flor.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Doñ. Montin.*

Su traza es como la de la *Gorteria yerta* ; y acaso es- ta especie es variedad de ella. Echa los tallos del largo de un xeme , sencillos , herbáceos , tendidos y foliosos por todas partes : las hojas alternas , sin peciolo , lanceoladas , enteras , enterisimas y por debaxo con tomento de color de nieve : el *pedunculo* terminal , mas largo que las hojas y de una flor ; con el *radio* amarillo.

Bar- 12. *GORTERIA foliis el-* X Gorteria de hojas entre
bata. *liptico-lanceolatis dentato* X elípticas y lanceoladas , con
aristatis , calycibus pedun- X dientes con arista ; cálices
culatis ciliato-setaceis. Sup- X pedunculados y con cerdas
pl. p. 382. X pestañosas.

Cast. Gorteria barbada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.* 24

Arroja los tallos difusos , sencillos y con tomento blanco : las hojas opuestas , ó alternas , sin peciolo , agudas , lisas , rayadas , con quatro ó cinco dientes con arista puestos en cada lado de su remate , y con tomento blanco por debaxo : el *pedunculo* terminal , larguísimo , sin hojuelas , de una flor , y que se desnuda del tomento blan-

blanco : el *orden exterior de las hojuelas del caliz* de la figura de las hojas ; y el *interior* de color , mas copioso , mas angosto , que remata en cerdas mas abundantes y al doble mas largas que la flor.

1171. Género ZOEGEA.

CHAR. GEN. NAT.

CAL. común aovado y apiñado ; con *escamas lanceoladas* y *pestañosas* ; las *de mas adentro* escariosas , lanceoladas y mas largas.

COR. *compuesta radiada* ; con muchas *corolillas* hermafroditas , en el disco ; y mas pocas femeninas , en el radio.

Propia de la hermafrodita : de un petalo ; con el *tubo* filiforme ; *borde* partido en cinco lacinias , lanceoladas y derechas.

De la femenina : de un petalo , ligulada , plana y casi con cinco dientes.

ESTAMB. en las hermafroditas : *filamentos* cinco y cortos : con la *antera* cilindrica.

PIST. en las hermafroditas : *germen* corto : *estilo* capilar , larguísimo y derecho : con el *estigma* corto y hendido en dos partes.

En las femeninas : *germen* corto : sin *estigma* ni *estilo*.

PERIC. ninguno : el *caliz* cerrado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas : con el *vilano* setáceo.

En las femeninas : ninguna.

RECEPT. setáceo.

Obs. Tiene mucha afinidad con el género *Centaurea* ; pero el radio de la corola es plano.

ESPECIES.

- Lep. 1. ZOEGEA *foliis oblongis*, calyce *hirto campanulato*. Suppl. p. 383. Zoegea de hojas oblongas; caliz con pelo áspero, y en forma de campana.
Lep. *Zoegea lept aurea*. Syst. pl. 895. Zoegea lept aurea.

TOM. VI.

Pp

Cast.

594 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. *Zoegea leptayrea*.

Habita en Egipto? Fue remitida á Linneo por el Doctor Zoega desde el Jardin de Haffnia.

Produce el tallo difuso, algo áspero, ramoso y del largo de un palmo: las hojas alternas, lanceoladas, apartadas, sin peciolo, enterisimas y ásperas: los pedunculos alargados, desnudos y de una flor: ésta como la de la *Centaurea*; pero con el radio ligulado: el caliz con pestañas de color de ladrillo: y la corola como la de la *Calendula* de color amarillo-roxo, ó de la *Centaurea moscada*.

Vease la *Centaurea* de Gmel. it. 1. p. 126. t. 20.

Ca-
pensis. **2. ZOEGEA** *foliis lineari-ribus, calyce glabro, basi gibbo*. Suppl. p. 382. *Zoegea* con hojas lineares; caliz lampiño y por su base giboso.

Cast. *Zoegea* del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. ☉

Tiene el tallo ramoso por arriba y por debaxo: las hojas alternas, lineares y algo vellosas: las flores terminales, solitarias y con pedunculo: el caliz aovado, apiñado, liso y amarillo: la corola radiada y amarilla: el disco pequeño; con el radio lanceolado y de la longitud del caliz: las semillas oblongas, y coronadas de cerditas cortisimas: y el receptaculo pajoso.

Parece que esta especie (si exceptuamos el radio) corresponde al género *Chrysocoma*.

1172. Género CENTAUREA. * Centaurium majus
 Tourn. t. 256. Jacea Tourn. t. 254. Dill. gen. 13.
 Cyanus Tourn. t. 254. Vaill. Calcitrapa Vaill.
 1718. Calcitrapoides Vaill. Rhaponticum Vaill.
 Rhaponticoides Vaill. Jacea Vaill.
 Amberboi Vaill. Crocodilium Vaill.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun casi redondo y apifinado; con *escamas* las mas veces terminadas variamente.

COR. *compuesta* flosculosa y disforme; con muchas *corolillas* hermafroditas, en el disco; y mas pocas femeninas, mayores y laxas, en el radio.

Propia de la hermafrodita: de un *petalo*; con el *tubo* filiforme; *borde* ventricosos, oblongo, derecho, y terminado en cinco lacinias, lineares y derechas.

De la femenina: de un *petalo*, en forma de embudo; con el *tubo* delgado, gradualmente ensanchado, encorvado ácia atrás; y el *borde* oblongo, obliquo y desigualmente dividido.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, capilares y cortísimos; con la *antera* cilíndrica, tubulosa y del largo de la corolilla.

PIST. en las hermafroditas: *germen* pequeño: *estilo* filiforme y de la longitud de los estambres: con el *estigma* muy obtuso con puntita, que sobresale (y en muchas especies hendido en dos partes).

En las femeninas: *germen* muy pequeño: *estilo* apenas alguno: y sin *estigma*.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: solitarias; con el *vilano* en las mas especies plumoso, ó peloso.
 En las femeninas: ninguna.

RECEPT. setáceo.

OBS. La Calcitrapa de Vaill. posee el caliz con aguijoncitos solitarios, rectos y grandes: y las semillas desnudas, ó coronadas.

596 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

La Calcitrapoide de V. tiene el caliz con aguijones amontonados y pequeños.

El Rhapontico de V. echa el caliz con membranas escariosas y enteras.

El Rhapenticoide de V. arroja el caliz con escamas lanceoladas y puntiagudas.

El Amberboi de V. lleva el caliz con escamas obtusas y muy sencillas.

La Yacea de V. produce el caliz con escamas pestañosas : y las semillas con el vilano setáceo.

T el Cocodrillo de V. echa el caliz de escamas con aguijones : y las semillas con el vilano plumoso.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

CENTAURIUM MAJUS. p. 449.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes , sentados en el embrion , y comprendidos en el caliz escamoso y sin aguijones : y el embrion pasa á semilla adornada de vilano. A estas notas se ha de añadir la notable magnitud de la flor , por la qual se diferencia de la Yacea.

JACEA. p. 443.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos hendidos en muchas partes , sentados en el embrion , y comprendidos en el caliz escamoso y sin aguijones : y el embrion pasa á semilla adornada de vilano.

CRANUS. p. 445.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos desemejantes. Los unos que ocupan el centro de la flor son mas pequeños que los demas y se dividen en lacinias iguales ; pero los otros puestos en la circunferencia son mucho mayores , mas manifestos y como divididos en dos labios. Unos y otros están sentados en el embrion , comprendidos en el caliz escamoso y sin aguijones : y el embrion pasa á semilla adornada de vilano.

ESPECIES LLAMADAS YACEA, CON LOS CALICES
LISOS E INERMES.

- Cru-
pina. 1. *CENTAUREA calyci-* X Centaurea de cálices iner-
bus inermibus, squamis lan- X mes, con escamas lanceola-
ceolatis, foliis pinnatis ser- X das; hojas pinnadas y aser-
ratis. Syst. veg. 65. X radas.
- Centaurea calycibus iner-* X Centaurea de cálices iner-
mibus, squamis lineari-su- X mes, con escamas entre li-
bulatis, foliis pinnatis ser- X neares y alesnadas; hojas
ratis. Hort. cliff. 420. Spec. X pinnadas y aserradas.
- pl. 3. p. 1285.
- Serratula foliis radicali-* X Serratula de hojas radica-
bus petiolatis, ovatis, cau- X les con peciolo, y aovadas;
linis pinnatis, linearibus, X las del tallo pinnadas, linea-
denticulatis, ciliatis. Hall. X res, con dientecitos y pesta-
helv. n. 197. X fiasas.
- Chondrilla foliis lacinia-* X Chôndrila con hojas laci-
tis, serratis, purpurascen- X niadas, aserradas; y flor de
te flore. C. B. P. 130. X color que tira á purpúreo.
- Senecio-Carduus Apulus.* X Senecio-Cardo de Pulla.
- Col. ecphr. 1. p. 32. t. 34.
- Yacea annua, foliis laci-* X Yacea annua, con hojas
niatis, serratis, purpuras- X laciniadas, aserradas; y flor
cente flore. Tourn. p. 444. X de color que tira á purpúreo.
- Chondrilla purpurascens,* X Chôndrila purpurascente,
tenuifolia, capite Yaceæ, X con hoja delgada; cabezuela
semine Cardui. Barr. ic. X como la de la Yacea; y se-
1136. X milla parecida á la del Car-
do.

Cast. Centaurea crupina.

Habita en los cerros de Toscana, de Narbona y de Orien-
te: en el Real Sitio de Aranjuez, en la serrania de
Cuenca, en la Mancha, Aragon, Cataluña y en otras
partes de España. ☉

Tiene las *hojuelas* ásperas, y las de mas abaxo encorva-
das ácia atrás: tres *corolillas* en el disco y cinco en el
radio, hendidas en quatro partes; y las mas veces una
ó dos *semillas* en cada flor.

598 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

El tallo estriado, de la altura de tres pies y casi sencillisimo: las *hojuelas* lineares, ásperas y enterisimas: los *cálices* aovados, agudos, con escamas de color que tira á purpúreo por su ápice y muy lampiñas: y el *vilano de las semillas* negro y rígido. *Gov. hort.* 459.

Mos-
chata.

2. *CENTAUREA calycibus inermibus subrotundis glabris, squamis ovatis, foliis lyrato-dentatis.* Hort. cliff. 421. Knorr. del. 2. t. C. Centaurea de cálices inermes, casi redondos y lampiños, con las escamas aovadas; y hojas entre liradas y dentadas.

4. f. 2.

Cyanus Orientalis, major, moschatus, flore purpureo & albo. Moris. hist. 3. p. 135. sect. 7. t. 25. f. 5. Aciano Oriental, mayor, moscado, con la flor purpúrea y blanca.

α *Centaurea Amberboi.*

Centaurea Amberboi. α

Centaurea calycibus inermibus, subrotundis glabris, squamis ovatis obtusis, foliis laciniatis serratis. Mill. dict. n. 9. Knorr. del. 2. t. Centaurea de cálices inermes, casi redondos, y lampiños, con las escamas aovadas y obtusas; hojas laciniadas y aserradas.

C. 4. f. 1.

Cyanus Orientalis, major, foliis magis dissectis, flore luteo. Moris. hist. 3. p. 135. sect. 7. t. 25. f. 9. Aciano Oriental, mayor, con hojas mas cortadas; y flor amarilla.

Cyanus Orientalis, flore luteo, fistuloso. Dodart. mem. 267. Aciano Oriental, con la flor amarilla y fistulosa.

Cast. *Centaurea moscada.*

Habita en Persia y Rusia. ☉

Tiene las *flores* blancas y muy olorosas: y las *hojas* las mas veces hendidas al través.

La variedad α se diferencia por las *corolas* grandes: sin embargo el que quiera distinguir esta especie acaso lo acertará; aunque la *traza de la planta* declara bastante-mente que provienen la una de la otra.

Eruci-
folia.

3. CENTAUREA *calycibus inermibus, squamis lanceolatis, foliis lanceolatis subdentatis lanuginosis*. Centaurea de cálices inermes, con escamas lanceoladas; hojas tambien lanceoladas, con algun diente y lanuginosas.
Hort. cliff. 421.

Jacea foliis Erucæ, lanuginosis. Tourn. p. 444. Yacea con hojas como las de la Oruga y lanuginosas.

Amberboi Erucæ folio, majus. Vaill. act. 1718. p. 181. Amberboi mayor, con hoja como la de la Oruga.

Stœbe major, foliis Erucæ, mollibus, lanuginosis. Estebe mayor, con hojas como las de la Oruga, blandas y lanuginosas.
C. B. P. 273.

Stœbe Salmantica, secunda. Clus. hist. 2. p. 9. Tourn. Estebe segunda, de Salamanca.

Cast. Centaurea con hoja de Oruga.

Habita en Castiila la vieja y señaladamente en los campos de Salamanca. 24

Lippii.

4. CENTAUREA *calycibus inermibus, squamis mucronatis, foliis subdecurentibus lyrato-dentatis*. Centaurea de cálices inermes, con las escamas terminadas en punta rigida; hojas algo escurridas, y entre liradas y dentadas.
Mill. dict. n. 11.

Centaurea calycibus inermibus, squamis mucronatis, foliis sessilibus pinnatifidis, lobis dentato--angulatis. Centaurea de cálices inermes, con escamas terminadas en punta rigida; hojas sin peciolo, hendidas al traves; y sus lóbulos entre dentados y angulados.
Gou. illustr. p. 72.

Amberboi Erucæ folio, minus. Isn. act. 1719. p. 169. t. 10. Amberboi menor, con hoja como la de la Oruga.

Cast. Centaurea de Lippio.

Habita en Egipto, en Alexandria y Rosetta. ☉

Es del largo de un palmo; con la traza como la del *Aciano*. Echa el tallo ramosisimo: las hojas comunmente sentadas y rara vez escurridas: los cálices con pedunculo y apiñados, con escamas terminadas en una punta escariosa: las corolas de color purpúreo, con el radio

600 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

dio grande : los *flosculos* del radio de nueve á doce , lineares y partidos en tres ó quatro lacinias , con otros tantos en el disco.

Alpina

5. *CENTAUREA calycibus inermibus, squamis ovatis obtusis, foliis pinnatis glabris integerrimis, impari serrato.* Hort. cliff. 421.

Centaurium alpinum, luteum. C. B. P. 117. Prodr. 56. Moris. hist. 3. p. 132. sect. 7. t. 25. f. 5. Tourn. p. 449.

Centaurium majus, luteum. Corn. canad. 69. t. 70.

Centauroides folio glabro, flore flavescente. Bauh. hist. 3. p. 40.

Centaurea de cálices inermes , con escamas aovadas y obtusas; hojas pinnadas, lampiñas , enterisimas , y la hoja impar aserrada.

Centaurea alpina , con la flor amarilla.

Centaurea mayor , con la flor amarilla.

Planta semejante á la Centaurea , con hoja lampiña ; y flor de color que tira á amarillo-roxo.

Cast. Centaurea alpina.

Habita en el monte Baldo.

Centaureum

6. *CENTAUREA calycibus inermibus, squamis ovatis, foliis pinnatis, foliolis decurrentibus serratis.* Hort. cliff. 421. Gmel. sib. 2. p. 39. t. 41.

Centaurium majus, folio in lacinias plures diviso. C. B. P. 117. Tourn. p. 449.

Centaurium majus, primum, vulgare. Clus. hist. 2. p. 10.

Centaurium magnum. Dod. pempt. 334.

Centaurea de cálices inermes , con escamas aovadas; hojas pinnadas , con sus hojuelas escurridas y aserradas.

Centaurea mayor , con hoja dividida en muchas lacinias.

Centaurea mayor , primera , vulgar.

Centaurea grande.

Cast. Centaurea Centaurea.

Habita en Tartaria , en los montes Gargano ó de San Angelo , y Baldo. 24

ESPECIES LLAMADAS ACIANO, CON LAS ESCAMAS DEL
CALIZ ENTRE ASERRADAS Y PESTAÑOSAS.

- Phry-
gia. 7. *CENTAUREA calyci-* Centaurea de cálices con
bus recurvato-plumosis, fo- pestañas plumosas y encor-
liis indivisis oblongis sca- vadas ácia atrás; hojas indi-
bris. Gou. illustr. 72. Flor. visas, oblongas y ásperas.
dan. t. 520. Gmel. it. 1. p.
136. t. 23. f. 2.
- Centaurea calycibus cilia-* Centaurea de cálices con
tis, ciliis setaceis recurva- pestañas setáceas y encorva-
tis. Hort. cliff. 422. das ácia atrás.
- Cyanus foliis subhirsutis,* Aciano de hojas con algun
ovato-lanceolatis, amplexi- pelo áspero, entre aovadas y
caulibus, dentatis, plumu- lanceoladas, amplexicaules,
lis calycinis reflexis. Hall. dentadas; y las plumitas del
helv. n. 188. caliz redobladas.
- Yacea angustifolia* & *la-* Yacea de hoja angosta, ó
tifolia, capite hirsuto. C.B. ancha; y la cabezuela con
P. 271. Tourn. p. 443. pelo áspero.
- Yacea quarta, Austriaca,* Yacea quarta, de Austria,
capite villosa. Clus. hist. 2. con la cabezuela vellosa.
P. 7.
- Yacea alba, capite hir-* Yacea quarta, de cabe-
suto. C. B. P. 271. Tourn. zuela con pelo áspero. α
P. 443.

Cast. Centaurea de Frigia.

Habita en Suiza, Austria, Finlandia y Alemania: en la Alcarria, Asturias, montes de Burgos y en otras partes de España. 26

Las pestañas del caliz se levantan con la lluvia. Tiene las hojas aovadas, dentadas y amplexicaules.

- Capil-
lata. 8. *CENTAUREA calyci-* Centaurea de cálices con
bus recurvato-plumosis, fo- pestañas plumosas, encorva-
liis imis pinnatis dentatis, das ácia atrás; hojas de mas
summis lanceolatis. abaxo pinnadas, con dien-
tes, y las de mas arriba lan-
ceoladas.

Cyz.

602 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cyanus foliis calycinis X Aciano con las hojas del
plumosis, reflexis, foliolis X caliz plumosas, redobladas,
pinnatis. Act. goett. 1. p. 202. X y las hojuelas pinnadas.
 t. 6. X

Cast. Centaurea cabelluda.

Habita en la Siberia : en la Alcarria, Sierra-morena,
 Mancha y en otras partes de España.

Uni- 9. CENTAUREA calyce X Centaurea de caliz con
 flora. recurvato-plumoso, foliis X pestañas plumosas, encorva-
 lanceolatis subdentatis to- X das ácia atrás; hojas lanceo-
 mentosis. Ger. prov. 785. X ladas, con algun diente y
 tomentosas.

Centaurea calycibus re- X Centaurea de cálices con
curvato-plumosis, foliis X pestañas plumosas, encorva-
lanceolatis, tomentosis, ra- X das ácia atrás; hojas lanceo-
dicalibus dentatis, summis X ladas, tomentosas, las radi-
integerrimis. Gou. illustr. X cales dentadas, y las de mas
 172. R. X arriba enterisimas.

Cyanus foliis lanceolatis, X Aciano con hojas lanceo-
tomentosis, calycinis plu- X ladas, tomentosas; y las plu-
mulis reflexis. Hall. helv. n. X mitas del caliz redobladas.
 189. R.

Cyanus alpinus, capitulo X Aciano alpino, con la ca-
reticulato. Bocc. mus. 2. p. X bezuela en redeciña.
 20. t. 2. X

Cast. Centaurea de una flor.

Habita en los alpes de la Europa austral. 24

Es muy parecida á la *Centaurea de Frigia* y produccion
 suya variada. Tiene las hojas lanceoladas, con algun
 diente; y una sola flor sentada.

Lint- 10. CENTAUREA caly- X Centaurea de cálices con
 folia. cibus recurvato-plumosis, X pestañas plumosas, encorva-
foliis linearibus sparsis. X das ácia atrás; hojas lineares
 X y esparcidas.

Centaurea calycibus plumosis, foliis linearibus integerrimis scabris ciliatis mucronato-spinosis. Gov. illustr. 73. R. Centaurea con los cálices plumosos; hojas lineares, enterisimas, ásperas, pestañosas y terminadas en punta espinosa.

Facea Hispanica, pumila, Linariæ folio. Tourn. p. 445. Barr. ic. 162. Yacea de España, enana, con hoja como la de la Linaria.

Facea minor, purpurea, parvis & integris foliis. Barr. ic. 139. Gov. Yacea menor, con la flor purpúrea; hojas pequeñas y enteras.

Cast. Centuarea con hoja de Lino.

Habita en Italia: en la Mancha, Extremadura y en otras partes de España. 24

Posee el tallo corto y las mas veces echado: las hojas lineares, enteras, ásperas y muy amontonadas en las ramas: y el caliz del todo como el de la *Centaurea de Frigia*.

Pectin-
nata. 11. *CENTAUREA calycibus recurvato-plumosis, foliis lyratis denticulatis, rameis lanceolatis integerrimis.* Syst. veg. 653. Centaurea de cálices con pestañas plumosas, encorvadas ácia atrás; hojas liradas, con dientecitos, y las de las ramas lanceoladas y enterisimas.

Centaurea calycibus erecto-plumosis, foliis lyratis denticulatis, rameis lanceolatis integerrimis. Spec. pl. ed. 3. p. 1287. Gov. illustr. 72. Centaurea de cálices con pestañas plumosas y levantadas; hojas liradas, con dientecitos, y las de las ramas lanceoladas y enterisimas.

Facea montana, incana, aspera, capitulis hispida. C. B. P. 272. Prodr. 128. Tourn. p. 443. Yacea montana, blanquecina, áspera, y con cabezuelas erizadas.

Facea montana, incana, laciniata, capitulo hispido. Bauh. prodr. 128. Yacea montana, blanquecina, con hojas laciniadas, y cabezuela erizada.

Yacea cum squamis pen-^X
natis, seu capite villosa,^X Yacea mas erguida y mas
elatioꝝ & humilior. Bauh.^X baxa, con escamas plumosas,
 hist. 3. p. 29.^X ó cabezuela vellosa.

Cast. Centaurea de peyne.

Habita en Narbona y Provenza : en los circuitos de Madrid, Aragon, Cataluña y en otras partes de España.

Posee los cálices como los de la *Centaurea de Frigia*, terminales y sentados : las ramas mas desparramadas : las hojas oblongas, amplexicaules, en forma de lira y con los dientes ácia su base mas grandes : las *hojas florales* lanceoladas, enterisimas y vellosas.

Nigra. 12. *CENTAUREA caly-*^X Centaurea de cálices pes-
cibus ciliatis, squamula ova-^X tañosos, con la escamita aovada, y las pestañas capilares y derechas ; hojas entre
ta, ciliis capillaribus erect-^X liradas y angulosas ; y flores
is, foliis lyrato-angulatis,^X
floribus flosculosis. Reich. flosculosas.
 flor. moenofr. n. 625. cum
 icone.

Centaurea squamis caly-^X Centaurea con las escamas
cinis ciliatis inermibus, fo-^X del caliz pestañosas é inermes ; hojas pinnadas, con
liis pinnatis, foliolis linea-^X las hojuelas entre lineares y
ri-lanceolatis scabris. Sauv. lanceoladas, y ásperas.
 monsp. 239.

Yacea foliis radicalibus^X Yacea con las hojas radi-
semipinnatis, caulinis ova-^X cales medio pinnadas, y las
to-lanceolatis. Hall. helv. del tallo entre aovadas y lan-
 n. 184. R. ceoladas.

Yacea nigra, laciniata.^X Yacea negra, con hojas
 C. B. P. 271. Tourn. p. 443. laciniadas.

Yacea Austriaca, sexta.^X Yacea Austriaca, sexta.
 Clus. hist. 2. p. 7.

“ *Centaurea calycibus ser-*^X Centaurea con los cálices
ratis ciliatisque, foliis lan-^X aserrados y pestañosos ; ho-
ceolatis dentatis, floribus^X jas lanceoladas, con dientes ;
sessilibus. Hort. cliff. 422. “ y flores sentadas. “

Cast. Centaurea negra.

Habita en Inglaterra, Suiza, Austria, Alemania y Mompeller : en la Sierra de Miraflores, Bustarviejo, en Ara-

Aragon , Cataluña y otras muchas partes de España. ♂
Se diferencia de la *Centaurea de Frigia* en quanto la es-
camita pestañosa se halla aovada , entre derecha y ex-
tendida , y no encorvada ácia atrás , ni alesnada.

Tiene las *hojas de mas arriba* lanceoladas y enterisimas.
Gov. hort. 458.

Pulla-
ta.

13. *CENTAUREA caly-
cibus ciliatis verticillato-
foliosis , foliis lyratis den-
tatis obtusis.* Mill. ic. 152.
f. 2. Lepech. it. i. p. 219.

*Centaurea inermis , caly-
cum ciliis pinnatis , foliis
oblongis villosis humifusis ,
floralibus verticillatis ligu-
latis.* Sauv. monsp. 288.

*Facea humilis , alba , Hie-
racii folio.* C.B.P. 271. Mo-
ris. hist. 3. p. 140. sect. 7.
t. 28. f. 18.

*Cyanus humilis , albus ,
Hieracii folio.* Tourn. p. 446.

*Facea Monspessulana ,
cui in squamis fibræ nigræ ,
interdum acaulis.* Bauh. hist.
3. p. 29.

*Facea pumila , serpens ,
acaulis ferme , flore albo.*
Lob. ic. 542.

Centaurea de cálices pes-
tañosos y ceñidos con hojue-
las puestas en verticilo; hojas
en forma de lira , dentadas
y obtusas.

Centaurea inermis, con las
pestañas de los cálices pin-
nadas; hojas oblongas , ve-
llosas , tendidas por el suelo;
y las florales verticiladas y
en forma de cintilla.

Yacea baxa , blanca , con
hoja como la del Hieracio.

Aciano baxo , y blanco,
con hoja como la del Hiera-
cio.

Yacea de Mompeller que
tiene en las escamas del ca-
liz fibras negras ; y algunas
veces se halla sin tallo.

Yacea enana , rastrera ,
casi sin tallo ; y con flor
blanca.

Cast. Centaurea enlutada.

Habita en Narbona y Oriente : en Extremadura , Anda-
lucia y otras partes de España. ☉

Tiene el *caliz* ceñido con hojas sentadas : las *escamas del
caliz* entre lineares y lanceoladas , con su margen ne-
gra y por su ápice con pestañas de color amarillo-roxo:
las *hojas del tallo* las mas veces en forma de lira : la
corola de color que tira á purpúreo con el radio grande.

Es

Es planta baxa ; y varía con todas las *hojas* enterisimas.

Montana.

14. CENTAUREA caly-
cibus serratis, foliis lanceo-
latis decurrentibus, caule
simplicissimo. Hort. cliff. 422.
 Jacq. austr. t. 371. Centaurea con los cálices
 aserrados ; hojas lanceola-
 das, escurridas ; y tallo muy
 sencillo.
- Cyanus caule unifloro ,
 alato , foliis ellipticis , lan-
 ceolatis. Hall. helv. n. 170. y lanceoladas.
- Cyanus montanus , lati-
 folius seu Verbasculum Cya-
 noides. C. B. P. 273. Tourn. Aciano montano , de hoja
 ancha , ó pequeño Verbasco
 parecido al Aciano.
- Cyanus montanus , caule
 folioso , capitulo oblongo. Aciano montano , con el
 tallo folioso ; y cabezuela
 oblonga.
- Cyanus major. Lob. ic. Aciano mayor.
548. Blackw. t. 66.
- α Jacea integrifolia , humi-
 lis. C. B. P. 271. Prodr. 127. Yacea baxa , con hoja en-
 tera. α
- Burs. XV. 29.

Cast. Centaurea montana.

Habita en los alpes de Suiza , Austria y Alemania : en
 Aragon , Cataluña , Asturias , Alcarria y en otras mu-
 chas partes de España. 24

La variedad α se diferencia por las *hojas* mas pequeñas y
 algo escurridas por su base.

Tiene el tallo lanudo y las *hojas* enterisimas : y varía tam-
 bien con las *flores* blancas y las *hojas* cortadas.

Cya-
 nus.

15. CENTAUREA caly-
cibus serratis, foliis linea-
ribus integerrimis, infimis
dentatis. Mat. med. 220. aserrados ; hojas lineares, en-
 terisimas , y las de mas aba-
 xo dentadas.
- Hort. cliff. 422. Knorr. del.
1. t. K. 4. 5.

Cyanus foliis imis ellipticis, dentatis, superioribus linearibus, semiflosculis latissimis. Hall. helv. n. 191. Aciano con las hojas de abaxo elípticas, dentadas, las superiores lineares; y los semiflosculos muy anchos.

Centaurea foliis imis simplicibus, dentatis, superioribus semipinnatis, supremis linearibus. Scop. carn. 1. p. 361. n. 2. ed. 2. n. 1023. Centaurea con las hojas de abaxo sencillas, dentadas, las superiores medio pinnadas, y las supremas ó de mas arriba lineares.

Cyanus segetum. C. B. P. 273. Tourn. p. 446. Aciano que nace entre los sembrados.

Cyanus vulgaris. Lob. ic. 545. Blackw. t. 270. Aciano vulgar.

Cyanus hortensis, flore simplici. C. B. P. 273. Aciano hortense, con la flor sencilla. α

Cyanus hortensis, flore pleno. C. B. P. 273. Aciano hortense, con la flor plena. β

Cast. Centaurea Aciano.

Habita entre los sembrados de Europa: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña; y es frecuente en las mas provincias de España. \odot

PROPIED. Las flores se usan en la optalmia: y algunas Farmacopeas las admiten en la composicion del Xarabe de Achicoria con Ruibarbo, baxo el nombre de Flos Bactisoseræ: y se gastan tambien las mismas flores para teñir de color azul.

Paniculata. 16. CENTAUREA calycibus ciliatis, squamis planis, foliis bipinnatifidis, ramis pinnatifidis linearibus, caule paniculato. Jacq. austr. t. 320. Centaurea de cálices pescañosos, con las escamas planas; hojas dos veces hendidas al través; las de las ramas hendidas al través, lineares; y tallo en panoja.

Cyanus pinnulis foliorum pinnatis, linearibus. Hall. helv. n. 187. Aciano con las hojuelas de las hojas pinnadas, y lineares.

Centaurea micranthus. Gmel. it. 1. p. 135. t. 23. f. 1. Centaurea de flor pequeña.

Cen-

Centaurea calycibus ciliatis, oblongis, foliis scabris, caulium pinnatis, ramorum simplicissimis, linearibus. Centaurea con los cálices pestañosos y oblongos; hojas ásperas, las del tallo pinnadas, y las de las ramas muy sencillas y lineares. Gmel. sib. 2. p. 98. t. 43.

Facea non spinosa, foliis magis divisis, elatior, capitulis minoribus, non splendentibus. Moris. hist. 3. p. 140. sect. 7. t. 28. f. 15. Yacea mas levantada, sin espinas, con hojas mas divididas; cabezuelas mas pequeñas y que no relucen.

Stæbe major, calyculis non splendentibus. C. B. P. 263. Estebe mayor, con los calicitos que no relucen.

Facea foliis candicantibus, laciniatis, calyculis non splendentibus. Tourn. P. 444. Yacea con hojas de color que tira á candido, lacinias; y calicitos que no relucen.

Centaurii majoris species tenuifolia. Bauh. hist. 3. p. 31. Especie de Centaura mayor, con hoja delgada.

Cast. Centaurea de panoja. vulgo: Arsolla. Matagallegos. *Habita en Narbona, Austria, Verona, Siberia y Alemania: en la Mancha, Cataluña, Aragon y en otras partes de España.* ☉

Tiene las flores purpúreas; con los pistilos blancos; y las hojas de las ramas hendidas al través.

Spi- 17. CENTAUREA calyce subciliato, ramis spinosis. Hort. cliff. 422. Centurea con el caliz algo pestañoso; y las ramas espinosas.

Facea Cretica, aculeata, incana. Tourn. p. 445. Yacea de Creta, con agujones y blanquecina.

Stæbe spinosa, Cretica. Moris. hist. 3. p. 136. Estebe espinosa, de Creta.

Cyanus spinosus. Alp. exot. 163. t. 162. Aciano espinoso.

Cast. Centaurea espinosa.
Habita en Creta.

Ragu-
sina.

18. *CENTAUREA caly- X* Centaurea de calices pes-
cibus ciliatis, foliis tomen- X tañosos; hojas tomentosas,
tosis pinnatifidis, foliolis X hendidas al través, con sus
obtusis ovatis integerrimis, X hojuelas ó lacinias obtusas,
exterioribus majoribus. Hort. X aovadas, enterisimas y las
cliff. 422. *X* de mas afuera mayores.

Yacea Cretica, lutea, fo- X Yacea de Creta, con la
liis Cinaræ. Moris. hist. 3. X flor amarilla; y hojas como
p. 141. sect. 7. t. 27. f. 22. *X* las de la Alcachofa.

Yacea arborea, argentea, X Yacea de Ragusa, arbo-
Ragusina. Zan. hist. 107. t. X rea y de color de plata.
43. Mill. dict. t. 152. f. 1. *X*

Stæbe montana, nivea, X Estebe montana, de color
capite Cardui, subrotundis X de nieve, con cabezuela de
foliorum lobis. Barr. ic. 309. X Cardo; y lóbulos de las ho-
X jas casi redondos.

Yacea epidaurica, candi- X Yacea de Ragusa, muy
dissima & tomentosa. Tourn. X candida y tomentosa,
p. 445. *X*

Cast. Centaurea de Ragusa.

Habita en Creta y en Ragusa. 24

Echa las *hojas* blancas y algo peludas, pinnadas, con
sus hojuelas ó lóbulos redondeados: la *flor* solitaria, pe-
dunculada y amarilla; con el *radio* pequeño y los *esti-*
los largos: el *caliz* grande, con las escamas agudas,
pestañosas y de color que tira á amarillo-roxo.

Cine-
maria.

19. *CENTAUREA caly- X* Centaurea con cálices pes-
cibus ciliatis terminali-ses- X tañosos, terminales y senta-
silibus, foliis tomentosis X dos; hojas tomentosas, dos
bippinnatifidis, lobis acutis. X veces hendidas al través, con
Hort. cliff. 422. *X* sus lacinias ó lobulos agudos.

Yacea montana, candidis- X Yacea montana, muy can-
sima, Stæbes foliis. C. B. X dida, y con hojas como las
P. 272. Prodr. 126. Moris. *X* de la Estebe.
hist. 3. p. 141. sect. 7. t. 26. *X*
f. 20. Tourn. p. 444. *X*

α *Jacea Cineraria, lacinia-* X *Yacea Cineraria, lacinia-*
ta, flore purpureo. Triumph. da y con la flor purpúrea. α
 obs. 72. Moris. hist. 3. p.
 141. Barr. ic. 348. 347. Jacq.
 hort. t. 92. cui distincta spe-
 cies. R. Tourn. p. 444. X

Cast. *Centaurea Cineraria.*

Habita en Italia. 26

Echa las *hojas* blancas y con alguna pelusa ; las *del tallo* dos veces pinnadas , con sus hojuelas ó lóbulos cortados , agudos , y el de mas afuera palmeado ; y las *de las ramas* hendidas al través : las *pestañas del caliz* de color obscuro : la *flor* purpúrea ; con los *estilos* blancos y el *radio* apenas mas largo que el disco.

Ar- 20. CENTAUREA caly- X *Centaurea* con los cálices
 gentea *cibus serratis, foliis tomen-* X aserrados ; hojas tomentosas,
tosis, radicalibus pinnatis, X las radicales pinnadas , y las
foliolis uniauritis. Mill. dict. X hojuelas con una orejilla.
 n. 18.

Centaurea calycibus ci- X *Centaurea* con cálices pes-
liatis villosis, foliis cunei- X tañosos y vellosos ; hojas en
formibus superne serratis, X forma de cuña , por arriba
inferne dentatis. Hort. cliff. X aserradas, y por debaxo den-
 422. X tadas.

Jacea Cretica, laciniata, X *Yacea* de Creta , lacinia-
argentea, flore parvo, fla- X da , de color de plata , con la
vescente. Tourn. cor. 31. X flor pequeña y de color amar-
 Barr. ic. 218. X rillo-roxo.

Cast. *Centaurea plateada.*

Habita en Creta.

Produce el *tallo* muy tomentoso ácia la raiz : las *hojas ra-*
dicales con tomento denso , y pinnadas , con las hojue-
 las casi iguales , ovales , y por la base inferior sola-
 mente acompañadas con un lóbulo : las *del tallo* senci-
 llas , en forma de cuña , y adornadas en la base por
 una margen de un dientecito obtuso : y las *flores* ama-
 rillas.

Sibi-
rica.

21. CENTAUREA *calycibus ciliatis, foliis tomentosis indivisis pinnatifidis integerrimis, caule declinato.* Pall. it. 1. p. 43. Centaurea con cálices pestañosos; hojas tomentosas, indivisas, enterisimas y hendidas al través; y tallo declinado.

Centaurea calycibus ciliatis subrotundis, foliis pinnatis & integris, foliolis simplicissimis, extremo maximo. Gmel. sib. 2. p. 96. t. 42. f. 2. Centaurea con cálices pestañosos y casi redondos; hojas pinnadas y enteras; las hojuelas muy sencillas y la de mas afuera muy grande.

Cast. Centaurea de Siberia.

Habita en la Siberia. Doct. Gmel. 2f

Echa las hojas tomentosas, lanceoladas, con la mayor parte de las radicales hendidas al través, y sus lóbulos vueltos ácia arriba, lanceolados, enterisimos, escurridos y el de mas afuera mayor: las hojas del tallo de mas arriba las mas veces en número de seis ó siete é indivisas: el tallo muy sencillo, velloso, algo asurcado y rara vez con una ramita: comunmente una sola flor; con el caliz ventricosos y sus hojuelas acompañadas de una escamita aovada, de la magnitud de ellas, con pestañas agudas y de color palido: la corola purpúrea; con el radio esteril y grande.

Sem-
pervi-
rens.

22. CENTAUREA *calycibus ciliatis, foliis lanceolatis serratis, infimo dente substipulatis, inferioribus hastatis.* Bocc. sic. 73. t. 39. f. 3. Dodart. mem. 85. Centaurea con cálices pestañosos; hojas lanceoladas, aserradas, casi con estipulas de un diente por debaxo, y las inferiores en forma de alabarda.

Centaurea calycibus ciliatis, foliis lanceolatis serratis, inferioribus hastatis. Spec. pl. 3. p. 1291. Hort. cliff. 422. Centaurea con cálices pestañosos; hojas lanceoladas, aserradas, y las inferiores en forma de alabarda.

Yacea Lusitanica, sempervirens. Moris. hist. 3. p. 139. sect. 7. t. 28. f. 9. Yacea de Portugal, siempreverde.

Cast. Yacea siempreverde.

612 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Habita en Portugal: en Galicia, señaladamente ácia Pontevedra, en Vigo y Tuy. 24

Arroja el *tallo* rollizo, vellosos y de color gris por debaxo: las *hojas* lanceoladas, aserradas, vellosas y blandas, y las inferiores en forma de alabarda: las *estipulas* lanceoladas y las mas veces arqueadas ácia el tallo: los *pedunculos* encrasados por arriba: y las *pestañas del caliz* de color gris.

Las *flores* flosculosas: y las *hojas* con un diente en su base alargado; por lo que parece que el *tallo* está adornado de *estipulas*. *Syst. veg. p. 654.*

Scabiosa. 23. CENTAUREA caly- X Centaurea con cálices pes-
cibus ciliatis, foliis pinna- X tañosos; y hojas hendidas al
ristidis, pinnis lanceolatis. X través, con sus lacinias ú
Hort. cliff. 422. X hojuelas lanceoladas.

Cyanus foliis pinnatis, X Aciano de hojas pinnadas,
pinnis dentatis, obtusis, X con las hojuelas dentadas,
squamis calycinis triangu- X obtusas; y las escamas del
laribus. Hall. helv. n. 186. X caliz triangulares.

Scabiosa major, squama- X Escabiosa mayor, con ca-
tis capitulis. C. B. P. 269. X bezuelas escamosas.

Facea vulgaris, lacinia- X Yacea vulgar, laciniada,
ta, flore purpureo. Tourn. X con la flor purpúrea.
P. 443.

Scabiosa major. Matth. X Escabiosa mayor,
969. Dalech. hist. 1066. X

Cast. Centaurea Escabiosa.

Habita en los prados de la Europa septentrional: en las viñas y laderas del término de Sacedon, y de la Alcarria: en los montes de Burgos, de Asturias y en otras partes de España. 24

Stoebe. 24. CENTAUREA caly- X Centaurea con cálices pes-
cibus ciliatis oblongis, fo- X tañosos y oblongos; hojas
liis pinnatifidis linearibus X hendidas al través, lineares
integerrimis. Roy. lugdb. X y enterisimas.
140. X

Stæbe incana, *Cyano si-* X Estebe blanquecina, se-
milis, *tenuifolia*. C. B. P. X mejante al Aciano, y con ho-
273. X ja delgada.

Stæbe Austriaca, *humi-* X Estebe baxa, de Austria.
lis. Clus. hist. 2. p. 10. X

Cast. Centaurea Estebe.

Habita en Austria.

Acau- 25. CENTAUREA *caly-* X Centaurea con cálices pes-
lis. *cibus ciliatis*, *foliis lyratis*, X tañosos; hojas liradas; y ca-
caule subnullo. X si sin tallo.

Facea acaulos, *lutea*, X Yacea sin tallo, con flor
Erucae folio, *squamarum ci-* X amarilla; hoja como la de la
lis candidis. Shaw. spec. X Oruga; y pestañas de las es-
342. t. 342. X camas candidas.

Cast. Centaurea sin tallo.

Habita en Arabia.

Tata- 26. CENTAUREA *caly-* X Centaurea con cálices pes-
rica. *cibus ciliatis*, *foliis pinna-* X tañosos; hojas pinnadas; y
tis, *pinnis lanceolatis indi-* X hojuelas lanceoladas é indi-
visis. Suppl. p. 383. X visas.

Cast. Centaurea de Tartaria.

Habita en la Siberia. 2

Tiene las flores y cálices enteramente como los de la Cen-
taurea Escabiosa: las primeras hojas anchas, lanceo-
ladas, indivisas y enterisimas; las restantes hendidas
al través, con sus lacinias tambien enterisimas.

ESPECIES CON LAS ESCAMAS DEL CALIZ
ARIDAS Y ESCARIOSAS.

Orien- 27. CENTAUREA *caly-* X Centaurea de cálices con
talis. *cibus squamis ciliatis*, *fo-* X las escamas pestañosas; ho-
liis pinnatifidis, *pinnis lan-* X jas hendidas al través y sus
ceolatis. Mill. dict. n. 17. X hojuelas lanceoladas.
Gmel. sib. 2. p. 98. X

614 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cyanus foliis radicalibus partim integris, partim pinnatis, bractea calycis ovali, flore sulphureo. Hall. Act. angl. 1745. v. 43. n. 472. p. 94. Aciano con las hojas radicales, parte enteras y parte pinnadas; la bractea del caliz oval; y la flor de color de azufre.

Cast. Centaurea Oriental.

Habita en la Siberia. ¶

Es semejante á la *Centaurea Escabiosa*; pero se diferencia por la corola de color de azufre, y principalmente por el caliz, cuyas hojuelas terminan en una escama aovada, de color amarillo ferrugineo, con pestañas del largo de ella y en forma de peyne.

Behen. 28. *CENTAUREA calycibus scariosis, foliis radicalibus lyratis, lobis oppositis, caulinis amplexicaulis.* Mat. med. 220. Gron. orient. 273. Lepech. it. 1. p. 264. Centaurea con cálices escariosos; hojas radicales en forma de lira, con sus lóbulos opuestos, y las del tallo amplexicaules.

Rhaponticoides lutea, foliis inferioribus dissectis, ceteris Carthami. Vaill. act. 1718. p. 229. Planta como Rhapontico, con la flor amarilla; hojas inferiores cortadas, y las restantes como las del Carthamo.

Serratulae affinis, capitulo squamoso, luteo ut Serratula. C. B. P. 235. Planta parecida á la Serratula, con la cabezuela escamosa y de color amarillo igualmente que la flor.

Behen album. Rauw. it. 288. t. 288. Bauh. hist. 3. p. 36. t. 37. C. B. P. 234. Behen blanco.

Cast. Centaurea Behen. Farm. Behen album.

Habita en la Asia menor, y en el monte Libano. ¶

PROPIED. La raíz es olorosa y acre: se tiene por corroborante y cordial; y se usa en el temblor.

Re-
pens. 29. *CENTAUREA calycibus scariosis, foliis lanceolatis subpetiolatis dentatis, pedunculis filiformibus aphyllis.* Centaurea con cálices escariosos; hojas lanceoladas, casi sin peciolo y dentadas; pedunculos filiformes y sin hojuelas.

Yacea Orientalis, Cyanifolio, flore parvo, calyce argenteo. Tourn. corol. 92. Yacea Oriental, con hoja como la del Aciano; flor pequeña; y caliz de color de plata.

Cast. Centaurea rastrera.

Habita en Oriente. 24

Posee el tallo angulado, ramoso y liso: las hojas lanceoladas, lisas, con dientes, adelgazadas por su base y ásperas en la margen: los pedunculos filiformes, del largo de las hojas y desnudos: las escamas del caliz agudas y enterisimas.

Jacea. 30. *CENTAUREA calycibus scariosis laceris, foliis lanceolatis, radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis.* Hort. cliff. 421. Oed. dan. t. 519. Pall. it. 1. p. 72. Centaurea con cálices escariosos y lacerados; hojas lanceoladas, las radicales entre sinuosas y dentadas; y ramas angulosas.

Yacea nigra, pratensis, latifolia. C. B. P. 271. Tourn. de hoja ancha. P. 473.

Yacea nigra, vulgaris, capitata & squamata. Bauh. hist. 3. p. 27. Yacea negra, vulgar, con cabezuelas escamosas.

Yacea nigra. Tabern. ic. 152. Yacea negra.

α *Yacea nigra, angustifolia, Lithospermi arvensis.* C. B. P. 271. Prodr. 127. Tourn. p. 443. Yacea negra, de hojas angostas, como las del Lithospermo arvense; y tallo áspero ó liso. α

Cast. Centaurea Yacea.

Habita en la Europa septentrional: en el Real Sitio del Escorial, en la Cartuxa del Paular de Segovia, en Aragón, Cataluña y otras partes de España. 24

Tie-

616 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Tiene la *semilla* sin vilano.

El *vilano* con pocas cerdas, muy cortas, y que se caen facilmente. *Leers. herb. n. 674.* Varía con las *flores* blancas: y con las *hojas* lineares y enterisimas.

Amara 31. *CENTAUREA calycibus scariosis, caulibus decumbentibus, foliis lanceolatis integerrimis.* Gov. illustr. p. 75. Centaurea con cálices escariosos; tallos tendidos; hojas lanceoladas y enterisimas.

Cyanus repens, latifolius. C. B. P. 274. Aciano rastrero, con hoja ancha.

Cyanus repens. Lob. ic. 548. Aciano rastrero.

α *Jacea saxatilis, longo, incano, angusto, Helichrysi Cretici folio.* Bocc. mus. 31. t. 17. Yacea saxátil, con hoja larga, blanquecina, angosta, y como la del Helichryso de Creta. α

Cast. Centaurea amarga.

Habita en Italia y Mompeller: en la Alcarria y Serrania de Cuenca entre las grietas de las peñas. 26

Gerardo p. 188. tiene á esta especie por variedad de la *Centaurea Yacea.*

Alba. 32. *CENTAUREA calycibus scariosis integris mucronatis, foliis pinnatodentatis, caulinis linearibus basi dentatis.* Centaurea con las escamas del caliz escariosas, enteras y terminadas en punta rígidas; hojas entre pinnadas y dentadas; las del tallo lineares y con dientes por su base.

Rhaponticum foliis radicalibus semipinnatis, caulinis lanceolato-linearibus, nervosis, calycibus nitidis. Hall. helv. n. 196. Rhapontico con las hojas radicales medio pinnadas; las del tallo entre lanceoladas y lineares, nerviosas; y cálices lustruos.

Jacea calyculis argenteis, minor. Tourn. p. 444. Yacea menor, con los calicitos de color de plata.

Stoebe calyculis argenteis, minor. C. B. P. 273. Estebe menor, con los calicitos de color de plata.

Cast.

Cast. Centaurea blanca.

Habita en Suiza : en los circuitos de Madrid , en la Alcarria , Castilla la vieja y otras partes de España.

Echa el tallo en panoja : las *hojas* lineares , puntiagudas , entre pinnadas y dentadas : las *superiores* solamente dentadas ; y las *supremas* ó *de mas arriba* lineares y muy sencillas : los *cálices* terminales , aovados y pequeños ; con las *escamas* membranosas , laxas , terminadas en punta rígida y de color de nieve.

Späen-
dens.

33. CENTAUREA calycibus scariosis obtusis , foliis radicalibus bipinnatifidis , caulinis pinnatis , dentibus lanceolatis. Roy. lugdb. 142. Pall. it. 3. p. 683. Centaurea de cálices escariosos y obtusos ; hojas radicales dos veces hendidas al través , las del tallo pinnadas y sus dientes lanceolados.

Rhaponticum foliis pinnatis , pinnis semipinnatis , pinnulis lanceolatis , calycibus nitidis . Hall. helv. n. 197. Rhapontico de hojas pinnadas , con las hojuelas medio pinnadas y sus laciniás lanceoladas ; y cálices lustrosos.

Jacea calyculis argenteis , major. Tourn. p. 444. Yacea mayor , con los calicitos de color de plata.

Stæbe calyculis argenteis. Estebe con los calicitos de color de plata.

C. B. P. 273. Stæbe Salmantica , tertia. Clus. hist. 2. p. 10. Estebe tercera , de Salamanca.

Cast. Centaurea reluciente.

Habita en Suecia y Siberia : en los circuitos de Madrid , en la Real Dehesa de San Sebastian , en Salamanca y otras partes de España. ♂

Rha-
ponti-
ca.

34. CENTAUREA calycibus scariosis , foliis ovato-oblongis denticulatis integris petiolatis , subtus tomentosis. Hort. cliff. 221. Centaurea de cálices escariosos ; hojas entre aovadas y oblongas , con denticitos , enteras , pecioladas y por debaxo tomentosas.

618 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Centaurium foliis petiolatis, lanceolatis, ad pediculum emarginatis. Hall. Centaura de hojas con petiolo, lanceoladas y escotadas ácia el piececito. helv. n. 160.

Rhaponticum capitatum, Inulæ seu Centauræ majoris facie. Lob. ic. 288. R. Rhapontico con flores en cabezuela; y traza como la de la Inula, ó Centaura mayor.

Rhaponticum alterum, angustiori folio. Lob. ic. 288. Hall. Otro Rhapontico con hoja mas angosta.

Rhaponticum folio Helenii, incano. C. B. P. 117. Rhapontico con hoja como la del Helenio, y blanquecina.

Rhaponticum angustifolium, incanum. C. B. P. 117. Hall. Rhapontico blanquecino, de hoja angosta.

Centaurium majus, folio Helenii, incano. Tourn. p. 449. Centaura mayor, con hoja como la del Helenio, y blanquecina.

Centaurium sive Rhaponticum alterum, angustiore folio. Bauh. hist. 3. p. 41. Centaura ú otro Rhapontico, con hoja angosta.

Cast. Centaurea Rhapontico.

Habita en los alpes de Suiza y de Verona.

Tiene las *hojas* entre de figura de corazon y oblongas, aserradas y con tomento blanco por debaxo: pocas en el tallo y alguna vez hendidas al través: la *flor* solitaria y grande, con ningun flosculo neutro. Hall.

Baby-
onica.

35. CENTAUREA calycibus scariosis, foliis sub-tomentosis decurrentibus indivisis, radicalibus lyratis. Centaura con los cálices escariosos; hojas algo tomentosas, escurridas, indivisas, y las radicales en forma de lira.

Serratula (Babyloniæ) fo-
liis tomentosis decurrenti-
bus subintegerrimis conca-
vis canaliculatis, radicali-
bus lyratis, floribus thyr-
soideo-spicatis. Spec. pl. ed.
 3. p. 1148. Gov. illustr. 61.

Serratula (de Babilonia)
 con hojas tomentosas, escur-
 ridas, casi enterisimas, cón-
 cavas y acanaladas, las ra-
 dicales en forma de lira; y
 flores entre en panoja aova-
 da y espigadas.

Rhaponticoides lutea, al-
tissima, Helenii folio, ala-
to caule. Vaill. aét. 182. n.
 27.

Planta como Rhapontico,
 altísima, con la flor amari-
 lla; hoja como la del Hele-
 nio; y tallo alado.

Yacea latissimo, lacinia-
to folio. C. B. P. 272. Tourn.

Yacea con hoja muy an-
 cha y laciniada.

P. 443.

Yacea Babylonica. C. B.

Yacea de Babilonia.

Prodr. 235.

Yacea maxima. Alp. exot.

Yacea muy grande.

t. 282.

Cast. Centaurea de Babilonia.

Habita en Oriente. 24

Es muy semejante á la *Centaurea con hoja de Pastel*.

Echa el tallo con muchas ramas anguladas: las *hojas*
radicales entre lanceoladas y aovadas, con algun dien-
 tecito, y las mas veces con dos mas grandes en su base,
 algo ásperas, pecioladas y de la magnitud de las de la
Bella-dama: las del tallo lanceoladas y escurridas co-
 mo las de la *Centaurea con hoja como la del Pastel*; el
caliz ligeramente escarioso: la *corola* amarilla: las *flo-*
res casi sentadas, con sus piecitos de quatro flores
 poco mas ó menos, y puestas en panoja aovada.

Glas-
 titolia.

36. CENTAUREA caly-
cibus scariosis, foliis indi-
visis integerrimis decurren-
tibus. Hort. cliff. 421. Gov.
 illustr. 75.

Centaurea con cálices es-
 cariosos; hojas indivisas, en-
 terisimas y escurridas.

Centaurium majus, Orien-
tale, erectum, Glastifolio,
flore luteo. Comm. rar. 39.
 t. 39.

Centaurea mayor, Orien-
 tal, derecha, con hoja co-
 mo la del Pastel; y flor ama-
 rilla.

Cast.

620 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Centaurea con hoja de Pastél.

Habita en Oriente y en la Siberia. 2

Tiene la flor amarilla : y el radio mas corto que el disco.

Coni-
fera.

37. CENTAUREA caly-
cibus scariosis , foliis to-
mentos , radicalibus lan-
ceolatis , caulinis pinnatifi-
dis , caule simplici . Roy.
lugdb. 142.

Centaurea con cálices es-
cariosos ; hojas tomentosas,
las radicales lanceoladas,
las del tallo hendidas al tra-
vés ; y éste sencillo.

Yacea montana , incana,
capite pini. C. B. P. 272.
Mill. dict. t. 153.

Yacea montana , blan-
quecina , con la cabezuela
como piña.

Chamelæon non aculeatus.
Lob. ic. 7.

Châmeleon sin agujones.

Centaurium majus , inca-
num , humile , capite pini.
Tourn. p. 449.

Centaura mayor , blan-
quecina , baxa , con cabe-
zuela de piña.

Stæbe pinea , amplo capi-
te. Barr. ic. 138.

Estebe con la cabezuela
como piña y ancha.

Cast. Centaurea de piña.

Habita en Mompeller : en los circuitos de Madrid , en el
Real Sitio de Aranjuez , en la Mancha , Alcarria , Ara-
gon , Cataluña y en otras partes de España. 2

Posee el vilano de las semillas plumoso. Dill.

Es planta del largo de un pie y tomentosa. Tiene la raíz
fusiforme : las hojas radicales enterisimas ; y las de mas
arriba hendidas al través , con su lacinia terminal mas
grande : las escamas del caliz transparentes ; y las su-
periores de color que tira á purpúreo. Gov. hort. 459.

ESPECIES CON LAS ESPINAS DEL CALIZ PALMEADAS.

Son-
chifo-
lia:

38. CENTAUREA caly-
cibus palmato-spinosis , fo-
liis decurrentibus spinulo-
sis repando-dentatis. Hort.
cliff. 423. n. 22.

Centaurea de cálices con
espinas palmeadas ; hojas es-
curridas , con espinitas , on-
deadas por su margen y den-
tadas.

Facea laciniata, *Sonchi-* *Yacea laciniada*, con ho-
folio, seu *Facea latifolia*, ja como la de la Cerraja, ó
purpurea, *capite spinoso*. *Yacea* de hoja ancha, con
 C. B. P. 272. Prodr. 128. la flor purpúrea y cabezuela
 Herm. lugdb. 331. t. 675. espinosa.
 Pluk. phyt. t. 39. f. 1.

Cast. Centaurea con hoja de Cerraja.

Habita en lugares marítimos del Mediterráneo. ☉ 4

Echa las *hojas inferiores* con peciolo, indivisas, entre lanceoladas y aovadas; las *superiores* sin peciolo, y dentadas ácia su base; las *supremas* algo escurridas y lanceoladas: el *tallo* sencillo y angulado, con sus hojas escurridas entre ondeadas por su margen y espinosas: el *ramo* mas largo que el tallo: la *flor* solitaria, grande y que comunmente deprime el tallo ácia la tierra: el *caliz* aovado, verde, con espinas de color amarillo-roxo, y la del medio mas larga y casi encorvada ácia atrás: el *radio de la flor* hendido en cinco lacinias, mayor y purpúreo: el *disco* blanquecino y de color que tira á purpúreo por su ápice.

Seri-
dis.

39. CENTAUREA *calycibus palmato-spinosis, foliis decurrentibus tomentosis oblongis, infimis sinuato-dentatis*. Sauv. meth. 288. *Centaurea* de cálices con espinas palmeadas; hojas escurridas, tomentosas, oblongas, y las de mas abaxo entre sinuosas y dentadas.

Facea foliis Seridis, candidantibus, purpurea. C. B. P. 272. *Yacea* con hojas como las de la Endibia, de color que tira á candido; y flor purpúrea.

Carduus Hispanicus, purpureus, foliis Cichorei. Tourn. p. 442. *Cardo* de España, con la flor purpúrea; y hojas como las de la Achicoria.

Facea purpurea, Hispanica, muricata. Bauh. hist. 3. p. 33. descriptio. *Yacea* de España, de flor purpúrea, y cabezuela con puntitas ó espinas rígidas.

Facea latifolia, spinosis capitulis, pulchris, flore purpureo. Bauh. hist. 3. p. 33. Rai. hist. 320. *Yacea* con hoja ancha, cabezuelas hermosas, con espinas; y flor purpúrea.

622 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Facea latifolia, caule alato, capite magno, turbinato. Pluk. phyt. t. 38. f. 1. Yacea con hoja ancha; tallo alado; cabezuela grande y de figura de trompo.

Cast. Centaurea como Endibia.

Habita en los campos y viñas de España. 26

Es planta tomentosa y casi del largo de un pie; con tallos algo ramosos. Echa las hojas anchas y lanceoladas, escurridas, aserradas y con sus aserraduras algo espinosas: los cálices terminales, aovados; y sus escamas en el ápice palmeadas con nueve ó mas espinas setáceas: las corolas con el radio purpúreo: y el disco de pocas flores y blanquecino.

Lleva algunos pedunculos axilares, solitarios, de una flor, cortos y con dos hojuelas.

Romana. 40. CENTAUREA calycibus palmato-spinosis, foliis decurrentibus inermibus, radicalibus pinnatifidis, impari maximo. Hort. cliff. 423. Centaurea de cálices con espinas palmeadas; hojas escurridas, é inermes, las radicales hendidas al través, con la lacinia impar muy grande.

Facea spinosa, Cretica. Zann. hist. 141. t. 42. Yacea espinosa, de Creta.

Cyanus Erucæ folio, flore rubro. Barr. rar. 87. t. 504. Aciano con hoja como la de la Oruga; y flor encarnada.

Cast. Centaurea Romana.

Habita en la campiña de Roma. ☉

Sphaerocephala. 41. CENTAUREA calycibus palmato-spinosis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis dentatis. Hort. cliff. 423. Centaurea de cálices con espinas palmeadas; hojas entre aovadas y lanceoladas, con peciolo y dientes.

Facea sphaerocephala, spinosa, Tingitana. Herm. lugdb. 332. t. 333. Moris. hist. 3. p. 143. sect. 7. t. 27. f. 9. Yacea de Tanger, con cabezuela redonda y espinosa.

Cast.

Cast. Centaurea de cabeza redonda.

Habita en Mauritania y en España.

Isnard.

42. CENTAUREA calycibus palmato-spinosis, foliis lyrato-dentatis hispidis subamplexicaulibus, floribus sessilibus terminalibus. Centaurea de cálices con espinas palmeadas; hojas entre en forma de lira y dentadas, con pelo rígido y que casi abrazan el tallo; flores sin pedunculo y terminales.

Calcitrapoides procumbens, Cichorii folio, flore purpurascens. Isn. paris. 1719. p. 164. t. 9. Planta como la Calcitrapa, tendida, con hoja como la de la Achicoria; y flor de color que tira á purpúreo.

Cast. Centaurea de Isnard.

Habita en la Europa austral? 24

Acaso es variedad solamente de la Centaurea enlutada?

Napifolia.

43. CENTAUREA calycibus palmato-spinosis, foliis decurrentibus sinuatis spinulosis, radicalibus lyratis. Roy. lugdb. 141. Mill. dict. n. 14. Centaurea de cálices con espinas palmeadas; hojas escurridas, sinuosas y con espinitas, y las radicales liradas.

Facea Cyanoides, altera, alato caule. Herm. par. 189. t. 189. bona. Otra Yacea como Aciano, con el tallo alado.

Facea peregrina, Napifolia, echinatis capitulis, caule alato. Pluk. alm. 192. t. 94. f. 2. Moris. hist. 3. p. 154. f. 7. t. 26. f. 20. Yacea peregrina, con hoja como la del Nabo; cabezuelas erizadas; y tallo alado.

Cast. Centaurea con hoja de Nabo.

Habita en Creta. ☉

Tiene las espigas del caliz de color amarillo-roxo: los pétalos del radio de la corola purpúreos, neutros, hendidos en cinco lacinias, y las dos interiores mas pequeñas.

As- 44. *CENTAUREA calycibus palmato-trispinosis, foliis lanceolatis dentatis.* Centaurea de cálices con tres espinas palmeadas; hojas lanceoladas y con dientes. Sauv. monsp. 289.

Stæbe squamis asperis. Estebe con escamas del caliz ásperas. C. B. P. 273. Rai. hist. 319.

Yacea cum spinosis capitulis, purpurea, tenuifolia. Yacea con cabezuelas espinosas; flor purpúrea; y hoja delgada. Bauh. hist. 3. p. 33.

Yacea supina, maritima, laciniata, capite spinoso, flore rubello. Yacea echada, maritima, y laciniada, con cabezuela espinosa; y flor roxita. Bocc. mus. 2. p. 35. t. 26.

Carduus Yaceæ folio, capitulo minori, cum squamis tricuspidatis. Cardo con hoja como la de la Yacea; cabezuela mas pequeña, y sus escamas con tres puntas. Tourn. p. 442.

Cast. Centaurea áspera.

Habita en Mompeller, Toscana y Portugal: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España.

Posee las espinas del caliz divididas en tres ó en cinco: y es planta muy ramosa.

ESPECIES CON LAS ESPINAS DEL CALIZ COMPUESTAS.

Bene- 45. *CENTAUREA calycibus duplicato-spinosis lanatis involuocratis, foliis semidecurrentibus denticulato-spinosis.* Centaurea de cálices con espinas duplicadas, lanudos y con involuacro; hojas medio escurridas, y con dientes espinosos. Mat. med. 220. Mill. dict. n. 24.

Cnicus caule diffuso, foliis dentato-sinuatis. Cnico con el tallo difuso; y hojas entre dentadas y sinuosas. Hort. cliff. 365. spec. pl. 1. p. 826.

Cnicus sylvestris, hirsutus, seu Carduus benedictus. Cnico silvestre, con pelo áspero; ó Cardo santó. C. B. P. 378. Tourn. p. 450.

Carduus benedictus. Cam. x Cardo bendito ó santo.
 epit. 562. Bauh. hist. 3. p. x
 75. Dod. pempt. 737. x

Cast. Centaurea bendita. *Farm.* *Carduus benedictus*. vulgo: Cardo santo.

Habita en Chio y en Lemnos: en los alrededores de Madrid, en Aragon, Cataluña y otras muchísimas partes de España. ☉

Los *flosculos* del radio son pequeños y hendidos en tres partes.

PROPIED. La yerba es muy amarga, balsámica, antacida, sudorífica, tónica y expelente: se usa en la anorexia, caquexia, y artritis: en los vertigos, emicranea ó xaqueca, terciana, pleuritis y en la peste.

Eriophora. 46. **CENTAUREA** calycibus duplicato-spinosis lanatis, foliis semidecurrentibus integris sinuatisque, caule prolifero. Hort. ups. x Centaurea de cálices con espinas duplicadas, y lanudos; hojas medio escurridas, enteras y sinuosas; y tallo prolifero.
 472. Mill. dict. n. 23. x

Calcitrapa lutea, alato caule, capite eriophoro. Vaill. act. 1718. p. 212. x Calcitrapa con la flor amarilla; tallo alado; y cabezuela lanuda.

Carduus Lusitanicus, canescens, alato-caule, capite lanuginoso. Tourn. p. 441. x Cardo de Portugal, con pelo blanquecino; tallo alado; y cabezuela lanuginosa.

Cast. Centaurea lanuda.

Habita en Portugal: en Sierra-morena, Extremadura y otras partes de España en terrenos áridos é incultos. ☉

Arroja el tallo prolifero: las hojas inermes; las radicales lanceoladas: las del tallo laciniadas: y las de las ramas lineares: el caliz grande y muy entretejido de lana: la corola pequeña y amarilla: los *flosculos* neutros hendidos en quatro lacinias y mas cortos que los hermafroditos.

Ægyptiaca.

47. *CENTAUREA calycibus duplicato-spinosis sublanatis, foliis sessilibus lanceolatis integris dentisque, caule prolifero.* Centaurea de cálices con espinas duplicadas, algo lanudos; hojas sin peciolo, lanceoladas, enteras y dentadas; y tallo prolifero.

Cast. Centaurea de Egipto.

Habita en Egipto. Turra. ☉

Produce el tallo del largo de un pie, difuso, y entre prolifero y ramoso: las ramas que salen de las axilas de las hojas superiores, alternas y terminadas en una flor: las hojas alternas, sentadas, ó que abrazan la mitad del tallo, y algo ásperas: las de mas abaxo hendidas al través: las del medio liradas: y las superiores lanceoladas: las flores casi sin pedunculo y mediocres: el caliz aovado y algo lanudo, con pelillos claros: las escamas con una espina de color que tira á purpúreo, delgada y adornada por su base en ambos lados con dos espinitas setáceas: la corola blanca: las corolillas del radio mas pequeñas, hendidas en quatro lacinias: con las anteras de color amarillo-roxo y que por su ápice tira al de rubio.

Calci-
trapa.

48. *CENTAUREA calycibus subduplicato-spinosis sessilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloso.* Centaurea de cálices con espinas casi duplicadas, y sentados; hojas hendidas al través, lineares, dentadas; y tallo peloso.

Mat. med. 221.

Centaurea calycibus subulato-spinosis sessilibus, foliis linearibus pinnatifidis. Centaurea de cálices con espinas alesnadas, y sentados; hojas lineares y hendidas al través.

Hort. cliff. 423. Gort. Gelr. 496.

Calcitrapa foliis pinnatis, pinnis dentatis, floribus indivisis, alis sessilibus. Calcitrapa de hojas pinnadas, sus hojuelas con dientes; y flores sentadas en las axilas.

Carduus stellatus, sive Calcitrapa. Cardo estrellado, ó Calcitrapa. Bauh. hist. 3. p.

89. Tourn. p. 440.

Car.

Carduus stellatus, foliis *Cardo* estrellado, con ho-
Papaveris erratici. C. B. P. jas como las de la Amapola.
 387. Rai. hist. 317.

Carduus muricatus, vul- *Cardo* con puntas rígidas
go Calcitrapa dictus. Clus. ó espinas, llamado vulgar-
 hist. 2. p. 7. mente *Calcitrapa*.

Cast. Centaurea Calcitrapa.

Habita en Suiza, Inglaterra y en la Europa austral: en
 los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña, Alcar-
 ría, Castilla la vieja, y en otras muchas partes de Espa-
 ña, junto á los caminos. ☉

Tiene la flor purpúrea: el tallo prolifero: las espinas del
 caliz blancas: y varía con la flor tambien blanca.

PROPIED. La corteza de la raíz es amarga, balsamica y
 tonica: produce admirables efectos en las calenturas
 intermitentes: ayuda á expeler el cálculo y suaviza el
 dolor nefritico.

Cal- 49. CENTAUREA caly- *Centaurea* de cálices con
 citra- *cibus subduplicato-spinosis*, espinas casi duplicadas; ho-
 poides *foliis amplexicaulibus lan-* jas amplexicaules, lanceola-
ceolatis indivisis serratis. das, indivisas y aserradas.
 Amoen. acad. 4. p. 291.

Carduus stellatus, foliis *Cardo* estrellado, con ho-
integris, serratis. Tourn. jas enteras y aserradas.
 p. 440. Magn. monsp. 242.

Cast. Centaurea como Calcitrapa.

Habita en Mompeller y Palestina.

Es producida de la *Centaurea Calcitrapa*; pero posee las
 hojas indivisas.

Solsti- 50. CENTAUREA caly- *Centaurea* de cálices con
 tialis. *cibus duplicato-spinosis so-* espinas duplicadas, y soli-
litariis, foliis rameis de- tarios; hojas de las ramas es-
currentibus inermibus lan- curridas, inermes, lanceola-
ceolatis, radicalibus lyrato- das, y las radicales entre li-
pinnatifidis. Hort. cliff. 423. radas y hendidas al través.

Calcitraba caule alato, *foliis tomentosis*, *radicalibus semipinnatis*, *caulinis lanceolatis*, *dentatis*. Hall. helv. n. 193. *Calcitraba* con el tallo alado; hojas tomentosas, las radicales medio pinnadas, las del tallo lanceoladas y con dientes.

Carduus stellatus, *luteus*, *foliis Cyani*. C. B. P. 387. Rai. hist. 317. Tourn. p. 440. *Cardo* estrellado, con la flor amarilla; y hojas como las del Aciano.

Carduus stellatus, *minor*, *Apulus*. Col. ecphr. 1. p. 30. t. 31. *Cardo* estrellado, de Puzos, mas suave ó con menos espigas.

Cast. Centaurea Solstitial.

Habita en Francia, Inglaterra, Italia y Alemania: en el circuito de Madrid, en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. ☉

Posee las *hojas radicales* liradas y puntiagudas: las *flores* terminales y solitarias: los *pedunculos* larguissimos y foliosos, sin alguna hojuela en el caliz: las *espigas del caliz* blancas; las *de abaxo de él* mas largas y dentadas solamente por su base.

Melitenensis.

51. CENTAUREA *calycibus duplicato-spinosis terminalibus confertis*, *foliis decurrentibus lanceolatis sinuosis inermibus*. Roy. lugdb. 140. *Centaurea* de cálices con espigas duplicadas, terminales y amontonados; hojas escurridas, lanceoladas, sinuosas é inermes.

Carduus Melitensis, *capitulis conglobatis*. Tourn. p. 443. Bocc. sicc. 65. t. 35. *Cardo* de Malta, con cabezuelas conglobadas.

Cast. Centaurea de Malta.

Habita en Malta y Mompeller. ☉

Echa las *hojas radicales* liradas y obtusas: dos ó tres *flores* terminales y amontonadas: los *pedunculos* cortísimos: las *espigas* que no son mas largas que el caliz, y tambien dentadas sobre su base: una ú otra *hojuela* en el caliz y de su misma longitud.

Sicula.

52. *CENTAUREA caly-* X Centaurea de cálices con
cibus ciliato-spinosis, foliis X espinas pestañosas; hojas es-
decurrentibus lyratis iner- X curridas, liradas, inermes,
mibus incanis, capitulis ter- X blanquecinas; y cabezuelas
minalibus. Sauv. monsp. 290. X terminales.

Yacea Sicula, Cichorii X Yacea de Sicilia, con ho-
folio, flore luteo, capite spi- X ja como la de la Achicoria;
noso. Magn. monsp. 138. X flor amarilla; y cabezuela
Moris. hist. 3. p. 144. sect. X espinosa.
 7. t. 28. f. 26.

Carduus Melitensis, Eru- X Cardo de Malta, con ho-
cæ folio, luteo flore. Tourn. X ja como la de la Oruga; y
 p. 442. X flor amarilla.

Cast. Centaurea de Sicilia.

Habita en Sicilia: en Santa Cruz de Mudela y otras par-
 tes de Andalucía. 24

Tiene las *hojas radicales* liradas, obtusas, con dienteci-
 tos y ásperas: las del *tallo* lanceoladas y escurridas: los
cálices grandes, aovados, y sus escamas con la espina
 mas grande de color pardo.

Cen-
 tauroi-
 des.

53. *CENTAUREA caly-* X Centaurea de cálices pes-
cibus ciliatis spinosis, foliis X tañosos y espinosos; hojas
lyrato-pinnatis integerri- X entre en forma de lira y pin-
mis, lacinia impari majore. X nadas, enterisimas, y la la-
 Roy. lugdb. 141. n. 27. X cinia impar mas grande.

Yacea lutea, spinosa, Cen- X Yacea como Centaura,
tauroides. C. B. P. 272. X espinosa, y con la flor ama-
 rilla.

Yacea levis, maxima, X Yacea de Pulla, lisa, muy
Centauroides, Apula. Col. X grande, y parecida á la Cen-
ecphr. 1. p. 33. t. 35. X taura.

Cast. Centaurea como Centaura.

Habita en Italia y Mompeller: en la Alcarria, Asturias
 y otras partes de España.

Las *escamas del caliz* se hallan pestañosas, con una es-
 pina terminal; pero las *interiores* son escariosas, pes-
 tañosas y sin espinas.

630 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL,

Colli-
na.

54. *CENTAUREA calycibus ciliatis inermi-spinosis, foliis radicalibus bipinnatifidis, caule acutangulo.* Scop. carn. 2. 1029. Centaurea de cálices pestañosos, con espinas que no punzan; hojas radicales dos veces hendidas al través; y tallo acutangulo.

Facea lutea, capite spinoso. C. B. P. 272. Yacea con la flor amarilla; y cabezuela espinosa.

Facea luteo flore. Clus. hist. 2. p. 8. Yacea con la flor amarilla.

Carduus luteus, Centaureoides, segetum. Tourn. p. 443. Cardo de sembrados, como Centaura, con la flor amarilla.

Cast. Centaurea colina.

Habita en Italia, Mompeller y en la Carniola: en los circuitos de Madrid, Aragon, Cataluña y en otras partes de España. ¶

Tiene las flores neutras del radio hendidas en quatro partes; y las lacinias de las hojas terminadas en una espina que no punza. Sinops. pl. Arag. p. 127.

Las hojas radicales dos veces solamente hendidas al través: y las escamas de mas arriba del caliz obtusas y pestañosas. Gov. hort. 467.

Ru-
pestris

55. *CENTAUREA calycibus ciliatis spinosis, foliis bipinnatis linearibus.* Centaurea de cálices pestañosos, con espinas; hojas dos veces pinnadas y lineares.

Facea laciniata, lutea. C. B. P. 272. Yacea laciniada, con la flor amarilla.

Facea montana, minima, tenuifolia. Col. ecphr. 1. p. 36. t. 35. f. 2. Yacea montana, muy pequeña, con hoja delgada.

Cast. Centaurea rupestre.

Habita en Italia. ¶

Es muy semejante á la *Centaurea colina*. Posee las escamas del caliz con pestañas de color pardo, terminadas en una espina débil, sencilla y mas corta que la misma escama: las escamas interiores escariosas: el tallo algo ramoso y apenas angulado: las hojas casi todas dos veces pinnadas, lineares y lisas, á excepcion de su margen;

gen; sin que sean lanceoladas, ni con las hojuelas ramosas al modo que la asta de Ciervo.

ESPECIES CON LAS ESPINAS SENCILLAS.

Verutum.

56. CENTAUREA calycibus simplicissime spinosis, dentibus duobus oppositis, foliis lanceolatis integris decurrentibus. Amœn. acad. 4. p. 292.

Centaurea de cálices con espinas muy sencillas y dos dientes opuestos; hojas lanceoladas, enteras y escurridas.

Centaurea foliis radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis decurrentibus subintegerrimis, spinis calycum longissimis unidentatis. Gou. illustr. p. 73. R.

Centaurea con las hojas radicales entre en forma de lira y runcinadas; las del tallo escurridas, casi enteras; y espinas de los cálices larguissimas y con un diente.

Cast. Centaurea armada ó veruta.

Habita en Oriente.

Tiene las hojas de abaxo del tallo liradas: la corola de la magnitud del caliz, con el radio igual.

Sal-manti-ca.

57. CENTAUREA calycibus setula subspinosa exstante glabris, foliis lyrato-runcinatis serratis. Jacq. hort. t. 64.

Centaurea de cálices lampiños, con una cerdita algo espinosa que sobresale; hojas entre en forma de lira, y runcinadas, y aserradas.

Centaurea calycibus setula reflexa spinosis glabris, foliis lyrato-runcinatis serratis. Spec. pl. 3. p. 1299. Hort. cliff. 421.

Centaurea de cálices lampiños y espinosos, con una cerdita redoblada; hojas entre en forma de lira, y runcinadas, y aserradas.

Yacea major, foliis Cichoraceis, mollibus, flore stamineo. Moris. hist. 3. p. 140. sect. 7. t. 26. f. 14.

Yacea mayor, con hojas como las de la Achicoria, blandas; y flor estambrosa.

Yacea major, foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginosis. C. B. P. 273.

Yacea mayor, con hojas como las de la Achicoria, blandas y lanuginosas.

Ja-

632 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Jacea foliis Cichoraceis, Yacea altísima, con hojas
villosis, *altissima*, *flore* como las de la Achicoria,
purpureo. Tourn. p. 444. vellosas; y flor purpúrea.

Stæbe Salmantica, pri- Estebe primera, de Sala-
ma. Clus. hist. 2. p. 9. Rai. manca.
 hist. 324.

Cast. Centaurea de Salamanca. *vulgo*: Escobilla.

Habita en la Europa austral: en los circuitos de Madrid,
 en Andalucía, Mancha, Alcarria, y en las dos Casti-
 llas donde la gastan para escobas. 24

Echa el tallo en panoja; con las ramas algo sencillas: las
 flores terminales: las hojas radicales lanceoladas, aser-
 radas, con pelo rígido y las aserraduras terminadas en
 punta rígida: las del tallo runcinadas, ásperas y eriza-
 das, con aserraduras algo espinosas: los cálices muy
 lampiños y aovados: las espigas del caliz pequeñas,
 tanto que apenas se manifiestan: las corolas blancas ó
 purpúreas: y las masculinas hendidas en quatro laci-
 nias.

Las hojas del tallo entre aovadas y lanceoladas, aser-
 radas y sin peciolo: las de mas arriba lanceoladas, entre
 dentadas y espinosas: los cálices aovados, con escamas de
 color entre negro y purpúreo por su ápice, y terminadas
 en una espinita setácea y muy pequeña. *Gov. hort.* 461.

Cicho-
 racea.

58. CENTAUREA *caly-* Centaurea de cálices con
cibus setaceo-spinosis, fo- espinas setáceas; hojas es-
liis decurrentibus, indivi- curridas, indivisas y con
sis serrato-spinosis. † aserraduras espinosas.

Jacea foliis Cichoreis, Yacea con hojas como las
caule alato, *flore purpureo*. de la Achicoria; tallo alado;
 Rai. Suppl. p. 203. Till. pis. y flor purpúrea.

84. t. 27.

Cast. Centaurea como Achicoria.

Habita en el monte argentario de Italia.

Muri-
cata.

59. CENTAUREA calycibus simplicissimè spinosis, foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus lanceolatis, pedunculis longissimis. Centaurea de cálices con espinas muy sencillas; hojas inferiores hendidas al través, las superiores lanceoladas; y pedunculos larguissimos.

Roy. lugdb. 141.

Cyanoides flos. Dod. pempt.

Flor como la del Aciano.

251.

Jacea Cyanoides, echinato capite. C. B. P. 272. Morris. hist. 3. p. 195.

Yacea como Aciano, con la cabezuela erizada.

Cast. Centaurea de puntitas.

Habita en España. ☉

Peregrina.

60. CENTAUREA calycibus setaceo-spinosis, foliis lanceolatis petiolatis, infernè dentatis. Hort. cliff. 423. Centaurea de cálices con espinas setáceas; hojas lanceoladas, pecioladas y con dientes por debaxo.

Roy. lugdb. 141.

Centaureum majus, foliis molli, acuto, lanceolato, flore aureo, magno, calyce spinoso. Boerh. lugdb. 1. p. 144. Centaura mayor, con hoja blanda, aguda y lanceolada; flor de color de oro, grande; y caliz espinoso.

Cast. Centaurea peregrina.

Habita en la Europa austral. ♂

Radiata.

61. CENTAUREA calycibus subinermibus subaristatis radiatis, foliis pinnatifidis. Syst. veg. 656. Centaurea de cálices casi inermes, con alguna arista, radiados; y hojas hendidas al través.

Xeranthemum (Erucifolium) foliis pinnatifidis. Xeranthemo (de hoja de Oruga) con hojas hendidas al través. Spec. pl. ed. 3. p. 1021. Gmel. sib. 2. p. 108. t. 47. f. 1. Pall. it. 3. p. 682.

Cast. Centaurea radiada.

Habita en Tanain cerca de la Villa llamada Cavilnense.

Tie.

634 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Tiene el *caliz* angosto; con las *escamas interiores* mas largas.

Nudi-caulis. 62. CENTAUREA caly- Centaurea de cálices con
cibus setaceo-spinosis, fo- espinas setáceas; hojas indi-
liis indivisis, superioribus visas, y las superiores casi
subdentatis, caule simplici dentadas; tallo sencillo, al-
nudiusculo unifloro. † Ger. go desnudo y de una flor.
prov. 187. t. 5.

Facea folio Cerinthes, Yacea de la peña de la
purpurascens flore, è rupe Victoria, con hoja como la
Victoriæ. Herm. parad. 190. de la Cerinte; y flor de co-
t. 190. lor que tira á purpúreo.

Facea Intibacea, capite Yacea como Endibia,
rubro, spinoso. Barr. ic. 1218. con la cabezuela roxa y es-
Bocc. mus. 2. p. 60. t. 48. pinosa.

Cast. Centaurea de tallo desnudo.

Habita en Italia y en la peña de la Victoria de Proven-
za. 24

Posee las primeras hojas aovadas al revés y enterisimas;
y las restantes entre aovadas y lanceoladas, con dien-
tes por su base: y el tallo casi desnudo.

Crocodilium. 63. CENTAUREA caly- Centaurea de cálices esca-
cibus scariosis simplicissi- riosos, con espinas muy sen-
me spinosis, foliis pinnati- cillas; hojas hendidas al tra-
fidis integerrimis, lacinia vés, enterisimas, y la laci-
extima majore dentata. nia de afuera mayor y den-
tada.

Crocodilium Vulneraria Cocodrilo con hojas como
foliis. Vaill. act. 183. las de la Vulneraria.

Cyanus purpureus, capi- Aciano de Siria, con la
te spinoso, Sirciacus. Barr. flor purpúrea; y cabezuela
rar. 927. t. 503. bona. espinosa.

Cast. Centaurea Cocodrilo.

Habita en la Siria. ☉

Arroja el tallo con ramas estriadas y ásperas: las hojas en-
tre en forma de lira y pinnadas, ó indivisas: los pedun-
culos largos y de una flor: las escamas del caliz aova-
das, gibosas, membranosas por sus margenes, blancas
y

y terminadas en una espina sencilla: los *flosculos neutros* muy grandes, hendidos en cinco lacinias casi iguales y de color que tira á purpúreo: los *hermafroditos* blanquecinos, purpúreos en su ápice y de la longitud de los del radio.

Pu-
mila.

64. *CENTAUREA calycibus simplicissimis spinosis, foliis dentato-pinnatis villosis, caule nullo.* Amœnit. acad. 4. p. 292. Centaurea de cálices muy sencillos, espinosos; hojas entre dentadas y pinnadas, vellosas; y sin tallo.

Crocodilium acaulon ferme, Calcitrapæ foliis crassis. Vaill. aët. 163. Cocodrilo casi sin tallo, con hojas como las de la Calcitrapa y crasas.

Cast. Centaurea enana.

Habita en Egipto.

Es semejante á la *Centaurea sin tallo*.

Tin-
gitana.

65. *CENTAUREA calycibus margine spinosis, foliis lanceolatis indivisis serrato-subspinosis, caulis unifloris.* † Centaurea de cálices espinosos por su margen; hojas lanceoladas, indivisas, entre aserradas y algo espinosas; y tallos de una flor.

Cyanus foliis ellipticis, dentatis, rigidis, floribus cœruleis oblongis. Hall. goett. 370. Zinn. goett. 393. Aciano con hojas elípticas, dentadas y rígidas; flores cerúleas y oblongas.

Cnicus perennis, cœruleus, Tingitanus. Herm. lugdb. 162. t. 163. Cnico perenne, de Tanger, con la flor cerúlea.

Cast. Centaurea de Tanger.

Habita en Tanger. ¶

Tiene los *flosculos del radio* estériles.

Galac-
tites.

66. *CENTAUREA calycibus setaceo-spinosis, foliis decurrentibus sinuatis spinosis subtus tomentosis.* Hort. cliff. 424. Centaurea de cálices con espinas setáceas; hojas escurridas, sinuosas, espinosas y con tomento por debaxo.

Car.

636 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Carduus tomentosus, *capitulum minore*. C. B. P. 382. X Cardo tomentoso, con la cabezuela mas pequeña.

Carduus galaetites. Bauh. X Cardo lechoso ó con manchas de color de leche.

Carduus Creticus, *non maculatus*, *caule alato*. Tourn. p. 441. X Cardo de Creta, sin manchas; y con el tallo alado. X urn. cor. 31.

Cast. Centaurea lechosa.

Habita en la Europa austral. 24

ORDEN IV.

POLYGAMIA NECESARIA. DE LAS MISMAS FLORES CON LOS FLOSCULOS DEL DISCO MASCULINOS, Y LOS DEL RADIO FEMENINOS.

1173. Género MILLERIA. * Mart. cent. 4.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun de una pieza, dividido en tres partes, muy grande, cerrado, en forma entre plana y de tres caras, y persistente: con las *dos hojuelas interiores* iguales, casi aovadas, agudas y planas: y la *exterior* al doble mayor, casi redonda, puntiaguda, plana, de figura de corazon y dividida mas profundamente que las demas.

COR. compuesta medio radiada; con dos *corolillas* hermafroditicas, puestas entre las hojuelas menores del caliz; y una sola femenina colocada dentro de la hojuela mayor.

Propia de las hermafroditicas: de un petalo, tubulosa, derecha y con cinco dientes.

De la femenina: ligulada, derecha, obtusa, cóncava y escotada.

ESTAMB. en las hermafroditicas: *filamentos* cinco y capilares: con otras tantas *anteras* derechas, lineares, unidas en medio de sus lados, del largo de la corola y agudas.

PIST. en las hermafroditicas: *germen* oblongo y muy delga-

gado: *estilo* filiforme, y de la longitud de la corolilla: con dos *estigmas* lineares, debiles, obtusos y extendidos.

En las femeninas: *germen* grande, de tres lados: *estilo* filiforme y del largo de la corolilla: con dos *estigmas* setáceos, redoblados y largos.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado en figura trigona hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas: ninguna (1).

En las femeninas: una sola, mas angosta ácia su base, obtusa, oblonga, de tres caras: y sin *vilano*.

RECEPT. comun apenas alguno.

R S P E C I E S.

Quin-
queflo-
ra.

1. MILLERIA *foliis cordatis, pedunculis dichotomis*. Hort. cliff. 425. Roy. culos ahorquillados. lugdb. 182.

Milleria annua, erecta, floribus spicatis, luteis. *Milleria annua*, derecha, con flores espigadas y amarillas. Mart. cent. 41. t. 41.

* *Milleria annua, ramosior, foliis maculatis profundius serratis*. Mart. cent. 47. t. 47. f. 2. *Milleria annua*, mas ramosa, con hojas manchadas, y mas profundamente aserradas. α

Milleria (maculata) foliis infimis cordato-ovatis acutis rugosis, caulinis lanceolato-ovatis, acuminatis. *Milleria (manchada)* con las hojas de abaxo entre de figura de corazon y aovadas, agudas, rugosas; las del tallo entre lanceoladas y aovadas, y puntiagudas. Mill. dict. n. 2.

Cast. *Milleria* de cinco flosculos.

Habita en Panamá y Vera-cruz.

Produce el tallo del largo de dos pies, apretado y rígido, liso, asurcado y con ramas opuestas en forma de aspa: las hojas opuestas, de tres nervios unidos mas arriba de su

(1) La flor hermafrodítica, como está dicho, es aquella que consta de *estambres* y *pistilo*; pero este sin fecundarse, respecto de hallarse imperfectos sus *estigmas*; por lo que no produce fruto.

su base , y con venas en redecilla : los *peciolos* unidos por su margen , con una estipula interpuesta obtusa y redoblada : las *panojas* divididas en dos ó tres partes , con los *piececitos* de una flor : el *caliz* de dos ventallas , coartado , y despues de haber florecido cerrado en forma de globo : las *corolillas masculinas* ó *hermafroditicas* de color amarillo-roxo ; y una sola *femenina* partida en tres lacinias : el *estilo* en las *masculinas* sencillo ; y en la *femenina* hendido en dos partes.

Biflora

2. MILLERIA *foliis ovatis*, *pedunculis simplicissimis*. Hort. cliff. 425. t. 25. Loeß. it. 239. X Milleria con hojas aovadas ; y pedunculos muy sencillos.

Milleria annua, *erecta*, *minor*, *foliis Parietariæ*, *floribus ex foliorum alis*. Mart. cent. 47. t. 47. f. 1. X *Milleria annua*, derecha , menor , con hojas como las de la *Parietaria* ; y flores que salen de las axilas de las hojas.

Cast. Milleria de dos flosculos.

Habita en Campeche. ☉

Tiene el *tallo* derecho , de la altura de tres ó quatro pies , algo rollizo y delgado ; con *ramas* opuestas en forma de aspa y articuladas ; y las articulaciones mas crasas por arriba y por un lado : las *hojas* entre oblongas y lanceoladas , del largo de una pulgada , con venas alternas , claras por arriba , y que sobresalen por debaxo , de color verde obscuro por encima , palidas por debaxo , opuestas , casi sentadas , lampifias ; aunque con algunos pelos apretados y claros : las *flores* axilares , ó terminales , con pedunculos amontonados , copiosos , capilares , sencillos y que cada uno lleva una flor comprimida : la *corola* compuesta de dos flosculos , el uno *masculino* y el otro *femenino* : el *masculino* tubuloso , angosto , de la longitud del caliz , abierto y con cinco dientes agudos : el *femenino* muy angosto , filiforme , derecho , estriado y con dos ó tres dientes. En algunas *flores* vió *Loefling.* los *flosculos masculinos* solamente , sin *femenino* alguno. Loeß. it. 239.

1174. Género BALTIMORA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun cilindrico ; de siete *hojuelas* lanceoladas , de-
rechas y las interiores mas cortas.

COR. *compuesta* radiada ; con muchas (XI.) corolillas
hermafroditicas , en el disco ; y cinco femeninas , en
el radio.

Propia de las hermafroditicas : en forma de embudo ;
con el *borde* hendido en cinco lacinias y tomentoso.

De las femeninas : ligulada , aovada , y hendida en tres
lacinias , con la del medio mas pequeña.

ESTAMB. en las hermafroditicas : *filamentos* cinco : con la
antera cilindrica.

PIST. en las hermafroditicas : *germen* desfigurado : *estilo*
corto : y sin *estigma*.

En las femeninas : *germen* oblongo , coronado con un
calicito con dientes y que se cae facilmente : *estilo* fi-
liforme y muy corto : con dos *estigmas* filiformes y
mas largos que la corolilla.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas : ninguna.

En las femeninas : de tres caras , desnuda y por su ápi-
ce gibosa.

RECEPT. pajoso.

ESPECIE.

Recta. I. BALTIMORA *foliis* ^X _X Baltimore con hojas opues-
oppositis. ^X _X tas.

Chrysanthemum Ameri- ^X _X Chrysanthemo de Ameri-
canum, caule alato, amplio- ^X _X ca , con el tallo alado ; hojas
ribus foliis binatis, flori- ^X _X mas anchas y de dos en dos ;
bus pallide lutescentibus ^X _X flores de color amarillo pali-
parvis. Pluk. mant. 46. t. ^X _X do y pequeñas.

342. f. 3. ^X _X

Cast. Baltimore recta.

Habita en Marilandia , junto á la Ciudad de Baltimo-
ra. ○

Arroja el tallo del largo de dos pies , de quatro lados , de-
re-

recho , verde , profundamente acanalado por sus lados , con los ángulos ásperos : las *ramas* laterales y cortísimas : las *hojas* opuestas , con peciolo , aovadas , puntiagudas , aserradas , de tres nervios , extendidas , algo tomentosas , con pelos cortísimos y como seda ; pero las antiguas ásperas : las *panojas* terminales y pequeñas : las *flores* amarillas : y las *corolillas del disco* tomentosas , con las anteras negras. La *planta* es semejante á la *Milleria* ; pero de género distinto.

1175. Género SILPHIUM. * Asteriscus Dill.

elth. 39. 42.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun aovado , apifiado y desparramado ; con *escamas* entre aovadas y oblongas , en medio redobladas que sobresalen por todas partes y persistentes.

COR. *compuesta* radiada ; con muchas *corolillas* hermafroditicas , en el disco ; y mas pocas femeninas , en el radio.

Propia de la hermafroditica : de un petalo , en forma de embudo , con cinco dientes : y el *tubo* apenas mas angosto que el borde.

De la femenina : lanceolada , larguísima , y las mas veces con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditicas : *filamentos* cinco , capilares , cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditicas : *germen* rollizo y muy delgado : *estilo* filiforme , larguísimo y veloso : con el *estigma* sencillo.

En las femeninas : *germen* de figura de corazon al revés : *estilo* sencillo y corto : con dos *estigmas* setáceos y de la longitud del estilo.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas : ninguna.

En las femeninas : algo membranosas , de figura de corazon al revés , con la margen membranosa , de dos astitas y escotada.

RECEPT. con pajas lineares.

E S P E C I E S.

Laci-
niatum

1. *SILPHIUM foliis al-ternis, pinnato-sinuatis.* Silphio con hojas alternas, y entre pinnadas y sinuosas.
Linn. fil. fasc. 1. t. 1.

Cast. Silphio laciniado.

Habita en la America septentrional y en Misisipi. Collinson. 24

Produce el tallo de la altura de dos hombres, del grueso de una pulgada, muy sencillo, liso por debaxo, áspero y rollizo por arriba, con tuberculos de color obscuro, y pelos extendidos y blancos: las hojas alternas, con peciolo, del largo de dos pies, y del ancho de uno, amplexicaules y hendidas al través; con quatro ó cinco lacinias en ambas partes, apartadas, angostas, entre dentadas y sinuosas, ásperas, con sus lomos elevados y muy solidos; y la margen de las hojas superiores de color que tira á purpúreo: el caliz de diez escamas, que sobresalen en espinas grandes y alesnadas: la corola con treinta petalos en el radio y del largo del caliz; con el estilo hendido en dos partes y delgado: muchos floseulos en el disco, de color amarillo-roxo, separados por medio de pajas y adelgazados en su base: con el estilo sencillo: las semillas del radio membranosas, ovales, escotadas, con dos aristas pequeñas: y las semillas del disco columnares, de quatro lados y esteriles.

Perfo-
liatum.

2. *SILPHIUM foliis oppositis deltoidibus petiolatis, caule tetragono.* Silphio de hojas opuestas, de figura que tira á la de delta, con peciolo y perfoliadas; tallo de quatro lados y liso.
Perfoliatis, caule tetragono.
lavi.

Silphium foliis radicalibus cordato-ovatis inæqualiter dentatis, caulinis subintegerrimis. Silphio de hojas radicales, entre de figura de corazon y aovadas, con dientes desiguales; y las del tallo casi enterisimas. Gov. hort. 462.

Cast. Silphio perfoliado.

Habita en Misisipi. 24

TOM. VI.

Ss

Arro-

642 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Arroja el *tallo* mas alto que un hombre , de quatro lados y liso : las *hojas* opuestas , aovadas , ó que tiran á la figura de delta , aserradas , escurridas por los peciolo, opuestas y perfoliadas : las *de mas arriba* sin peciolo, muy anchas y perfoliadas : el *pedunculo* terminal y que sale de las axilas de las últimas hojas , rollizo é inclinado : el *caliz* desparramado y obtuso : la *corola* amarilla, con veinte y quatro radios , y los *estilos* divididos en dos partes : el *disco* con los estilos sencillos , mas largos y esteriles.

El *tallo* roxo : las *hojas radicales* con el peciolo largo : los *peciolo*s acanalados por una parte y alados : y las *corolas del radio* mas largas que los pedunculos. Gov. loco citato.

Con-
natum. 3. SILPHIUM *foliis oppositis sessilibus perfoliatis,* $\begin{smallmatrix} \times \\ \times \end{smallmatrix}$ Silphio con hojas opuestas sin peciolo , perfoliadas ; y $\begin{smallmatrix} \times \\ \times \end{smallmatrix}$ *caule tereti scabro.* tallo rollizo y áspero.

Cast. Silphio de hojas unidas.

Habita en la America. \mathcal{Z}

Produce el *tallo* de la altura de un hombre , del grueso de una pulgada , derecho , muy sencillo , rollizo , por debajo de quatro lados poco manifestos , y áspero con pelos doblados : las *hojas* opuestas , entre unidas por su base y perfoliadas , entre aovadas y oblongas , concavas en el disco , como en el *Dipsaco laciniado* , y sin peciolo , ásperas , del largo de un xeme , algo agudas y aserradas : la *panoja* terminal y ahorquillada : los *pedunculos* que salen de la horquilladura , solitarios , de una flor y del largo de los entrenudos : el *caliz* desparramado , con las escamas aovadas , algo obtusas , lisas , redobladas por su ápice plano , como en el *Silphio asperisco* : la *corola* radiada , de color amarillo-roxo , con muchos flosculos en el disco , hermafroditicos ó que abortan ; y el *estilo* sencillo que sale afuera : doce *flosculos* en el radio , alargados , femeninos , fértiles , con el pistilo hendido en dos partes , y mas corto que los flosculos.

Aste-
riscus.

4. *SILPHIUM foliis oppositis sessilibus indivisis, inferioribus alternis.* Mill. dict. n. 2. Silphio con hojas opuestas, sin peciolo é indivisas, y las inferiores alternas.

Silphium. Hort. cliff. 494.

Silphio.

Asteriscus Coronæ Solis

folio & facie. Dill. elth. 42. t. 37. f. 42. como las de la Corona del Sol.

Cast. Silphio Asterisco.

Habita en la Virginia y en la Carolina. 2

Solidagi-
noides

5. *SILPHIUM foliis oppositis petiolatis lanceolatis acute serratis.* Mill. dict. n. 3. Silphio de hojas opuestas, con peciolo, lanceoladas y agudamente aserradas.

Silphium (Heliantoides) foliis oppositis petiolatis serratis. Gron. virg. 134.

Silphio (como *Heliantho*) de hojas opuestas, con peciolo y aserradas.

Chrysanthemum Marianum, Virgæ-aureæ Americænæ foliis, florum petalis tridentatis. Pluk. mant. 46.

Chrysanthemo de la Isla Mariana, con hojas como las de la Virgaurea de America; y petalos de las flores con tres dientes.

Cast. Silphio como Solidago.

Habita en la Virginia. Doct. Gron.

Tiene el tallo lampiño: las hojas lampiñas por debaxo: el caliz con dos series de hojas: los petalos del radio hendidos ligeramente en tres partes; y los del disco que abortan. Su traza es como la del *Heliantho*.

Trifolium

6. *SILPHIUM foliis ternis.* Mill. dict. n. 1. Gron. virg. 133. Silphio con hojas de tres en tres.

*Chrysanthemum Virgini-
anum, foliis asperis, tri-
bus seu quaternis, ad geni-
cula sitis.* Moris. hist. 3. p. 24. sect. 6. t. 3. f. 68. Rai.

Chrysanthemo de Virginia, con hojas ásperas, de tres en tres, ó de quatro en quatro, y puestas en los nudos.

Suppl. p. 211.

Cast. Silphio con hojas de tres en tres.

Habita en la Virginia.

Trilobatum.

7. *SILPHIUM foliis oppositis sessilibus cuneiformibus trilobis.* Amoen. acad. 4. p. 307. Silphio con hojas opuestas, sentadas, en forma de cuña y hendidas en tres lóbulos.

Buphthalmum hirsutum, foliis trilobis, ad basim angustioribus, oppositis, floribus solitariis axillaribus. Brown. jam. 321, Buphthalmo con pelo áspero; hojas hendidas en tres lóbulos, mas angostas en su base y opuestas; flores solitarias y axilares.

Corona Solis, maritima, humilis, folio carnoso tri- cuspidi, flore luteo. Plum. spec. 10. ic. 107. f. 2. Corona del Sol, maritima, y baxa, con hoja carnosa, de tres puntas; y flor amarilla.

Chrysanthemum palustre, repens, minus, odoratum, folio scabro trilobato. Sloan. jam. 126. hist. 1. p. 62. t. 155. f. 1. Pluk. phyt. t. 450. f. 4. Chrysanthemo palustre, rastrero, menor y oloroso; con hoja áspera y hendida en tres lóbulos.

Cast. Silphio de tres lóbulos.

Habita en la America.

Terebinthaceum.

8. *SILPHIUM foliis alternis ovatis serratis scabris, radicalibus cordatis.* Suppl. p. 383. Silphio con hojas alternas, aovadas, aserradas y ásperas, y las radicales de hechura de corazon.

Silphium terebinthaceum. Jacq. hort. vol. 1. p. 16. t. 43. Silphio trementinoso.

Cast. Silphio trementinoso.

Habita.....

Tomó Linneo esta especie de la figura que trae el famoso Jacq.

1176. Género POLYMNIA. * Tetragonotheca

Gen. ed. VI. n. 976. Wedelia. Jacq.

amer. 217.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun exterior extendido , mayor y de cinco hojuelas aovadas : el interior de diez hojuelas, en forma de navecilla y derechas.

COR. compuesta radiada ; con muchas corolillas hermafroditicas , en el disco ; y cinco, ó diez femeninas , en el radio.

Propia de la hermafrodítica : en forma de embudo y hendida en cinco partes.

De la femenina : ligulada y con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditicas : filamentos cinco : con la antera cilindrica , tubulosa , y poco mas larga que la corola.

PIST. en las hermafroditicas : germen muy pequeño : estilo filiforme , del largo de los estambres : con el estigma obtuso.

En las femeninas ; germen aovado y mayorcito : estilo filiforme , del largo del tubo : con dos estigmas agudos.

PERIC. ninguno : el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. En las hermafroditicas : ninguna.

En las femeninas : aovadas al revés , gibosas , algo anguladas ácia dentro y desnudas.

RECEPT. convexô , apinado ; con pajas aovadas , obtusas , cóncavas y de la longitud de los flosculos.

OBS. La Polymnia con capsulas de quatro lados y la Wedelia tienen el caliz exterior de quatro hojuelas.

La Wedelia se diferencia de las demas especies por los petalos del radio escotados ; y por las semillas con el vilano plano y con diez dientes. Syst. veg. 658. R.

E S P E C I E S.

- Canadensis. 1. *POLYMNIA foliis alternis hastato-sinuatis*. Mill. Polymnia con hojas alternas, y entre de figura de dict. n. 2. alabarda, y sinuosas.
Polymnia. Amoen. acad. 3. Polymnia.
 p. 15. t. 1. f. 5.

Cast. Polymnia del Canadá.
 Habita en el Canadá. 24

- Vuedalia. 2. *POLYMNIA foliis oppositis hastato-sinuatis*. Fabric. helmst. 2. p. 145. Polymnia con hojas opuestas, y entre de figura de alabarda y sinuosas.
Polymnia Wedelia. Mill. Polymnia Wedelia.
 dict. n. 1. R.
Osteospermum foliis oppositis palmatis. Hort. cliff. 424. Osteospermo con hojas opuestas y palmeadas.
Chrysanthemum angulosis Platani foliis, Virginia-num. Pluk. alm. 99. t. 83. f. 3. Chrysanthemo de Virginia, con hojas angulosas y como las del Platano.
Chrysanthemum perenne, Virginianum, majus, Platani Orientalis folio. Moris. hist. 3. p. 22. sect. 6. t. 7. f. 55. Chrysanthemo perenne, mayor, de Virginia, con hoja como la del Platano Oriental.

Cast. Polymnia Vuedalia.
 Habita en la Virginia. 24

- Tetragonotheca. 3. *POLYMNIA foliis oppositis spathulatis subdentatis*. Syst. veg. 658. Polymnia con hojas opuestas, en forma de espátula y algo dentadas.
Tetragonotheca Helianthoides. Spec. pl. ed. 3. p. 1273. Tetragonotheca ó planta con capsula de quatro lados, parecida al Heliantho.
Tetragonotheca Doronici maximi folio. Dill. elth. p. 378. Tetragonotheca con hoja como la del Doronico muy grande.

Cast.

Cast. Polymnia con capsula de quatro lados.

Habita en la Virginia.

Wedelia.

4. POLYMNIA foliis lanceolatis, caule fruticoso. Polymnia con hojas lanceoladas; y tallo fruticoso.

Wedelia frutescens. Jacq. Wedelia frutescente.
amer. 217. t. 130.

Cast. Polymnia Wedelia.

Habita en las selvas de Cartagena de las Indias. \hbar

Es planta fruticosa y trepadora. Echa el caliz exterior de quatro hojuelas, como el de la precedente; y se diferencia tambien de las demas por los petalos del radio escotados y por las semillas con el vilano plano y con diez dientes.

Abysinica.

5. POLYMNIA foliis oppositis lanceolatis sessilibus. Suppl. p. 383. Polymnia con hojas opuestas, lanceoladas y sin peciolo.

Cast. Polymnia de Abissinia.

Habita en Abissinia. \odot

Tiene el tallo herbáceo, del largo de dos hasta seis pies, rollizo, del grueso de un dedo y áspero, con puntitos ovales, convexos y de color que tira á obscuro; y por arriba algo ramoso: las hojas opuestas, como las del Coreopsis cabizbaxo, amplexicaules, sin peciolo, lanceoladas desde su base mas ancha, aserradas, agudas y ásperas en ambas partes: el pedunculo terminal, derecho, solitario, de una flor y sin hojuelas: el periantio comun muy grande, extendido, y de cinco hojuelas de figura de corazon, algo aserradas y que se abren por su base: la corola amarilla: el radio con flosculos anchos, de tres dientes, obtusos, vellosos por su base, femeninos y fertiles: el disco con flosculos que salen afuera, vellosos por su base y acaso fertiles? las anteras de color de ladrillo, y mas largas que la corola: los estigmas que salen afuera, revueltos, tanto en el disco como en el radio: las semillas oblongas y desnudas: el receptaculo convexo y pajoso. Su traza es como la del Coreopsis cabizbaxo.

648 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Spino- 6. POLIMNIA fruticosa, X Polymnia fruticosa, dere-
sa. erecta, foliis ovato-cordatis X cha, con hojas entre aova-
oppositis sessilibus, aculeis X das y de figura de corazon,
supra-axillaribus, calyci- X opuestas, sentadas; aguijo-
bus integris. Suppl. p. 384. X nes sobre de las axilas; y
X cálices enteros.

Cast. Polymnia espinosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. ‡

Es planta muy lampiña; con hojas anchas; y el caliz ex-
terior de cinco hojuelas.

Car- 7. POLYMNIA frutes- X Polymnia frutescente, ten-
nosa. cens, decumbens, foliis al- X dida, con hojas alternas,
ternis oblongis carnosis, ca- X oblongas, carnosas; y calí-
lycibus serratis. Suppl. p. X ces aserrados.
384. X

Cast. Polymnia carnosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ‡

Arroja el tallo frutescente, de color que tira á purpúreo,
angulado y muy lampiño: las hojas alternas, entre
lanceoladas y lineares, carnosas y lampiñas: las flores
terminales, solitarias, con pedunculo, y de la magni-
tud de las del *Buphthalmo*: el caliz plano, con tres
series de quatro hojuelas: la serie infima con hojuelas
aovadas, de tres nervios, algo aserradas y mas an-
chas: la segunda y tercera con las hojuelas lanceola-
das, aserradas y algo mas pequeñas: la corola radia-
da y amarilla: el radio lanceolado, poco mas largo
que el caliz: el disco con los flosculos rectos: y el re-
ceptaculo con pajas setáceas y de color purpúreo.

1177. Género CHRYSOGONUM. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun plano, extendido; de cinco hojuelas lan-
ceoladas y casi de la longitud de la flor.

COR. compuesta radiada, con muchas corolillas herma-
frodíticas, en el disco; y cinco femeninas, en el ra-
dio.

Pro-

FLOSC. DEL DISC. MASC. Y DEL RAD. FEM. 649

Propia de las hermafroditicas : en forma de embudo , con cinco dientes y derecha.

De las femeninas : ligulada , oblonga , truncada y con tres dientes.

ESTAMB. en las hermafroditicas : *filamentos* cinco , muy pequeños : con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditicas : *germen* muy pequeño : *estilo* setáceo y del largo de la corolilla : con el *estigma* desfigurado.

En las femeninas : *germen* mayor , y envuelto con su periantio propio : *estilo* mas corto : y con dos *estigmas* revueltos.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas : ninguna.

En las femeninas : de figura de corazon al revés , entre deprimidas y de quatro ángulos , con sus lados algo anchos ; y coronadas con una escamita de tres dientes , que se abre ácia dentro y contrahe ácia su base. Cada *semilla* se esconde dentro de una *gluma* propia y de quatro ventallas ó escamas ; con la *exterior* aovada y mas ancha ; y las *tres restantes* muy angostas , arimadas estrechamente entre sí , y que se abren hallandose maduro el fruto.

RECEPT. plano ; y con *pajas* lineares y obtusas.

ESPECIE.

Vir-
ginia-
num.

I. CKRYSOGONUM *pe- tiolis foliolongioribus.* Hort. cliff. 424. Gron. virg. 133. Chrysogono con los pecio- los mas largos que la hoja.

Chrysanthemum Virgi- nianum, villosum, disco lu- teo, quinis petalis, coronato. Pluk. alm. 100. t. 83. f. 4. & t. 242. f. 3. Rai. Suppl. p. 213. Chrysanthemo de Virgi- nia , veloso , con el disco amarillo , y coronado de cinco petalos (en el radio).

Cast. Chrysogono de Virginia.

Habita en la Virginia.

1178. Género MELAMPODIUM. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun plano, y de cinco *hojuelas* entre oblongas y aovadas, del largo de la flor y muy extendidas.

COR. compuesta radiada; con las *corolillas* hermafroditicas, en el disco; y casi cinco femeninas, en el radio.

Propia de la hermafroditica: de un petalo, en forma de embudo, con cinco dientes y derecha.

De la femenina:::

ESTAMB. en las hermafroditicas: *filamentos* cinco, muy pequeños: con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditicas: *germen* muy pequeño: *estilo* setáceo, del largo de la corola: con el *estigma* desfigurado.

En las femeninas: *germen* casi aovado, comprimido, áspero por sus lados, plano y membranoso en su ápice: y el *estilo* cortísimo.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas: ninguna.

En las femeninas: comprimidas, aovadas al revés, de quatro lados, con aguijones por sus lados; y coronadas con una *escama* de figura de corazon, envuelta por su margen y casi cerrada en forma de vulva.

RECEPT. cónico; con *pajas* lanceoladas, de color y del largo de los flosculos.


ESPECIES.

America-num.

1. MELAMPODIUM *caule erecto, foliis sublinearibus utrinque unidentatis.* Melampodio con el tallo derecho; hojas casi lineares, y con un diente en ambas partes.

Melampodium. Hort. cliff. Melampodio.
425.

Cast. Melampodio de America.
Habita en Vera-cruz.



Aus-
trale.

2. MELAMPODIUM *caule decumbente, foliis ovalibus serratis.* † Melampodio con el tallo tendido; hojas ovales y aserradas.

Melampodium seminibus quinque oblongis hispidis, calyce pentaphyllo, caule decumbente. Loeß. it. 268. X Melampodio con cinco semillas, oblongas y erizadas; caliz de cinco hojuelas; y tallo tendido.

Cast. Melampodio austral.

Habita en Cumaná. †

Tiene la raíz perenne y fibrosa: los tallos del largo de un xeme, tendidos, desparramados, rollizos y algo vellosos; con las ramas opuestas, echadas y por su remate ascendentes: las hojas opuestas, ovales, ó entre aovadas y obtusas, y por arriba ligeramente aserradas: los peciolo algo rollizos, por encima planos y del largo de la mitad de la hoja: las flores terminales que salen de las axilas ó ahorquilladura, solitarias y con el pedunculo corto. Loeß. loco citato.

1179. Género CALENDULA. * Caltha. Tourn. t. 284.

Vaill. A. G. 1720. 27. Dimorphotheca. Vaill. A. G.

1720. f. 21. 22. Cardispermum Trant.

A. G. 1724. f. 2.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun sencillo, partido en muchas lacinias, ú hojuelas (de catorce hasta veinte) algo derechas, entre lineares y lanceoladas, y casi iguales.

COR. compuesta radiada; con muchas corolillas hermafroditicas, en el disco; y muchas (del número de los segmentos del caliz) femeninas y larguissimas, en el radio.

Propia de la hermafroditica: tubulosa, medio hendida en cinco partes y de la longitud del caliz.

De la femenina: ligulada, larguissima, con tres dientes, vellosa por su base y sin nervios.

ESTAMB. en las hermafroditicas: filamentos cinco, capilares

652 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

res y cortísimos : con la *antera* cilíndrica , tubulosa y de la longitud de la corolilla.

PIST. en las hermafroditicas : *germen* oblongo : *estilo* filiforme y casi del largo de los estambres : con el *estigma* obtuso , hendido en dos partes y recto.

En las femeninas : *germen* oblongo y de tres lados : *estilo* filiforme , del largo de los estambres : con dos *estigmas* oblongos , puntiagudos y redoblados.

PERIC. ninguno : el *caliz* algo cerrado , casi redondo y deprimido hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas : ninguna en el centro del disco : á veces algunas en la periferie , membranosas , de figura de corazon y deprimidas.

En las femeninas : mayores , oblongas , encorvadas , de tres ángulos membranosos , con la figura del vegetal esculpida por defuera longitudinalmente : y sin vilano.

RECEPT. desnudo y plano.

OBS. La *Caltha* de Vaill. tiene las semillas de las florecitas femeninas adornadas en ambas partes de una ala membranosa doblada.

La *Dimorphotheca* de Vaill. posee las semillas que carecen de la expresada ala.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

CALTHA. p. 498.

La flor es radiada ó cuyo disco se compone de muchos flosculos , y la corona de semiflosculos , sentados en embriones y comprendidos en un caliz. Los embriones pasan á capsulas , las mas veces encorvadas , ribeteadas y llenas de una simiente oblonga.

ESPECIES.

Ar-
vensis. 1. CALENDULA semi-X Calendula de semillas en
nibus cymbiformibus muri-X forma de navecilla, con pun-
catis incurvatis , extimis-X titas rígidas , encorvadas , y
erectis protensis. Flor. suec. X las de afuera derechas y
p. 711. 777. X alargadas ó extendidas.

Ca-

Calendula foliis lanceolatis, amplexicaulibus, dentatis, floribus concoloribus. *Calendula* con hojas lanceoladas, amplexicaules, dentadas; y flores de un mismo color.

Hall. helv. n. 94.

Caltha arvensis. C. B. P. *Caltha* arvense.

275. Tourn. p. 498.

Caltha minima. Bauh. *Caltha* muy pequeña.

hist. 3. p. 103.

Cast. *Calendula* arvense.

Habita entre los sembrados de Europa: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña y en las mas Provincias de España. ☉

Es muy parecida á la *Calendula officinal.* Tiene las *hojas* casi dentadas, entre de figura de corazon y lanceoladas, y no en forma de espatula: las *flores* mas pequeñas: las *semillas* mas angostas, lineares; y las *exteriores*, derechas y mas largas.

Sancta 2. CALENDULA *semi-nibus urceolatis obovatis laevibus, calycibus submuricatis.* *Calendula* con las semillas en forma de jarrito, aovadas al revés, lisas; y cálices con alguna puntita rígida.

Cast. *Calendula* santa.

Habita en Palestina. ☉

Es muy semejante á la *Calendula arvense*; pero tiene el *caliz* con puntitas por defuera: las *semillas* mas ventricosas, sin puntitas; y las del *radio* sin aguijones. Es *planta* toda desnuda y sin vello ni pelo alguno, con las *hojas* ásperas por su margen.

Officinalis. 3. CALENDULA *semi-nibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus.* *Calendula* de semillas en forma de navecilla, con puntitas rígidas; y todas encorvadas.

Mat. med. 221. Blackw. t. 106. Knorr. del. 1. t. R. 21.

Calendula seminibus radii cymbiformibus echinatis bicornibus. *Calendula* con las semillas del radio en forma de navecilla, erizadas y con dos astitas.

Dalib. paris. 268.

654 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Caltha vulgaris*. C. B. P. \times *Caltha vulgar.*
 275. Tourn. p. 298.
Calendula. Dod. pempt. \times *Calendula.*
 254.
 α *Caltha polyanthos*, ma \times *Caltha mayor*, de muchas
 jor. C. B. P. 275. Tourn. p. flores. α
 498.
 β *Caltha floribus reflexis*. \times *Caltha con las flores redo-*
 C. B. P. 275. \times *bladas.* β
 χ *Caltha prolifera*, majori- \times *Caltha prolifera*, con las
 bus floribus. C. B. P. 275. \times flores mas grandes. χ
 Tourn. p. 498. \times

Cast. Calendula officinal.

Habita entre los sembrados de Europa : en los circuitos de Madrid , y en otras muchisimas partes de España. ☉

PROPIED. La yerba y flores son amargas y algo narcoticas , expelentes , emenagogas y sudorificas : se usan en la optalmia , en los vertigos , y en las calenturas exântematicas.

Plu-
vialis.

4. CALENDULA foliis \times *Calendula con hojas lan-*
lanceolatis sinuato-denticu- \times *ceoladas , sinuosas y con*
latis , caule folioso , pedun- \times *dientecitos ; tallo folioso ; y*
culis filiformibus. Hort. ups. \times *pedunculos filiformes.*
 274.
Calendula scabra. Berg. \times *Calendula áspera.*
 cap. 310.
Calendula foliis dentatis. \times *Calendula con hojas den-*
 Mill. dict. n. 4. ic. t. 75. f. 2. \times *tadas.*
Calendula seminibus ra- \times *Calendula con las semillas*
dii obsolete serratis , disci- \times *del radio con aserraduras po-*
cordatis. Hort. cliff. 425. \times *co manifestas ; y las del dis-*
Calendula humilis, Afri- \times *co de figura de corazon.*
cana , flore intus albo , foris \times *Calendula baxa , de Afri-*
violaceo , simplici. Herm. \times *ca , con la flor blanca por*
 lugdb. 104. t. 105. Breyn. \times *dentro , de color que tira al*
 ic. 26. t. 14. f. 1. Tourn. p. \times *de violeta por defuera y sen-*
 499. \times *cilla.*

Cal-

Caltha Africana, flore in-
tus albo, extus ferrugineo. flor blanca por dentro, y de
Moris. hist. 3. p. 14. sect. 6. color amarillo ferrugineo
t. 3. f. 8. por defuera.

Cast. Calendula pluvial.

Habita en Etiopia. ☉

Abre las flores entre seis y siete de la mañana, y las man-
tiene abiertas hasta las quatro de la tarde, si el tiempo
está seco; y si no abre las flores á las siete de la maña-
na aquel dia constantemente llueve. *Phil. bot. p. 275.*

Hy- 5. CALENDULA foliis
brida. lanceolatis dentatis, caule
folioso, pedunculis superne
incrassatis. Mill. dict. n. 6.
ic. t. 75. f. 1. crasados por arriba.

*Calendula foliis radicali-
bus sinuatis, caulinis su-
perne denticulatis.* Roy. lug-
db. 177. ba.

Caltha Africana, flore
intus albo, foris violaceo,
semine majore, oblongo. color que tira á violado por
Breyn. ic. 26. t. 14. f. 2, defuera; semilla mayor y
oblonga.

*Cardispermum Africa-
num, pubescens, foliis inci-
sis, parvo flore.* Trant. act.
paris. 1724. p. 29. t. 2. y flor pequeña.

Cast. Calendula hibrida.

Habita en Etiopia. ♂

Nudi- 6. CALENDULA foliis
caulis. lanceolatis sinuato-denta-
tis, caule subnudo. Mill. ceoladas, entre sinuosas y
dict. n. 5. Berg. cap. 312. dentadas; y tallo casi des-
nudo.

*Bellis florum pediculis
pené aphyllis, foliis incisis.* Belis con los piecitos de
Comm. hort. 2. p. 66. t. 33. las flores casi sin hojuelas;
y hojas cortadas.

656 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Caltha Africana, flore *intus albo*, *extus leviter violaceo*, *semine plano cordato*. Boerh. lugdb. 1. p. 113. *Caltha Africana*, con la flor blanca por dentro, y por defuera de color violado suave; semilla plana y de figura de corazon.

Cast. Calendula de tallo desnudo.

Habita en Etiopia.

Arroja el tallo muy sencillo, derecho y folioso por debajo: las hojas en forma de espátula, enterisimas, ásperas y alguna vez anguladas con un diente: y las semillas redondas.

Grami-
nifolia.

7. CALENDULA *foliis linearibus subintegerrimis, caule subnudo*. Mill. dict. n. 7. ic. t. 76. Berg. cap. 311. *Calendula* con hojas lineares, casi enterisimas; y tallo algo desnudo.

Calendula foliis linearibus denticulatis & integerrimis. Roy. lugdb. 177. *Calendula* de hojas lineares, con dientecitos y enterisimas.

Caltha Africana, *foliis Croci angustis*, *florum petalis externe purpurascens*, *intus albis*. Boerh. lugdb. 1. p. 113. *Caltha Africana*, con hojas como las del Azafran, angostas; petalos de las flores de color que tira á purpúreo por defuera, y blancos por dentro.

Calendula Africana, *surrecta*, *Rorismarini folio*. Pluk. mant. 35. t. 370. f. 7. *Calendula Africana*, levantada, con hoja como la del Romero.

Dimorphotheca Statices folio. Vaill. act. 1720. p. 280. *Dimorphotheca* con hoja como la de la Estaticce.

Bellis Africana, *florum pediculis foliosis, foliis angustis & integris*. Comm. hort. 2. p. 67. t. 34. *Belis Africana*, con los piececitos de las flores foliosos; hojas angostas y enteras.

Cast. Calendula con hoja de Grama.

Habita en Etiopia.

Fruti- 8. CALENDULA foliis X Calendula con hojas ao-
cosa. obovatis subdentatis, caule X vadas al revés, algo denta-
fruticoso decumbente. Amœn X das; tallo fruticoso y tendi-
acad. 5. p. 25. Mill. dict. n. X do.

8. ic. 189. t. 283. Berg. cap. X

315.

Calendula foliis obversè X Calendula de hojas aova-
ovatis denticularis, caule X das al revés, con dienteci-
perenni. Roy. lugdb. 531. X tos; y tallo perenne.

Cast. Calendula fruticosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

To- 9. CALENDULA foliis X Calendula con hojas ao-
mento- obovatis integris tomento- X vadas al revés, enteras, to-
sa. sis, scapo nudo unifloro. X mentosas; escapo desnudo y
Suppl. p. 384. X de una flor.

Cast. Calendula tomentosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

1180. Género ARCTOTIS. * *Arctotheca Vaill. A. G.*

1720. f. 39. 40. *Anemonospermus Comm.*

H. A. 2. p. 45.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun casi redondo, y apiñado; con las *escamas inferiores* mas laxas, alesnadas; las *del medio* aovadas; y las *intimas* oblongas, con su remate escarioso, redondeado y cóncavo.

COR. compuesta radiada; con muchas *corolillas* hermafroditicas, en el disco; y casi veinte femeninas, liguladas y mas largas que el diámetro del disco.

Propia de las hermafroditicas: en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco lacinias, redobladas por sus ápices é iguales.

De las femeninas: ligulada, lanceolada, con tres dientes muy delgados; y el *tubo* cortisimo.

ESTAMB. en las hermafroditicas: *filamentos* cinco, capila-

656 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Caltha Africana, flore *intus albo*, *extus leviter violaceo*, *semine plano cordato*. Boerh. lugdb. 1. p. 113. *Caltha Africana*, con la flor blanca por dentro, y por defuera de color violado suave; semilla plana y de figura de corazon.

Cast. Calendula de tallo desnudo.

Habita en Etiopia.

Arroja el tallo muy sencillo, derecho y folioso por debajo: las hojas en forma de espátula, enterisimas, ásperas y alguna vez anguladas con un diente: y las semillas redondas.

Grami-
nifolia.

7. CALENDULA *foliis linearibus subintegerrimis*, caule subnudo. Mill. dict. n. 7. ic. t. 76. Berg. cap. 311. *Calendula* con hojas lineares, casi enterisimas; y tallo algo desnudo.

Calendula foliis linearibus denticulatis & integerrimis. Roy. lugdb. 177. *Calendula* de hojas lineares, con dientecitos y enterisimas.

Caltha Africana, *foliis Croci angustis*, *florum petalis externè purpurascens*, *internè albis*. Boerh. lugdb. 1. p. 113. *Caltha Africana*, con hojas como las del Azafran, angostas; petalos de las flores de color que tira á purpúreo por defuera, y blancos por dentro.

Calendula Africana, *surrecta*, *Rorismarini folio*. Pluk. mant. 35. t. 370. f. 7. *Calendula Africana*, levantada, con hoja como la del Romero.

Dimorphotheca Statices folio. Vaill. act. 1720. p. 280. *Dimorphotheca* con hoja como la de la Estaticé.

Bellis Africana, *florum pediculis foliosis*, *foliis angustis & integris*. Comm. hort. 2. p. 67. t. 34. *Bellis Africana*, con los piececitos de las flores foliosos; hojas angostas y enteras.

Cast. Calendula con hoja de Grama.

Habita en Etiopia.

Fruti-
cosa.

8. *CALENDULA foliis obovatis subdentatis, caule fruticoso decumbente.* Amœn. acad. 5. p. 25. Mill. dict. n. do.

8. ic. 189. t. 283. Berg. cap.

315.

Calendula foliis obverse ovatis denticularis, caule perenni. Roy. lugdb. 531.

Cast. *Calendula fruticosa*.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

To-
mento-
sa.

9. *CALENDULA foliis obovatis integris tomentosis, scapo nudo unifloro.* Suppl. p. 384.

Cast. *Calendula tomentosa*.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

1180. Género ARCTOTIS. * *Arctotheca Vaill. A. G.*

1720. f. 39. 40. *Anemonospermus Comm.*

H. A. 2. p. 45.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun casi redondo, y apiñado; con las *escamas inferiores* mas laxas, alesnadas; las *del medio* aovadas; y las *intimas* oblongas, con su remate escarioso, redondeado y cóncavo.

COR. compuesta radiada; con muchas *corolillas* hermafroditicas, en el disco; y casi veinte femeninas, liguladas y mas largas que el diámetro del disco.

Propia de las hermafroditicas: en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco lacinias, redobladas por sus ápices é iguales.

De las femeninas: ligulada, lanceolada, con tres dientes muy delgados; y el *tubo* cortísimo.

ESTAMB. en las hermafroditicas: *filamentos* cinco, capila-

TOM. VI.

Tt

res

658 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

res y cortísimos : con la *antera* cilíndrica , tubulosa , de cinco dientes y del largo de la corolilla.

PIST. en las hermafroditicas : *germen* apenas manifiesto : *estilo* cilíndrico , poco mas largo que la corola : con el *estigma* sencillo.

En las femeninas : *germen* entre aovado y de quatro lados , veloso y coronado con el periantio propio : *estilo* filiforme : con dos *estigmas* entre aovados y oblongos , gruesecitos y derechos.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas : ninguna.

En las femeninas : casi redondas y vellosas : *vilano* formado del periantio propio , de cinco hojuelas , acavadas y extendidas , y puestas en cerco.

RECEPT. veloso , ó pajoso , y algo plano.

OBS. *Este es un género singular , en quanto en algunas especies , los flosculos femeninos del radio son estériles y los del disco fértiles ; y por lo contrario ; en otras especies los flosculos femeninos del radio son fértiles y los del disco esteriles.*

ESPECIES CON EL RECEPTACULO VELLOSO.

- | | | |
|---------------|---|---|
| Calendulacea. | 1. ARCTOTIS <i>flosculis radiantibus sterilibus , foliis runcinatis subtomentosis.</i> Syst. veg. 659. | Arctotis con los flosculos del radio estériles; hojas runcinadas y algo tomentosas. |
| α | <i>Arctotis</i> (<i>Calendula</i>) <i>flosculis radiantibus sterilibus duodenis subintegris , foliis lyratis nigro-denticulatis.</i> Spec. pl. ed. 3. 1036. | Arctotis (<i>Calendula</i>) con flosculos del radio estériles, de doce en doce , casi enteros; hojas liradas y con denticitos negros. α |
| | <i>Arctotis foliis ovatis dentatis , petiolis longissimis supernè dentatis , caule ramoso.</i> Hort. cliff. 412. | Arctotis de hojas aovadas y con dientes ; peciolo larguissimos , dentados por arriba ; y tallo ramoso. |

Anemone affinis Æthiopica, fibrosa radice, flore Asteris, Taraxaci foliis subincanis. Herm. lugdb. 43. t. 42.

Planta de Etiopia, parecida á la Anemone, con raíz fibrosa; flor como la del Aster; hojas semejantes á las del Taraxáco y algo blanquecinas.

Anemonospermus Africana, Jacobææ maritimæ foliis, flore sulphureo. Comm. rar. 36. t. 36.

Planta de Africa, con semilla de Anemone; hojas como las de la Jacobea maritima; y flor de color de azufre.

Cast. Arctotis como Calendula.

Habita en Etiopia. ☉

Tiene los pedunculos vellosos, salpicados de cerdas encarnadas, é inclinados antes y despues de florecer: el radio de color amarillo-roxo, que tira á purpúreo por debaxo, y torcido por la noche; las corolillas del disco negras por defuera; con las anteras tambien negras: y las escamas exteriores del caliz extendidas, alesnadas, cortísimas y erizadas.

^β *Arctotis (hypochondriaca) flosculis radiantibus sterilibus trifidis media inflexa.* Arctotis (*hipochondriaca*) con los flosculos del radio estériles, hendidos en tres lacinias y la del medio doblada. β

Arctotis (tristis) flosculis radiantibus vicenis tripartitis. Spec. pl. 3. p. 1306. Mill. dict. n. 1. Arctotis (*triste*) con los flosculos del radio de veinte en veinte y partidos en tres lacinias.

Arctotis foliis pinnatifidis, caule herbaceo, petalis radii profundè trifidis. Roy. lugdb. 179. Arctotis con hojas hendidas al través; tallo herbaceo; y petalos del radio hendidos profundamente en tres partes.

Anemonospermus Africana, foliis & facie Taraxaci incanis. Breyn. ic. 27. t. 15. Planta de Africa, con semilla de Anemone; hojas y traza como las del Taraxáco y blanquecinas.

- x *Arctotis* (*tristis*) *flosculis* x *Arctotis* (*triste*) con los
radiantibus sterilibus qua- x flosculos del radio esteriles
dripartitis. Mant. 479. Berg. x y partidos en quatro laci-
cap. 320. x nias. x

Produce los tallos extendidos y con pelo áspero : las hojas runcinadas , algo crasas , fragiles , vellosas , con el vello blanco por debaxo y sus aserraduras con espinitas : los *pedunculos* estriados , largos , con pelo áspero y con flecos : los *cálices* antes de abrirse cabizbaxos , con escamas entre vellosas y pestañosas por su remate: el *disco* negro, con las corolillas amarillas y negras en su ápice : los *pistilos* como una maza amarilla: el *radio* con los flosculos amarillos , de color de plomo por debaxo , y partidos en quatro ó cinco lacinias , y la una intermedia divergente y que cerca el disco.

- A *Arctotis* (*coruscans*) *flos-* x *Arctotis* (*que brilla*) con
culis radiantibus sterilibus x los flosculos del radio esté-
tripartitis , exteriore tri- x les y partidos en tres laci-
fida. x nias , con una exterior hen-
x dida en otras tres. A

- x *Arctotis* (*superba*) *floscu-* x *Arctotis* (*arrogante*) con
lis radiantibus sterilibus x los flosculos del radio esté-
quinque partitis , foliis pin- x riles , divididos en cinco
natis dentatis , laciniis bi- x partes; hojas pinnadas, den-
partitis. Spec. pl. ed. 3. p. x tadas y sus lacinias dividi-
1305. Amoen. acad. 4. p. 331. x das en otras dos. x

Jacobeia Africana, *Stee-* x *Jacobeia Africana* , con
bes facie , flore ampliore, x traza como la de la Estebe;
petalis radialibus trifidis. x flor mas ancha; y petalos del
Volk. norib. 224. t. 224? x radio hendidos en tres laci-
x nias.

Habita en Etiopia.

Tiene los *pedunculos* vellosos , salpicados de cerdas cristalinas , y recostados de noche ; pero nunca cabizbaxos : el *radio* verdoso por debaxo y cerrado por la noche : las *corolillas* del *disco* amarillas ; y las *anteras* tambien amarillas.

Plan-
taginea

2. ARCTOTIS *flosculis* X Arctotis con los flosculos
radiantibus fertilibus, foliis X del radio fértiles; hojas en-
lanceolato-ovatis nervosis X tre lanceoladas y aovadas,
denticulatis amplexicauli- X nerviosas, con dientecitos y
bus. Mill. dict. n. 5. X amplexicaules.

Anemonospermus Afra, X Planta de Africa, con se-
folio Plantaginis, florum X milla de Anemone; hojas
radiis intus aureis, extus X como las del Llantén; radios
fuscis. Boerh. lugdb. 1. p. X de las flores de color de oro,
100. X por dentro, y obscuro por de-
X fuera.

Cast. Arctotis como Llantén.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Las hojas son tomentosas por debaxo; y los *flosculos* del disco esteriles.

An-
gusti-
folia.

3. ARCTOTIS *flosculis* X Arctotis con los flosculos
radiantibus fertilibus, cau- X del radio fértiles; tallos ras-
libus repentibus arachnoi- X treros, cubiertos con tomen-
deis, foliis lyratis utrinque X to como tela de araña; ho-
bidentatis. Syst. veg. 659. X jas liradas y con dos dientes
X en ambos lados.

Arctotis radicans. Mant. X Arctotis cuyos tallos arro-
2. p. 479. X jan raíces.

Arctotis flosculis radian- X Arctotis con los flosculos
tibus fertilibus, foliis lan- X del radio fértiles; hojas lan-
ceolatis integris dentatis. X ceoladas, enteras y denta-
Hort. cliff. 412. Spec. pl. 3. X das.
p. 1306.

Anemonospermus Afra, X Planta de Africa, con se-
folio serrato rigido, flore X milla de Anemone; hoja aser-
intus sulphureo, extus pu- X rada, rígida; flor por den-
niceo. Boerh. lugdb. 1. p. X tío de color de azufre, y por
100. X defuera de color de granada.

Cast. Arctotis de hoja angosta.

Habita en los fosos del Cabo de Buena-esperanza.

Produce el tallo (como toda la planta) con tomento blan-
co, muy ramoso, postrado, fragil y que echa raíces:
las hojas con peciolo, liradas, aovadas al revés, algo
obtusas, de tres nervios, con dos dientes en ambos la-
dos

662 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

dos y cubiertas de lana como tela de araña : los *pedunculos* larguissimos y casi desnudos : el *radio* purpúreo : y el *receptaculo* muy lanudo. Varía con las *hojas* apenas mas anchas que las del *Espliego*.

As- 4. *ARCTOTIS flosculus* X Arctotis con los flosculos
pera. *radiantibus fertilibus, foliis pinnato-sinuatis villosis, laciniis oblongis dentatis.* Hort. cliff. 412. Berg. X del radio fertiles ; hojas entre pinnadas y sinuosas, vellosas, con sus lacinias oblongas y dentadas,
cap. 305.

Arctotheca Jacobeæ folio, radiis florum intus luteis, extus purpureis. Vaill. act. X Arctoteca con hoja como la de la Jacobea ; y los radios de las flores amarillos por dentro, y purpúreos por defuera.
1720. p. 428.

* *Anemonospermus Afra, folio Jacobeæ tenuiter laciniato, flore aurantio pulcherrimo.* Boerh. lugdb. 1. X Planta de Africa, con semilla de Anemone ; hoja como la de la Jacobea, delgadamente laciniada ; y flor muy hermosa de color de naranja. α

Cast. Arctotis áspera.

Habita en Etiopia.

Posee el tallo yerto, perenne, entre vellosa y tomentosa, con estrias de color que tira á purpúreo : las *hojas* por debaxo con tomento blanquecino : el *radio de la corola* fertil, amarillo, y con estrias roxas por debaxo : el *pisilo* amarillo y su cuello de color de plomo.

ESPECIES CON EL RECEPTACULO PAJOSO.

Para- 5. *ARCTOTIS flosculus* X Arctotis con los flosculos
doxa. *radiantibus sterilibus, paleis coloratis disco longioribus, foliis bipinnatis, linearibus.* Amœn. acad. 4. p. X del radio esteriles ; pajas de color, mas largas que el disco ; hojas dos veces pinnadas y lineares.
330. Non synonymum.

Planta. Piuk. phyt. t. 312. X Planta.
f. 5.

Cast.

FLOSC. DEL DISC. MASC. Y DEL RAD. FEM. 663

Cast. Arctotis paradoxa.

Habita en Etiopia. ☉

Echa las pajas de color , y casi de la longitud del radio ; por lo que la flor parece casi plena.

Pa-
leacea. 6. ARCTOTIS *flosculis* X Arctotis con los flosculos
radiantibus sterilibus , pa- X del radio esteriles ; pajas
leis flosculos disci æquanti- X iguales á los flosculos del
bis , *foliis pinnatis* , *linea-* X disco ; hojas pinnadas y li-
ribus. Amœn. acad. 6. afr. X neares.
84. Mill. dict. n. 8.

Aster foliis integris , an- X Aster con hojas enteras ,
gustis , *flore magno* , *luteo.* X angostas; flor grande y ama-
Burm. afr. 176. t. 65. f. 1. X rilla.

Cast. Arctotis pajosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Den-
tata. 7. ARCTOTIS *flosculis* X Arctotis con los flosculos
radiantibus sterilibus , *foliis* X del radio esteriles ; hojas pin-
pinnatis , *pinnis pinnatifido-* X nadas , con sus hojuelas en-
dentatis. X tre hendidas al través y den-
tadas.

Arctotis pilifera. Berg. X Arctotis que lleva pelos.
cap. 325.

Chrysanthemum Æthio- X Chrysanthemo de Etiopia,
picum , *foliis brevibus* , *ri-* X con hojas cortas , algo rígi-
gidiusculis , *subhirsutum* , X das , con algun pelo áspero ;
flore minore. Pluk. alm. 103. X y flor mas pequeña.
t. 276. f. 2.

Chrysanthemum foliorum X Chrysanthemo con las ho-
pinnis brevissimis dentatis. X juelas de las hojas cortísimas
Burm. afr. 175. t. 64. X y dentadas.

Cast. Arctotis dentada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

An-
themo-
ides. 8. ARCTOTIS *paleis flos-* X Arctotis con las pajas mas
culo brevioribus , *foliis su-* X cortas que el flosculo ; hojas
pradecompositis linearibus. X sobredecompuestas y linea-
Amœn. acad. 6. afr. 85. Berg. X res.
cap. 324.

Cha-

664 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Chamæmelum pumilum, X Manzanilla enana, con
foliis angustis pinnatis. X hojas angostas y pinnadas.
 Burm. afr. 174. t. 63. f. 2. X

Cast. Arctotis como Anthemis.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Tiene el radio estéril, y de color de violeta.

Te-
nuifo-
lia I. 9. ARCTOTIS *flosculis* X Arctotis con los flosculos
radiantibus sterilibus? fo- X del radio estériles? hojas li-
liis linearibus indivisis gla X neares, indivisas y lampi-
bris, X fias.

Cast. Arctotis con hoja delgada 1.^a

Habita en las playas del mar del Cabo de Buena-espe-
 ranza.

Arroja el tallo ramoso, frutescente y liso: las *hojas* linea-
 res, filiformes, algo carnosas, lisas y del largo de un
 dedo: los *pedunculos* larguissimos y de una flor: el *ca-*
liz hemisférico y lampiño, con las escamas de mas adentro
 escariosas y blancas: y la *corola* toda amarilla.

Acau-
lis. 10. ARCTOTIS *pedun-* X Arctotis con los peduncu-
culis radicalibus, foliis ly- X los radicales; y las hojas en
ratis. Mill. dict. n. 6. X forma de lira.

Anemonospermum Africa- X Planta Africana, con semi-
na, folio Plantaginis, flore X lla de Anemone; hoja co-
sulphureo. Comm. rar. 35. X mo la del Llantén; y flor de
 t. 35. X color de azufre.

Cast. Arctotis sin tallo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Ser-
rata. 11. ARCTOTIS *flosculis* X Arctotis con los flosculos
radiantibus sterilibus, fo- X del radio estériles; hojas lan-
liis lanceolatis indivisis den- X ceoladas, indivisas, y entre
tato-serratis. Suppl. p. 385. X dentadas y aserradas.

Cast. Arctotis aserrada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Produce los tallos derechos, sencillos, leñosos y con algun
 vello: las *hojas* lanceoladas, sin peciolo, algo vellosas
 y un poco amontonadas: muchos *pedunculos* terminales

FLOSC. DEL DISC. MASC. Y DEL RAD. FEM. 665

y larguissimos : el *caliz* escarioso y amarillo : la *corola* tambien amarilla : y la *coronilla de las semillas* de color de nieve.

Te- 12. ARCTOTIS *flosculis* X Arctotis con los flosculos
nuifo. *radii sterilibus*, *foliis li-* X del radio esteriles; hojas li-
lia II. *nearibus indivisis*, *nudis.* X neares, indivisas y desnu-
Suppl. p. 385. X das.

Carr. Arctotis con hoja delgada 2.^a

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Echa pocos tallos, herbáceos y algo ramosos : las *hojas* filiformes ó lineares, casi carnosas y desnudas : los *pedunculos* larguissimos, solitarios, desnudos y filiformes : una *bractea* menuda y tambien filiforme : el *caliz* apinado, y por arriba escarioso : y el *radio de la corola* amarillo y esteril.

1181. Género OSTEOSPERMUM. * Monilifera

Vaill. A. G. 1720. f. 28. Chrysanthemoides

Tourn. A. G. 1705. f. 4. Dill.

gen. 9. elth. 68.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun sencillo, hemisférico, y de muchas *hojuelas* alesnadas y pequeñas.

COR. compuesta radiada; con muchas *corolillas* hermafroditicas, en el disco; y cerca de diez femeninas, en el radio.

Propia de la hermafroditica : tubulosa, con cinco dientes y del largo del caliz.

De la femenina : ligulada, linear, con tres dientes y larguissima.

ESTAMB. en las hermafroditicas : *filamentos* cinco, capilares y cortisimos : con la *antera* cilindrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditicas : *germen* muy pequeño : *estilo* filiforme, casi de la longitud de los estambres : con el *estigma* desfigurado.

En las femeninas : *germen* globoso : *estilo* filiforme, y del

666 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

del largo de los estambres : con el *estigma* escotado.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas : ninguna.

En las femeninas : globosas , de color, y finalmente endurecidas y que encierran una almendra semejante á ellas : y sin *vilano*.

RECEPT. desnudo y plano.

OBS. *El Osteospermo corimboso se diferencia por las semillas reducidas á baya y oblongas. R.*

ESPECIES.

Spinosum.

1. OSTEOSPERMUM

spinis ramosis. Hort. cliff. Osteospermo con espinas ramosas.

424. Berg. cap. 327.

Chrysanthemoides Osteospermum Africanum, odoratum, spinosum & viscosum. Osteospermo como el Chrysanthemo de Africa, oloroso, espinoso y viscoso.

Comm. hort. 2. p. 85. t. 43.

Chrysanthemum Africanum, frutescens, spinosum. Chrysanthemo de Africa, frutescente y espinoso.

Volk. norib. 105. t. 105. Morris. hist. 3. sect. 6. t. 3. f. 56.

Cast. Osteospermo espinoso.

Habita en Etiopia. *h*

Es muy parecido al *Osteospermo* que lleva guisantes.

Tiene el *fruto* oblongo, con el pedunculo pendulo, y sus bayas dispuestas en cerco, oseas, globosas y de color pardo que tira á purpúreo.

Pisiferum.

2. OSTEOSPERMUM

foliis lanceolatis mucronatis subpetiolatis glabris serratis, ramulis denticulato-angulatis. Mill. dict. n. 2. Osteospermo de hojas lanceoladas, terminadas en punta rígida, con peciolo muy corto, lampiñas, aserradas; y ramitas anguladas con denticitos.

Berg. cap. 330.

Osteospermum foliis lanceolatis acute dentatis, caule fruticoso. Mill. ic. 129. Osteospermo de hojas lanceoladas, con dientes agudos; y tallo fruticoso.

t. 194. f. 1.

Osteospermum fruticans, X *Osteospermo frutescente*,
lanuginosum, *foliis oblon-* X *lanuginoso*, con hojas oblon-
gis, *dentatis*. Burm. afr. X *gas y dentadas*.
 171. t. 61. f. 2.

Cast. *Osteospermo* que lleva guisantes.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h

Tiene los ángulos de las ramas con dientecitos desde el dorso escurrido de los peciolos, y las mas veces, todos envueltos con lana, de la qual se despojan con el tiempo: las hojas en forma de cufia y rozadas: los pedunculos escamosos: las flores pequeñas: y las semillas aovadas al revés.

Moniliferum.

3. OSTEOSPERMUM

foliis obovatis serratis petiolatis subdecurrentibus. Hort. cliff. 423. Berg. cap. 331.

Chrysanthemoides Afrum, *Populi albæ foliis*. Tourn. Dill. elth. 80. t. 68. f. 79.

Chrysanthemum Africanum, *frutescens*, *Telephii fere foliis crassis*, *Osteoscarpum*. Pluk. amalth, 55. t. 382. f. 4.

Chrysanthemum arborescens, *Æthiopicum*, *foliis Populi albæ*. Breyn. cent. 155. t. 76.

Monilifera frutescens, *baccifera folio subrotundo crenato*. Vaill. act. 1720. p. 573. R.

Osteospermo de hojas aovadas al revés, aserradas, con peciolo, y algo escurridas.

Planta de Africa, semejante al *Chrysanthemo*, con hojas como las del Alamo blanco.

Chrysanthemo de Africa, frutescente, con hojas casi como las del *Telefio*, crasas; y fruto de consistencia de hueso.

Chrysanthemo arborescente, de Etiopia, con hojas como las del Alamo blanco.

Planta frutescente, que lleva bayas como granos para collares; con hoja casi redonda y recortada.

Cast. *Osteospermo* de collares ó con las simientes como granos para collares.

Habita en Etiopia. h

Los peciolos tienen un nudo debaxo de su base.

Ilici-
folium. 4. OSTEOSPERMUM X Osteospermo de hojas
foliis oblongis dentato-an- oblongas, con ángulos den-
gulatis scabris semiample- tados, ásperas, que abrazan
sicaulibus, ramis sulca- la mitad del tallo; y ramas
tis. asurcadas.

Osteospermum foliis sca- Osteospermo de hojas ás-
bris, sinuato-denticulatis. peras; sinuosas y con dien-
Burm. zeyl. 172. t. 62. tecitos.

Cast. Osteospermo con hoja de Acebo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Posee las *hojas* como las del *Acebo*, sin peciolo, casi am-
plexicaules, anguladas, con tres dientes en ambas par-
tes, envueltas por su margen, ásperas por encima, ve-
llosas y casi lanudas en su envés.

Cilia-
tum. 5. OSTEOSPERMUM X Osteospermo con hojas en-
foliis elliptico-lanceolatis tre elípticas y lanceoladas,
crenatis ciliatis. Berg. cap. recortadas y pestañosas.

332. †

Osteospermum fruticans, Osteospermo frutescente,
lanuginosum, foliis oblon- lanuginoso, con hojas oblon-
gis, dentatis. Burm. afr. gas y dentadas.

171. t. 61. f. 2.

Cast. Osteospermo pestañoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Jun-
ceum. 6. OSTEOSPERMUM X Osteospermo con hojas li-
foliis linearibus acutis ca- neares, agudas, aquilladas
rinatis distantibus, panicu- y distantes; y panoja termi-
la terminali. nal.

Cast. Osteospermo como junco.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Arroja el tallo apretado y rígido, del largo de cinco pies
y liso: las *hojas* alesnadas, ó lineares, agudas, apreta-
das y rígidas, lisas, sin peciolo y muy apartadas: la
panoja terminal, con pedunculos de una flor, claros,
apretados, rígidos, y salpicados de hojuelas alesnadas
y remotas.

Co-
symbo-
sum. 7. **OSTEOSPERMUM** Osteospermo con hojas
foliis lanceolatis glabris, lanceoladas, lampiñas; y
floribus paniculatis. flores en panoja.

Cast. Osteospermo corimboso.

Habita en lugares montuosos y pedregosos del Cabo de Buena-esperanza. *h*

Echa el tallo fruticoso, derecho, ramoso por arriba, liso y del grueso de un dedo: las hojas alternas, sin peciolo, lanceoladas, lampiñas, sin venas, apretadas y rígidas, del largo de un dedo, mas pequeñas en las ramas de las flores y ásperas por su margen: la panoja terminal, corimbosa, con los pedunculos vellosos y viscosos: las flores amarillas: y las simientes reducidas á bayas oblongas y mayores que un grano de trigo.

Imbri-
catum. 8. **OSTEOSPERMUM** Osteospermo con hojas ao-
foliis ovatis obtusis imbri- vadas, obtusas y apiñadas.
caris.

Cast. Osteospermo apiñado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Tiene el tallo fruticoso, ramoso por arriba, del largo de dos pies y con cicatrices: las hojas amontonadas, sin peciolo, aovadas, ó aovadas al revés, algo apiñadas, enterisimas, lisas, amplexicaules, glutinosas, con pelos cortísimos en la margen, y vellosas en las axilas: el pedunculo terminal, filiforme, de una flor, del largo de ella, velloso y sin hojuelas: la corola amarilla: y el caliz sencillo.

Po-
lygalo-
ides. 9. **OSTEOSPERMUM** Osteospermo con hojas
foliis lanceolatis sparsis de- lanceoladas, sin orden, es-
currentibus glabris inte- curridas, lampiñas, enterisi-
gerrimis, axillis lanatis. mas; y axilas lanudas.

Berg. cap. 333. Roy. lugdb.

179.

Monilifera Polygalæ fo- Planta con hojas como las
liis. Vaill. act. 1720. p. 374. de la Poligala, y que lleva
granos para collares.

670 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Chrysanthemum fruticosum, *Polygoni foliis*, *Africanum*, *caulibus scabris*, *foliis linearibus triquetris*, *peris*; y flor mas pequeña. Pluk. mant. 47. t. 382.

Cast. Osteospermo como Poligala.

Habita en Etiopia. *h*

Posee el tallo entre las hojas salpicado comunmente con pelillos como de seda: las *hojas* sin peciolo, derechas, lanceoladas, enterisimas, terminadas en punta rígida, aquilladas y lampiñas: los *pedunculos* y *cálices* erizados con espinas muy blandas.

Tri- 10. OSTEOSPERMUM Osteospermo con hojas li-
g u c- *foliis linearibus triquetris*. neares y de tres caras.
trum. Suppl. p. 385.

Cast. Osteospermo de tres caras.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.* *h*

Arroja el tallo sufruticoso: las *hojas* lineares, de tres caras, lisas, del largo de un dedo y abundantes: las *flores* que salen de las axilas mas altas, solitarias, con pedunculo y amarillas: el *caliz* como el del *Geropogon*, y apinado con pocas hojuelas y agudas.

Herba- 11. OSTEOSPERMUM Osteospermo con hojas ca-
ceum. *foliis subsessilibus ovatis*, *spathulatis serratis*, *caule herbaceo*. Suppl. p. 385.

Cast. Osteospermo herbáceo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Arcto- 12. OSTEOSPERMUM Osteospermo de hojas pe-
toides. *foliis petiolatis lyratis*, *petiolis basi auriculatis semiamplexicaulibus tomentosis*. Suppl. p. 385.

Cast. Osteospermo como Arctotis.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Tiene la superficie, figura de la yerba, y casi la flor seme-

mejantes á las del *Arctotis*; pero las *semillas* son lampiñas.

Ni-
veum. 13. OSTEOSPERMUM X Osteospermo de hojas con
foliis petiolatis ovatis den- peciolo, aovadas, dentadas
tatis lanatis. Suppl. p. 386. X y lanudas.

Cast. Osteospermo de color de nieve.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

La yerba se halla toda cubierta de pelusa densa y blan-
quisima.

Perfo-
liatum. 14. OSTEOSPERMUM X Osteospermo de hojas con
foliis petiolatis ovatis an- peciolo, aovadas, entre an-
gulato-dentatis subtus to- guladas y dentadas, tomen-
mentos, *petiolis perfolia-* tosas por debaxo; los pe-
to-amplexicaulibus. Suppl. ciolos perfoliados, y que
p. 386. X abrazan el tallo.

Cast. Osteospermo perfoliado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

El peciolo ensanchado en su insercion y redondo, abraza
el tallo.

Calen-
dula-
ceum. 15. OSTEOSPERMUM X Osteospermo de hojas lan-
foliis lanceolatis sessilibus X ceoladas, sin peciolo, con
dentatis scabris, caule car- X dientes y ásperas; tallo car-
noso, laxo. Suppl. p. 386. X noso y laxo.

Cast. Osteospermo como Calendula.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Es muy parecido á la *Calendula arvense*; pero tiene las
semillas sin alas, cilindricas, oseas y lampiñas.

1182. Género OTHONNA. * *Jacobeastrum*

Vaill. A. G. 1720. f. 15.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun muy sencillo, de una pieza, obtuso en su ba-
se, agudo, igual, y dividido en ocho, ó doce seg-
mentos.

COR.

672 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

COR. *compuesta radiada*; con muchas *corolillas* hermafroditicas, en el disco; y las femeninas en número de los segmentos del caliz (*las mas veces ocho*), en el radio.

Propia de la hermafroditica: *tubulosa*, con cinco dientes y casi mas larga que el caliz.

De la femenina: *ligulada*, *lanceolada*, mas larga que el caliz, con tres dientes y *redoblada*.

ESTAMB. en las hermafroditicas: *filamentos* cinco, *capilares* y *cortisimos*: con la *antera* *cilindrica*, *tubulosa* y de la longitud de la corolilla.

PIST. en las hermafroditicas: *germen* *oblongo*: *estilo* *filiforme*, y casi mas largo que los estambres: con el *estigma* *hendido* en dos partes.

En las femeninas: *germen* *oblongo*: *estilo* *filiforme*, de la longitud del de la hermafroditica: con el *estigma* *redoblado* y mas grande.

PERIC. ninguno: el *caliz* *persistente* y sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas: ninguna.

En las femeninas: *oblongas*, *desnudas*, ó con *vilano*.

RECEPT. *desnudo* y *punteado*.

OBS. *En algunas especies las semillas se hallan coronadas con vilano; en otras el caliz está dividido mas de la mitad; en otras es solamente dentado; pero la figura siempre se mantiene constante.*

E S P E C I E S.

- | | | |
|---------------|--|---|
| Bul-
bosa. | <p>1. OTHONNA <i>foliis ob-</i>
<i>longis nudis petiolatis, cau-</i>
<i>le herbaceo, pedunculis uni-</i>
<i>floris, longissimis.</i>
<i>Jacobeæ affinis, planta</i>
<i>tuberosa, Capitis Bonæ spei.</i>
Breyn. cent. 1. t. 66. Moris.
hist. 3. p. 111. sect. 7. t. 18.
f. 33.</p> | <p>Othonna con hojas oblon-
gas, desnudas y pecioladas;
tallo herbáceo; pedunculos
de una flor y larguissimos.
Planta tuberosa, del Cabo
de Buena-esperanza, pare-
cida á la Jacobea.</p> |
|---------------|--|---|

Solidago foliis oblongis, *Solidago* con hojas oblon-
dentatis, *glabris*, *floribus* gas, dentadas, lampiñas; y
magnis. Burm. afr. 164. flores grandes.

t. 59.

Othonna foliis cuneifor- *Othonna* con hojas en for-
mibus integerrimis, *caule* ma de cuña y enterisimas;
fruticoso procumbente, *pe-* tallo fruticoso, tendido; y
dunculis longissimis. Mill. pedunculos larguissimos. α
 ic. ed. germ. t. 202. f. 1. R.

Cast. *Othonna bulbosa*.Habita en Etiopia. *h*

Es planta tan variable como otra qualquiera. Echa las ho-
 jas florales en los pedunculos, y las mas veces opues-
 tas: los pedunculos comunmente de dos en dos: los cali-
 ces partidos en cinco lacinias: y varía de los modos si-
 guientes:

β *Herbacea foliis ovatis* *Herbácea* con hojas aova-
integerrimis. das, y enterisimas. β

Herbacea foliis radicali- *Herbácea* con las hojas ra-
bus pinnatis integerrimis. dicales pinnadas, y enteri-
 simas. χ

α *Herbacea foliis lineari-* *Herbácea* con hojas linea-
bus angustisimis. res, y muy angostas. α

ε *Herbacea foliis lanceola-* *Herbácea* con hojas lan-
tis integerrimis. ceoladas, y enterisimas. ε

φ *Herbacea foliis lanceola-* *Herbácea* de hojas lanceo-
tis dentatis. ladas, y con dientes. φ

γ *Herbacea foliis lanceola-* *Herbácea* con hojas lan-
to-subellipticis. ceoladas, y casi elípticas. γ

ν *Herbacea foliis sublan-* *Herbácea* de hojas casi
ceolatis tridentatis. lanceoladas, y con tres dien-
 tes. ν

ι *Fruticosa foliis apicibus* *Fruticosa* con las hojas
lanceolatis subsessilibus. lanceoladas en sus ápices, y
 casi sin peciolo. ι

κ *Fruticosa foliis alternis* *Fruticosa* de hojas alter-
lanceolatis dentatis. nas, lanceoladas, y con dien-
 tes. κ

674 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Tagetes.

2. OTHONNA *foliis linearibus pinnatis subdentatis, caule herbaceo.*

Othonna con hojas lineares, pinnadas, casi dentadas; y tallo herbáceo.

Tagetes minimus, tener diviso folio. Breyn. Prodr. 2. p. 99.

Tagetes muy pequeña, con hoja delgadamente cortada.

Chrysanthemum Africanum, pumilum, ramosum, foliis tenuissimis. Rai. Suppl. p. 212.

Chrysanthemo de Africa, enano y ramoso, con hojas muy delgadas.

Cast. Othonna Tagetes.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Posee el tallo filiforme y ondeado: el caliz como jarrito con catorce dientes, poco mas ó menos, en su boca: y el radio de muchos semiflosculos.

Pectinata.

3. OTHONNA *foliis pinnatifidis, laciniis linearibus parallelis.* Hort. cliff. 419. Mill. dict. n. 3. ic. t. 194. f. 2.

Othonna de hojas hendidas al través, con sus laciniias lineares y paralelas.

Jacoea Africana, frutescens, foliis Absinthii umbelliferi incanis. Comm. hort. 2. p. 137. t. 69.

Jacoea de Africa, frutescente, con hojas como las del Axenjo umbelifero y blanquecinas.

Cast. Othonna de hojas como peyne.

Habita en Etiopia. h

Es planta, las mas veces, toda tomentosa: y tiene el tallo con cicatrices.

Abrotanifolia.

4. OTHONNA *foliis multifido-pinnatis linearibus, caulis geniculis villosis.* Roy. lugdb. 380.

Othonna con hojas entre hendidas en muchas partes y pinnadas, lineares; y nudos del tallo vellosos.

Cineraria Abrotanifolia. Berg. cap. 292.

Cineraria con hoja como la del Abrotano.

Asteroplatycarpus Africana, frutescente, con el fruto como el del Aster, ancho; y hojas parecidas á las del Hinojo marino. 2. p. 2. t. 32.

Jacobaea Africana, fruticosa, mayor y menor, con hojas como las del Abrotano, ó del Hinojo marino. Volk. norib. 225. t. 225. Rai. Suppl. p. 179. Pluk. phyt. t. 323. f. 2. Seb. mus. 2. t. 23. f. 6.

Cast. Othonna con hoja de Abrotano.

Habita en Etiopia. \hbar

Coro-
nopi-
folia. 5. OTHONNA foliis infimis lanceolatis integerimis; superioribus sinuato-dentatis. Hort. cliff. 419. Othonna con las hojas mas abaxo lanceoladas enterisimas, y las superiores sinuosas y dentadas. *Jacobaea Africana*, frutescens, Coronopifolio. Comm. hort. 2. p. 139. t. 70. Rai. Coronopo. Suppl. p. 175.

Cast. Othonna con hoja de Coronopo.

Habita en Etiopia. \hbar

Cheiri-
folia. 6. OTHONNA foliis lanceolatis trinerviis integerimis, caule suffruticoso repente. Duham. arb. 2. p. 94. t. 17. Mill. ic. 245. f. 1. Othonna de hojas lanceoladas, con tres nervios enterisimas; tallo sufruticoso y rastrero. *Aster fruticosus*, Africanus, luteus, foliis Thymeleae. Rai. Suppl. p. 167. Aster fruticoso, Africano con flor amarilla; y hojas como las de la Thymelea.

Cast. Othonna con hojas de Aleli amarillo.

Habita en Etiopia. \hbar

Echa los tallitos tendidos por el suelo, que arrojan raíces, de color garzo, y casi sencillísimos: las hojas con tres nervios, lampiñas, de color garzo, xugosas, car-

676 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

tilaginosas por su margen y que abrazan la mitad del tallo: las *flores* amarillas: los *pedunculos* solitarios, terminales, de una flor, largos, fistulosos y por arriba encrasados: los *cálices* hendidos en cinco ó seis partes: y el *vilano* blanco y largo. Florece en todo el verano é inuierno. *Gov. hort. p. 464.*

Cras-
sifolia.

7. OTHONNA *foliis lanceolatis integerrimis sub-carnosis, caule erecto.* Hort. cliff. 419. Mill. ic. 163. t. 245. f. 2.

Jacobæa Africana, frutescens, crassis & succulentis foliis. Comm. hort. 2. p. 147. t. 74. Rai. Suppl. 174.

Othonna con hojas lanceoladas, enterisimas, algo carnosas; y tallo derecho.

Jacobeæ Africana, frutescente, con hojas crasas y xugosas.

Cast. Othonna con hojas crasas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Es semejante á la *Othonna* con *hoja de Aleli*; pero derecha y del largo de quatro pies.

Par-
visflora.

8. OTHONNA *foliis lanceolatis glabris amplexicaulis, floribus paniculatis.* Berg. cap. 335.

Senecio rigens. Spec. pl. ed. 2. p. 1224.

Jacobæa Africana, frutescens, folio longiore, & glauco. Comm. hort. 2. p. 143. t. 72. Rai. Suppl. p. 147.

Jacobæa Africana, perennis, integro, oblongo, folio glauco. Volk. norib. 226. t. 226. Rai. Suppl. p. 179.

Othonna con hojas lanceoladas, lampifias, amplexicaules; y flores en panoja.

Senecio yerto.

Jacobeæ Africana, frutescente, con hoja mas larga y de color garzo.

Jacobeæ de Africa, perenne, con hoja entera, oblonga y de color garzo.

Cast. Othonna de flor pequeña.

Habita en lugares aguanosos del Cabo de Buena-esperanza. *h*

Produce el *tallo* fruticoso, del largo de dos pies y liso: las *hojas* alternas, con peciolo, anchas y lanceoladas: las

las de mas arriba de figura de delta , lampiñas y con un diente en cada lado : los *pedunculos* larguissimos , lisos , apretados y rígidos , con algunas hojuelas muy pequeñas , muy distantes , lanceoladas y con un diente en cada lado : la *panoja* chica , con las *flores* pequeñas y amarillas : y el *caliz* sencillo , liso y hendido en ocho partes.

Te-
nuissi-
ma.

9. OTHONNA *foliis filiformibus carnosis , caule fruticoso*. Pluk. phyt. t. 3 19. f. 5. Othonna con hojas filiformes , carnosas ; y tallo fruticoso.

Crassula (fruticosa) *foliis longis teretibus alternis , caule fruticoso , ramoso*. Mill. dict. n. 8. *Crasula* (fruticosa) con hojas largas , rollizas , alternas ; tallo fruticoso y ramoso.

Cast. Othonna muy delgada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. $\frac{1}{2}$

No vió Linneo la flor de esta planta ; aunque la cultivó mucho tiempo. Tiene el tallo liso y del largo de uno , ó dos pies , y aun mas ; las hojas alternas , filiformes , carnosas , lisas , extendidas , algo declinadas , y por su base mas angostas. Por el vello que posee en la base de las hojas como en la *Othonna fruticosa* juzgó Linneo que esta especie pertenecia á este género ; mientras que se descubra lo mas cierto.

Frutes-
cens.

10. OTHONNA *foliis ovalibus subdentatis , caule frutescente*. Othonna con hojas ovales , algo dentadas ; y tallo frutescente.

Cineraria (Othonnites) *pedunculis unifloris , foliis oblongis indivisis subdentatis petiolatis alternis nudis*. Spec. pl. 3. p. 1244. Mill. dict. n. 4. *Cineraria* (como Othonna) con pedunculos de una flor ; hojas oblongas , indivisas , algo dentadas , con peciolo , alternas y desnudas.

Chrysanthemum Africanum , frutescens , Telephii foliis crassis. Pluk. amalth. 45. t. 382. f. 4? *Chrysanthemo* de Africa , frutescente , con hojas como las del *Telephio* y crasas.

Cast.

678 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Cast. Othonna fruticosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Es semejante á la *Othonna arborescente*. Tiene el tallo del primer año del largo de un pie , derecho , sencillo , rollizo , liso y lampiño : las *hojas* alternas , con peciolo corto , aovadas al revés ; las *de arriba* lanceoladas , sin venas , de color garzo , que tira á verde (como el de la Berza) y terminadas en una punta menuda ; las *inferiores* enterisimas ; las *del medio* con dos dientes por su base ; las *supremas* ó *mas altas* dentadas en sus lados , y todas casi escurridas por su dorso : los *pedunculos* que salen de la extremidad del tallo , del largo de quatro dedos , de una flor , filiformes , derechos y con algunas hojuelas menudas : el *caliz* cilindrico , obtuso , igual y hendido en ocho partes : el *radio* amarillo , de ocho petalos , lanceolados , casi con tres dientes , y al doble mas largo que el caliz : dos *estigmas* lanceolados y cortos : el *disco* amarillo : las *semillas del radio* cortísimas ; con el *vilano* capilar , copioso y de la longitud del caliz.

Arbores-
gens.

11. OTHONNA *foliis oblongis integerrimis , caulibus arborescente carnosos , cicatricibus lanatis.*

Doria Africana , arborescens , floribus singularibus. Dill. elth. 123. t. 103. f. 123.

Othonna con hojas oblongas , enterisimas ; tallo arborescente , carnosos y con cicatrices lanudas.

Doria Africana , arborescens , con flores de una en una.

Cast. Othonna arborescente.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Posee el *caliz* hendido en cinco partes : y el *radio* de cinco petalos.

Athanasia.

12. OTHONNA *foliis pinnatis filiformibus , calice hemisphaerico duodecimitato.* Suppl. p. 386.

Cast. Othonna como Athanasia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Back.* \hbar

Echa el tallo fruticoso , como el de la *Athanasia* , prolifera

FLOSC. DEL DISC. MASC. Y DEL RAD. FEM. 679

ro y liso: las *hojas* alternas, remotas, pinnadas, filiformes, con tres pares de hojuelas, opuestas, terminadas en impar y desnudas: el *pedunculo* de una flor, rollizo y al doble mas largo que las hojas y que sale de la horquilladura, con la flor mayorcita y terminal: el *caliz* de una pieza, hemisférico, liso, y las mas veces con doce dientes en su margen: la *corola* amarilla; con el *radio* al doble mas largo que el caliz: y las *semillas* con vilano.

Ci- 13. OTHONNA *foliis* X Othonna de hojas senta-
liata. *pinnatifidis sessilibus, pin-* das y hendidas al través,
nis ovatis ciliatis, pedun- con sus hojuelas ó lacinias
culis terminalibus elongatis aovadas y pestañosas; pe-
unifloris. Suppl. p. 386. *dunculos terminales, alarga-*
X *dos y de una flor.*

Cast. Othonna pestañosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Digi- 14. OTHONNA *foliis* X Othonna de hojas oblon-
tata. *oblongis indivisis seu di-* gas, indivisas, ó entre en for-
gitato-dentatis pedunculis ma de dedos y dentadas; y
unifloris. Suppl. p. 386. *X pedunculos de una flor.*

Cast. Othonna en forma de dedos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Es muy semejante á la *Othonna pestañosa*; y tiene la *raiz* bulbosa.

Pinna- 15. OTHONNA *foliis* X Othonna de hojas hendi-
ta. *pinnatifidis, pinnis lanceo-* das al través, con sus hojue-
latis integerrimis decurren- las ó lacinias lanceoladas,
tibus. Suppl. p. 387. *X enterisimas y escurridas.*
Othonna bulbosa. Spec.pl. *X Othonna bulbosa. β*
ed. 3. p. 1309.

Cast. Othonna pinnada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

68o FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Lingua 16. OTHONNA *foliis* X Othonna con hojas entre
ovato-lanceolatis semiam- X aovadas y lanceoladas , y
plexicaulibus. Suppl. p. 387. X que abrazan la mitad del
 X tallo.

Cast. Othonna lengua.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Posee tambien la raiz bulbosa.

Tri- 17. OTHONNA *foliis* X Othonna con hojas hendi-
 fida. *trifidis linearibus , floribus* X das en tres partes y lineares;
lateralibus pedunculatis . X flores laterales y con pedun-
 Suppl. p. 387. X culo.

Cast. Othonna hendida en tres partes.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Arroja el tallo fruticoso , prolifero , extendido y de color pardo : las *hojas* esparcidas , medio hendidas en tres partes , lineares , algo carnosas y con lana blanca en las axilas : los *pedunculos* axilares , solitarios , de una flor y mucho mas largos que las hojas : los *cálices* divididos profundamente : y las *semillas* con lana blanca.

Lateri- 18. OTHONNA *foliis* X Othonna con hojas lan-
 flora. *lanceolatis , floribus latera-* X ceoladas ; flores laterales ; y
libus , pedunculis longitudi- X pedunculos del largo de las
ne foliorum. Suppl. p. 387. X hojas.

Cast. Othonna con flores laterales.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Back. h*

Echa el tallo del grueso de una pluma de Cigueña y derecho : las *hojas* esparcidas , lanceoladas , sin peciolo , enterisimas y lampiñas : los *pedunculos* laterales , solitarios , de una flor y del largo de las hojas : la *flor* casi redonda : el *caliz* de una pieza , y hendido casi en ocho partes : y la *corola* amarilla. Los *pedunculos* y *receptaculos* del año antecedente permanecen acorchados en el tallo.

He-
tero-
phylla. 19. OTHONNA *foliis radicalibus ovatis angulato-denticatis, caulinis lanceolatis integriusculis.* Suppl. p. 387. Othonna con las hojas radicales aovadas, entre angulosas y dentadas; las del tallo lanceoladas, y algo enteras.

Cast. Othonna de hojas varias.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Tiene la raíz bulbosa.

Trifurcata. 20. OTHONNA *foliis trifido-pinnatifidis, pinnis linearibus, pedunculis lateralibus, fastigiatis.* Suppl. p. 387. Othonna con hojas hendidas en tres partes, y al través con sus hojuelas ó lacinias lineares; pedunculos laterales, y elevados en ramillete horizontal.

Cast. Othonna de tres horquillas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Cacalioides. 21. OTHONNA *carnosa, nuda, lævis, palmaris, foliis fasciculatis obovatis sessilibus, pedunculis unifloris.* Suppl. p. 388. Othonna carnosa, desnuda, lisa y del largo de cuatro dedos, con hojas en halbecillo, aovadas al revés, sin peciolo; y pedunculos de una flor.

Cast. Othonna como Cacalia.

Habita en las peñas del Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Es planta muy distinta por el tallo carnoso y lampiño como el de las *Cacalias*; y por la flor semejante á la de la *Othonna*.

Posee las cicatrices de las hojas redondas y tomentosas.

Eri-coides. 22. OTHONNA *caule dichotomo imbricato, foliis acerosis, pedunculo longissimo ex divaricaturis solitario.* Suppl. p. 388. Othonna de tallo ahorquillado y apañado, con hojuelas lineares y rígidas; pedunculo larguísimo, solitario, y que sale de las divisiones del tallo.

Cast. Othonna como Brezo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Back. h*

Es

682 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Es *arbusto* con traza de *Brezo*, derecho, y las mas veces ahorquillado. Tiene las *hojas* como las del *Brezo*, esparcidas, algo amontonadas, alesnadas, cortas, encorvadas y lisas: los *pedunculos* axilares, larguissimos, rectos, lisos, y de una flor, casi redonda, y no muy grande.

Mu- 23. OTHONNA *foliis* X Othonna de hojas hendi-
nita. *pinnatifidis imbricatis in-* X das al través, apañadas y
curvis, pinnis triquetris X encorvadas, con las lacinias
subulatis, caule dichotomo, X ú hojuelas de tres caras, ales-
pedunculis ex divaricaturis. X nadas; tallo ahorquillado; y
Suppl. p. 388. X pedunculos que salen de las
X horquilladuras.

Cast. Othonna guarecida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Es muy parecida á la *Othonna como Brezo*.

Lini- 24. OTHONNA *herba-* X Othonna herbácea, con
folia. *cea, foliis linearibus mar-* X hojas lineares, como las de la
ginatis gramineis. Suppl. X Grama, y ribeteadas.
p. 388.

α Othonna (bulbosa) *foliis* X Othonna (bulbosa) con
linearibus angustissimis. X hojas lineares y muy angos-
Spec. pl. ed. 3. p. 1309. X tas. α

Cast. Othonna con hoja de Lino.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Echa el tallo del largo de un xeme, filiforme y liso, con uno ú otro ramo de una flor: las *hojas radicales* lineares, filiformes, casi de la longitud del tallo, y lanudas por su base; tres ó quatro solamente en el tallo, y semejantes á las radicales: las *flores terminales* solitarias, de la magnitud de un guisante y amarillas: y el *caliz* de ocho hojuelas, poco mas ó menos.

Capil- 25. OTHONNA *foliis ly-* X Othonna con hojas en for-
laris. *ratis, ramis capillaribus.* X ma de lira; y ramas capila-
Suppl. p. 388. X res.

Cast. Othonna capilar.

Ha-

FLOSC. DEL DISC. MASC. Y DEL RAD. FEM. 683

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.* ☉

Lleva las *hojas* radicales; con una ú otra en el *tallo*, en forma de lira, del largo de una pulgada y lisas: los *tallos* levantados, del largo de quatro dedos, filiformes; con *ramas* setáceas, capilares y lisas: las *flores* terminales, de la magnitud de un grano de cáñamo y amarillas; con el *caliz* de cinco hojuelas, aovado y agudo.

Vir- 26. OTHONNA *foliis* X Othonna con hojas en for-
ginea. *cuneatis incis.* Suppl. p. X ma de cuña y cortadas.
389. X

Cast. Othonna Virginea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.* ♀

Produce el *tallo* fruticoso, compuesto, derecho y rollizo; con *ramas* que se caen cada año y muy sencillas: las *hojas* esparcidas á montones, en forma de cuña, pequeñas respecto de la planta, sin peciolo, derechitas, planas y lisas, con cinco ó siete dientes derechos; y las inferiores mas cortas: las *flores* que salen de la parte superior de los entrenudos, laterales, sin orden, solitarias, pequeñas y semejantes á las de la *Cotula*: los *pedunculos* de una flor: el *caliz* de siete hojuelas, sencillo, agudo y persistente: el *radio* pequeño, amarillo y fértil; con el *estilo* hendido en dos partes: el *disco* amarillo y convexo; con los *flosculos* hendidos en cinco lacinias, y tal vez fértiles? y el *vilano* sencillo y sin estipite.

1183. Género HIPPIA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* hemisférico y casi apinado; con *escamas* aovadas.

COR. *compuesta* sin radio; con muchos *flosculos* masculinos, en el disco; y diez femeninos, en el ámbito.

Propia de los masculinos: en forma de embudo, hendida en cinco partes y derecha.

De los femeninos: poco formada, tubulosa, y casi hendida en tres partes.

ESTAMB. en los masculinos: *filamentos* cinco, cortísimos: con la *antera* cilíndrica y mas corta.

PIST.

684 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

PIST. en los femeninos : *germen* ribeteado y grande : *estilo* hendido en dos partes : con los *estigmas* derechos.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en los femeninos : ovals , con ribete muy ancho por todas partes , y desnudas ó sin vilano.

RECEPT. desnudo.

ESPECIES.

Frutes-
cens.

1. HIPPIA *fruticosa*, vil- X *Hippia fruticosa* , vellosa,
losa, *foliis pinnatifidis*, flo- X con hojas hendidas al través;
ribus corymbosis. Suppl. p. X y flores en corimbo.
390.

Tanacetum (*frutescens*) X *Tanaceto* (*frutescente*)
foliis pinnatifidis, *laciniis* X de hojas hendidas al través,
lanceolatis obtusiusculis in- X con sus lacinias algo obtusas;
tegerrimis. Spec. pl. ed. 3. X y enterisimas.
p. 1183. Berg. cap. 243.

Eriocephalus (*pectinifo-* X *Eriocephalo* ó cabeza de
lius) *foliis planis pinnatis*. X lana (*con hoja de peyne*) con
Syst. nat. ed. 12. p. 579. X hojas planas y pinnadas.

Tanacetum foliis pinna- X *Tanaceto* con hojas pin-
tis integerrimis. Hort. cliff. X nadas y enterisimas.
398. Roy. lugdb. 154.

Tanacetum Africanum, X *Tanaceto* de Africa , ar-
arborescens, *foliis Laven-* X borescente , con hojas como
dulæ, *multifido folio*. Comm. X las del Espliego, y hendidas
hort. 2. p. 201. t. 101. X en muchas partes.

Cast. *Hippia frutescente*.

Habita en Etiopia. *h*

Se acerca mas bien á la fructificacion de la *Iva* , que á la del *Tanaceto* ; y sin embargo es distinta del uno y del otro género.

Inte-
grifolia

2. HIPPIA *hispida*, *erect-* X *Hippia* erizada , derecha,
a, *foliis ovatis serratis* X con hojas aovadas , aserra-
quinque-nerviis, *racemis ter-* X das , de cinco nervios ; y ra-
minalibus. Suppl. p. 389. X cimos terminales.

Cast. *Hippia* con hoja entera.

Habita en la India.

3. HIPPIA *herbacea*, pro-~~X~~ Hippiá herbácea , tendi-
 Mi- cumbens , repens , glabra, ~~X~~ da , rastrera y lampiña , con
 nuda. foliis pinnatis , pedunculis ~~X~~ hojas pinnadas ; pedunculos
 axillaribus unifloris. Suppl. ~~X~~ axilares y de una flor.
 P. 389. ~~X~~

Cast. Hippiá menuda.

Habita en la America Meridional. Mutis.

Es *planta* muy pequeña , á la qual tuvo *Linneo* entre las mas dificultosas de exâminar. Echa los *tallos* tendidos, articulados , y que arrojan raices por todas las articulaciones : las *hojas* alternas , con peciolo , de la figura de las de la *Hippiá frutescente* , opuestas en los nudos , y las mas veces de tres en tres ; con los *peciolos* ensanchados por su base , y amplexicaules : los *pedunculos* axilares , doblados , filiformes y mas largos que las hojas : las *flores* pequeñas : el *caliz* sencillo , de siete hojuelas ó escamas entre aovadas y oblongas : los *flosculos del radio* fértiles : pocos en el *disco* y estériles : las *semillas del radio* aovadas al revés , ribeteadas longitudinalmente en ambas partes , y hendidas en su ápice : y el *receptaculo* desnudo.

1184. Género ERIOCEPHALUS. * *Dill. elth.* 110.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun derecho ; con diez *escamas* aovadas , iguales, arrimadas entre sí , de las quales *cinco exteriores* se hallan aquilladas , y las *interiores* planas.

COR. compuesta radiada ; con diez *corolillas* hermafroditicas , en el disco ; y cinco femeninas , en el radio.

Propia de la hermafroditica : en forma de embudo ; con el *borde* hendido en cinco partes y extendido.

De la femenina : ligulada , de figura de *corazon* al revés , con su ápice hendido en tres lóbulos é igual.

ESTAMB. en las hermafroditicas : *filamentos* capilares y cortísimos : con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. en las hermafroditicas : *germen* muy pequeño y desnudo : *estilo* sencillo : con el *estigma* hendido en dos partes y agudo.

En las femeninas : *germen* aovado y desnudo : *estilo* sen-

686 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

sencillo : con el *estigma* puntiagudo y doblado.

PERIC. ninguno : el *caliz* apenas mudado hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas : ninguna.

En las femeninas : aovadas al revés y desnudas.

RECEPT. desnudo y plano : ó bien con una pelusa del caliz interpuesta en dos órdenes entre los flosculos hermafroditicos y los femeninos.

OBS. *Se halla un cuerpecito comprimido , y arrimado en la base de cada escamita del caliz.*

ESPECIES.

Ahi-
canus.

1. ERIOCEPHALUS *foliis integris divisisque, floribus corymbosis.* Hort. cliff. 424. Erioccephalo ó cabeza de lana , con hojas enteras y divididas; y flores en corimbo.

Erioccephalus sempervirens , foliis fasciculatis & digitatis. Dill. elth. 132. t. Erioccephalo siempreverde, con hojas en hacecillo y divididas como en dedos.

110. f. 134.

Abrotanum Africanum , foliis tereti tridentato. Walth. hort. 1. t. 1. Abrotano de Africa , de hoja rolliza y con tres dientes.

Cast. Erioccephalo de Africa.

Habita en Etiopia. ♀

Race-
mosus.

2. ERIOCEPHALUS *foliis linearibus indivisis, floribus racemosis.* Amoen. acad. 6. afr. 87. Erioccephalo con hojas lineares , indivisas ; y flores en racimo.

6. afr. 87.

Abrotanum Africanum , foliis argenteis angustis, floribus spicatis. Rai. Suppl. p. 233. Abrotano de Africa , con hojas de color de plata , angostas ; y flores en espiga.

p. 233.

Cast. Erioccephalo racimoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ♀

1185. Género FILAGO. * *Tourn. t. 259. Vaill.*

act. 1719. f. 6. 7. Gnaphalium

Vaill. A. G. 1719.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* con pajas apiñadas , que contiene en el *disco* muchos flosculos hermafroditicos ; y en el *ámbito* entre las escamas inferiores del caliz, los flosculos femeninos solitarios.

COR. *compuesta* con los flosculos hermafroditicos en forma de embudo ; el *borde* hendido en quatro partes y derecho : y los femeninos apenas perceptibles, filiformes , muy angostos , y hendidos por su boca en dos partes.

ESTAMB. en los hermafroditicos: *filamentos* quatro , capilares , y pequeños : con la *antera* cilindrica y de quatro dientes en su ápice.

PIST. en los hermafroditicos: *germen* apenas alguno: *estilo* sencillo : con el *estigma* agudo y hendido en dos partes.

En los femeninos : *germen* aovado , mayorcito y deprimido: *estilo* filiforme : con el *estigma* hendido en dos partes y agudo.

PERIC. ninguno.

SEM. en los hermafroditicos : ninguna.

En los femeninos : aovadas al revés, comprimidas , lampiñas , pequeñas ; y sin *vilano*.

RECEPT. El *disco* desnudo y sin pajas ; pero en sus lados con pajas del caliz , que separan los flosculos.

OBS. En el Filago de Alemania , montano , arvense y de Francia , se hallan las semillas con *vilano*.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 454.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos , divididos á manera de estrella , sentados en el embrión , y comprendidos en el caliz escamoso , el qual no es reluciente ni hermoso : y el embrión pasa á semilla adornada de vilano.

ESPECIES.

- Acau-
lis. 1. FILAGO (pygmea) X Filago (enano) con flores
floribus acaulibus sessili- sin tallo, sentadas; y hojas
bus, foliis floralibus majo- florales mas grandes.
ribus. Spec. pl. 3. p. 1311.
 Loeß. it. 165.
Gnaphalium roseum, hor- Gnaphalio hortense, como
tense. C. B. P. 263. Prodr. X rosa.
 -122. Barr. ic. 127.
Filago marina, capite fo- Filago marino (maritimo)
lioso. Tourn. p. 455. X con la cabezuela foliosa.

Cast. Filago sin tallo.

Habita en la Europa austral y en Oriente: en los circui-
 tos de Madrid: en Extremadura, Andalucía y otras
 partes de España. ☉

Tiene las flores sentadas y radicales dentro de un cerco
 de hojas y rara vez arroja tallo.

Es de la altura de una ó dos pulgadas. Posee las ho-
 jas amontonadas al rededor de las flores, mas largas que
 la cabezuela, de forma que parece forman radio y cubier-
 tas de tomento ceniciento. Gov. hort. 465.

Echa la raíz descendente, sencilla, tortuosa, con fi-
 bras por los lados, de color amarillo ferrugineo, y comun-
 mente mas larga que la misma planta. Algunas veces tiene
 tallo cortísimo, muy sencillo y cubierto con todas las ho-
 jas apañadas, y tres veces mas grueso por arriba, respec-
 to de hallarse muchas flores sentadas en un mismo lugar:
 los tallos, en lugares mas fertiles, ramosos por arriba, y sus
 ramas extendidas en forma de una rosa con las hojas de
 mas arriba apañadas y ácia fuera siempre mas grandes que
 las restantes interiores. Loeß. loco citato.

- Ger-
manica 2. FILAGO panicula di- X Filago con la panoja ahor-
chotoma, floribus rotunda- quillada; flores redondeadas,
tis axillaribus hirsutis, fo- axilares, con pelo áspero; y
liis acutis. Pall. it. 1. p. 40. X hojas agudas.
Gnaphalium vulgare, ma- Gnaphalio vulgar, mayor.
jus. C. B. P. 263. X

Gna.

Gnaphalium Germanicum. X Gnaphalio de Alemania.

Bauh. hist. 3. p. 158.

Gnaphalium. Fuchs. hist. X Gnaphalio.

222.

Filago impia, Dodonei. X Filago impio, de Dodo-
Tourn. p. 454. X neo.

Cast. Filago de Alemania.

Habita en la Europa: en los alrededores de Madrid: en
Aragon, Cataluña y otras partes de España. ☉

Las semillas poseen vilano.

Tiene las hojas casi escurridas y blanquecinas: y el tallo
algunas veces dividido en tres partes.

Pyra-
midata 3. FILAGO caule dicho- X Filago con el tallo ahor-
tomo, floribus pyramidalis X quillado; flores piramidales,
pentagonis axillaribus, flos- X de cinco lados, axilares; y
culis femineis seriatis. X flosculos femeninos puestos
en series.

Gnaphalium medium. C. X Gnaphalio medio.

B. P. 263.

Cast. Filago piramidal.

Habita en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cata-
luña, Castilla la vieja y en otras partes de España. ☉

Arroja el tallo derecho, del largo de dos ó tres pulgadas
y aun mas; con ramas radicales: las hojas lanceoladas
y algo obtusas: las flores que salen de la horquilladura
del tallo, y terminales, sentadas, piramidales y de
cinco ángulos, agregadas y tomentosas como toda la
planta.

Mon-
tana. 4. FILAGO caule subdi- X Filago con el tallo casi
chotomo erecto, floribus co- X ahorquillado y derecho; flo-
nicis terminalibus axillari- X res cónicas, terminales y axi-
busque. Leers. herb. 678. X lares.

Filago caule dichotomo, X Filago con el tallo ahor-
floribus glomeratis, spicatis. X quillado; flores conglobadas
Hall. helv. n. 115. X y en espiga.

Gnaphalium minus, re- X Gnaphalio menor, rastre-
pens. C. B. P. 263. X ro.

692 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Gnaphalium minimum. X Gnaphalio muy pequeño.
 Bauh. hist. 3. p. 159. Lob.
 ic. 481. Rai. hist. 296.

Filago minor. Ger. 141. X Filago menor.
 Tourn. p. 454. X

Cast. Filago montano.

Habita en lugares areniscos y montuosos de Europa. ☉
 Los *flosculos* son hermafroditos segun Haller y Leers. R.

Gallica 5. FILAGO caule dicho- X Filago con el tallo ahor-
 tomo erecto, floribus sub- quillado, derecho; flores
 latis axillaribus, foliis fili- alesnadas, axilares; y hojas
 formibus. Pollich. pal. n. filiformes.
 832.

Gnaphalium vulgare, me- X Gnaphalio vulgar, medio.
 dium. Moris. hist. 3. sect. 7.
 t. 11. f. 14. Pet. herb. t. 18.
 f. 12.

Gnaphalium minimum, X Otro Gnaphalio muy pe-
alterum, nostras, *Stœcadis* queño, de nuestro pais (In-
citrinæ foliis tenuissimis. glaterra), con hojas como
 Pluk. alm. 172. t. 298. f. 2. las del Cantueso cetrino, y
 muy delgadas.

Gnaphalium vulgare, te- X Gnaphalio vulgar, con
nuifolium. Bauh. hist. 3. p. hoja delgada.
 159.

Filago vulgaris, tenuis- X Filago vulgar, levantado,
simo folio, erecta. Tourn. p. con hoja muy delgada.
 454. X

Cast. Filago de Francia.

Habita en Francia, Suiza, Inglaterra y Alemania.

Tiene las hojas algo tomentosas, lisas y no ásperas. Los
flosculos se hallan hermafroditos. Hall. R.

Ar- 6. FILAGO caule pani- X Filago con el tallo en pa-
 vensis. culato, floribus conicis la- noja; flores cónicas y late-
 teralibus. Leers. herb. n. 679. X rales.

Filago caule erecto, ramosissimo, foliis mollissimis, tomentosis, florum acervis sessilibus, in spicas continuatis. Hall. helv. n. 154. Filago con el tallo derecho y muy ramoso; hojas muy blandas y tomentosas; montones de las flores sentados y continuados en espiga.

Gnaphalium majus, angusto-oblongo folio. C. B. P. 263. Gnaphalio mayor, con hoja angosta y oblonga.

Filago altera. Dod. pempt. Otro Filago.

67. Tourn. p. 464.

Cast. Filago arvensis.

Habita en los campos areniscos de Europa: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña, Alcarria y en otras partes de España. ☉

Leontopodium.

7. FILAGO *caule simplicissimo, capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato.* Jacq. vind. 150. Pall. it. 3. p. 265. Filago de tallo muy sencillo; cabezuela terminal, y radiada con brácteas con muchísimo pelo áspero.

Filago floribus sessilibus, umbellatis, foliis umbellam excedentibus, tomentosis. Hall. helv. n. 152. Filago con flores sentadas, y en umbela; hojas mas altas que ella, y tomentosas.

Gnaphalium Leontopodium. Scop. carn. 2. n. 1045. Jacq. austr. t. 86. Gnaphalio Leontopodio ó pie de Leon.

Gnaphalium alpinum, magno flore, folio oblongo. C. B. P. 264. Gnaphalio alpino, con flor grande; y hoja oblonga.

Gnaphalium alpinum, pulchrum. Bauh. hist. 3. p. 161. Gnaphalio alpino, hermoso.

Gnaphalium alpinum. Clus. hist. 1. p. 328. Gnaphalio alpino.

Leontopodium. Dod. pempt. 68. Leontopodio ó pie de Leon.

Filago alpina, capite folioso. Tourn. p. 454. Filago de alpes, con la cabezuela foliosa.

694 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

* *Gnaphalium magno flore*, X *Gnaphalio* con la flor gran-
brevi folio. C. B. P. 264. X de, y la hoja corta. *

Cast. Filago Leontopodio ó pie de Leon.

Habita en los alpes de Suiza, Valesia, Corinto, Austria, Siberia y Alemania: en las peñas de la Marina de Rosas en Cataluña, y en otras partes de España. 24

Es planta blanquecina, terminada en una estrella de hojas lanuginosas, de cuyo centro salen las flores hermafroditicas, hendidas en cinco lacinias. En las bracteas que forman el radio se hallan sentadas algunas flores femeninas hendidas en quatro lacinias; y otras incompletas, ó destituidas de estambres, de germen y de estilo. Scop. ann. 2. p. 63.

1186. Género MICROPUS. * *Gnaphalodes*

Fourn. t. 439.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun inferior de cinco hojuelas delgadas, pequeñas y desfiguradas.

Comun interior muy grande, y de cinco hojuelas laxas, separadas, comprimidas, arrimadas entre sí longitudinalmente por su margen y en forma de capete.

COR. compuesta de diez flosculos hermafroditicos, en el disco; y de cinco femeninos, en el ambito.

Propia del hermafroditico: de un petalo, en forma de embudo, con cinco dientes y derecho.

Del femenino: ninguna.

ESTAMB. en los hermafroditicos: filamentos cinco, setáceos y cortísimos: con la antera cilíndrica, tubulosa y de la longitud de la corolilla.

PIST. en los hermafroditicos: germen desfigurado: estilo filiforme y mas largo que los estambres: con el estigma tambien desfigurado.

En los femeninos: germen aovado al revés, comprimido, y escondido dentro de cada escama del caliz comun interior: el estilo que sale del lado interior del germen, setáceo, doblado ácia los flosculos herma-
fro-

FLOSC. DEL DISC. MASC. Y DEL RAD. FEM. 695

frodíticos y de la longitud del caliz : con el *estigma* dividido en dos partes , delgado y puntiagudo.

PERIC. ninguno : el *caliz* no se muda ; pero el *comun inte-*rior mas crecido y duro hace sus veces.

SEM. en los hermafrodíticos : ninguna.

En los femeninos : aovadas al revés, y encerradas en su propia hojuela del caliz interior : y sin *vilano*.

RECEPT. con *pajas* agudas , muy pequeñas , que separan las semillas de los flosculos femeninos , y no los flosculos del disco.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

GNAPHALODES. p. 439.

La flor es flosculosa ó que consta de muchos flosculos esteriles : y los embriones que constituian el caliz de la flor pasan á fruto crestado y lleno de una semilla oblonga.

ESPECIES.

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Sp.
pinus. | 1. MICROPUS <i>caule pro-</i> | Micropo con el tallo ten- |
| | <i>cumbente , foliis geminis.</i> | dido ; y hojas meilizas. |
| | Mill. dict. n. 1. | |
| | <i>Micropus foliis floralibus</i> | Micropo con las hojas flo- |
| | <i>oppositis, fructibus murica-</i> | rales opuestas ; y frutos con |
| | <i>ris.</i> Gov. illustr. p. 74. | puntitas rígidas. |
| | <i>Gnaphalium supinum ,</i> | Gnaphalio echado , con la |
| | <i>echinato semine.</i> Pluk. alm. | semilla erizada. |
| | 171. t. 187. f. 6. Rai. Suppl. | |
| | p. 191. | |
| | <i>Pseudo-Gnaphalium su-</i> | Falso-Gnaphalio echado , |
| | <i>pinum , semine echinato.</i> | con la semilla erizada. |
| | Moris. hist. 3. p. 93. | |
| | <i>Gnaphalodes Lusitanica.</i> | Planta como Gnaphalio , |
| | Tourn. p. 439. | de Portugal. |

Casi. Micropo echado.

Habita en lugares maritimos de Oriente , Italia y Portugal : en los circuitos de Madrid, en Extremadura y otras partes de España. ☉

Erec-
tus.

2. *MICROPUS caule erecto, calycibus edentulis, foliis solitariis*, Amœnit. acad. 3. 421. Micropo con el tallo levantado; cálices sin dientes; y hojas solitarias.

Micropus seminibus compressis lanatis inermibus. Loeß. it. 166. t. 1. f. 3. Micropo con las semillas comprimidas, lanudas é inermes.

Gnaphalium caule ramoso diffuso, floribus confertis, lana tectis, Hort. cliff. 402. Gnaphalio con el tallo ramoso y difuso; flores amontonadas y cubiertas de lana.

Gnaphalium minus, latioribus foliis. C. B. P. 263. Gnaphalio menor, con hojas mas anchas.

Gnaphalium Plateau III. Clus. hist. 1. p. 229. Gnaphalio tercero, de Plateau.

Leontopodium verius, Dioscorides. Barr. ic. 296. Leontopodio ó pie de Leon mas verdadero, de Dioscorides.

Filago supina, capitulis rotundis, tomento obsitis, Barr. n. 999. Filago echado, con cabezuelas redondas y cercadas de tomento,

Cast. Micropo levantado.

Habita en los cerros de Oriente y de Francia: en los circuitos de Madrid, en Cienpozuelos, en Aragon y otras partes de España. ☉

Echa la raiz descendente, fibrosa y sencilla: muchos tallos, ó uno solo, derechos, ascendentes, ó difusos por razon del suelo, cubiertos de tomento delgado y laxo; con las ramas extendidas, y las mas veces ahorquilladas: las hojas lanceoladas, algo obtusas, adelgazadas por debaxo, sin peciolo, á veces en forma de espátula, alternas y tomentosas: las flores sentadas, muchas, ó solitarias que salen de las axilas de las hojas y de las ramas, en globulillos muy tomentosos, ó lanudos.

ORDEN V.

POLYGAMIA SEGREGATA. DE LAS MISMAS FLORES CON LOS FLOSCULOS SEGREGADOS Ó QUE TIENEN SU CALIZ PROPIO.

1187. Género ELEPHANTOPUS. * *Vaill. A. G. 1719, f. 11. 41. Dill. elth. 104.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Involucro* de tres hojuelas, anchas y agudas, grande, con muchas flores, persistente y sin umbela.

Periantio parcial, con quatro flores, oblongo y apiñado con escamas entre lanceoladas y alesnadas, terminadas en punta rígida, derechas, y quatro de ellas mas largas é iguales.

COR. *compuesta* tubulosa; con quatro ó cinco corolillas hermafroditas, iguales y dispuestas en un cerco sencillo.

Propia: de un petalo, ligulada; con el *borde* angosto, y partido en cinco lacinias casi iguales.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica y tubulosa.

PIST. *Germen* aovado y coronado: *estilo* filiforme, de la longitud de los estambres: con dos *estigmas* delgados y extendidos.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. comprimidas; con el *vilano* setáceo.

RECEPT. desnudo.

ESPECIES.

Scaber I. ELEPHANTOPUS fo- \times Elephantopo ó pie de Ele-
liis oblongis scabris. Hort. \times fante con hojas oblongas y
cliff. 390. Gron. virg. 176. \times ásperas.

Ele-

Elephantopus erectus, foliis oblongo-ovatis rugosis serratis, floralibus cordiformibus ternatis, capitulis remotis, terminalibus. Brown. jam. 312. Elephantopo derecho, con hojas entre oblongas y aovadas, rugosas y aserradas, las florales de hechura de corazón, y de tres en tres; cabezuelas apartadas y terminales.

Elephantopus Conyzaefolius. Dill. elth. 126. t. 106. f. 126. Vaill. act. 1719. Elephantopo con hoja como la de la Conyza.

Bidens frutescens, foliis oblongis, utrinque acuminate, venosis & lanuginosis. Breyn. ic. 32. t. 34. Bidente fruticoso, de hojas oblongas, aguzadas en ambas partes, con venas y lanuginosas.

Echinophora Indicae affinis, semine & floribus in capitulis levibus, in caulium cymis. Pluk. alm. 132. t. 388. f. 6. Planta parecida á la Echinophora de Indias, con la semilla y flores en cabezuelas lisas y colocadas en las cimas de los tallos.

Anaschovadi. Rheed. mal. 10. p. 13. t. 7. Burm. ind. 185. Anaschovadi.

Cast. Elephantopo áspero.
Habita en las Indias. 2

To- 2. ELEPHANTOPUS foliis ovatis tomentosis. Gron. mento- virg. 115. Mill. dict. n. 2. sus. Elephantopo con hojas aovadas y tomentosas.

Elephantopus erectus hirsutus, foliis inferioribus ovatis, utrinque productis, floribus oblongis, capitulis alaribus. Brown. jam 311. Elephantopo levantado, con pelo áspero; hojas inferiores aovadas, alargadas en ambos extremos; flores oblongas; y cabezuelas axilares.

Cast. Elephantopo tomentoso.
Habita en America.

Es muy parecida esta especie á la precedente.

1188. Género OEDERA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *comun* de muchas flores, mayor que ellas; y con muchas *hojuelas* desparriamadas, lanceoladas; las inferiores mas grandes, y que contienen muchos calicitos parciales.

Parcial: de muchas *hojuelas* pajosas, lanceoladas, é igual á los flosculos.

COR. *comun* radiada, con muchas flores parciales.

Parciales: radiadas y puestas tambien en el disco.

Propia del disco: hermafrodita, en forma de embudo, héndida en cinco partes y derecha.

Del radio: femenina, ligulada, lanceolada, y de la longitud del caliz comun.

ESTAMB. en las hermafroditas: *filamentos* cinco, y cortísimos: con la *antera* cilíndrica.

PIST. en las hermafroditas: *germen* oblongo: *estilo* filiforme: con dos *estigmas* filiformes y obtusos.

En las femeninas: *germen* oblongo: *estilo* filiforme: con dos *estigmas* filiformes y mas largos.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditas: oblongas y coronadas con muchas pajas, agudas y cortas.

En las femeninas: oblongas, y coronadas con muchas pajas.

RECEPT. *comun*: pajoso.

Parcial: con pajas lineares, y que se caen facilmente.

E S P E C I E S.

Pro-
lifera. 1. OEDERA *foliis lanceo-* Oedera con hojas lanceo-
ceolatis oppositis ciliatis, ladas, opuestas, pestañosas,
utrinque glabris. Suppl. p. y lampiñas en una y otra
391. parte.

700 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID EN CIL.

Buphthalmum (Capense) *Buphthalmo* (del Cabo de
foliis oppositis lanceolato-linearibus recurvis denticulato-ciliatis, *calycibus* y lineares, encorvadas ácia
acute foliosis, *caule sufruticoso*. Spec. pl. ed. 3. p. 1274. Amœn. acad. 6. afr. 15. Berg. cap. 297.

Cast. *Oedera* prolifera.

Habita en lugares arenosos del Cabo de Buena-esperanza. *h*

Alic-na. 2. *OEDERA foliis linearibus subtus tomentosis*, y por debaxo tomentosas.
 Suppl. p. 390.

Cast. *Oedera* aliena.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Bladh. h*

Es planta con traza como la de la *Stihelina*, ó del *Gnaphalio*; y sus flores son como las de la *Calendula*; la qual no pudo *Linneo* determinar bien, por estar la flor mal conservada. Echa el tallo sufruticoso, algo ramoso y con tomento blanco: las hojas alternas, lineares, como las del *Romero*, con tomento blanco por debaxo, y uno ú otro diente agudo en la margen: las flores terminales, solitarias, sentadas, amarillas y de la magnitud de las de la *Calendula*: el radio con las corolillas liguladas, de tres dientes, rayadas y hermafroditas: las anteras unidas en cilindro y amarillas: el estilo de color de azafran y que sale afuera; con dos estigmas: las semillas lanudas, blancas y coronadas con muchas cerdas amarillas.

1189. Género SPHÆRANTHUS. * Vaill. A. G.

1719. t. 20. f. 12.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun globoso y apiñado; con escamas puntiagu-
das, persistentes, y que visten por todas partes al
receptaculo universal.

Periantio parcial con muchas flores, solitario, colo-
cado dentro de cada escama del caliz comun, y que
consta de cinco hojuelas lineares, iguales y dere-
chas.

COR. comun con pocas corolillas (tres) hermafroditicas,
en el disco; y las mas veces cinco femeninas, en el
ambito.

Propia: de la hermafroditica: de un petalo, en forma de
embudo; con el borde hendido en cinco partes y ex-
tendido.

De la femenina: alesnada, tubulosa, hendida en tres
partes por su boca, muy pequeña y cerrada.

ESTAMB. en las hermafroditicas: filamentos cinco, capilares
y cortisimos: con la antera cilindrica, tubulosa y mas
larga que la corola.

PIST. en las hermafroditicas: germen marchito: estilo mas
largo y mas grueso: con el estigma muy sencillo.

En las femeninas: germen oblongo: estilo setáceo, y
de la longitud de los estambres: con el estigma divi-
dido en dos partes.

PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. en las hermafroditicas, ninguna.

En las femeninas: oblongas y desnudas.

RECEPT. comun escamoso: y el parcial desnudo.

ESPECIES.

In-
dicus.

1. SPHÆRANTHUS fo-
liis decurrentibus lanceola-
tis serratis, pedunculis
crispatis. Fl. zeyl. 312. Roy.
lugdb. 145.

Espheranto con hojas es-
curridas, lanceoladas, aser-
radas; y pedunculos crespados.
X

Sphæ-

702 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Sphaeranthus purpurea, *Espheranto* con la flor
alata, *serrata*. Burm. zeyl. purpúrea; tallo alado; y ho-
220. t. 94. f. 3. jas aserradas.

Scabiosa Indica, *major*, Escabiosa de Indias, ma-
caule & *pediculis foliosis*. yor, con el tallo y pieceti-
Pluk. phyt. t. 312. f. 6. tos foliosos.

Adaca-manien. Rheed. Adaca-manien.
mal. 10. p. 85. t. 43. Rai.
Suppl. p. 241.

Cast. Espheranto de Indias.

Habita en la India. 2

Produce los tallos por abaxo y por arriba ramosos y lisos:
las hojas alternas, lanceoladas, desnudas, aserradas,
sin peciolo, totalmente escurridas, y con olor como el
del aceyte de *Espliego*: las flores solitarias, terminales,
casi globosas, de color cerúleo, y con el estilo que sale
afuera: el *pedunculo* unico en cada rama y opuesto á
las hojas.

Afri-
canus.

2. SPHÆRANTHUS fo-
liis decurrentibus ovatis Espheranto con hojas es-
serratis, *pedunculis tereti-* curridas, aovadas, aserra-
bus. Burm. ind. t. 60. f. 2. das; y pedunculos rollizos.

Senecio minor, *alato cau-* Senecio menor, de Ma-
le, *Maderaspatana*. Pluk. draspatan, con el tallo ala-
alm. 335. t. 108. f. 7. Rai. do.
Suppl. p. 235.

Cast. Espheranto Africano.

Habita en Africa, y Asia. ○

Se diferencia de la precedente por los *pedunculos* rollizos
y sin alas escurridas.

Chi-
nensis.

3. SPHÆRANTHUS fo-
liis sessilibus pinnatifidis. Espheranto con hojas sin
peciolo y hendidas al través.

Cast. Espheranto de la China.

Habita en la India.

Es planta mucho mas pepueña que el *Espheranto de In-*
dias. Tiene las hojas entre pinnadas y sinuosas: y los
pedunculos con alas escurridas y rizadas como en el
Espheranto de Indias.

Gé-

1190. Género ECHINOPS. * Echinopus Tourn. t. 262.

Vaill. A. G. 1718. f. 4. 5. 15.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun de muchas *hojuelas* ó *escamas* alesnadas , enteramente redobladas y que contienen muchas flores (1).

Periantio parcial : con una flor , oblongo , angulado y apifinado , con *hojuelas* alesnadas , laxas por arriba , derechas y persistentes.

COR. de un *petalo* , del largo del caliz y tubulosa : con el borde hendido en cinco partes , entre redoblado y extendido.

ESTAMB. Filamentos cinco , capilares y cortísimos : con la antera cilíndrica , tubulosa y de cinco dientes.

PIST. Germen oblongo : *estilo* filiforme , y de la longitud de la corola : con el *estigma* duplicado , algo deprimido y revuelto.

PERIC. ninguno : el *caliz* mas crecido y sin mudarse hace sus veces.

SEM. entre aovada y oblonga , mas angosta por su base y obtusa en el remate ; con el *vilano* desfigurado.

RCCEPT. comun globoso y setáceo.

62-

(1) En la página 19 diximos que el *caliz* falta en el *Echinope* , para prueba de que la *esencia de la flor flosculosa* no puede consistir en el caliz.

El *Carácter esencial* así clasico , como generico debe ser comun á todas las especies , sin exceptuar alguna : y como en el género *Echinope* se halla sin *caliz comun* la especie que llamamos *estrigosa* ; por consiguiente el *Carácter esencial* de la clase y de la flor flosculosa no se puede fundar en el caliz.

El *Carácter generico natural* se deduce de la semejanza que las especies tienen entre sí en las partes de la fructificacion : y como el mayor número de las de este género gozan de *caliz comun* , y son semejantes en esta parte , no debe éste excluirse del *Carácter generico natural*.

La falta del *caliz comun* en el *Echinope estrigoso* es una nota disenciente que no puede entrar en la constitucion del género , ni menos ofrecer e *Carácter clasico esencial*.

CARACT. GENRR. DE TOURNEF.

ECHINOPUS. p. 463.

La flor es globosa, y flosculosa ó que consta de muchos flosculos, hendidos en muchas partes, sentados en el embrión; pero cada flosculo tiene su caliz escamoso fixado en el receptaculo: y el embrión pasa á semilla recogida en un involucre que antes fue caliz de la flor.

ESPECIES.

Sphæ-
roce-
phalus

1. ECHINOPS *capitulis* X Echinope con cabezuelas
globosis, foliis pubescenti- X globosas; y hojas vellosas.
bus. Scop. carn. ed. 2. n. X
933. Lepech. it. 1. p. 79. X

Echinops caliculis uniflo- X Echinope con calicitos de
ris, caule multifloro, foliis X una flor; tallo de muchas
spinosis supra nudis. Sp. pl. X flores; hojas espinosas y por
1. p. 814. X encima desnudas.

Echinops caule ramoso, X Echinope de tallo ramoso;
foliis semipinnatis, pinnis X hojas medio pinnadas; ho-
dentatis dentibus aristatis. X juelas dentadas y los dientes
Hall. helv. n. 158. X con arista.

Echinops foliis supra vil- X Echinope con hojas vello-
losis hispidis, subtus to- X sas y erizadas por encima,
mentosis, caule multifloro. X tomentosas por debaxo; y
Gou. illustr. p. 74. X tallo de muchas flores.

Echinopus major. Bauh. X Echinope mayor.
hist. 3. p. 69. Tourn. p. 463. X

Carduus sphaerocephalus X Cardo vulgar, con cabe-
latifolius, vulgaris. C. B. X zuela redonda; y hoja an-
P. p. 381. X cha.

Carduus sphaerocephalus. X Cardo con cabezuela re-
Dod. pempt. 722. X donda.

Cast. Echinope de cabezuela redonda.

Habita en Italia, Austria y Alemania: en el Ampurdá y plana de Vic de Cataluña y en otras partes de España. 26

Echa el tallo ramoso, de muchas flores y vellosa, con pe-
li-

lillos extendidos: las *hojas* pelosas por encima: y todas las *escamas del caliz* vellosas hasta su ápice.

Spi-
nosus. 2. ECHINOPS *capitulis* X Echínope con las cabezue-
inspersis spinis longis. X las salpicadas por encima de
espinas largas.

Echinops capitulis glo- X Echínope de cabezuelas
bosis, aculeatis, foliis un- X globosas, con agujones; y
dique tomentosis. Turr. fars. X hojas tomentosas por todas
partes.

13. *Carduus sphaerocephalus* X Cardo con la cabezuela
capite longis spinis arma- X redonda, y armada de espi-
to. C. B. P. 382. X nas largas.

Carduus sphaerocephalus, X Cardo con la cabezuela
acutus. Dod. pempt. 722. X redonda y espinas agudas.
bene. X

Cast. Echínope espinoso y agudo.

Habita en Egipto y Arabia. 2 ½

Es planta de la estatura del Echínope de cabeza redonda; pero tiene el tallo y hojas mas tiernos. Produce el tallo (en el invernáculo) sufruticoso y sin pelos glandulosos: las cabezuelas como las del Echínope de cabezuela redonda; pero los flosculos blancos, y mas grandes, con sus lacinias redobladas y ganchosas. Entre los flosculos salen espinas formadas de los calicitos que no se han abierto, quatro veces mas largas que los flosculos, las quales por ultimo se hienden en dos, entre las quales sale un flosculo mucho mas corto que la espina.

Ritro. 3. ECHINOPS *capitulo* X Echínope con la cabezue-
globoso, foliis pinnatifidis X la globosa; hojas hendidas
supra glabris. Mill. dict. n. X al través y por encima lam-
2. ic. t. 130. X piñas.

Echinops foliis supra X Echínope con hojas muy
glaberrimis, subtus tomen- X lampiñas por encima, tomen-
tosis, caule multifloro, co- X tosas por debaxo; tallo de
rymboso. Gou. illustr. 74. X muchas flores y corimboso.

*Echinops caule subuni-
floro, foliis duplicato-pin-
natifidis, foliolis latiuscu-
lis vicinis.* Gmel. sib. 2. p.
100. Echînope con el tallo casi
de una flor; hojas dos veces
hendidadas al través, con sus
hojuelas algo anchas y acer-
cadas.

*Carduus sphærocephalus,
cæruleus, minor.* C. B. P.
381. Cardo con la cabezuela
redonda, menor y de flor ce-
rúlea.

Ritro floribus cæruleis. Ritro con flores cerúleas.
Lob. ic. 2. p. 8.

*Crocodilium Monspeliën-
sium.* Dalech. hist. 1476. Cocodrilo de los de Mom-
peller.

*Echinops caule subuni-
floro, foliis duplicato-pin-
natifidis, foliolis linearibus
remotis.* Gmel. sib. 2. p. 102. Echînope con el tallo casi
de una flor; hojas dos veces
hendidadas al través, con las
hojuelas lineares y aparta-
das. α

Echinopus minor. Bauh. Echînope menor.
hist. 3. p. 72. Tourn. p. 463. x

Cast. Echînope ritro.

Habita en los collados aridos de Siberia, Francia é Ita-
lia: en Aragon, Cataluña y otras partes de España. 4
Tiene el tallo blanco y tomentoso: las hojas lampiñas por
encima, y con tomento blanco por debaxo: y las esca-
mas del caliz pestañosas hasta su ápice.

Stri- 4. ECHINOPS *capitulis* x Echînope con cabezuelas
gosus. *fasciculatis, calycibus la-* en hacecillo; cálices late-
teralibus sterilibus, foliis rales esteriles; y hojas por
supra strigosis. Loefl. it. encima con aguijoncitos del-
159. gados.

Carduus tomentosus, ca- Cardo tomentoso, con la
pitulo majore, vel minore. cabezuela mas grande, ó mas
C. B. P. 382. pequeña.

Scabiosa Carduifolia, an- Escabiosa annua, con ho-
nua. Herm. par. 224. t. 224. ja como la del Cardo.

Spina alba. Lob. ic. 2. Espina blanca.
p. 9.

Echinopus tenuifolius, X Echínope con flores de co-
violaceus. Tourn. p. 463. X lor violado; y hoja delgada.
 Barr. 1028.

Carduus sphærocephalus, X Cardo con cabezuela re-
tenuifolius, *violaceus*. Barr. X donda; flores de color viola-
 ic. 144. X do; y hoja delgada.

Cast. Echínope estrigoso ó con aguijoncitos delgados.

Habita en Soto-luzon y en varias partes del circuito de Madrid: en Cataluña y otros parages de España. ☉

Tiene las *hojas* hendidas al través, y algo anchas, con sus lacinias lanceoladas, terminadas en una espina muy pequeña, inermes por sus lados, con pelos y puntitas rígidas por encima, y tomentosas por debaxo: los *calicitos* con sus escamas aquilladas, lisos por encima, pestañosos en su base, amontonados en hacecillo, y no en cabezuela globosa: los *calicitos laterales* ó *inferiores* mas pequeños y esteriles, ó destituidos de flosculo.

Posee la *raiz* sencilla, descendente, filiforme y annua: el *tallo* derecho, sencillo, con tomento apretado, tenaz y delgado: las *hojas radicales* pinnadas, y sus *hojuelas* opuestas, con dientes espinosos: las *inferiores* y las *del medio* hendidas al través, y sus lacinias lanceoladas, enteras, agudas y espinosas en su ápice, con pelos rígidos, y deprimidos por encima y del todo tomentosas por debaxo: las *de mas arriba* lanceoladas, con dientes armados con espinitas: las *flores* amontonadas en cabezuela casi redonda, solitaria y algo laxâ: el *caliz comun* ninguno, sino unos pelos redoblados en la sumidad del tallo: el *receptaculo* globoso con pelos: las *flores laterales* ó *inferiores* mas pequeñas y esteriles. *Loefl. loco citato.*

1191. Género GUNDELIA. † Tourn. t. 486. Hacub

Vaill. A. G. f. 16.

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun apenas alguno, á excepcion de las hojas que cifien el receptaculo compuesto.

COR. compuesta tubulosa y uniforme; con cinco corolillas hermafroditas é iguales.

TOM. VI.

Yy

Pro-

708 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Propia; de un petalo, y á manera de maza; con el *borde* de ventricosos, hendido en cinco partes y derecho.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares y cortísimos: con la *antera* cilíndrica, tubulosa y larga.

PIST. *Germen* aovado, metido dentro del receptáculo, baxo de la flor y coronado con escamitas muy pequeñas: *estilo* filiforme, mas largo que la corola: y con dos *estigmas* revueltos.

PERIC. ninguno: las *semillas* se esconden metidas del todo dentro del receptáculo.

SEM. casi redondas, puntiagudas, coronadas con un ribete desfigurado; y las *laterales* que abortan ó no cuajan.

RECEPT. *comun* cónico, cubierto por todas partes con los receptáculos parciales, divididos por medio de pajas con tres puntas.

El *parcial* cónico y obtuso, quadrangular y truncado; con cinco *hoitos*, de los cuales uno se halla en el centro, y los restantes en el ambito excavados para la insercion de los cinco flosculos.

CARACT. GENER. DE TOURN. Cor. p. 51.

La flor es amontonada en cabezuela, flosculosa ó que consta de muchos flosculos, que salen de un caliz comun y sentados en frutos muy tiernos; los cuales se recogen en las celdillas del caliz, y pasan á simientes entre redondas y puntiagudas.

ESPECIE.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| Tour-
nefor -
tii. | I. GUNDELIA. Gron. | X | Gundelia. |
| | orient. 251. Mill. ic. t. 287. | X | |
| | Gundelia Orientalis, | X | Gundelia Oriental, de |
| | Acanthi aculeati folio, ca- | X | hoja como la del Acantho |
| | pite glabro. Tourn. cor. 51. | X | con agujones; y cabezuela |
| | it. 2. p. 108. t. 108. | X | lampiña. |
| | Schybum Dioscoridis, seu | X | Schybo de Dioscorides, |
| | Hacub Alcardeg Serapio- | X | ó Hacub Alcardeg de Sera- |
| | nis. Rauw. it. 74. t. 74. | X | pio. |

Gun-

FLOSC. SEGREG. Ó QUE TIEN. CAL. PROP. 709

α *Gundelia Orientalis*, X *Gundelia Orientalis*, de ho-
Acanthi aculeari folio, flo- X ja como la del Acantho con
ribus intense purpureis, ca- X aguijones; flores de color
pite araneosa lanugine ob- X purpúreo intenso; y cabe-
sito. Tourn. cor. 51. X zuela cercada de pelusa co-
X mo tela de araña. α

Cast. *Gundelia* de Tournefort.

Habita en America, en Siria y Alepo. 2f

Dedicó Tournefort este género á *Andres Gundelio*, quien le acompañó y ayudó en la peregrinacion y herborizaciones que hizo á Oriente.

1192. Género STÖBE. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. comun casi redondo y apifinado; con *escamas* alesnadas, y que cubren por todas partes al receptaculo universal.

Periantio parcial: con una flor, solitario, colocado dentro de cada una de las escamas del caliz comun, y que consta de cinco *hojuelas* lineares, agudas, iguales y derechas.

COR. Propia de un petalo, en forma de embudo; con el *borde* hendido en cinco partes y extendidos.

ESTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortos: con la *antera* cilindrica y de cinco dientes.

PIST. Germen oblongo: *estilo* filiforme y de la longitud de los estambres: con el *estigma* agudo y hendido en dos partes.

PERIC. ninguno: el caliz sin mudarse hace sus veces.

SEM. oblongas: con el *vilano* plumoso y largo.

RECEPT. propio desnudo.

E S P E C I E S.

Æthyopica.

1. STÖBE *foliis recur-* X Estebe con hojas entre en-
vato-uncinatis nudis. Hort. X corvadas ácia atrás y gan-
eliff. 390. X chosas, y desnudas.

710 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Conyza Africana, frutescens, foliis *Ericæ*, hamatis & incanis. Tourn.p.455. *Conyza Africana*, frutescente, con hojas como las del Brezo, ganchosas y blanquecinas.

Helichrysoides Juniperi creberrimis aduncis foliis, floribus in ramulorum cymis. Vaill. act. 1719.p.393. Planta como el *Helichryso*, con hojas como las del Enebro, muy espesas y ganchosas; y flores colocadas en las cimas de las ramitas.

Cast. Estebe de Etiopia.

Habita en Etiopia. \bar{h}

Posee las hojas aleanadas, envueltas, arqueadas ácia atrás, rígidas, que punzan como las del Enebro, y lisas menos en la base.

Eri- 2. STÖBE foliis recur- Estebe con hojas encorva-
coides. vatis incanis, corollis bi- das ácia atrás y blanqueci-
floris difformibus. Berg.cap. nas; corolas de dos flores,
339. y disformes.

Eupatorium Ericoides, Capitatis Bonæ spei. Breyn. cent. Eupatorio como Brezo,
140. t. 9. Moris. hist. 3. p.97. del Cabo de Buena-esperanza.
sect. 7. t. 8. f. 10.

Cast. Estebe como Brezo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \bar{h}

Es arbustito torcido. Echa las hojas amontonadas, lineares, blanquecinas, encorvadas ácia atrás y agudas: las flores terminales y sentadas: el caliz comun apañado, algo desparramado y con muchas flores: los cálices parciales apañados, (diez) cilindricos y con dos flores; la una tubulosa hermafrodita; y la otra ligulada y neutra: la corola hemisferica: el estilo con dos estigmas: el vilano sin estipite y plumoso: y el receptaculo tomentoso.

Pros- 3. STÖBE foliis resupi- Estebe de hojas con la su-
trata. natis hinc tomentosis, cau- perficie superior vuelta ácia
libus prostratis. abaxo, y la inferior ácia ar-
riba, tomentosas por una de
ellas; y tallos postrados.

Cast. Estebe postrada.

Ha-

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h

Arroja los tallos filiformes, algo leñosos, ramosos por arriba, tendidos, cenicientos en su extremo, y de la magnitud de los del *Sérpol*: las hojas alternas, sentadas, elípticas, muy agudas, de la magnitud de las de la *Herniaria*, con tomento blanco por encima, desnudas por debaxo, encorvadas ácia atrás, y resupinadas de suerte, que la superficie tomentosa se vuelve á la parte inferior ó ácia abaxo: las cabezuelas sencillas, terminales, sentadas y de la magnitud de un guisante.

Gnaphaloides.

4. *STOEBE foliis imbricatis appressis.* Syst. veg. y Estebe con hojas apinadas y apretadas.

664.

Seriphium (corymbiferum) floribus fasciculatis. Seriphio (*corymboso*) con flores en hacecillo.

Mant. 1. p. 119.

Gnaphalium (niveum) fruticosum, foliis filiformibus tomentosis subimbricatis, caule ramosissimo. Spec. Gnaphalio (*de color de nieve*) fruticoso, con hojas filiformes, tomentosas, algo apinadas; y tallo muy ramoso.

Gnaphalium incanum, folio lineari, caule accumbente. Burm. afr. 215. t. 77.f.1. Gnaphalio blanquecino, con hoja linear; y tallo tendido.

Elichrysum Æthiopicum, tenuissimis Stœchadis citrine foliis confertis, ramissimum, comis argenteis. Pluk. mant. 67. Rai. Suppl. p. 171. Elichryso de Etiopia, muy ramoso, con hojas como las de la Estechâde cetrina; y penachos de color de plata.

Cast. Estebe como Gnaphalio.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h

Produce los tallos fruticosos, proliferos, en varitas, y del largo de pie y medio; con las ramas filiformes y cubiertas con hojas apretadas: las hojas entre aovadas y lanceoladas, sin peciolo, pestañosas, desnudas por defuera, tomentosas por dentro, derechas y apretadas estrechamente á las ramas: las cabezuelas terminales, hemisféricas, blancas y compuestas de muchos cálices amontonados.

712 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

nados: las *flores* sentadas y en hacecillo: los *cálices* apañados, lampiños, blancos, con escamas entre lanceoladas y alesnadas, y sin radio: una sola *corolilla* blanca: los *estambres* tambien blancos: y la *semilla* coronada con seis cerdas plumosas. Su *traza* es como la del *Xeranthemo* del Cabo de Buena esperanza. Mant.

I. p. 119.

El *caliz comun* casi de cinco hojuelas, con muchas flores en forma de campana, ó en globo. *Syst. Veg.* 664.

Gom-
phre-
noides

5. STOEBE *foliis lanceo-* X Estebe con hojas lanceo-
latis imbricatis appresis, X ladas, apañadas y apretadas;
capitulo terminali sessili. X cabezuela terminal y senta-
da.
Suppl. p. 391.

Stoebe gomphrenoides. X Estebe como gomfrena.
Berg. cap. 336.

Cast. Estebe como Gomfrena.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Es muy semejante á la *Estebe como Gnaphalio*; pero se diferencia por las *hojas* inermes y sin puntitas; por las *flores* en cabezuela, y no en umbela.

Ambas son singulares; por las *hojas* lanceoladas, apretadas, convexas y lampiñas por defuera, acanaladas, y con tomento blanco por dentro.

Scabra

6. STOEBE *foliis tortis* X Estebe de hojas torcidas,
appresis linearibus extus X apretadas, lineares, ásperas
tuberculato--scabris intus X con tuberculos por defuera,
tomentosis, floribus race- X tomentosas por dentro; y
mosis. Suppl. p. 391. X flores en racimo.

Cast. Estebe áspera.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

La *traza de la yerba* es como la del Brezo.

Refle-
xa.

7. STOEBE *procumbens,* X Estebe tendida, con hojas
foliis linearibus, spicis ova- X lineares; espigas aovadas; y
tis, ramis adscendentibus. X ramas ascendentes.
Suppl. p. 391. X

Cast. Estebe redoblada.

Ha-

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Rhi- 8. STOEBE *foliis trique-* X Estebe con hojas de tres
no ce- *tris appresis, ramulis to-* X caras, apretadas; ramitas
rotis. *mentos cernuis, racemis* X tomentosas, cabizbaxas; y
proliferis. Suppl. p. 391. X racimos proliferos.

Cast. Estebe del Rinoceronte.

Habita en el Cabo de Buena esperanza. Thunb.

Es alimento principal del Rinoceronte; por lo que le pusieron este nombre los habitantes del Cabo de Buena-esperanza.

Dis- 9. STOEBE *foliis fasci-* X Estebe con hojas en hace-
ticha. *culatis recurvis, spicis bi-* X cillo, encorvadas ácia atrás;
fariis. Suppl. p. 391. X y espigas en dos órdenes.

Cast. Estebe distica.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

1193. Género JASIONE.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio comun* de diez hojuelas, con las interiores alternadamente mas angostas, que encierra muchas flores con pedunculos cortísimos; y persistente.

Periantio propio hendido en cinco partes, encima del germen y persistente.

COR. *Propia regular* y de cinco *petalos* lanceolados, derechos, y unidos por su base.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, alessnados y cortos: con cinco *anteras*, oblongas, y unidas por su base.

PIST. *Germen* casi redondo, y debaxo de la flor: *estilo* filiforme y de la longitud de la corola: con el *estigma* hendido en dos partes.

PERIC. *Capsula* casi redonda, de cinco ángulos, coronada con el caliz propio, y de dos celdillas.

SEM. muchas y casi aovadas.

OBS. *Los flosculos centrales con el estigma indiviso y á manera de maza, las mas veces abortan ó no cuajan.*

E S P E C I E .

Mon-
tana.

1. JASIONE. Fl. dan. t. X

Yasione.

319. Sabb. hort. 1. t. 76.

Jasione foliis lineari-lanceolatis obsolete serratis.
Hort. cliff. 426.

Yasione de hojas entre lineares y lanceoladas, con aserraduras poco manifestas.

Rapunculus foliis linearibus, subasperis, spica planiuscula, petalis liberis.
Hall. helv. n. 678.

Ruyponce con hojas lineares y algo ásperas; espiga algo plana; y petalos sueltos.

Rapunculus Scabiosæ capitulo, cæruleo. C. B. P. 92.
Tourn. p. 113.

Ruyponce con la cabezuela como la de la Escabiosa y cerúlea.

Rapuntium montanum, capitatum, leptophyllum. Col. ecphr. 1. p. 226. t. 227.

Ruyponce montano, con flores en cabezuela; y hojas delgadas.

Aphyllanthes. Delech. hist. 804.

Aphyllanthes.

Cast. Yasione montana.

Habita en collados muy secos de Europa: en los circuitos de Madrid, en Castilla la vieja, Alcarria, Aragon, Cataluña y en otras partes de España. ☉Tiene el tallo del largo de un pie, y vellosos: las *hojas* las mas veces pestafiosas; y el *pedunculo* desnudo y larguísimo.α *Jasione (perennis) radi-
ce perenni.* Suppl. 392.

Yasione con la raiz perenne. α

Cast. Yasione perenne.

Habita:::: Mr. Thovin comunicó á Linneo las semillas de esta variedad.*Echa* la raiz perenne: el tallo como el de la *Yasione montana annua*, pero mas alto: las *cabezuelas de las flores* mas grandes: y varia con las *hojas* muy lampiñas y con mucho pelo áspero, en una misma planta; y tambien con las *hojas* enteras y aserradas.

1194. Género JUNGIA. *Suppl. p. 58.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio comun* de muchas hojuelas , algo extendidas , lineares , obtusas , acanaladas , mas cortas que las del *Periantio parcial* ; y que envuelven tres ó quatro flores.

Periantio parcial con muchas flores , de muchas hojuelas casi iguales , oblongas , acanaladas , obtusas y derechas.

COR. *compuesta* uniforme é igual ; con las *corolillas* hermafroditas , de un petalo , en forma de embudo : el *tubo* gradualmente ensanchado ; el *borde* de dos labios ; con la *lacinia exterior* revuelta , mas larga , linear y dentada por su ápice ; la *interior* dividida en otras dos lacinias derechas y agudas.

ESTAMB. *Filamentos* cinco , cortísimos , é insertos en el tubo : con las *anteras* unidas.

PIST. *Germen* debaxo de la flor , linear y angulado : *estilo* filiforme : con dos *estigmas* revueltos y obtusos.

PERIC. ninguno : el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. anguladas : con el *vilano* largo , sin estipite y plumoso.

RECEPT. con *pajas* semejantes á las hojuelas del caliz.

ESPECIE.

Ferruginea.

1. JUNGIA. *Suppl. p. 390.* Jungia.

Cast. Jungia de color amarillo-ferrugineo.

Habita en la America meridional.

Arroja los *tallos* leñosos , con tomento amarillo-ferrugineo : las *hojas* alternas , con peciolo , remotas , planas , redondeadas , de figura de corazon por su base , con pelo áspero , y blanquecino por debaxo , hendidas en cinco lobulos redondeados y obtusos : la *panoja* terminal , grande y decompuesta ; con las *cabezuelas* de las flores pequeñas y amontonadas.

OR-

ORDEN VI.

MONOGAMIA. DE LAS FLORES SENCILLAS QUE TIENEN SUS
ANTERAS UNIDAS EN FIGURA
DE CILINDRO.

1195. Género SERIPHIMUM. † Helichrysoides

Vaill. act. A. P. 1719.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio exterior* de cinco hojuelas, casi redondas, apiñadas y tomentosas: el *interior* de cinco hojuelas derechas, puntiagudas, alesnadas, muy lampiñas, escariosas, al doble mas largas y con una flor.

COR. de un *petalo*, en forma de embudo, y mas corta que el caliz interior; con el *borde* de cinco dientes.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, capilares: con la *antera* cilindrica.

PIST. *Germen* debaxo de la corolilla y encima del caliz: *estilo* filiforme: con el *estigma* casi hendido en dos partes.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado hace sus veces.

SEM. oblonga.

ESPECIES.

Cine-
um.

I. SERIPHIMUM floribus Seriphio de flores entre
verticillato-spicatis uniflo- verticiladas y en espiga, con
ris, foliis patentibus. Berg. una florecita; y hojas exten-
cap. 340. didas.

Artemisia floribus sim- Artemisia con flores sen-
plicibus. Hort. cliff. 403. cillas.

Tamariscus Æthiopicus, Taray de Etiopia, con ho-
Coridis folio glabro, Herbæ ja como la del Coris, lampi-
impiæ capitulis, in spicam ña; cabezuelas como las
sessilibus. Pluk. mant. 178. de la Yerba impia y sentadas
t. 297. f. 1. en espiga.

SENCIL. CON LAS ANTER. UNID. EN CIL. 717

Abrotanoides Africanum, X Planta como Abrotano,
foliis minimis, *argenteis*, X de Africa, con hojas muy
reflexis, *floribus in summis* X pequeñas, de color de plata
caulibus & *ramulis in spi-* X y redobladas; flores en las
cas oblongas. Rai. Suppl. p. X sumidades de los tallos y
 233. X ramitas, dispuestas en espi-
 X gas oblongas.

Cast. Seriphio ceniciento.

Habita en Etiopia. \bar{h}

Echa las *hojas* lanceoladas, pequeñas, amontonadas, en-
 corvadas ácia atrás, gibosas por su base y canas: las
espigas como cola de zorro, de color melado, é inter-
 rumpidas: las *ramas* verticiladas: y las *escamas del*
caliz casi setáceas.

P'umo-
sum.

2. SERIPHIMUM *floribus* X Seriphio con flores espi-
spicatis sexfloris, *foliis gra-* X gadas, de seis flosculos, con
mulato-ovatis. X hojas aovadas y con gra-
 X nitos.

Stæbe floribus spicatis, X Estebe de flores espiga-
calycibus unifloris. Roy. X das, y cálices con un flos-
 lugdb. 145. X culo.

Breynia Capensis, *capit-* X Breynia del Cabo de Bue-
ulis albis, *plumosis*. Pet. X na-esperanza, con cabezue-
 gaz. 9. t. 5. f. 4. X las blancas y plumosas.

Abrotanoides Africanum, X Planta como Abrotano,
foliis cinereis, *muscosis*, *ca-* X de Africa, con hojas cení-
pitulis florum globosis, X cientas, musgosas; cabezuelas
magnis. Rai. Suppl. p. 233. X de las flores globosas y gran-
 X des.

Cast. Seriphio plumoso.

Habita en Etiopia. \bar{h}

Tiene las *flores* casi con cinco flosculos, laterales, sentadas
 y apinadas: las *hojas* filiformes, y con granitos.

Fus-
cum.

3. SERIPHIMUM *floribus* X Seriphio de flores en ca-
capitatis unifloris, *foliis* X bezuela, con un flosculo; y
imbricatis. X hojas apinadas.

Stæbe Ericoides. Berg. X Estebe como Brezo.
 cap. 339. X

Eu-

718 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Eupatorium Ericoides, Eupatorio como Brezo,
Capitis Bonæ spei. Breyn. del Cabo de Buena-esperan-
 cent. t. 69. Moris. hist. 3. p. za.
 97. sect. 7. t. 18. f. 10.

Abrotanoides Capensis, Planta como Abrotano,
Ericæ folio. Pet. gaz. 9. t. 5. del Cabo de Buena-esperan-
 f. 2. za, con hoja como la del
 Brezo.

Cast. Seriphio pardo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Posee las flores con un flosculo, terminales, sentadas y
 en hacecillo: los tallos torcidos, ramosos y ondeados;
 y las hojas cenicientas y mochas.

Gna-
 phaloi-
 des.

4. SERIPHIMUM *floribus* Seriphio de flores espiga-
spicatis subtrifloris, caule das, casi con tres flosculos;
erecto. y tallo derecho.

Seriphium floribus spica- Seriphio de flores espiga-
tis, unifloris. Amœn. acad. das, y con un flosculo.

4. p. 392.

Stœbe capitata. Berg. Estebe con flores en cabe-
 cap. 338. zuela.

Abrotanoides Africanum, Planta como Abrotano, de
foliis argenteis, minoribus Africa, con hojas de color
& brevissimis, floribus in de plata, mas pequeñas y cor-
spicas breves congestis. tísimas; y flores amontona-
 Rai. Suppl. p. 233. das en espigas cortas.

Cast. Seriphio como Gnaphalio.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Tiene las flores con dos ó tres flosculos y en espiga: el tallo
 y ramas derechos: las hojas cenicientas y terminadas
 en punta rígida.

Ambi-
 guum.

5. SERIPHIMUM *floribus* Seriphio de flores en espi-
spicatis trifloris, foliis li- ga, con tres flosculos; hojas
nearibus, caule procumben- lineares; y tallo tendido.
 te. Syst. veg. 665.

Gnaphalium Seriphoides. Gnaphalio como Seriphio.
 Berg. cap. 267.

Artemisia (ambigua) fo-
liis linearibus indivisis ace-
rosis, spicis terminalibus,
calycum foliolis intimis co-
loratis, caule fruticoso. Sp.
 pl. ed. 3. p. 1190.

Artemisa (ambigua) con
 hojas lineares y rígidas, é
 indivisas; espigas termina-
 les; hojuelas intimas de los
 cálices de color; y tallo
 fruticoso.

Frutex Africanus, aro-
maticus, flore spicato, exi-
guo. Comm. hort. 2. p. 217.
 t. 59?

Arbusto de Africa, aro-
 matico, con la flor espigada
 y pequeña.

Cast. Seriphio ambiguo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. $\frac{f}{h}$

Es *arbusto* tendido y ceniciento. Echa las *hojas* sencillas lineares y amontonadas: las *espigas* largas, y que terminan á las ramas: las *flores* casi redondas: los *cálices* cenicientos: pero el *orden interior de las escamas* escarioso ó membranoso y de color blanco como en los *Gnaphalios*; con quatro, ó cinco *radios* que están al circuito de las florecitas, capilares, del largo de ellas y plumosas por su ápice; con las *semillas* desnudas.

1196. Género STRUMPFIA. Jacq. amer. 218.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, con cinco dientes, encima del germen, muy pequeño y persistente.

COR. *Petalos* cinco, oblongos, obtusos y extendidos.

ESTAMB. *Filamentos* ninguno: *anteras* cinco y unidas en un cuerpo aovado.

PIST. *Germen* debaxo del caliz y casi redondo: *estilo* alesnado, derecho, y casi mas largo que los estambres: con el *estigma* sencillo y obtuso.

PERIC. *Baya* coronada con el caliz, casi redonda, y de una celdilla.

SEM. una sola, y casi redonda.

ESPECIE.

Mari-
tima.

1. STRUMPFIA. Jacq. $\frac{x}{x}$ Estrumfia.
 amer. 218.

Thy.

720 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID EN CIL.

Thymela humilior, foliis \times Thymelea mas baxa, con
acutis atrovirentibus. Sloan. \times hojas agudas y de color en-
 jam. 168. hist. 2. p. 93. t. \times tre negro y verde.
 189. f. 1. 2. Rai. dendr. 55. \times

Thymela frutescens, Ros- \times Thymelea frutescente, con
marini folio, flore albo. \times hoja como la del Romero; y
 Plum. spec. 17. t. 251. f. 1. \times flor blanca.

Cast. Estrumfia maritima.

Habita en la America. \mathcal{H}

1197. Género CORYMBIUM. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* con una flor, baxo del germen, largo, pris-
 matico, de seis ángulos; y de dos *hojuelas* derechas,
 arrimadas longitudinalmente entre sí, con tres ángu-
 los en el dorso, truncadas, con tres dientes desfigu-
 rados, persistentes; y otras dos *hojuelas* muy peque-
 ñas en la base.

COR. de un *petalo*, é igual; con el *tubo* cortísimo; *borde*
 extendido y partido en cinco lacinias lanceoladas.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, sencillos, derechos y sentados
 en el tubo: con las *anteras* oblongas, derechas, mas
 cortas que la corola y unidas en cilindro.

PIST. *Germen* dentro del caliz, debaxo de la corolilla, con
 pelo áspero: *estilo* sencillo, derecho y de la longitud
 de la corola: con el *estigma* oblongo, dividido en
 dos partes y extendido.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. una sola, oblonga, casi de la longitud del caliz, y
 cubierta de lana á manera de vilano.

RECEPT. desnudo.

OBS. El caliz varia en la figura. R.

ESPECIES.

Sca-
brum.

1. CORYMBIUM foliis

lanceolatis et analiculatis nervosis recurvatis glabris, caule brevioribus. Suppl. p. 392.

Corymbium scabrum. Syst. veg. ed. 13. p. 665.

Corymbium caule scabro. Syst. pl. p. 952.

Corymbium Africanum. Sp. pl. 3. p. 1317. Hort. cliff. 494.

Corymbium foliis ad radicem longissimis lyratis. Burm. afr. 189. t. 70. f. 1.

Bupleuri folia, semine paposo, Valerianoides umbellata, cauliculo scabro. Pluk. alm. 73. t. 272. f. 5.

Corimbio con hojas lanceoladas, acanaladas, nerviosas, encorvadas ácia atrás, lampiñas y mas cortas que el tallo.

Corimbio áspero.

Corimbio con el tallo áspero.

Corimbio Africano.

Corimbio con las hojas en la raíz larguissimas y en forma de lira.

Planta con hoja de Bupleuro; semilla con vilano, como la Valeriana umbellada; y con tallito áspero.

Cast. Corimbio áspero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Acaso es variedad del *Corimbo filiforme*.

Tiene un *bulbo* casi globoso, y que sale de las raíces marchitas que han producido las hojas: el *tallo* de color que tira á purpúreo y áspero: las *hojas* radicales, filiformes, como juncos ó setáceas, no anchitas ni acanaladas: el *corimbo* apretado y rígido: las *flores* mellizas y acercadas; con quatro ó cinco *bracteas* lineares: el *caliz* á manera de maza, con escamas ó ventallas en forma de navecilla y que no se abrazan. Roy.

Gla-
brum.

2. CORYMBIUM gla-

berrium, foliis ensiformibus planis nervosis. Suppl. p. 392.

Corymbium caule lævi, axillis lanatis. Syst. veg. p. 665.

Corimbio muy lampiño, con hojas en forma de espada, planas y nerviosas.

Corimbio con el tallo liso, y axilas lanudas.

Bu-

722 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Bupleuro similis, planta \times Planta de Etiopia, seme-
Æthiopica, ad caulium no- \times jante al Bupleuro, y tomen-
 dos tomentosa. Pluk. alm. \times tosa en los nudos de los ta-
 73. t. 272. f. 4. \times llos.

Cast. Corimbio lampiño.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \mathcal{C}

Echa la panoja laxâ y extendida: las flores separadas,
 con dos ó tres bracteas menudas: el caliz cilindrico,
 y con una ventalla que abraza á la otra. Royen.

Fili- 3. CORYMBIUM foliis \times Corimbio con hojas fili-
 forme. filiformibus \times glaberrimis \times formes, muy lampiñas, de-
 erectis, caule brevioribus. \times rechas y mas cortas que el
 Suppl. p. 392. \times tallo.

Cast. Corimbio filiforme.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Villo- 4. CORYMBIUM villo- \times Corimbio con vello lanu-
 sum. so-lanatum, foliis caulinis \times do; hojas del tallo amplexi-
 amplexicaulibus subulatis \times caules, alesnadas, rectas y
 rectis planis. Suppl. p. 392. \times planas.

Cast. Corimbio velloso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

OBS. Las especies de Corimbio constituyen un género tan
 natural, que apenas admiten diferencias, como suele
 suceder en los géneros mas naturales.

1198. Género LOBELIA. * Jacq. amer. 219. Plum.

gen. 31. Dortmanna Rudb. A. V. 1720. Laurentia

Mich. 14. Rapuntium. Tourn. t. 51.

Dill. elth. 242.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, hendido en cinco partes,
 muy pequeño, puesto al rededor del germen, y que
 se marchita; con dientecitos casi iguales; y los dos
 superiores que miran mas ácia arriba.

COR.

COR. de un *petalo* , irregular : *tubo* cilindrico , mas largo que el caliz , y por arriba dividido longitudinalmente : *borde* partido en cinco *lacinias* , lanceoladas , de las cuales las *dos superiores* son mas pequeñas , mas redobladas , mas profundamente divididas , y que constituyen un labio superior : y las *tres inferiores* mas extendidas y mayores.

ESTAMB. *Filamentos* cinco , alessnados y de la longitud del tubo del petalo : con las *anteras* unidas en cilindro oblongo y que se abre por su base en cinco partes.

PIST. *Germen* puntiagudo , debaxo de la flor : *estilo* cilindrico , y de la longitud de los estambres : con el *estigma* obtuso y erizado.

PERIC. *Capsula* aovada , de dos celdillas , que se abre por su ápice , y ceñida con el caliz.

SEM. muchas y muy pequeñas.

OBS. La Lobelia de Plumier se diferencia de las demas especies por el pericarpio que es drupa , y con la nuez de dos celdillas.

La capsula en algunas especies se halla de tres celdillas. R.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.

RAPUNTIIUM, p. 163.

La flor es monopetala , anomala , tubulosa , ó asurcada , dividida como en dedos en muchas partes de hechura de lengueta , y guarecida de una vayna que abraza al pistilo : el caliz pasa á fruto (es el *pericarpio*) dividido en tres celdillas y lleno de simientes pequeñas , fixadas en la placenta ó receptaculo dividido en tres partes.

ESPECIES CON LAS HOJAS ENTERISIMAS.

Simplex.

I. LOBELIA caule erecto , foliis linearibus integerrimis , pedunculis solitariis. Lobelia con el tallo derecho ; hojas lineares , enterisimas ; y pedunculos solitarios.

Cast. Lobelia sencilla.

TOM. VI.

Za

Ha

724 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Tiene el tallo herbáceo, derecho, sencillo, liso y del largo de quatro dedos: las *hojas* alternas, sin peciolo, apartadas, lineares, enterisimas, agudas, lisas, extendidas, y del largo del través de un dedo: los *pedunculos* axilares, solitarios, de una flor, desnudos, lisos, derechos y al doble mas largos que las hojas: la *cap-sula* debaxo de la flor y de figura cónica-inversa.

Pini- 2. LOBELIA *fruticosa*, X Lobelia fruticosa, con ho-
folia. *foliis linearibus confertis*, X jas lineares, amontonadas y
integerrimis. Roy. lugdb. enterisimas.
242. Berg. cap. 343.

Rapunculus Æthyopicus, X Ruyponce de Etiopia, de
violaceo, galeato flore, foliis X flor violada, con capacete;
Pinastri. Breyn. cent. 173. X y hojas como las del Pino
t. 87. Rai. Suppl. p. 385. X silvestre.
Tourn. p. 164.

Rapunculus fruticosus, X Ruyponce fruticoso, con
foliis nervosis, acutis, flori- X hojas nerviosas, agudas; y
bus in ramulorum summo. X flores en la sumidad de las
Burm. afr. 111. t. 41. f. 2. X ramitas.

Rapunculus flore cœruleo X Ruyponce de flor cerúlea,
galericulato, Rosmarini fo- X con capacete; hoja como la
lio, angustiore. Rai. Suppl. X del Romero y mas angosta.
p. 384. X

Cast. Lobelia con hoja de Pino.

Habita en Etiopia. *h*

Tiene las *hojuelas del caliz* con una glandula en su base.

Dort- 3. LOBELIA *foliis linea-* X Lobelia con hojas linea-
manna *ribus bilocularibus integer-* X res, de dos celdillas, ente-
rimis, caule subnudo. Flor. X risimas; y tallo casi desnudo.
dan. t. 39.

Lobelia foliis biloculari- X Lobelia con hojas de dos
bus, subulatis. Fl. lapp. X celdillas y alesnadas.
279. Hort. cliff. 426. X

Dortmanna lacustris, flo-
ribus sparsis, pendulis. flores esparcidas y pendulas.
Rudb. act. ups. 1720. p. 97.
t. 2.

Gladiolus stagnalis seu lacustris. Rudb. elys. 2. p. 202. f. 15. Gladiolo de estanques ó lacustre.

Gladiolus stagnalis, Dortmanni. Clus. cur. 40. Rai. hist. 1911. Gladiolo de estanques, de Dortman.

Cast. Lobelia de Dortman.

Habita en las balsas y riveras muy frias de Europa. 24

Tupa. 4. LOBELIA foliis lanceolatis integerrimis, racemo spicato. Lobelia con hojas lanceoladas, enterisimas; y racimo espigado.

Rapuntium spicatum, foliis acutis; vulgo Tupa. Ruyponce espigado, con hojas agudas, llamado vulgarmente Tupa.
Few. peru. 2. p. 739. f. 29.

Cast. Lobelia Tupa.

Habita en el Perú.

La yerba y raiz son muy venenosas; y el olor solo hace vomitar. Fewil.

Kalm. 5. LOBELIA caule erecto, foliis lanceolato-linearibus obtusiusculis alternis, integerrimis, racemo terminali. Lobelia con el tallo derecho; hojas entre lanceoladas y lineares, algo obtusas, alternas, enterisimas; y racimo terminal.

Rapuntium Canadense, pumilum, Linariæ folio. Ruyponce del Canadá, enano, con hoja como la de la Linaria.
Tourn. p. 164.

Cast. Lobelia de Kalmio.

Habita en el Canadá. Kalm. ☉

Es planta del largo de un pie. Tiene el tallo rollizo, y algo ramoso: las hojas entre lineares y lanceoladas por abaxo, y lineares por arriba, enterisimas, algo obtusas, desnudas y sin peciolo: el racimo terminal y laxo; con los pedunculos alternos, de una flor, que salen de las

726 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

axilas de las hojas de mas arriba , y adornados con una hojuela : y las flores cerúleas.

Paniculata.

6. LOBELIA *foliis linearibus integerrimis , panicula dichotoma.* Lobelia con hojas lineares, enterisimas; y panoja ahorquillada.

Rapuntium foliis linearibus acutis , floribus gemellis , polyanthos. Burm. afr. Ruyponce con hojas lineares , agudas; y de muchas flores mellizas.
100. t. 38. f. 3.

Cast. Lobelia en panoja.

Habita en Etiopia.

Cornuta.

7. LOBELIA *foliis ovatis petiolatis , staminibus longissimis.* Lobelia de hojas aovadas, con peciolo; y estambres larguissimos.

Cast. Lobelia cornuda.

Habita en la Cayena.

Grandis.

8. LOBELIA *foliis oblongis integerrimis glabris , corymbis bracteatis , corollis hispidis.* Suppl. p. 394. Lobelia de hojas oblongas , enterisimas y lampiñas; corimbos con bracteas ; y corolas erizadas.

Cast. Lobelia grande.

Habita en la America meridional. Mutis.

Echa las hojas muy grandes , oblongas , muy lampiñas, enterisimas , ondeadas por la margen y con peciolo : muchas flores en corimbo , entremezcladas con bracteas redondas y erizadas : los *piececitos* que florecen alargados y erizados : el *caliz* tambien erizado , con sus lacinias aovadas y obtusas : la *corola* en forma de maza erizada , de color amarillo-ferrugineo , corva antes de su florescencia y despues recta ; con los *estambres* rubicundos y erizados.

ESPECIES CON EL TALLO DERECHO,
Y HOJAS CORTADAS.

Phy- 9. LOBELIA *foliis ovato-oblongis crenatis, caule subnudo spicato, antheris hirsutis distinctis.* Lobelia con hojas entreovadas y oblongas, recortadas; tallo casi desnudo y espigado; anteras erizadas y distintas.

Cast. Lobelia Phyteuma.
Habita en Etiopia.

Bulbo- 10. LOBELIA *caule erecto, foliis inferioribus pedatis.* Lobelia con el tallo derecho; y hojas inferiores ramosas.
sa I. *Cyphia bulbosa.* Berg. cap. 172. Cyphia bulbosa.
Rapuntium tuberosum, foliis multifidis, floribus spicatis. Burm. afr. 99. t. 38. f. 1. Ruyponce tuberoso, con hojas hendidas en muchas partes; y flores en espiga.

Cast. Lobelia bulbosa 1.^a
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
Posee los filamentos unidos por su base: las anteras separadas: y cinco petalos iguales. Berg.

Tri- 11. LOBELIA *caule erecto, foliis lanceolatis dentatis, racemo terminali aphylo.* Lobelia con el tallo derecho; hojas lanceoladas, dentadas; y racimo terminal.

Lobelia capitata. Burm. Lobelia en cabezuela.
prodr. 25.

α *Lobelia* (comosa) *foliis linearibus dentatis, spica terminali foliosa.* Spec. pl. ed. 3. p. 1323. Lobelia (de penacho) con hojas lineares, dentadas; espiga terminal y foliosa. α

Lobelia (corymbosa). Berg. cap. 344. Lobelia corimbosa.

Cast. Lobelia de tres caras.

Ha

728 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Posee los tallos herbáceos y del largo de un pie : las *hojas* alternas , sin peciolo , angostas y lanceoladas , con dientes y casi aglutinadas por su base ; y las *superiores* menos apartadas : el *racimo* terminal , derecho , con el pedunculo de tres lados poco manifestos, en los mas ; y las *flores* de color cerúleo.

Lon-
giflora.

12. LOBELIA *foliis lanceolatis dentatis*, pedunculis brevissimis lateralibus, tubo corollae filiformi longissimo. Brown. jam. 322. Jacq. amer. 219. hort. t. 27.

Rapunculus aquaticus, foliis Cichorei, flore albo, tubo longissimo. Sloan. jam. 58. t. 101. f. 2. Rai. Suppl. p. 383.

Trachelium Sonchi folio, flore albo, longissimo. Plum. spec. 3. ic. 253. f. 1.

Lobelia de hojas lanceoladas , con dientes ; pedunculos cortísimos, laterales ; tubo de la corola filiforme y larguísimo.

Ruyponce aquático , con hojas como las de la Achicoria ; flor blanca ; y su tubo larguísimo.

Trachélio con hoja como la de la Cerraja ; flor blanca y larguísima.

Cast. Lobelia de flor larga.

Habita en las riberas de la Jamaica. ☉

Arroja el tallo con muchas ramas que salen de las axilas, con pelo áspero y del largo de un pie : las *hojas* alternas , sin peciolo , lanceoladas , dentadas , y con pelo áspero por debaxo : las *flores* axilares y solitarias : los *pedunculos* cortísimos ; con una *bráctea* alesnada : el *caliz* truncado , de cinco dientes apartados , y con dientecitos ; el *tubo de la corola* filiforme , y de la longitud de la hoja : el *borde* blanco, partido en cinco lacinias , lanceoladas , é iguales : el *germen* debaxo de la flor , conico-inverso y de cinco lados : el *estigma* carnososo y hendido en dos labios : y la *antera* con diez surcos.

El xugo de esta planta inflama las manos : y las hojas son venenosas para los caballos. Jacq.

Asur-
gens.

13. LOBELIA *foliis lanceolatis serratis inferne dentatis, racemis compositis terminalibus*. Amœn. acad. 5. p. 408. Lobelia de hojas lanceoladas, aserradas, con dientes por debaxo; racimos compuestos y terminales.

Lobelia major, brachiata, assurgens, foliis oblongo-ovatis denticulatis, basi appendiculatis utrinque productis. Brown. jam. 322. Lobelia mayor, que se levanta, con ramas opuestas en forma de aspa; hojas entre oblongas, y aovadas con dientecitos; con apendices en su base, y alargadas en uno y otro extremo.

Cast. Lobelia que se levanta.
Habita en la Jamaica.

Cardi-
nalis.

14. LOBELIA *caule erecto, foliis lato-lanceolatis serratis, spica terminali secunda*. Hort. cliff. 426. Gron. virg. 134. Knorr. del. 2. t. L. 2. Lobelia con el tallo derecho; hojas entre anchas y lanceoladas, aserradas; espiga terminal y ladeada.

Rapuntium galeatum, Virginianum, coccineo flore majore. Moris. hist. 2. p. 466. sect. 5. t. 5. f. 54. Ruyponce de Virginia, de flor mas grande, con capete, y de color coccineo.

Rapuntium maximum, coccineo spicato flore. Hern. mex. 879. t. 880. Ruyponce muy grande, con la flor espigada, y de color coccineo.

Cast. Lobelia Cardenala.
Habita en la Virginia. 26

Syphi-
litica.

15. LOBELIA *caule erecto, foliis ovato-lanceolatis subserratis, calicum sinibus reflexis*. Hort. cliff. 426. Amœn. acad. 4. p. 527. Mat. med. p. 222. Lobelia con el tallo derecho; hojas entre aovadas y lanceoladas, algo aserradas; y los pliegues de los cálices redoblados.

730 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Rapunculus galeatus, X Ruyponce de Virginia, de
Virginianus, flore violaceo, X flor mas grande, con capa-
 majore. Moris. hist. 2. p. 466. X cete y violada.
 sect. 5. t. 5. f. 55.

Rapunculus Americanus, X Ruyponce de America, con
 flore dilute cœruleo. Dodart. X la flor de color cerúleo cla-
 mem. 297. X ro.

Cast. Lobelia syphilitica ó para la lue venerea.

Habita en las selvas áridas y lodosas de la Virginia. 24

Tiene el tallo sencillo, derecho, del largo de un pie, con
 pelos algo rígidos en los ángulos que se escurren desde
 las margenes de las hojas: las *hojas* alternas, sin pecio-
 lo, anchas, lanceoladas, aserradas y algo ásperas: las
flores axilares, solitarias, con el pedunculo muy corto
 y de color cerúleo: el *caliz* entre aserrado y con dien-
 tecitos, con sus lacinias lanceoladas, y los pliegues re-
 doblados de suerte, que cubren al germen, como en la
Campanula medium: la *corola* cerúlea, y angulada, con
 sus lacinias casi iguales y pestafiosas en la quilla, y
 con dos eminencias en el paladar.

PROPIED. La raiz es lactescente, acre y nauseosa, expe-
 lente, purgante y emetica: y es admirable en la lue
 venerea.

Surina-
 mensis

16. LOBELIA caule suf-X Lobelia con el tallo sufru-
 fruticoso, foliis oblongis X ticoso; hojas oblongas, lam-
 glabris serratis, floribus X riñas, aserradas; flores axi-
 axillaribus pedunculatis. X lares y con pedunculo.

Cast. Lobelia de Surinam.

Habita en Surinam. 25

Posee las *hojas* alternas, oblongas, con el peciolo corto,
 lisas, agudas y muy delgadamente aserradas: los *pe-*
dunculos axilares, solitarios, casi del largo de las hojas,
 y con dos bracteas lineares puestas ácia la base: el *caliz*
 giboso, con eminencias, y sus lacinias entre lineares y
 lanceoladas: la *corola* de cinco lados, y señalada sobre
 la base en cinco partes: y la *capsula* ventricosa.

Infla-
ta.

17. *LOBELIA caule erecto, foliis ovatis subserratis, pedunculo longioribus, capsulis inflatis.* Act. ups. 1741. p. 23. t. 1. Gron. virg. 134. Lobelia con el tallo derecho; hojas aovadas, algo aserradas, mas largas que el pedunculo; y capsulas infladas.

Lobelia caule erecto brachiato, foliis ovato-lanceolatis obsolete incis, capsulis inflatis. Hort. cliff. 500. Roy. lugdb. 528. Lobelia de tallo derecho, con ramas opuestas en forma de aspa; hojas entre aovadas y lanceoladas, muy poco cortadas; y capsulas infladas.

Cast. Lobelia inflada.

Habita en la Virginia y en el Canadá. ☉

Cliff-
fortia-
na.

18. *LOBELIA caule erecto, foliis cordatis obsolete dentatis petiolatis, corymbo terminali.* Hort. cliff. 426. t. 26. Gron. virg. 107. Lobelia con el tallo derecho; hojas de figura de corazon, con dientes desfigurados, pecioladas; y corimbo terminal.

Rapunculus Trachelii folio, flore purpurascens. Plum. sp. 5. ic. 235. f. 2. Tourn. p. 163. Ruyponce con hoja como la del Trachêlio; y flor de color que tira á purpúreo.

Cast. Lobelia Cliffortiana.

Habita en la Virginia y en el Canadá. ☉

Tiene los pedunculos largos y casi angulados.

Urens.

19. *LOBELIA caule erectiusculo, foliis inferioribus subrotundis crenatis, superioribus lanceolatis serratis, floribus racemosis.* Lobelia con el tallo derecho; hojas inferiores casi redondas, recortadas, las superiores lanceoladas, aserradas; y flores racimosas.

Lobelia caule erecto, foliis lanceolatis subdentatis, spica laxa longa terminali. Loeff. it. 167. Lobelia con el tallo derecho; hojas lanceoladas, casi dentadas; espiga laxa, larga y terminal.

Rapunculus galeatus, Blesensis seu Saloniensis, flore violaceo minore. Moris. hist. 2. p. 407. sect. 5. t. 5. f. 56. Ruyponce de Blois, ó de Salonia, de flor con capace-te, violada y mas pequeña.

Ra-

732 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Rapuntium urens Solo-
niense. Moris. bles. 300. To-
urn. p. 163. Bocc. sic. 20.
t. 11. Rai. hist. 746. Monn.
obs. 131.

Draba flore cœruleo, ga-
leato. C. B. P. 110. Prodr. 53.

Ruyponce de Solonia, que
abrasa ó muy picante.

Draba de flor cerúlea , y
con capacete.

Cast. Lobelia muy picante.

Habita en Francia ; en Ribadeo y otras partes de Es-
paña. ☉

Arroja el tallo apretado y rígido, sencillo, del largo de un
pie , algo desnudo y con ángulos ásperos : las *hojas ra-
dicales* elípticas , lampiñas , algo obtusas y con algun
dientecito : las del tallo muy apartadas , lanceoladas,
sin peciolo , casi pegadas por su base , agudamente
aserradas y lisas : el *racimo* terminal , apretado y rígi-
do ; con las *flores* derechas y apartadas : el *caliz* áspero,
hendido en cinco lacinias iguales, alesnadas y derechas :
la *corola* cerúlea , áspera , con dos manchas pálidas en
el paladar ; y las *lacinias del labio inferior* lanceoladas,
y que cuelgan,

20. LOBELIA *foliis radi-*
calibus ovatis , scapis ca-
pillaribus.

Lobelia con las hojas radi-
cales aovadas ; y escapos ca-
pillares.

Cast. Lobelia menuda.

Habita en lugares algo aguanosos del Cabo de Buena-es-
peranza. ☉

Es *planta* del largo casi de una pulgada. Echa la *raiz* fili-
forme , rastrera y con vastagos ; las *hojas radicales* aov-
vadas al revés , obtusas , tiernas , algo recortadas y con
el peciolo largo ; el *escapo* setáceo , de dos pulgadas,
derecho , sin hojuelas y de una flor : el *caliz* oblongo,
lanceolado y derecho : la *corola* en forma de embudo :
y la *capsula* baxo de la flor , y oblonga.

Es semejante á la *Lobelia Lorenza* ; pero mas tierna,
y sin bráctea alguna en el escapo.

Lævi-
gata.

21. *LOBELIA foliis ellipticis serratis glabris*, cas, aserradas y lampiñas ;
capsulis grossis globosis, capsulas gruesas y globosas ;
calycibus subulatis, corollis cálices alesnados ; y corolas
glaberrimis. Suppl. p. 392. muy lampiñas.

Cast. Lobelia alisada.

Habita en Surinam. Dalberg.

Produce el tallo herbáceo , lampiño y rollizo : las hojas alternas , con peciolo , elípticas, ó entre aovadas y lanceoladas , agudas , lampiñas y aserradas : los pedunculos laterales , axilares , rollizos y en su base con dos brácteas alesnadas : el caliz encima del germen , con cinco dientes alesnados y extendidos ; la corola oblonga , tubulosa , encorvada , roxa en la cavidad de su base , como tambien dentro , y debaxo de los estambres : el borde corto y hendido en cinco lacinias : con las dos superiores agudas ; y las tres inferiores mas cortas : los estambres mas largos que la corola : la capsula globosa , coronada con el caliz , y de dos celdillas ; con la simiente menuda.

Colum-
nea.

22. *LOBELIA foliis oblongis obtusis crenatis glaberrimis subtus tomentosis* obtusas , recortadas , muy lampiñas , con tomento blanco por debaxo ; tallo y corol-
albis, caule corollisque pulverulentis. Suppl. p. 393. las polvoreados.

Cast. Lobelia como la Columnea.

Habita en la Nueva Granada. Mutis.

Posee el ramo (acaso es el tallo ?) con tomento polvoreado y blanco : las hojas alternas , con peciolo , entre ovales y oblongas , obtusas , muy rugosas , de consistencia mas crasa , recortadas , con tomento blanco y denso por debaxo , lustrosas , y muy lampiñas por encima : las flores laterales , solitarias y con pedunculo : la corola como la de la Columnea trepadora y tomentosa por fuera ; el tubo encorvado : el borde hendido en cinco lacinias , con la infima mas profundamente separada , y las de mas arriba menos divididas : y los filamentos debaxo de las lacinias menos separados.

734 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Ferru- 23. LOBELIA *caule vil-* Lobelia con el tallo vello-
ginea. *loso, foliis lanceolatis ser-* so ; hojas lanceoladas , aser-
ratis acutis anastomosibus radas , agudas ; anastomoses
venarum utrinque tomento- de las venas en ambas par-
so-ferrugineis genitalibus tes con tomento de color fer-
elongatis. Suppl. p. 394. rugineo ; y genitales alarga-
dos,

Cast. Lobelia ferruginea.

Habita en la America. Mutis.

Se diferencia de la *Lobelia grande* por el tomento de co-
lor amarillo-ferrugineo , con el qual se cubren los ta-
llos , peciolas , nervios de las hojas , pedunculos , cáli-
ces y corola ; por las hojas mucho mas pequeñas , agu-
das y aserradas : por los pedunculos mas alargados y
casi de la longitud de las hojas ; por las flores mas en-
corvadas ; y por los genitales muy alargados fuera de
la corola , y no encerrados.

To- 24. LOBELIA *herbacea,* Lobelia herbácea , recta,
mento- *recta, tomentosa, foliis li-* tomentosa , con hojas linea-
sa. *nearibus dentatis, pedun-* res , dentadas ; pedunculos
culis terminalibus longissi- terminales , larguissimos y
mis uni seu bifloris. Suppl. con una ó dos flores.
p. 394.

Cast. Lobelia tomentosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

An- 25. LOBELIA *foliis lan-* Lobelia con hojas lanceo-
ceps. *ceolatis, decurrentibus. Sup-* ladas y escurridas.
pl. p. 395.

Cast. Lobelia dudosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. ☉

Echa las *hojas radicales* con peciolo , y aovadas al revés :
el tallo muy sencillo , del largo de un xeme y liso : las
hojas del tallo alternas , lanceoladas , lisas , algo den-
tadas , remotas , y escurridas hasta la hoja mas cerca-
na : las flores que salen de las axilas mas altas de las
hojas , con pedunculo , solitarias , pequeñas y cerúleas.
Acaso es variedad de *Lobelia como Erina* ?

Debilis 26. *LOBELIA erecta, foliis lanceolatis serratis glabris, pedunculis lateralibus folio longioribus.* Suppl. p. 395. Lobelia derecha, con hojas lanceoladas, aserradas y lampiñas; pedunculos laterales y mas largos que la hoja.

Cast. Lobelia debil.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Es muy semejante á la *Lobelia depressa*, y acaso variedad de ella.

Secunda. 27. *LOBELIA erecta, glabra, foliis infimis oblongis dentatis, superioribus lanceolatis integris, pedunculis racemosis secundis.* Suppl. p. 393. Lobelia derecha, lampiña, con las hojas de abaxo oblongas, dentadas, las superiores lanceoladas, y enteras; y pedunculos racimosos con flores ladeadas.

Cast. Lobelia ladeada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Tiene los ramos que casi desde la base, en todas las axilas de las hojas, llevan flores, y todas ellas inclinadas á un lado.

Patula. 28. *LOBELIA herbacea, diffusa, virgata, glabra, foliis ovatis dentatis, pedunculis lateralibus.* Suppl. p. 395. Lobelia herbácea, difusa, en varitas, lampiña, de hojas aovadas, con dientes; y pedunculos laterales.

Casc. Lobelia extendida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Rara vez se halla con hojas, ó con flores.

Bulbosa II. 29. *LOBELIA erecta, herbacea, foliis digitatis, laciniis linearibus pinnatifidis.* Suppl. p. 396. Lobelia derecha, herbácea, de hojas divididas como en dedos, con sus laciniias lineares, y hendidas al través.

Cas. Lobelia bulbosa 2.^a

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Es muy semejante á la *Lobelia con hoja de Coronopo.*

LO.

Belli-
diflora. 30. LOBELIA *caule erecto paniculato, foliis obovatis crenatis*. Suppl. p. 396. Lobelia con el tallo derecho y en panoja; hojas obovadas al revés y recortadas.

Cast. Lobelia con flores de Belis.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. ☉

Tiene el tallo del largo de quatro dedos, derecho, erizado, folioso por debaxo, y dividido en panoja mas larga por arriba: las hojas aovadas al revés, recortadas, obtusas y vellosas por debaxo: la panoja lisa: las hojas de las ramificaciones alesnadas; y los pedunculos inferiores mas largos.

Volu-
bilis. 31. LOBELIA *caule volubili*. Suppl. p. 396. Lobelia con el tallo voluble.
Lobelia *volubilis*. Burm. prod. 25. Lobelia voluble.

Cast. Lobelia voluble.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm. Thunb.

Posee el tallo filiforme, voluble y herbáceo: las hojas alternas, lisas, apartadas y lineares, con dientecitos desfigurados y algo callosos; hendidas las mas veces por arriba en tres lacinias, con las laterales mas cortas: las flores laterales, solitarias y con pedunculo: las antzras separadas como en la Lobelia bulbosa, y en la Lobelia phyteuma.

ESPECIES CON EL TALLO POSTRADO, Y HOJAS CORTADAS.

Lau-
rentia. 32. LOBELIA *caule prostrato, foliis lanceolato-ovalibus crenatis, caule ramoso, pedunculis solitariis unifloris longissimis*. Schreb. in nov. act. A.N.Cur. 3. 480. Lobelia con el tallo postrado; hojas entre lanceoladas y ovales, recortadas; tallo ramoso; pedunculos solitarios, de una flor, y larguissimos.
Laurentia *annua, minima, flore caeruleo*. Michx. gen. 18. t. 14. Lorenza annua, muy pequeña, con la flor cerúlea.

Rapunculus aquaticus, *Ruyponce aquatico*, *ras-*
repens, *flore caruleo ina-* *trero*, con la flor cerúlea y
perto. Rai. Suppl. p. 383. *cerrada*.
 Bocc. mus. 35. t. 27.

• *Rapuntium creticum*, *Ruyponce cretico*, muy
nimum, *Bellidis folio*, *flore* *pequeño*, con hojas de Belis
maculato. Tourn. cor. 9. *ó Margarita*; y flor mancha-
 da. α

Cast. Lobelia Lorenza.

Habita en Italia y en Creta. ☉

Tiene una *bractea* setácea en medio del pedúnculo.

Los *pedunculos* larguissimos; y varia con *hojas* en forma de espatula. Gov. hort. 476.

Erinus 33. LOBELIA *caule pa-* Lobelia con el tallo exten-
tulo, *foliis lanceolatis sub-* dido; hojas lanceoladas, casi
dentatis, *pedunculis longis-* dentadas; y pedunculos lar-
simis. Mill. dict. n. 8. Sub *guissimos*.
 Rapuntio.

Campanula minor, *Afri-* Campanula menor, de
cana, *Erini facie*, *flore vio-* Africa, con traza como la
laceo, *caulibus erectis*. Herm. del Erino; flor de color de
 lugdb. 110. t. 111. *violeta*; y tallos derechos.

Trachelium minus, *Afri-* Trachélio menor, de Afri-
canum, *floribus violaceis*, *ca*, con flores de color de
per caulem sparsis. Tourn. *violeta* y esparcidas por el
 p. 131. *tallo*.

Cast. Lobelia Erino.

Habita en Etiopia. ☉

Arroja el tallo del largo de un xeme, filiforme y ramoso por debaxo: las *hojas radicales* ovales: las del *tallo* lanceoladas, todas lampiñas y casi dentadas: los *pedunculos* axilares, desnudos, tres veces mas largos que las hojas y de una flor: *ésta* delgada y cerúlea: y el *fruto* de tres celdillas.

Erinoides. 34. LOBELIA *caulibus* Lobelia con los tallos pos-
prostratis filiformibus, *foliis* trados y filiformes; hojas con
periolatis oblongis denta- peciolo, oblongas y denta-
tis. *das*.

Lo-

Lobelia caulibus procumbentibus, foliis lanceolatis, serratis, pedunculis lateralibus. Hort. cliff. 426. Spec. pl. 3. 1322.

Lobelia con los tallos tendidos; hojas lanceoladas, aserradas; y pedunculos laterales.

Campanula minor, Africana, Erini facie, caulibus procumbentibus. Herm. lugdb. 108. t. 100.

Campanula menor, de Africa, con traza como la del Erino; y tallos tendidos.

Rapuntium Africanum, minus, angustifolium, flore violaceo. Tourn. p. 163.

Ruyponce de Africa, menor, con hoja angosta; y flor de color de violeta.

Cast. Lobelia como Erino.

Habita entre los pastos del Cabo de Buena-esperanza. ☉

Produce muchos tallos postrados, filiformes, herbáceos, sencillos y del largo de medio pie: las hojas alternas, con peciolo corto, apartadas, oblongas, algo obtusas, con dos ó tres dientes laterales y poco manifestos: los pedunculos laterales, solitarios y mas cortos que la hoja: el caliz con hojuelas lanceoladas: la corola en forma de embudo, angulada, igual, cerúlea, con sus lacinias extendidas y lanceoladas: los filamentos unidos en un tubo con cinco estrias y en forma de maza: las anteras apartadas por sus ápices: el germen debaxo de la flor: el estigma hendido en dos labios y con pelo áspero: y la capsula aovada al revés y de dos celdillas.

Zeylanica.

35. LOBELIA *caulibus procumbentibus, foliis ovatis serratis acutis, inferioribus obtusis, pedunculis unifloris, capsulisque subvillosis.*

Lobelia con los tallos tendidos; hojas aovadas, aserradas, agudas, y las inferiores obtusas; pedunculos de una flor; y capsulas algo vellosas.

Campanula Zeylanica, Senecionis folio, flore purpureo. Seb.thes. 1. p. 37. t. 22. f. 12?

Campanula de Zeylan, con hoja como la del Senecio; y flor purpúrea.

Lobelia hirta. Spec. pl. 1. p. 935.

Lobelia con pelo áspero. α

Cast. Lobelia de Zeylan.

Ha-

Habita en la China: Osbeck. y en Etiopia.

Es planta pequeña, con traza como la de la *Veronica Châmedris*. Tiene el tallo rastrero: las hojas alternas, aovadas, con peciolo, casi lampiñas; las inferiores obtusas y recortadas; y las superiores agudas, y agudamente aserradas: los pedunculos axilares, casi solitarios, mas largos que la hoja, vellosos y de una flor: y el caliz algo vellosos.

Lutea. 36. *LOBELIA caulibus procumbentibus, foliis lanceolatis serratis, floribus sessilibus subspicatis.* Lobelia con los tallos tendidos; hojas lanceoladas, aserradas; flores sin piececito y casi en espiga.

Rapuntium foliis oblongis, dentatis, flore luteo spicato, flagellis procumbentibus. Burm. afr. 101. t. Ruyponce con hojas oblongas y dentadas; flor amarilla, espigada; y vastagos tendidos.

39. f. 1.

Rapunculus Africanus, ramosus, foliis dentatis, floribus Gladioli lacustris. Ruyponce de Africa, ramoso, con hojas dentadas; y flores como las del Gladiolo lacustre.

Herm. afr. 18. Rai. Suppl. p. 248.

Cast. Lobelia amarilla.

Habita en Etiopia.

Arroja el tallo muy sencillo, derecho y estriado: las hojas alternas, sin peciolo, lanceoladas, derechas, puntiagudas, con pocas aserraduras y derechas: las flores terminales, amarillas y mayores que la hoja: los filamentos unidos: las anteras derechas, estriadas, separadas y barbadadas por su ápice: el estilo tambien barbado en su punta: con el estigma oblongo, hendido en dos partes y revuelto.

Hirsuta 1. 37. *LOBELIA foliis ovalibus crenatis lanatis, floribus lateralibus solitariis.* Lobelia con hojas ovales, recortadas, lanudas; flores laterales y solitarias.

Rapunculus foliis subro- X Ruyponce de hojas casi
tundis hirtis, flore ex alis X redondas, con pelo áspero;
solitario. Burm. afr. 105. t. X flor que sale de las axilas y
40. f. 2. X solitaria.

Rapuntium Africanum, X Ruyponce de Africa, de
galeatum, foliis oblongo- X flor con capacete; hojas en-
rotundis, dentatis, villosis. X tre oblongas y redondas,
Rai. Suppl. p. 385. X dentadas y vellosas.

Cast. Lobelia con pelo áspero.

Habita en Etiopia.

Coro-
nopifo-
lia.

38. LOBELIA *foliis lan-* X Lobelia de hojas lanceola-
ceolatis dentatis, pedun- X das, con dientes; y pedun-
culis longissimis. X culos larguissimos.

Rapuntium folio longo, X Ruyponce con hoja larga,
profunde dentato, florum X profundamente dentada; y
petalis longissimis. Burm. X petalos de las flores larguissi-
afr. 98. t. 38. f. 1. X mos.

Rapuntium Æthyopicum, X Ruyponce de Etiopia, de
cæruleo galeato flore, foliis X flor cerúlea, con capacete; y
Coronopi. Herm. afr. 18. X hojas como las del Coronop-
Breyn. cent. t. 88. Tourn. X po.
p. 164. X

Cast. Lobelia con hoja de Coronopo.

Habita en Etiopia.

Posee el tallo tendido y peloso: las *hojas* lineares, con
tres dientes en ambos lados: y los *pedunculos* mas lar-
gos que toda la planta.

Te-
nella.

39. LOBELIA *caulibus* X Lobelia con los tallos pos-
prostratis filiformibus fru- X trados, filiformes, fruticu-
ticulosis, foliis ovato-lanceo- X losos ó leñosos; hojas entre
latis glabris, utrinque biden- X aovadas y lanceoladas, lam-
tatis. X piñas y con dos dientes en
X ambos lados.

Lobelia parviflora. Berg. X Lobelia con la flor peque-
cap. 354. X ña.

Cast. Lobelia tiernecita.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Echa

Echa las ramas filiformes y postradas: las *hojas* alternas, casi sin peciolo, entre aovadas, y lanceoladas, redobladas, menudas, lampifias y con dos aserraduras en ambos lados; la *una* en la base; y la *otra* en medio: los *pedunculos* filiformes, en el remate de las ramas, y de la longitud de la hoja: el *caliz* liso, y hendido en cinco lacinias alesnadas: el *germen* parte encima de la flor y parte debaxo: y el *fruto* que se abre por su ápice en tres ventallas.

De-
pressa 40. *LOBELIA depressa*, *X* Lobelia deprimida, con
foliis lanceolatis, caule car- *X* hojas lanceoladas; y tallo
noso. Suppl. p. 395. *X* carnoso.

Cast. Lobelia deprimida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Tiene el tallo herbáceo, del largo de quatro dedos, muy deprimido, varicoso y postrado por todas partes: los *pedunculos* alternos, del largo de las hojas y solitarios: las *hojas* lanceoladas y sin ser escurridas: y las *flores* de color entre negro y purpúreo.

Hirsu-
ta, II. 41. *LOBELIA fruticosa*, *X* Lobelia fruticosa, postra-
hirsuta prostrata, foliis *X* da, con pelo áspero; hojas
ovatis dentatis, pedunculis *X* aovadas y dentadas; pedun-
lateralibus longissimis-bi *X* culos laterales, larguissimos,
seu trifloris. Suppl. p. 395. *X* y con dos ó tres flores.

Cast. Lobelia con pelo áspero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. *h*

1199. Género VIOLA. * Tourn. t. 236.

Calceolaria Loeff. 183.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio corto, persistente y de cinco *hojuelas* entre aovadas, y oblongas, derechas, mas agudas en su ápice, obtusas por su base, fixadas por arriba de la misma base, iguales, pero várias en la disposion: de las quales dos juntas sostienen el *petalo* *, cada

Aaa 2

una

una un *petalo* $\beta \chi$, y una sola dos *petalos* α : juntamente.

COR. Irregular, de cinco *petalos* desiguales ; de los quales el *petalo* α de mas arriba es recto, que mira ácia abajo, mas ancho, mas obtuso, escotado, que remata por su base en un *nectario* como cuernecillo, obtuso y que sobresale entre las hojuelas del caliz.

Los *Petalos* $\beta \chi$ laterales iguales, opuestos, obtusos y rectos.

Los *Petalos* α : *infimos* iguales, mayores y redoblados ácia arriba.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, muy pequeños, de los quales los dos próximos al *petalo* α entran en el *nectario* con apendices anexos: las *anteras*, las mas veces, unidas, obtusas y con membranas por su ápice.

PIST. *Germen* dentro de la flor y casi redondo: *estilo* filiforme, que sobresale fuera de las *anteras*: con el *estigma* obliquo.

PERIC. *Capsula* aovada, de tres lados, obtusa, de una celdilla y de tres ventallas.

SEM. muchas, aovadas, con apendice y fixadas á las ventallas.

RECEPT. linear, y que se escurre por cada ventalla en forma de una linea.

OBS. El *estigma* ó (como en las violas llamadas del mes de Marzo) se redobla en un anzuelo sencillo, ó es (como en las que se llaman de tres colores) una *cabezuela cóncava* y horadada en su ápice.

La flor en las especies de Europa siempre se halla inversa; pero en las de las Indias las mas veces recta.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 419.

La flor es de muchos *petalos*, anomala, y parecida á la flor como mariposa; con dos *petalos* superiores, que forman el *vexilo*, dos laterales que constituyen las alas, y el inferior que remata en una cola, que en algun modo representa una quilla. Del caliz sale el *pistilo*, que pasa á fruto de tres lados, que se abre en tres partes y lleno de simientes casi redondas.

ESPECIES SIN TALLO.

- Pal-
mata. 1. *VIOLA acaulis, foliis palmatis quinque lobis dentatis indivisque.* Gron. virg. 135. *Viola* ó *Violeta* sin tallo, con hojas palmeadas, hendidas en cinco lóbulos, dentadas, é indivisas.
- Viola foliis palmatis sinuatis, stolonum reniformibus.* Gron. virg. 1. p. 182. *Viola* con hojas palmeadas, sinuosas; y las de los renuevos en forma de riñon.
- Viola Virginiana, Platani fere foliis parvis & incanis.* Pluk. mant. 187. *Viola* de Virginia, con hojas casi como las del Platanó, pequeñas y blanquecinas.
- Viola alba, folio Securis Romanæ effigie, Floridana.* Pluk. amalth. 129. t. 447. f. 1. *Viola* blanca, de la Florida, con hoja semejante á la *Segur Romana* (*ancha, oblonga y encorvada*).

Cast. *Viola* ó *Violeta* palmeada.

Habita en la Virginia. 26

- Pedata 2. *VIOLA acaulis, foliis pedatis septem-partitis.* Gron. virg. 135. *Viola* sin tallo, con hojas ramosas y divididas en siete partes.
- Viola multifida.* Mill. dict. n. 5. *Viola* con hojas hendidas en muchas partes.
- Viola foliis palmatis.* Gron. virg. 1. p. 107. *Viola* con hojas palmeadas.
- Viola Virginiana, tricolor, foliis multifidis, cauliculo aphylo.* Pluk. alm. 388. t. 114. f. 7. *Viola* de Virginia, con la flor de tres colores; hojas hendidas en muchas partes; y tallito sin ellas.

Cast. *Viola* ó *Violeta* con hojas ramosas.

Habita en la Virginia. 26

- Pinna-
ta. 3. *VIOLA acaulis, foliis pinnatifidis.* Mill. dict. n. 6. *Viola* sin tallo, y con hojas hendidas al través.
- Gmel. sib. 4. p. 101. t. 49. f. 4.

744 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Viola acaulis, foliis multifidis, obtusis. Hall. helv. n. 561. X Viola sin tallo, con hojas hendidas en muchas partes y obtusas.

Viola Martia, inodora, folio instar Petroselini eleganter dissecto. Act. nat. cur. vol. 3. n. 3. R. X Viola del mes de Marzo, sin olor, con hoja cortada hermosamente al modo que la del Peregil.

Viola montana, laciniato folio. Plus. hisp. 309. Hall. X Viola montana, con hoja laciniada.

Viola alpina, folio in plures partes dissecto. C. B. P. 199. Tourn. p. 420. X Viola alpina, con hoja cortada en muchas partes.

Viola montana, folio multifido. Bauh. hist. 3. p. 544. X Viola montana, con hoja hendida en muchas partes.

Cast. Viola pinnada.

Habita en la Siberia, y en los alpes de Europa.

Lanceolata.

4. VIOLA *acaulis*, foliis lanceolatis, crenatis. Gmel. sib. 4. p. 99. t. 49. f. 2. X Viola sin tallo, con hojas lanceoladas y recortadas.

Viola Acadiensis, folio longo sinuato. Dierv. X Viola de Acadia, con hoja larga y sinuosa.

Cast. Viola lanceolada.

Habita en el Canadá y en la Siberia.

La planta del Canadá, traída por el Doctor Kalmio, tenía las hojas angostas, algo aserradas, con el peciolo largo, y los nervios alternos y paralelos. La de Siberia, traída por el Doctor Gmelino, poseía las hojas entre aovadas y lanceoladas, con los peciolos la mitad mas cortos que la hoja, y era menos estriada; y sus flores se hallaban mas grandes.

Primulifolia.

5. VIOLA *acaulis*, foliis oblongis subcordatis, petiolis membranaceis. Gron. virg. 135. Lepech. it. 1. p. 188. X Viola sin tallo, de hojas oblongas, casi de figura de corazon; y con peciolos membranosos.

Cast. Viola con hoja de Primula.

Habita en la Siberia y Virginia.

Echa

Echa las *hojas* de figura de corazon , oblongas , muy obtusas , recortadas , escurridas por el peciolo , y del todo semejantes á las de la *Primula oficala*.

- Hirta. 6. *VIOLA acaulis , foliis cordatis piloso-hispidis*. Hall. helv. n. 559. Flor. dan. t. 618. *Viola* sin tallo , de hojas en forma de corazon y con pelos erizados.
- Viola Martia , hirsuta , inodora* . Moris. hist. 2. p. 475. sect. 5. t. 35. f. 4. *Viola* del mes de Marzo , con pelo áspero y sin olor.
- Viola Trachelii folio*. Rai. hist. 1051. *Viola* con hoja como la del Trachêlio.
- Viola*. Brunsf. herb. 1. p. 137. f. 3. *Viola*.

Cast. *Viola* con pelo áspero.

Habita en los bosques sombríos y mas frios de la Europa. 2

Arroja la *raiz* gruesecita , derecha , y nudosa con cicatrices : las *hojas* de hechura de corazon , algo oblongas , y pelosas por debaxo , como los peciolos : los *pedunculos* radicales , acanalados por su dorso , y puestos sobre las bracteas : y el *petalo* del *cuernecillo* escotado.

- Pa-lustris. 7. *VIOLA acaulis , foliis reniformibus*. Hall. helv. n. 560. Pall. it. 3. p. 34. Flor. dan. t. 83. *Viola* sin tallo , y con hojas en forma de riñon.
- Viola alpina , minima , Nummulariæ folio* . Bocc. mus. 163. t. 127. Allion. t. 2. f. 2. Hall. R. Tourn. p. 421. *Viola* alpina , muy pequeña , con hoja como la de la Numularia.
- Viola palustris , rotundifolia , glabra*. Moris. hist. 2. p. 475. sect. 5. t. 35. f. 5. Tourn. p. 420. *Viola* palustre , de hoja redonda y lampiña.

Cast. *Viola* palustre.

Habita en las balsas de la Europa mas fria. 2

Gmelino sib. 4. p. 98. combina malamente esta especie con la *Viola canina*.

746 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Odo- 8. VIOLA *acaulis odorata*, X Viola sin tallo, con hojas
rata. *foliis cordatis, stolonibus* X de figura de corazon; y re-
reptantibus. Mat. med. 222. X nuevos rastreros.
Flor. dan. t. 309. Knorr. del.
1. t. V.
Viola acaulis, stolonibus X Viola sin tallo, con re-
teretibus reptantibus, pe- X nuevos rollizos, rastreros; y
dunculis radicalibus. Hort. X pedunculos radicales.
cliff. 427.
Viola Martia, purpurea, X Viola del mes de Marzo,
flore simplici odoro. C. B. X con la flor sencilla, de color
P. 199. Tourn. p. 419. X purpúreo y olorosa.
Viola nigra seu purpurea. X Viola con la flor negra ó
Dod. peimpt. 156. t. 1. 2. X purpúrea.
Viola Martia, alba. C.B. X Viola del mes de Marzo,
P. 199. Tourn. p. 419. X con la flor blanca. *α*
Viola Martia, multiplici X Viola del mes de Marzo,
flore. C. B. P. 199. Tourn. X con la flor multiplicada. *β*
p. 419. X

Cast. Viola olorosa.

Habita en bosques y otros parages sombríos de Europa:
en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña y en
las mas Provincias de España. 24

Echa la raiz rastrera y filiforme: las *hojas* de figura de
corazon, redondeadas, algo desnudas y por debaxo ve-
llosas: los *pedunculos* radicales, sin ser acanalados: y
el *petalo* que lleva el cuernecillo escotado.

Se halla una variedad de esta especie, cuyas *flores* son
mayores, semejantes á las de la *Aquilegia*, y en forma
de campana; con los *petalos* casi iguales, arrimados
entre sí y todos con espolon por su base. Es verdadera
Petoria de la violeta! R.

PROPIED. Las flores son fragrantés, anodinas y emolien-
tes: las hojas tambien emolientes: la raiz purgante y
emetica: y las semillas promueven la orina y el vomito.

ESPECIES QUE ARROJAN TALLOS.

- Ca-
nina. 9. *VIOLA caule adscen-* Viola con el tallo mas cre-
re adscendente , foliis oblon- cido ascendente; hojas en-
go-cordatis . Gmel. sib. 4. tre oblongas y de figura de
p. 98. t. 49. f. 1. corazon.
Viola caulibus adscenden- Viola con los tallos ascen-
tibus floriferis , foliis cor- dentes , y que llevan flores;
datis. Hort. cliff. p. 427. y hojas de figura de cora-
zon.
Viola pedunculis caulinis, Viola con los pedunculos
stipulis ciliatis , foliis cor- que salen del tallo; estipulas
datis. Scop. carn. 1. p. 546. pestañosas; y hojas de figura
n. 2. ed. 2. n. 1098. de corazon.
Viola Martia , inodora, Viola del mes de Marzo,
sylvestris. C. B. P. 199. To- silvestre y sin olor.
urn. p. 419.
Viola sylvestris, inodora. Viola silvestre y sin olor.
Dod. pempt. 156.

Cast. *Viola canina.*

Habita en lugares abrigados de Europa: en Miraflores de la Sierra, Alcarria, Aragon, Cataluña, y en otras muchas partes de España. 24

Echa los tallos lisos, casi rollizos, y por una parte planos: las hojas de hechura de corazon y lampifias: las estipulas pestañosas y con dientes: y la corola cerúlea, con el espolon blanco.

Leers. herb. p. 684. describe una variedad singular de esta especie, y se asemeja á la *Viola admirable*. *Thalio* trahe otra variedad con hojas que terminan en punta rígida, oblongas, apretadas y enxutas. R.

- Mon-
tana. 10. *VIOLA caulibus erectis,* Viola con los tallos dere-
foliis cordatis oblongis. chos; hojas de figura de co-
Mill. dict. n. 8. razon y oblongas.
Viola caule lato, erecto, Viola con el tallo ancho,
foliis ellipticis, crenatis, sti- derecho; hojas elípticas, re-
pulis semipinnatis . Hall. cortadas; y estipulas medio
helv. n. 567. pinnadas.

Vio-

*Viola flore cæruleo, longi-
folia.* Riv. t. 119. Viola con la flor cerúlea;
y hojas largas.

*Viola Martia, arbores-
cens, purpurea.* C. B. P. 199. Viola del mes de Marzo,
arborescente, y con la flor
purpúrea.

*Viola erecta, flore cæru-
leo & albo.* Moris. hist. 2. p. Viola derecha, con la flor
cerúlea y blanca.

475. sect. 5. t. 7. f. 7.

Viola arborescens. Cam. Viola arborescente.
epit. 911.

Cast. *Viola montana.*

Habita en los alpes de Lapponia, Austria y Alemania:
en los montes de Burgos, de Asturias, de la Alcarria y
en otros de España. 24

Ceni-
sia.

11. *VIOLA caulibus fili-
formibus indivisis prore-
pentibus, foliis ovatis pe-
tiolatis integerrimis gla-
bris, stipulis indivisis, pe-
dunculo solitario.* Mill. dict. Viola con los tallos fili-
formes, indivisos y muy ras-
treros; hojas aovadas, ente-
risimas y lampiñas; estipu-
las indivisas; y pedunculo
solitario.

n. 7.

*Viola multi-caulis foliis
ovatis, petiolatis, integerrimis.* Hall. helv. n. 565. Viola de muchos tallos;
hojas aovadas, con peciolo
y enterisimas.

*Viola foliis ovalibus in-
tegerrimis uniformibus, pe-
dunculis caulinis.* Allion. Viola con hojas ovales,
enterisimas, uniformes; y
pedunculos que salen del ta-
llo.

Cast. *Viola de Cenisia.*

Habita en los montes alpinos de Cenisia llamados *Ron-
che.* 24

Arroja los tallos filiformes, perennes, indivisos, y que se
arrastran por debaxo de la tierra, muy sencillos, y as-
cendentes por su extremidad: las *hojas* aovadas, muy
pequeñas, con peciolo, lampiñas y amontonadas en el
extremo del tallo: el *pedunculo* solitario y largo: con
la *flor* grande, cerúlea, y su espolon mas corto que los
petalos.

Canadensis.

12. *VIOLA caule erecto, foliis cordatis acuminatis.* Viola con el tallo derecho; hojas de figura de corazon y puntiagudas.

Viola caulescens, foliis cordatis oblongis acuminatis. Viola que arroja tallos, con hojas de figura de corazon, oblongas y puntiagudas. Amœn. acad. 1. p. 157.

Cast. Viola del Canadá.

Habita en el Canadá. Kalm.

Produce el tallo derecho, del largo de un xeme y algo rollizo: las hojas alternas, entre de figura de riñon y de corazon, puntiagudas, aserradas, lisas, pálidas por debaxo, con los peciolos la mitad mas cortos que ellas, y aun mas pequeños en las de mas arriba: las estipulas de dos en dos, derechas, lanceoladas y que se marchitan: los pedunculos que salen de cada axila, solitarios, desnudos, y del largo de las hojas.

Mirabilis.

13. *VIOLA caule triquetra, foliis reniformi-cordatis, floribus caulinis apetalis.* Mill. dict. n. 4. Jacq. flores del tallo sin petalos. austr. t. 19.

Viola floribus radicalibus corollatis abortientibus, caulinis apetalis seminiferis. Viola con las flores radicales con corola, y que abortan; las del tallo sin petalos y que llevan semilla. Hort. cliff. 407. it. Oel. 81.

Viola montana, latifolia, flores è radice, semina in cacumine ferens. Dill. elth. 408. t. 303. f. 390. Viola montana, con hojas anchas; que lleva flores (esteriles) inmediatamente de la raiz; y las semillas (con sus capsulas) en la cima del tallo.

Cast. Viola admirable.

Habita en bosques sombríos de Alemania y Suecia. 24

Tiene las corolas blanquecinas; y el petalo impar con venas de color violado.

750 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

- Biflora** 14. *VIOLA caule biflora*, *foliis reniformibus serratis*. Gmel. sib. 4. p. 98. n. 61. Flor. dan. t. 46. *Viola* con el tallo de dos flores ; hojas en forma de riñon y aserradas.
- Viola caule debili*, *pauciflora*, *foliis petiolatis*, *reniformibus*, *obtusis*. Hall. helv. n. 564. *Viola* de tallo debil , con pocas flores ; hojas peciola-
das, en forma de riñon, y con
dientes obtusos.
- Viola pedunculis caulinis*, *stipulis lanceolatis*, *foliis reniformibus*. Scop. carn. ed. 2. 1099. *Viola* con pedunculos en el tallo ; estipulas lanceola-
das ; y hojas en forma de ri-
ñon.
- Viola flore luteo*. Riv. t. 119. Haller. *Viola* con la flor amarilla.
- Viola alpina*, *rotundifolia*, *lutea*. C. B. P. 199. Tourn. p. 420. *Viola* alpina, con hoja re-
donda ; y flor amarilla.
- Viola montana*, *prima*. Clus. hist. 1. p. 309. *Viola* montana , primera.
- Viola rotundifolia*, *montana*, *major*. Pluk. alm. 388. t. 234. f. 1. *Viola* montana , mayor ,
con hoja redonda.
- Viola alpina*, *rotundifolia*, *minor*, *lutea*. Tourn. p. 420. Pluk. alm. 388. t. 233. f. 7. *Viola* alpina , menor , con
hoja redonda ; y flor amari-
lla.

Cast. *Viola* de dos flores.

Habita en los alpes de Lapponia , de Austria , Suiza , é Inglaterra. 24

- Uni-
flora.** 15. *VIOLA caule uniflora*, *foliis cordatis dentatis*. Gmel. sib. 4. p. 101. t. 48. f. 5. *Viola* con el tallo de una flor ; hojas en forma de co-
razon y dentadas.

Cast. *Viola* de una flor.

Habita en la Siberia. 24

Es el tallo casi del largo de un xeme , desnudo , firme , por su remate lleva tres hojas casi alternas , de figura de corazon , dentadas , algo vellosas , y con pe-
cio-

SENCIL. CON LAS ANTER. UNID. EN CIL. 71

ciolos cortísimos: una sola flor con el pedunculo cortí-
simo, amarilla, y mas grande que las hojas.

ESPECIES CON LAS ESTIPULAS HENDIDAS AL TRAVES,
Y EL ESTIGMA EN FORMA DE JARRITO.

- Tri- 16. *VIOLA caule trique-* Viola con el tallo de tres
color. *tro diffuso, foliis oblongis* caras, y difuso; hojas oblon-
incisis, stipulis pinnatifi- gas, cortadas; y estipulas
dis. Syst. veg. 668. hendidas al través.
Viola pedunculis caulinis Viola con los pedunculos
angulatis, stipulis oblon- del tallo angulados; estipu-
gis pinnato-dentatis, foliis las oblongas, entre pinnadas,
ovato—oblongis crenatis. y dentadas; hojas entre aovadas y oblongas, y recor-
Hort. cliff. 527. tadas.
Viola caule diffuso, ra- Viola con el tallo difuso,
moso, foliis ovatis, denta- y ramoso; hojas aovadas,
tis, flore calyce paulo ma- con dientes; y flor poco mas
jore. Hall. helv. n. 569. grande que el caliz.
Viola bicolor, arvensis. Viola arvense, de dos co-
C. B. P. 200. Tourn. p. 421. lores.
Trinitatis herba. Fuchs. Yerba de la Trinidad.
hist. 803.
Yacea altera. Cam. epit. Otra Yacea.
913.
α *Viola tricolor, hortensis,* Viola rastrera, hortense,
repens. C. B. P. 200. Tourn. y de tres colores. α
p. 421.
Viola caule anguloso, dif- Viola con el tallo angulo-
fuso, foliis ovatis, dentatis, so y difuso; hojas aovadas,
flore calyce duplo longiore. dentadas; y flor al doble
Hall. helv. n. 568. Fl. dan. mas larga que el caliz.
t. 623. Knorr. del. 1. t. D.
Viola tricolor. Renealm. Viola de tres colores.
spec. 144. t. 140. Riv. t. 120.
Yacea seu flos Trinitatis. Yacea ó flor de la Trini-
Cam. epit. 912. dad.
Cast. Viola de tres colores. vulgo: Trinitaria. Pensa-
mientos.

Habita en lugares cultivados de Europa : en los circuitos de Madrid ; y es comun en las mas provincias de España. ☉

Grandiflora.

17. VIOLA *caule triquetra simplici , foliis oblongiusculis , stipulis pinnatifidis.*

Viola con el tallo de tres caras y sencillo ; hojas algo oblongas ; y estipulas hendidas al través.

Viola caule erecto , pauciflora , foliis imis subrotundis , caulinis ellipticis , stipulis semipinnatis maximis. Hall. helv. n. 566. t. 17? Videtur cum sequenti confundere. R.

Viola con el tallo derecho y de pocas flores ; hojas de abaxo casi redondas , las del tallo elipticas ; estipulas medio pinnadas y muy grandes. Parece que Haller confunde esta especie con la siguiente.

Viola montana , tricolor , odoratissima. C. B. P. 199.

Viola montana , de tres colores y muy olorosa.

Viola montana , lutea , grandiflora. C. B. P. 200. Tourn. p. 420. Barr. ic. 691. p. 692.

Viola montana , con la flor grande y amarilla.

Cast. Viola de flor grande.

Habita en los alpes de Suiza , y en los Pirineos. 26

Tiene el tallo alto , ramoso , folioso , con estipulas y del todo como el de la *Viola de tres colores* ; pero la flor muy grande , y de color amarillo-roxo ; con los petalos aovados y de la longitud de las hojas ; y el espolon al doble mas largo que el caliz ; pero mas corto que los petalos.

Es muy semejante á la *Viola de espolon grande* ; pero debe separarse de ella ; aunque las dos provienen de la *Violeta de tres colores*.

Calcarata.

18. VIOLA *caule abbreviato , foliis subovatis , stipulis pinnatifidis , nectariis calyce longioribus.* Syst. veg. 669.

Viola con el tallo muy corto ; hojas casi aovadas ; estipulas hendidas al través ; y nectarios mas largos que el caliz.

Viola alpina , purpurea , exiguis foliis. C. B. P. 199.

Viola alpina , con la flor purpúrea ; y hojas pequeñas.

Vio-

Viola montana, *cærulea*, *grandiflora*. Tourn. p. 420. *Viola montana*, con la flor grande y de color cerúleo.

Melanium montanum. Dalech. hist. 1204. *Melanio montano*.

Cast. *Viola* de espolon grande.

Habita en los Pirineos de España, y en los alpes de Suiza.

Tiene el tallo cortísimo: los *petalos* redondos, y mayores que las hojas; y éstas entre redondas y aovadas.

Cor-
nuta. 19. *VIOLA caule elongato*, *foliis oblongo-ovatis*, *stipulis pinnatifidis*, *nectariis subulatis corolla longioribus*. Syst. veg. 669. *Viola* con el tallo alargado; hojas entre oblongas, y aovadas; estipulas hendidas al través; nectarios alesnados, y mas largos que la corola.

Viola foliis cordato-lanceolatis, *serratis*, *stipulis lanceolatis*, *acute dentatis*. Hall. helv. n. 570. *Viola* con hojas entre de figura de corazon y lanceoladas, aserradas; estipulas lanceoladas, y con dientes agudos.

Viola Pyrenaica, *longius caudata*, *Teucree folio*. Tourn. p. 421. *Viola* de Pirineos, con el espolon mas largo; y hoja como la del Teucro.

Viola Pyrenaica, *folio Teucree*, *serotina*. Rai. Suppl. p. 510. *Viola* tardía, de los Pirineos, con hoja como la del Teucro.

Cast. *Viola* cornuda.

Habita en los Pirineos: en los montes de Asturias y otras partes de España.

Posee el tallo mas largo y derecho: los *petalos* oblongos, y mas pequeños que las hojas; y éstas entre oblongas y aovadas.

Ar-
bores-
cens. 20. *VIOLA caule fruticoso*, *foliis lanceolatis integerrimis*. *Viola* con el tallo fruticoso; hojas lanceoladas y enterisimas.

Viola Hispanica, fruticosa, *longifolia*. Tourn. p. 421. *Viola* de España, fruticosa, y con hoja larga.

Viola Hispanica, fruticans. Barr. ic. 568. *Viola* de España, fruticosa.

Viola montana, *pumila*, *angustifolia*, *flore inodoro*. C. B. P. 199. *Viola* montana, enana, con hoja angosta; y flor sin olor.

Cast. Viola arborescente.

Habita en el desierto de la Murta del Reyno de Valencia, entre los peñascos no muy distantes del mar. h

ESPECIES CON LAS FLORES DERECHAS
X NO RESUPINADAS.

En- 21. *VIOLA caule basi ra-* *Viola* con el tallo muy ra-
ne as- *mosissimo*, *foliis lanceola-* moso en su base; hojas entre
perma. *to-linearibus integerrimis* lanceoladas y lineares, en-
distantibus, *calycibus pos-* terisimas, apartadas; y calí-
tice æqualibus. Flor. zeyl. ces iguales por debaxo.

317.

Herba Indica, *flore monopetalo*, *labiato*, *capsula è rotundo-trilaterali octosperma*. Rai. Suppl. p. 402. *Yerba de las Indias*, con la flor de un petalo, y labiada; capsula entre redonda y de tres lados, y con ocho simientes.

Nellam-parenda. Rheed. *Nellam-parenda*.
mal. 9. p. 117. t. 60.

Polygala frutescens, *Lavendulæ folio viridi*, *flore cæruleo*. Burm. zeyl. 195. *Polygala frutescente*, con hoja como la del Espliego, verde; y flor cerúlea.
t. 85.

Cast. Viola de nueve semillas.

Habita en la India. 24

Suffru- 22. *VIOLA caule pro-* *Viola* con el tallo tendi-
tiosa. *cumbente*, *foliis lanceolatis* do; hojas lanceoladas, algo
sub serratis confertis, *caly-* aserradas, amontonadas; y
cibus postice æqualibus. *calices* iguales por debaxo.
Flor. zeyl. 318.

Cast.

Cast. Viola sufruticosa.

Habita en la India. *h*

Calceolaria. 23. VIOLA caule simplici *X* Viola de tallo sencillo, *X*
hirsuto herbaceo, foliis lanceolatis pilosis, floribus solitariis. *X* herbáceo, y con pelo áspero; hojas lanceoladas, pelosas; y flores solitarias. *X*
Calceolaria caule simplici hirsuto, floribus axillaribus solitariis. *X* Calceolaria de tallo sencillo, con pelo áspero; flores axilares y solitarias. *X*
 184.

Cast. Viola Calceolaria.

Habita en Cumaná. *h*

Tiene la raíz fibrosa y gruesecita: muchos tallos herbáceos, sencillos, del largo de un pie y rollizos: las hojas alternas, lanceoladas, ó entre oblongas y lanceoladas, sin peciolo, pelosas, aserradas y derechas: las estipulas alesnadas, derechas, pelosas y unidas con el tallo: las flores solitarias, alternas, axilares, casi sentadas, ó sostenidas por un pedunculo que tiene en medio dos bracteas pequeñas y setáceas: el caliz aovado, con todas las hojuelas derechas, lampiñas por dentro, con pelo áspero por defuera, y ácia su margen cercadas de tuberculos filiformes, truncados y pelosos: los petalos laterales lanceolados, vellosos por defuera y con una uña linear: los petalos de mas abaxo muy grandes, con su uña aquillada por debaxo: la capsula cubierta con el caliz tumido y laxo, aovada y algo rolliza. *Loefl. loco citato.*

Opositifolia. 24. VIOLA caule suffruticoso *X* Viola de tallo sufruticoso, *X*
brachiato, foliis oppositis, floribus racemosis. *X* con ramas opuestas en forma de aspa; hojas opuestas; y flores en racimo. *X*
Calceolaria caule brachiato glabro, floribus racemosis. *X* Calceolaria de tallo con ramas opuestas en forma de aspa, lampiño; y flores racimosas. *X*
Loefl. it. 183.

Cast. Viola con hojas opuestas.

Habita en Cumaná. *h*

7, o FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Produce los *tallos* derechos, y del largo de un xeme hasta pie y medio, leñosos por debaxo, herbáceos por arriba, rollizos, lampiños; con *ramas* opuestas en forma de aspa y que salen de las axilas superiores: las *hojas* opuestas, lanceoladas, casi sin peciolo, agudamente aserradas y enterisimas por su ápice. *Loefl. loco citato.*

Hyban-
thus.

25. VIOLA *arborescens*, *scandens aculeata*, *foliis oblongis obtusis*, *glabris*. *Loefl. it. 282. 185. n. 3.*

Viola Hybanthus. Jacq. *Viola Hybantho.*
amer. 17.

Cas. Viola Hybantho.

Habita en la America meridional. *fl*

Posee los *pedunculos* con muchas flores. *Linneo*: la *raiz* leñosa: el *tallo* frutescente, trepador, torcido, y retorcido por arriba y por debaxo, del grueso del brazo de un niño; con su *corteza* algo rugosa y fibrosa: las *ramitas de mas arriba* algo pendulas, filiformes, leñosas, cubiertas de una corteza mas tosca, de color entre ceniciento y pardo, con otras ramitas esparcidas, cortas, foliosas y variamente dobladas: las *hojas* alternas, amontonadas en las extremidades de las ramitas laterales, oblongas, ó entre oblongas y lanceoladas, mas anchas comunmente por arriba, obtusas, enterisimas, lampiñas en ambas partes, y del largo de dos, tres, ó quatro pulgadas; con los *peciolos* cortos, rollizos por debaxo, y algo planos por arriba: los *pedunculos* axilares, solitarios, pendulos, filiformes, sencillos y de una flor. *Loefl. loco citato.*

Ipeca-
cuanha

26. VIOLA *foliis ovalibus*, *marginibus subtusque pilosis*. *Suppl. p. 397.*

Viola Ipecacuanha. Syst. *Viola Ipecacuana.*
veg. ed. 13. p. 669.

Pombalia Ipecacuanha. *Pombalia Ipecacuana.*
Vand. fasc. 1761. p. 7. t. 1.

Viola grandiflora, Vero-~~X~~ *Viola* con la flor grande;
nice folio villosa. Barr.~~X~~ hoja como la de la *Veronica*
 æquin. 113. ~~X~~ y vellosa.

Cast. *Viola Ipecacuana*.

Habita en el Brasil. *h*

Produce la *raiz* fibrosa, blanca y ramosa: los *tallos* del
 largo de dos pies, derechos, rollizos, ramosos y lisos:
 las *hojas* alternas, con peciolo, elípticas, agudamente
 aserradas, lampiñas, y con los peciolos cortísimos: las
estipulas de dos en dos, escariosas, lanceoladas, aqui-
 lladas, con aristas y pelosas: las *flores* laterales, soli-
 tarias, cabizbaxas, y con el pedunculo mucho mas cor-
 to que las hojas: las *bracteas* de dos en dos, en medio
 del pedunculo, cortísimas, lanceoladas y pelosas por su
 ápice: el *caliz* de cinco hojuelas, y con puntitas rígidas
 en su margen: cinco *petalos* blancos; dos mas cortos
 que el caliz y lineares; dos poco mas largos, redobla-
 dos y escotados; y uno muy grande, terminado en se-
 ño obtuso, ancho, giboso por su base, sin espolon y
 vellosa por debaxo. *Vandeli*.

Muchos pretenden que la *raiz de la Ipecacuana blan-*
ca proviene de esta especie: y ciertamente no produce la
raiz como la de la Ipecacuana parda.

Dian- 27. *VIOLA caule serpen-*~~X~~ *Viola* con el tallo que ser-
 dra. *te; herbaceo, foliis oblon-*~~X~~ pea y herbáceo; hojas oblon-
gis, pedunculis unifloris.~~X~~ gas; y pedunculos de una
 Syst. veg. 669. † ~~X~~ flor.

Cast. *Viola* de dos estambres.

Habita::::

Arroja el *tallo* filiforme, y que serpeando trepa sobre
 las cercas: las *hojas* alternas y apartadas: los *peduncu-*
los solitarios, de una flor, con articulos, é incrasados;
 con dos *bracteas* menudas: la *corola* blanca: el *petalo*
superior echado, muy grande, y casi como un capacete
 boquiabierto y hendido en tres partes, el qual se extien-
 de por detrás en un nectario ó espolon muy largo y tor-
 cido: los *petalos laterales* ascendentes; y los de mas
abaxo mas pequeños y doblados ácia abaxo: cinco *estam-*
bres

2, 8 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID EN CIL.

bres de los quales los tres interiores se hallan esteriles, y los dos de atrás fertiles. *Allamand.*

Par- 28. *VIOLA caulibus dif-* Viola de tallos difusos,
viflora. *fusis debilibus polyphyllis,* debiles y con muchas hojas
foliis ovatis petiolatis ser- aovadas, pecioladas y aser-
ratis, floribus axillaribus radas; flores axilares y soli-
solitariis. Suppl. p. 396. *X* tarias.

Cast. Viola de flor pequeña.

Habita en las regiones mas calientes de la America meri-
dional. *Mutis.*

Tiene la traza como la de la *Veronica con hoja de Sérpol:* la raíz cilíndrica, del grueso de una pluma de paloma, ondeada, con eminencias, y cenicienta: los tallos casi del largo de un pie, difusos, algo volubles, filiformes, ramosos por su base, despues sencillos y algo vellosos: muchas hojas en el tallo y en las ramas, acercadas, con peciolo, aovadas, planas, lampiñas, obtusas y con cinco aserraduras en ambos lados: los pedunculos por todo el tallo axilares, la mitad mas cortos que la hoja, solitarios, derechos, desnudos, con una flor y mas pequeña que las demas de este género: la capsula pequeña y de tres celdillas.

Esta especie posee las raíces muy semejantes á las de la *Ipecuacana* en quanto á su traza y virtudes.

De- 29. *VIOLA caulescens,* Viola que arroja tallos,
cum- *procumbens, foliis lineari-* tendida, con hojas lineares
bens. *bus confertis.* Suppl. p. 397. *X* y amontonadas.

Cast. Viola tendida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Arroja los tallos tendidos, filiformes, algo ramosos y casi frutescentes: las hojas lineares, algo amontonadas, del largo de una pulgada, enterisimas, agudas y sin peciolo: las estipulas menudas, alesnadas y agudas: los pedunculos solitarios, mas largos que las hojas y axilares: las bracteas de dos en dos, menudas y colocadas en medio del pedunculo: la corola cerúlea y con espolon. Es muy parecida á la *Viola de tres colores.*

1200. Género IMPATIENS. * Riv. IV. 146.

Balsamina Tourn. t. 235.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de dos *hojuelas*, muy pequeñas, entre casi redondas y puntiagudas, iguales, colocadas ácia los lados de la flor, de color y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. boquiabierta, de cinco *petalos* desiguales; de los quales el *de mas arriba* α es casi redondo, plano, derecho, hendido ligeramente en tres partes, puntiagudo por su ápice y que constituye el *labio superior*:

Los dos *de mas abaxo* β γ iguales, redoblados, muy grandes, mas anchos ácia afuera, obtusos, irregulares, y que forman el *labio inferior*:

Y los *intermedios* δ ϵ iguales, opuestos y que nacen en la base del petalo α .

Neſtario de una pieza, que recoge el fondo de la flor á manera de un cucurucho, obliquo por su boca, que se levanta ácia afuera, y termina por su base en un cuernecillo.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, cortísimos, mas angostos ácia su base y encorvados: con otras tantas *anteras* unidas; pero divididas por su base.

PIST. *Germen* dentro de la flor, entre aovado y puntiagudo: *estilo* ninguno: *estigma* sencillo y mas corto que las anteras.

PERIC. *Capsula* de una celdilla, que se abre elasticamente en cinco ventallas las quales se envuelven en figura espiral.

SEM. muchas, casi redondas, y fixadas en el *receptaculo* columnar.

OBS. En algunas especies faltan los petalos δ y ϵ : y en otras el cuernecillo del neſtario.

La Capsula se diferencia en figura: en la Impacien-
te de Rivino se halla larga; y en la Balsamina del
mismo Rivino se observa aovada.

En la planta donde faltan los dos petalos, parece que
los

760 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

los tres están unidos por su base.

Llamase Impaciente porque hallandose el fruto maduro, al menor impulso se abre elasticamente.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.

BALSAMINA. p. 418.

La flor es anomala, de quatro petalos, ó de seis. El petalo superior de la flor de quatro petalos, es arqueado; el inferior cóncavo, y que por debaxo termina en una cola; y los dos laterales se hallan como orejillas y mas anchos. La flor de seis petalos es muy rara, y carece de cola: *Vea-se la tabla de Tournefort*. Su pistilo, acompañado de dos hojuelas, ocupa el centro de la flor, y pasa á fruto, unas veces de figura de trompo, otras semejante á una siliqua que consta de muchos musculos, ó como musculos, y que se abre elasticamente, saltando por una y otra parte, y llena de simientes casi redondas, fixadas al exe ó receptaculo.

ESPECIES CON LOS PEDUNCULOS DE UNA FLOR.

Chi- 1. IMPATIENS peduncu-
nensis lis unifloris solitariis, fo-
liis oppositis ovatis, necta-
riis arcuatis. X Impaciente con los pedun-
culos de una flor y solitarios;
hojas opuestas, aovadas; y
nectarios arqueados.

Cast. Impaciente de la China.

Habita en la China. ☉

Echa el tallo alternadamente ramoso y roxo: las hojas opuestas, sin peciolo, aovadas y algo aserradas: los pedunculos axilares, solitarios, mas largos que su hoja y de una flor: ésta de color purpúreo; con el nectario muy arqueado y craso.

Lati- 2. IMPATIENS peduncu-
folia. lis unifloris solitariis, foliis X Impaciente con peduncu-
ovatis serraturis lanceolatis, X los de una flor, solitarios;
nectariis flore longioribus. X hojas aovadas, con aserra-
duras lanceoladas; y necta-
rios mas largos que la flor.

Val-

Valli-onapu. Rheed. mal. \times \times Valli-onapu.

9. p. 91. t. 48.

Cast. Impaciente de hoja ancha.

Habita en la India. \odot

Posee las *hojas* lanceoladas, alternas, recortadas, con una punta rígida que sobresale desde cada feston: los *pedunculos* solitarios, de una flor, y casi de la longitud de las hojas: la *flor* grande, como la de la *Impaciente Balsamina*; pero con el *espolon* alesnado, y casi del largo del pedunculo.

Opo-
siti-
lia. 3. IMPATIENS *pedun-* \times Impaciente con peduncu-
culis unifloris aggregatis, \times los de una flor y agregados;
foliis oppositis linearibus. \times hojas opuestas, lanceoladas
Flor. zeyl. 314. \times y lineares.

Kondam-pallu. Rheed. \times \times Kondam-pallu.
mal. 9. p. 57. t. 31?

Cast. Impaciente de hojas opuestas.

Habita en lugares arenosos de Zeylan.

Cor-
nuta. 4. IMPATIENS *pedun-* \times Impaciente con peduncu-
culis unifloris aggregatis, \times los de una flor y agregados;
foliis lanceolatis, nectariis \times hojas lanceoladas; y necta-
flore longioribus. Fl. zeyl. \times rios mas largos que la flor.
316. \times

Balsamina latifolia, *flo-* \times Balsamina con hoja an-
ris calcari longissimo. Burm. \times cha; y espolon de la flor
zeyl. 41. t. 16. f. 1. \times larguísimo.

Cast. Impaciente cornuda.

Habita en Zeylan. \odot

Balsa-
mina. 5. IMPATIENS *pedun-* \times Impaciente con los pedun-
culis unifloris aggregatis, \times culos de una flor y agrega-
foliis lanceolatis, superio- \times dos; hojas lanceoladas, las
ribus alternis, nectariis flo- \times superiores alternas; y necta-
re brevioribus. Blackw. t. \times rios mas cortos que la flor.
583. Konore. del. Hort. 2. t. \times
B. 3. flore pleno. \times

552 FLOR. HERM. CON ANTER. UNID. EN CIL.

Impatiens pedunculis confertis unifloris. Hort. cliff. 428. Impaciente con pedunculos amontonados, y de una flor.

Lacca herba. Rumph. amb. 5. p. 274. t. 90. Yerba Lacca.

Tilo-onapu seu nolengu. Rheed. mal. 9. p. 101. t. 52. Tilo-onapu ó nolengu.

Balsamina fœmina. C. B. P. 306. Tourn. p. 418. Balsamina hembra.

Balsamina. Dod. pent. 671. Balsamina.

Cast. Impaciente Balsamina. *vulgo*: Nicaragua.
Habita en la India. ☉

ESPECIES CON PEDUNCULOS DE MUCHAS FLORES.

Tri- 6. IMPATIENS *pedunculis trifloris solitariis, foliis angusto-lanceolatis.* Fl. zeyl. 315. Impaciente con pedunculos de tres flores, solitarios; hojas entre angostas y lanceoladas.

Balsamina angustifolia, floribus ternis communi pedunculo ortis. Burm. zeyl. 41. t. 116. f. 2. Balsamina con hoja angosta; flores de tres en tres y nacidas en un pedunculo comun.

Balsamina erecta, seu fœmina, Persicæ angusto folio, Zeylanica. Herm. par. 105. t. 105. Balsamina de Zeylan, derecha, ó hembra, con hoja como la del Persico y angosta.

Cast. Impaciente de tres flores.

Habita en lugares pantanosos de Zeylan.

Noli- 7. IMPATIENS *pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumulentibus.* Gmel. sib. 4. p. 102. Flor. dan. t. 588. Impaciente con pedunculos de muchas flores, solitarios; hojas aovadas; y nudos de los tallos hinchados.

Impatiens caule geniculato, pedunculis ramosis, foliis petiolatis, ovatis, cre- natis. Hall. helv. 557. Impaciente de tallo con nudos; pedunculos ramosos; hojas con peciolo, aovadas y recortadas.

Bal-

<i>Balsamita lutea</i> , Poloni-	X	Balsamina de Polonia, con
ca. Barr. ic. 1297. R.	X	la flor amarilla.
<i>Balsamina lutea</i> , sive no-	X	Balsamina con la flor ama-
<i>li me tangere</i> . C. B. P. 306.	X	rilla, ó no quieras tocarme.
Tourn. p. 419.	X	
<i>Noli me tangere</i> . Col.	X	No quieras tocarme.
ecphr. 1. p. 149. t. 150.	X	

Cast. Impaciente No quieras tocar.

Habita en los bosques sombríos de la Europa y del Cana-

dá. 26

Es *planta* que no sufre el calor; por lo que no se halla con frecuencia sino en lugares sombríos y húmedos del Septentrion. Es tierna y delicada, tanto, que al menor impetu de las aguas ó del ayre se rompe, se marchita y desvanece. Quando las *siliquas* se perficionan, si el ayre sopla, se caen y quebrantan, arrojando las *semillas* sin madurar; por cuyos motivos la pusieron el nombre trivial de *No quieras tocarme*.

Tiene el *tallo* del largo de dos pies, tierno, verde, y por debaxo de color purpúreo, nudoso, xugoso, liso, hueco y transparente: las *hojas* alternas, y algo semejantes á las de la *Mercurial annua* ú *hortense*; aunque algo mas grandes, mas largas, aserradas, y cerca del peciolo con dientes mas largos y agudos.

CLASE XX.

GYNANDRIA. DE LAS FLORES CUYOS ESTAMBRES SE HALLAN SENTADOS EN EL PISTILO.

ORDEN I.

DIANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS ESTAMBRES.

<i>Generos.</i>	<i>Caracteres sobresalientes.</i>
1201 ORCHIS.	NECTARIO en forma de cuernecillo , y detrás de la flor.
1202 SATYRIUM.	NECTARIO en forma de escroto ó hinchado , mellizo y detrás de la flor.
1203 OPHRYS.	NECTARIO algo aquillado por debaxo.
1204 SERAPIAS.	NECTARIO aovado , giboso ; con su <i>labio</i> aovado.
1205 LIMODORUM. . .	NECTARIO de una pieza , cóncavo , con piececito y puesto dentro del petalo inferior.
1206 ARETHUSA.	NECTARIO tubuloso , dentro del fondo de la corola ; y el <i>labio inferior</i> pegado al estilo.
1207 CYPRIPIEDUM. . .	NECTARIO ventricoso ó hinchado , y cóncavo.
1208 DISA. <i>Suppl. p. 59.</i>	ESPATA de una ventalla : tres <i>petalos</i> ; y el <i>tercero</i> menor , dividido en dos partes , y giboso por su base.
1209 EPIDENDRUM. . .	NECTARIO cónico—inverso , obliquo y redoblado.
1210 FORSTERA. <i>Suppl. p. 59.</i>	PERIANTIO doble ; el <i>exterior</i> debaxo de la flor y de tres hojuelas ; el <i>interior</i> enci-

DE LAS MISMAS FLOR. CON II. ESTAMB. 765

cima de la flor , hendido en seis partes : y la *corola* tubulosa.

- 1211 GUNNERA. AMENTO con escamas de una flor : *corola* ninguna : *germen* con dos dientes : *estilos* dos : y *semilla* una.

ORDEN II.

TRIANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON TRES ESTAMBRES.

- 1212 SISYRINCHIUM. . CON UN PISTILO: *espata* de dos hojuelas : *petalos* seis y planos : *capsula* de tres celdillas y debaxo de la flor.
- 1213 FERRARIA. CON UN PISTILO: *espata* de una flor : *petalos* seis, entre hendidos y crespados : *estigmas* á manera de cucurucho: *capsula* de tres celdillas y debaxo de la flor.
- 1214 SALACIA. CON UN PISTILO: *caliz* partido en cinco lacinias : *corola* de cinco *petalos*: y *anteras* sentadas en el ápice del *germen*.
- 1215 ESTILAGO. CON UN PISTILO : *caliz* de una pieza y casi hendido en tres lóbulos: *corola* ninguna : y *baya* globosa.

ORDEN III.

TETRANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CUATRO ESTAMBRES.

- 1216 NEPENTHES. . . . CON UN PISTILO: *caliz* partido en quatro lacinias : *corola* ninguna : y *capsula* de quatro celdillas.

PO-

1766 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

1217 POTHOS. ESPATA : *espadice* sencillo ,
cubierto con florecitas : *caliz* ninguno : *petalos* quatro :
estambres quatro : y *bayas*
de dos semillas.

La *Cleome fruticosa* tiene los mismos caracteres , y se halla en la clase *Tetradinamia siliquosa*.

ORDEN IV.

PENTANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO ESTAMBRES.

1218 GLUTA. CON UN PISTILO : *caliz* en forma de campana , y que cae quando las demas partes de la flor : *petalos* cinco , y pegados por debaxo de la columna del germen : *filamentos* insertos en el remate de la columna : y *germen* sentado en la columna.

1219 AYENIA. CON UN PISTILO : *caliz* de cinco hojuelas : *petalos* unidos en forma de estrella , con uñas largas : *anteras* cinco , debaxo de la estrella : y *capsula* de cinco celdillas.

1220 PASSIFLORA. . . . CON TRES PISTILOS : *caliz* de cinco hojuelas : *nectario* coronado : y *baya* con piececito.

La *Aristolochia* de cinco estambres pertenece al orden de seis estambres por ser este su caracter natural.

La *Helicteres pentandra* corresponde al orden de diez estambres.

ORDEN V.

HEXANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON SEIS ESTAMBRES:

1221 ARISTOLOCHIA. . CON SEIS PISTILOS: *caliz* ninguno: *corola* de un petalo, en forma de lengüeta y entera: *capsula* de seis celdillas y debaxo de la flor.

1222 PISTIA. CON UN PISTILO: *caliz* ninguno: *corola* de un petalo, en forma de lengüeta y entera: *anteras* seis, ú ocho, sentadas en un filamento: *capsula* de una celdilla, y colocada en el fondo de la corola.

ORDEN VI.

OCTANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON OCHO ESTAMBRES.

1223 SCOPOLIA. *Suppl.* 60. CALIZ de dos hojuelas, y con muchas flores: *corola* hendida en quatro partes: y *anteras* unidas en dos columnas, de las quales la una está puesta sobre la otra.

ORDEN VII.

DECANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DIEZ ESTAMBRES.

1224 KLEINHOVIA. . . . CON UN PISTILO: *caliz* de cinco hojuelas: *petalos* cinco: *nectario* en forma de campana, con pedunculo que lleva los estambres: y *capsula* inflada y de cinco caxitas.

1225 HELICTERES. . . . CON CINCO PISTILOS: *caliz* de una pieza y obliquo: *petalos*

768 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

*los cinco : néctario de cinco
hojuelas : capsulas cinco, y
torcidas ácia dentro.*

ORDEN VIII.

DODECANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOCE HASTA
DIEZ Y NUEVE ESTAMBRES.

- 1226 CYTINUS. CON UN PISTILO : *caliz* hendi-
do en quatro partes, y enci-
ma del germen : *corola* nin-
guna : *anteras* diez y seis :
baya de ocho celdillas y con
muchas simientes.

La *Crateva gynandria*, y *Crateva tapia* tienen estos
mismos caracteres, y pertenecen á la clase *Dodecandria*.

La *Helicteres apetala* posee tambien estos caracteres,
y corresponde al orden de diez estambres.

ORDEN IX.

POLYANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE VEINTE
ESTAMBRES.

- 1227 XYLOPIA. CON UN PISTILO : *caliz* de una
pieza : *petalos* seis : *estam-
bres* seis exteriores y mas
gruesos : y la *drupa* seca.
- 1228 GREWIA. CON UN PISTILO : *caliz* de cin-
co hojuelas : *petalos* cinco,
con una escama néctarífera
en su base : y *baya* de qua-
tro celdillas.
- 1229 AMBROSINIA. . . ESPATA : la una hojuela divi-
dida por medio de un dise-
pimento ó entretela : *estam-
bres* en el lado interior : y
pistilos en el exterior.
- 1230 ARUM. ESPATA de una pieza, en for-
ma

- ma de cucurucho: *espadice* desnudo por arriba, con flores femeninas por debaxo, y estambroso en medio.
- 1231 DRACONTIUM. ESPATA en forma de navecilla: *espadice* cubierto: *caliz* ninguno: *petalos* cinco: y bayas con muchas semillas.
- 1232 CALLA. ESPATA plana: *espadice* cubierto con florecitas: *caliz* ninguno: *petalo* ninguno: y bayas con muchas semillas.
- 1233 ZOSTERA. ESPADICE linear, y que lleva el fruto en un lado: *caliz* ninguno: *corola* ninguna: *estambres* alternos: *semillas* solitarias y alternas.

La *Helicteres* de Cartagena tiene tambien estos mismos caracteres, y corresponde al orden de diez estambres de esta misma clase.

CLASE XX.

GYNANDRIA. DE LAS FLORES CUYOS ESTAMBRES SE HALLAN SENTADOS EN EL PISTILO.

La clase *Gynandria* se distingue de las demas , por la situacion de los estambres en el *estilo* , ó en un *receptaculo* alargado en forma de estilo , que lleva el pistilo junto con los estambres y pasa á ser una parte del mismo pistilo.

OBSERVACION.

El primer orden de esta clase , que se llama de dos estambres , es natural , y los generos que van comprendidos en el se distinguen entre sí , casi por la sola consideracion del nectario ; cuya nota prefiere Linneo para la constitucion de dichos generos ; aunque no la hayan admitido los Botánicos antecesores.

La estructura de la fructificacion del mismo orden es del todo singular , y en la forma siguiente.

Tiene cinco *petalos* , de los cuales los *dos interiores* están las mas veces arrimados entre sí , y en forma de capete. El *labio* ó *petalo inferior* constituye el nectario , el qual ocupa el lugar del pistilo , y de un sexto petalo. El *germen* se halla siempre debaxo de la flor , y retorcido ; con el *estilo* y *estigma* pegados á la margen interior del nectario ; de suerte que apenas pueden distinguirse. Posee siempre dos *filamentos* cortísimos , con otras tantas *anteras* mas angostas por debaxo , desnudas ó sin cubierta , y divisibles como la pulpa de Cidra ; y éstas están dentro de dos celdillas abiertas por debaxo , y puestas sobre la misma margen interior del nectario. El *fruto* es una capsula de una celdilla , y de tres ventallas , que se abre por los ángulos aquillados debaxo de sus lomos. Las *semillas* son numerosas , en forma de serrin , y fixadas al *receptaculo* linear , en cada ventalla.

En el exámen y cotejo de los caracteres genericos de esta clase , se debe atender primero al pistilo que á los es-
tam.

tambres, si se quiere tener una idea distinta de la situacion de estos.

Podia *Linneo*, sino debia, poner á otras clases la *Calla*, el *Taro*, el *Draconcio*, el *Pothos* y la *Zostera*; pero siendo muy dificultoso determinar el número cierto de los estambres de estos generos, prefirió colocarlos en esta clase, antes que causar molestia á los que quisiesen ó debiesen exâminarlos.

Todos los autores atribuyen la virtud afrodisiaca á las plantas que pertenecen al orden segundo de esta clase.

CLASE XX.

GYNANDRIA. DE LAS FLORES CUYOS ESTAMBRES SE HALLAN SENTADOS EN EL PISTILO.

ORDEN I.

DIANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS ESTAMBRES.

1201. Género ORCHIS. * *Tourn. t. 247.* Limodorum.
Tourn. t. 250.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espatas* vagas ó apartadas: y *espadice* sencillo.
Periantio ninguno.

COR. *Petalos* cinco; *tres exteriores* y *dos interiores* arri-
mados ácia arriba entre sí, y en forma de capacete.

Nectario de una pieza, fixado en el receptaculo desde el lado inferior entre la division de los petalos: el *labio superior* derecho y cortísimo; el *inferior* grande, extendido y ancho: con el *tubo* por la parte de abaxo en forma de cuernecillo inclinado.

ESTAMB. *Filamentos* dos, muy delgados, cortísimos y sentados en el pistilo: con las *anteras* aovadas al revés, derechas y cubiertas con un pliegue de dos celdillas del labio superior del nectario.

PIST. *Germen* oblongo, retorcido y debaxo de la flor: *estilo* pegado al labio superior del nectario, y cortísimo: con el *estigma* comprimido y obtuso.

PERIC. *Capsula* oblonga, de una celdilla, con tres quillas, de tres ventallas, que se abre en tres partes debaxo de las quillas, y aquellas unidas ó arrimadas entre sí por su ápice y base.

SEM. numerosas, muy pequeñas y en forma de serrin.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT.

ORCHIS. p. 431.

La flor es de muchos petalos y anomala, ó que consta de seis petalos desemejantes, de los quales los cinco superiores se hallan dispuestos de forma, que en algun modo representan un morrion ó capacete; y el sexto inferior de muchas maneras; comunmente en forma de cabeza, y con cola, representando unas veces á un hombre desnudo, otras á una mariposa, á un zangano, una paloma, una mona, un lagarto, un papagayo, una mosca y á otros animales. El caliz pasa á fruto, ú odrecillo que se abre en tres ventanas, á las quales están arrimadas las ventallas, llenas de simientes muy menudas y á manera de serrin. A estas notas se añaden las de las raices carnosas y con fibras, á veces casi redondas, y á manera de testiculos; otras veces comprimidas y que rematan casi en forma de dedos.

LIMODORUM. p. 437.

La flor es de muchos petalos y anomala, semejante á la del Orchís; cuyo caliz pasa á fruto ú odrecillo que se abre en tres ventanas á las quales están arrimadas las ventallas llenas de simientes muy menudas y á manera de serrin.

ESPECIES.

Bicor-
nis.

1. ORCHIS *bulbis indivisis*, corollæ *galea bicalcarata*, labio *quinque-partito*. Orchís ó testiculo de bulbos indivisos; capacete de la corola con dos espolones; y el labio dividido en cinco partes.

Amœn. acad. 6. afr. 90. *Orchis lutea*, caule *geniculato*. Buxb. cent. 3. p. 6. t. 6. Orchís con la flor amarillada; y el tallo nudoso.

Cast. Orchís de dos espolones.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Es notable por el espolon mellizo, y por provenir este del capacete y no del labio.

774 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Biflora 2. ORCHIS *bulbis indivisis*, *corollæ galea unicalcarata*, *alis patentibus*, *labio lanceolato acuminato*. Amoen. acad. 6 afr. 92. Orchis de bulbos indivisos; capacete de la corolarata, alis patentibus, la la con un solo espolon; alas extendidas, labio lanceolado y puntiagudo.

Cast. Orchis de dos flores.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Cor-nuta. 3. ORCHIS *bulbis indivisis*, *corollæ galea unicalcarata*, *alis patentibus*, *labio minimo subovato*. Amoen. acad. 6. afr. 91. Orchis de bulbos indivisos; capacete de la corola calcarata, alis patentibus, con un espolon; alas extendidas; labio muy pequeño y casi aovado.

Cast. Orchis cornudo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Spa-thulata 4. ORCHIS *bulbis indivisis*, *corollæ galea calcarata*, *labio cordato longissime pedicellato*. Suppl. p. 398. Orchis de bulbos indivisos; capacete de la corolarata, labio cordato longisima con espolon; labio de figura de corazon y con piececito larguísimo.

Cast. Orchis en forma de espátula.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Produce muchas hojas radicales, lineares y la mitad mas cortas que el tallo: el *escapo* ó tallo del largo de un xeme, envaynado con hojas agudas, escariosas y mas anchas: dos flores comunmente y alternas: el *germen* oblongo, pedunculado y debaxo de la flor: el *capacete* de la corola de hechura de corazon, con piececito y espolon muy corto: dos *petalos* laterales, aovados y puntiagudos: el *labio* de figura de corazon, con piececito filiforme, y al doble mas largo que la flor.

Flexuosa 1. 5. ORCHIS *culmo flexuoso*, *corollæ galea calcarata*, *petalis duobus lineatis furcatis*. Suppl. p. 398. Orchis con la caña ondeadada; capacete de la corola con espolon; dos petalos rayados y ahorquillados.

Cast. Orchis ondeado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm.

Echa

Echa la *raiz* tuberosa: el *escapo* ó *caña* del largo de medio pie, filiforme, y ondeado por arriba de una hojuela del mismo escapo: las *hojas* radicales, aovadas, agudas y con peciolo: *tres* ó *quatro* en el tallo, pequeñas, que envaynan por su base y lanceoladas: el *racimo* de tres, ó cinco flores, apartadas y con piececito: el *petalo superior* lanceolado, derecho, con el espolon del largo de la flor y que sale fuera por detrás: el *segundo* y *tercero interiores* cortos, lineares y con dos dientes en su ápice: el *quarto* y *quinto* lanceolados, y algo mas largos que el primero: el *labio* alesnado, y con un diente por su base en ambos lados.

Tri-
petalo-
oides.

6. ORCHIS *foliis lanceo-* Orchís de hojas lanceola-
latis, corollæ galea fornica- das; capacete de la corola
ta obtusa calcarata, necta- arqueado, obtuso y con es-
rio lanceolato minimo. Sup- polon; nectario lanceolado
pl. p. 398. y muy pequeño.

Cast. Orchís como de tres petalos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Tiene la *caña* del largo de un pie y lisa: muchas *hojas* radicales, lanceoladas, y del largo de quatro dedos; cerca de ocho en el tallo, alternas, lanceoladas, del largo de una pulgada y amplexicaules: la *espiga* de muchas flores alternas y separadas: el *petalo primero* casi redondo, muy arqueado, y por detrás con un cuernecillo de figura cónica y larguísimo; el *segundo* y *tercero* oblongos, cortísimos y unidos con los genitales; el *quarto* y *quinto* casi redondos, extendidos y mayores que los restantes; por lo que sobresaliendo mas el primero, quarto y quinto parece que la flor es de tres petalos; con el *labio* muy pequeño, lanceolado y obtuso.

Sagit-
talis.

7. ORCHIS *corollæ galea* Orchís con el capacete de
calcarata biaurita, labio la corola con espolon, y dos
lanceolato. Suppl. p. 399. orejillas; y el labio lanceo-
lado.

Cast. Orchís de saeta.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrman.

Echa *quatro* ó *cinco* *hojas* radicales, la mitad mas cortas que

776 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

que la caña, lanceoladas y algo obtusas: la *caña* del largo de un xeme, toda vestida de vaynas foliaceas, membranosas y agudas: la *espiga* corta: el *petalo primero* cóncavo y con una puntita á manera de saeta; con dos orejillas agudas, y que miran ácia atrás; y el espolon corto; el *segundo* y *tercero* opuestos á los genitales, muy puntiagudos, anchos por su base, y no mas cortos que el de arriba; el *quarto* y *quinto* elípticos y de la longitud de los demas.

Bar- 8. ORCHIS *corollæ galea erecta calcarata, nectario subtrifido ciliato.* Suppl. p. 399. Orchís con el capacete de la corola con espolon; nectario casi hendido en tres partes y pestañoso.

Cast. Orchís barbado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrman.

Arroja los *bulbos* oblongos, indivisos y muy pelosos: el *escapo* del largo de un pie, sin hojuelas, y del grueso de una pluma de Gorrion: muchas *hojas* setáceas ó lineares; unas mas cortas, y otras casi de la longitud del *escapo*: el *petalo superior* aovado, con el espolon levantado por detrás: los *petalos laterales próximos* entre aovados y oblongos, del largo del superior y extendidos; los *dos próximos interiores* cortísimos, y colocados en los lados de los genitales: el *labio* lanceolado, casi hendido en tres partes, con pestañas ramosas, obtusas y del largo de la flor: y el *germen* encorvado ácia atrás.

Dra- 9. ORCHIS *bulbis indivisis, corollæ galea calcarata, nectario lineari apice ovato.* Suppl. p. 400. Orchís con los bulbos indivisos; capacete de la corola con espolon; nectario lineal y por su ápice aovado.

Cast. Orchís de Dragón.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrman.

Tiene el *escapo* del largo de pie y medio, del grueso de una pluma de Ganso, y todo envaynado con hojas: las *hojas radicales*, lanceoladas, del ancho de una pulgada y la mitad mas cortas que el *escapo*; las *del tallo* que todas envaynan, agudas y con venas en redecilla: la

la *espiga* con pocas flores, y un poco apartadas: las *brácteas* entre anchas y lanceoladas, con venas en redécilla y del largo del germen: el *petalo superior* aovado al revés, mayor, algo arqueado, con el espolon por detrás y larguísimo como el germen; dos *petalos laterales* en ambas partes y lanceolados: el *labio* linear, aovado por su ápice y de la longitud de los petalos.

Te-
nella. 10. ORCHIS *corollæ ga-* Orchis con el capacete de
lea calcarata basi conica, la corola con espolon, cóni-
nectario lineari. Suppl. p. co en su base; y nectario li-
400. near.

Cast. Orchis tiernecito.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Sparrman.*

Posee la *caña* muy corta: las *hojas radicales*, y las del tallo lineares: la *espiga* oblonga, con cinco hasta ocho flores: el *petalo primero* aovado, con el espolon cónico en su base; el *segundo* y *tercero* arrimados entre sí debaxo del primero y semejantes; el *quarto* y *quinto* laterales y extendidos: y el *labio* linear.

Fili-
comis. 11. ORCHIS *corollæ nec-* Orchis con el nectario de
tario bifido, cornu capillari. la corola hendido en dos
Suppl. p. 400. partes; y el cuernecillo ca-
pilar.

Cast. Orchis con el cuernecillo filiforme.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Arroja la *caña* del largo de medio pie, y aun mas, y algo ondeada: muchas *hojas radicales*, lineares, agudas y cortas; y las del tallo lanceoladas y puntiagudas: la *espiga* de ocho, ó nueve flores apartadas: y los *gérmenes* cubiertos con una *bráctea*: el *petalo superior* con piececito, arqueado, y entre oval y oblongo; los *laterales* sin piececito y ascendentes: el *nectario* dentro de la flor, derecho, cónico-inverso y á manera de cucurucho: el *labio superior* hendido en dos partes y obtuso; y el *inferior* del mismo modo: el *cuernecillo* ó *espolon* capilar, pendiente y del largo de los petalos.

778 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Hipidula. 12. ORCHIS *culmo aphyll-* Orchis con la caña sin ho-
lo, *foliis reniformibus*. Sup- juelas; y las hojas en forma
pl. p. 401. de riñon.

Cast. Orchis erizadito.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrman.

Tiene la raíz con testiculos: dos hojas radicales, en forma de riñon, erizadas y amplexicaules: el escapo del largo de medio pie, erizado y sin hojuelas: la espiga erizada, con flores que miran á un lado y menudas: los tres petalos exteriores en forma de caliz, aovados y vellosos: los dos interiores lineares, lampiños y al doble mas largos: el labio del nectario con cinco lacinias lineares: el cuernecillo encorvado ácia adentro y del largo de la flor.

Tipuloides. 13. ORCHIS *nectarii la-* Orchis con el labio del
bio *tripartito lineari sub-* nectario dividido en tres par-
æquali, cornu filiformi lon- tes, linear y casi igual; cuer-
gissimo. Suppl. p. 401. necillo filiforme y muy largo.

Cast. Orchis como Tipula. Es nombre de un insecto del género de la Chinche.

Habita en Kamtschatka.

Echa las hojas radicales, entre lanceoladas y aovadas, y con peciolo: el escapo sin mas hojuelas que una pequeña en medio y lanceolada: las flores en espiga oblonga y alternas: el labio superior aovado, hendido en tres lacinias, y la del medio mas larga; el inferior poco mas largo, partido en tres lacinias casi iguales y lineares: el cuernecillo filiforme, y seis veces mas largo que los petalos.

Speciosa. 14. ORCHIS *bulbis indi-* Orchis con bulbos indivi-
visis, *scapo folioso, foliis* sos; escapo folioso; hojas
latis ovatis, labello quin- anchas, aovadas; labio pe-
que partito, lacinii flexuo- queño y partido en cinco la-
sis. Suppl. p. 401. cinias ondeadas.

Cast. Orchis hermoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

El racimo es grande, con muchas flores grandes y blanquissimas.

OR-

Sancta 15. ORCHIS *bulbis indivi-* X Orchís con los bulbos in-
visis? nectarii labio lanceo- X divisos? labio del nectario
lato quinquedentato, cornu X lanceolado, con cinco dien-
incurvo, petalis conniventibus. X tes; cuernecillo encorvado
X ácia adentro; y petalos arri-
X mados entre sí.

Cast. Orchís Santo.

Habita en Palestina.

Posee el tallo del largo de un pie, la mayor parte desnudo, y por arriba vestido con una ú otra hojuela aguda: el racimo laxo; con bracteas lanceoladas y de la longitud del germen: tres petalos puntiagudos, que unidos forman el capacete oblongo, pero separados en su ápice: el labio entré ancho y lanceolado, dividido en cinco dientes agudos, y los intermedios gradualmente mas largos.

Susannæ. 16. ORCHIS *bulbis indivi-* X Orchís con bulbos indivi-
visis, nectarii alis amplioribus ciliatis. X sos; alas del nectario mas
X anchas y pestañosas.

Orchis Amboinensis, floribus albis fimbriatis. Herm. X Orchís de Amboina, con
X flores blancas y cortadas en
parad. 209. t. 209. Rai. X flecos.

Suppl. p. 588.

Flos Susannæ. Rumph. X Flor de Susana.

amb. 5. p. 286. t. 287. f. 2. X

Cast. Orchís de Susana.

Habita en la Amboina. La llamó Rumphio, Flor de Susana, en memoria de una Compañera suya que se llamaba así, la qual le ayudaba á buscar plantas, y fue la primera que la encontró.

Ciliatis. 17. ORCHIS *bulbis indivi-* X Orchís con bulbos indivi-
visis, nectarii labio lanceo- X sos; labio del nectario lan-
lato ciliato, cornu longissi- X ceolado, pestañoso; y cuer-
mo. Act. ups. 1741. p. 6. X necillo larguísimo.

Gron. virg. 136. X

780 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Orchis nectarii labio lanceolato ciliato, seta germine intorto longiore. Roy. lugdb. 15. Orchís con el labio del nectario lanceolado, pestafioso; y la cerda mas larga que el germen torcido ácia adentro.

Orchis Marilandica, grandis & procera, floribus luteis, calcar longissimo, lobulo fimbriato. Rai. Suppl. p. 588. Orchís de Marilandia, grande y muy levantado, con flores amarillas; espolon larguísimo; y lóbulo ó labio hendido en flecos.

Cast. Orchís pestafioso.

Habita en la Virginia y en el Canadá. 24

Habana. 18. ORCHIS *bulbis indivisis? nectarii labio tripartito, lateralibus setaceis, cornu filiformi, petalis decuplo longiore.* Amoen. acad. 5. p. 408. Orchís con bulbos indivisos? labio del nectario partido en tres lacinias, y las laterales setáceas; cuernecillo filiforme, y diez veces mas largo que los petalos.

Satyrium erectum, foliis oblongis, petiolis vaginatis amplexicaulibus, spica terminali, nectariis longissimis. Brown. jam. 324. Satyrio levantado, con hojas oblongas; peciolo con vayna, que abrazan el tallo; espiga terminal; y nectarios larguísimos.

Cast. Orchís de la Habana.

Habita en la Jamaica y en la Habana.

Bifolia 19. ORCHIS *bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longissimo, petalis patentibus.* Act. ups. 1740. p. 5. Mat. med. 224. Flor. dan. t. 235. Blackw. t. 588. Orchís con bulbos indivisos; labio del nectario lanceolado y enterísimo; cuernecillo larguísimo; y petalos extendidos.

Orchis radicibus oblongis, labello lineari. Hall. helv. n. 1285. t. 35. Orchís con las raices oblongas; y el labio linear.

Satyrium flore albo. Riv. t. 12. Satyrio con la flor blanca.

DE LAS MISMAS FLOR. CON II. ESTAMB. 781

Orchis alba, bifolia, minor, calcari oblongo. C. B. P. 83. Tourn. p. 433. Vaill. par. 151. t. 30. f. 7. Segui. ver. t. 15. f. 10. Orchís menor, de dos hojas, con la flor blanca; y el espolon oblongo.

Orchis serapias, I. Dod. pempt. 237. Orchís serapias, primero.

Testiculi species quinta. Cam. epit. 625. Quinta especie de Testiculo.

Orchis trifolia, major minor. C. B. P. 83. Tourn. p. 433. Orchís mayor y menor, con tres hojas. α

Orchis bifolia, altera. C. B. P. 82. Tourn. p. 433. Otra Orchís con dos hojas. β

Orchis hermafroditica, bifolia. Bauh. hist. 2. p. 772. Orchís hermafroditica, con dos hojas.

Orchis bifolia, latissima. C. B. P. 82. Tourn. p. 433. Orchís de dos hojas muy anchas

Orchis prima, amplissimis foliis. Clus. hist. 1. p. 267. Orchís primera, con hojas muy anchas.

Cast. Orchís de dos hojas. *Farm.* Radix satyrionis seu satyrii.

Habita entre pastos ásperos de Europa: en Aragon, Cataluña, Alcarria y en otras muchas partes de España. 26

Tiene la flor blanca: los petalos exteriores extendidos: el labio lanceolado y enterísimo: y el espolon alesnado y larguísimo.

PROPIED. La raíz es mucilaginoso, anodina, encrasante y obtundente, afrodisiaca y analeptica: se usa en la esterilidad, en la tabes y disenteria.

Fle-
nuosa
II.

20. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio imbricato, petalis duobus occultatis filiformibus, scapo flexuoso. Amœn. acad. 5. afr. 89. Orchís con bulbos indivisos; labio del nectario apinado; dos petalos escondidos, filiformes; y escapo ondeado.

Cast. Orchís ondeado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

OR-

782 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

- Cucul- 21. ORCHIS *bulbis indivi-* Orchís con bulbos indivi-
lata. *visis, nectarii labio trifido,* sos; labio del nectario hen-
petalis confluentibus, caule dido en tres partes; petalos
nudo. Pall. it. 3. p. 265. confluentes; y tallo desnudo.
Orchis radice rotunda, Orchís con la raiz redon-
cucullo tridentato. Gmel. da; y el cucurucho con tres
sib. 1. p. 16. t. 3. f. 2. dientes.

Cast. Orchís de cucurucho.

Habita en la Siberia. 24

Tiene las *hojas* radicales, aovadas y de dos en dos.

- Glo- 22. ORCHIS *bulbis indivi-* Orchís con los bulbos in-
bosa. *visis, nectarii labio resupi-* divisos; labio del nectario
nato trifido, media emargi- resupinado, hendido en tres
nata, cornu brevi, petalis lacinias, y la del medio es-
apice subulatis. Jaq. vind. cotada; cuernecillo corto;
292. austr. t. 265. y petalos alesnados por su
ápice.

Orchis radicibus subro- Orchís de raíces casi re-
tundis, spica densissima, dondas; espiga muy densa;
petalis exterioribus arista- y petalos exteriores con aris-
vis. Hall. helv. n. 1272. t. ta.
27. Opusc. 226.

Orchis flore globoso. C. B. Orchís con la flor globo-
P. 81. Tourn. p. 432. sa.

Orchis rotundus, Dale- Orchís con la flor redonda,
champi. Bauh. hist. 2. 765. de Dalechâmpio.
lugdb. 1556.

Cast. Orchís globosa.

Habita en Suiza, Austria, Carniola y en Alemania.

Posee los *bulbos* fusiformes: la *espiga* muy densa y corta:
las *flores* resupinadas, de color que tira á purpúreo;
con el *labio* hendido en tres lacinias, y la del medio
escotada: con el *espolon* mas corto que el germen.

Pyra-
midalis

23. *Orchis bulbis indivisis, nectarii labio bicornis trifido equali integerrimo, cornu longo, petalis sublan- ceolatis.* Jaq. vind. 292. austr. t. 266.

Orchis radicibus subrotundis, spica densa, calcar longissimo, labello bicorni, æqualiter tripartito. Hall. helv. n. 1286. t. 35.

Orchis bulbis indivisis, nectarii labio trifido antice bidentato: cornu longo, petalis acuminatis. Act. ups. 1740. p. 7.

Orchis radicibus subrotundis, bracteis flore brevioribus, nectarii labio trifido, seta longissima. Hort. cliff. 429.

Orchis purpurea, spica congesta, pyramidalis. Rai. angl. 3. p. 377. t. 18. Segui. ver. t. 15. f. 11.

Orchis flore conglomerata. Riv. t. 14.

Cynosorchis militaris montana, spica rubente, conglomerata. C. B. P. 81. prodr. 28. Tourn. p. 432. Sub orchide.

^a *Cynosorchis latifolia, hian- te cucullo, altera.* C. B. P. 81.

^β *Cynosorchis latifolia, spica compacta.* C. B. P. 81.

Cynosorchis tertius. Dod. pempt. 135.

Orchís de bulbos indivi- sos; labio del nectario con dos astitas, hendido en tres lacinias iguales y enterisi- mas; cuernecillo largo; y petalos casi lanceolados.

Orchís con raices casi re- dondas; erpiga densa; espo- lon larguísimo; labio con dos astitas, y partido en tres lacinias iguales.

Orchís de bulbos indivi- sos; labio del nectario hen- dido en tres partes, con dos dientes por delante y cuerne- cillo largo; y petalos pun- tiagudos.

Orchís con las raices casi redondas; bractees mas cor- tas que la flor; labio del nec- tario hendido en tres partes; cuernecillo larguísimo y co- mo una cerda.

Orchís con la flor purpú- rea; espiga amontonada y piramidal.

Orchís con la flor conglo- bada.

Cynosorchís militar, mon- tano, con la espiga de color que tira á roxo, y congloba- da.

Otro Cynosorchís con ho- ja ancha; y flor como un cu- curucho abierto. ^α

Cynosorchís de hoja an- cha, con la espiga compacta. ^β

Cynosorchís ó Testiculo de perro, tercero.

Or-

Orchis latifolia, *spica* \times Orchís con hoja ancha; y
compacta. Tourn. p. 432. \times espiga compacta.

Cast. *Orchis pyramidal*.

Habita en Suiza, Flandes, Inglaterra y Francia: en
 Cataluña y otras partes de España. \mathcal{U}

Tiene la flor de color purpúreo: los *petalos* entre aovados
 y lanceolados, y los laterales redoblados: el *labio* con
 dos astitas, hendido en tres partes, igual y enterísimo:
 y el *espolon* muy largo.

Corio-
 phora.

24. ORCHIS *bulbis indivi-* \times Orchís con bulbos indivi-
visis, *nectarii labio trifido* \times sos; labio del nectario hen-
reflexo crenato, cornu brevi, \times dido en tres partes, redobla-
petalis conniventibus. Act. \times do, recortado; cuernecillo
 ups. 1740. p. 8. Jaq. austr. \times corto; y petalos arrimados
 t. 122. Flor. dan. t. 224. \times entre sí.

Orchis bulbis indivisis, \times Orchís con bulbos indivi-
labello trifido punctato, la- \times sos; labio punteado, hendi-
cinula media longiore, cor- \times do en tres lacinias, con la
nu germinibus brevior. \times del medio mas larga; y cuer-
 Sauv. monsp. 23. \times necillo mas corto que los
 gérmenes.

Orchis radicebus subro- \times Orchís con las raices casi
tundis, galea connivente, \times redondas; capacetete casi cer-
labello trifido, reflexo. Hall. \times rado; labio hendido en tres
 helv. n. 1284. t. 34. \times partes y redoblado.

Orchis flore parvo, viridi \times Orchís con la flor peque-
purpureo. Riv. hex. t. 20. \times ña, y de color entre verde
 y purpúreo.

Orchis odore hirci, minor. \times Orchís menor, con olor
 C. B. P. 82. Tourn. p. 433. \times de macho cabrio.
 Vaill. par. 149. t. 31. f. 30.
 31. 32.

Trogorchis minor, flore \times Tragorchís ó Testiculo de
fuliginoso. Bauh. hist. 2. p. \times macho cabrio, menor, con
 764. \times la flor de color de hollín.

α *Orchis odore hirci, minor,* \times Orchís menor, con olor
spica purpurascens. C. B. \times de macho cabrio; y espiga
 P. 82. Tourn. p. 433. \times de color que tira á purpu-
 reo. *

Cast.

DE LAS MISMAS FLOR. CON II. ESTAMB. 785

Cast. Orchis con la flor de chinche ó de figura , color y olor de chinche.

Habita entre pastos de la Europa mas austral y en Oriente. 24

Tiene las flores fetidas, y de color entre verde y purpúreo: los *petalos* arrimados entre sí: el *labio* redoblado, hendido en tres lacinias iguales, aserradas y agudas; pero la del medio enterisima: y el *espolon* mas corto que el germen.

Cu-
bitalis. 25. ORCHIS *bulbis indivi-* Orchis con bulbos indivi-
visis, nectarii labio trifido sos; labio del nectario hen-
filiformi, intermedia ovata, dido en tres lacinias filifor-
cornu germinibus brevior. mes, con la intermedia aova-
da; y el cuernecillo mas
Flor. zeyl. 320. Xcorto que los gérmenes.

Cast. Orchis del largo de un codo.

Habita en Zeylan. 24

Morio. 26. ORCHIS *bulbis indivi-* Orchis con bulbos indivi-
visis, nectarii labio quadri- visos; labio del nectario hen-
fido crenulato, cornu obtuso dido en quatro partes y re-
adscendente, petalis obtu- cortadito; cuernecillo obtu-
sis conniventibus. Fl. dan. so, ascendente; petalos ob-
457. tusos y arrimados entre sí.

Orchis bulbis indivisis, Orchis con bulbos indivi-
nectarii labio quadrifido cre- visos; labio del nectario
nulato, cornu obtuso, pet- hendido en quatro partes y
alis omnibus conniventibus. recortadito; cuernecillo ob-
Aët. ups. 1740. p. 8. Flor. tuso; y todos los petalos ar-
dan. t. 253. Riv. hex. t. 19. rimados entre sí.

Mat. med. 224.

Orchis radicibus subro- Orchis con las raices casi
tundis, galeæ petalis linea- redondas; petalos del capa-
ris, labello trifido crenato, cete rayados; labio recorta-
medio segmento emargina- do y hendido en tres seg-
to. Hall. helv. n. 1282. t. 33. mentos, con el del medio es-
cotado.

786 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

<i>Orchis morio</i> , <i>fœmina</i> . C.	<i>Orchis morio</i> , femenino.
B. P. 82. Tourn. p. 433.	
Vaill. par. t. 31. f. 13. 14.	
Segui. ver. t. 15. f. 7.	
<i>Testiculus morionis</i> , <i>fœmina</i> . Dod. pempt. 236.	Testiculo de morio, hembra.
<i>Triorchis serapias</i> , <i>mas</i> .	Triorchis serapias, masculino.
Fuchs. hist. 559.	

Cast. *Orchis morio*. *Farm.* Rad. salep.

Habita en las selvas ásperas de Europa : en los prados del Real Sitio del Escorial y de San Ildefonso, en la Cartuxa del Paular de Segovia, en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. 2

Tiene pocas flores y de color purpúreo : todos los *petalos* obtusos, rayados y atrimados entre sí : el *labio* redoblado, recortado por sus lados, y hendido en tres lacinias con la del medio escotada : y el *espolon* obtuso y ascendente.

PROPIED. La raíz es mucilagínosa, lubricante, nutritiva y afrodisíaca : se usa en la disenteria, en las úlceras de la vejiga, y en la excoriación de los intestinos. Los bulbos cocidos y secos se vuelven transparentes, y reducidos á polvo como harina, les conocen en Oriente con el nombre de Salep, y les usan por muy especiales para corroborar las fuerzas. Este mismo polvo se prepara tambien de las raíces del *Orchis* masculino, del militar, y de otras especies de este género.

Mas- cula.	27. <i>ORCHIS bulbis indivi- visis</i> , <i>nectarii labio quadri- lobo crenulato</i> , <i>cornu obtu- so</i> , <i>petalis dorsalibus refle- xis</i> . Flor. dan. t. 457.	<i>Orchis</i> con bulbos indivi- sos ; labio del nectario hen- dido en quatro lóbulos y re- cortadito ; cuernecillo obtu- so ; y petalos del dorso re- dobladados.
---------------	---	---

<i>Orchis radicibus subro- tundis</i> , <i>petalis lateralibus reflexis</i> , <i>labello trifido</i> , <i>seg- mento medio longiori</i> , <i>bifido</i> .	<i>Orchis</i> con las raíces casi redondas ; petalos laterales redoblados ; labio hendido en tres segmentos, con el del medio mas largo y hen- dido en otros dos.
Hall. helv. n. 1283. t. 33.	

Or-

Orchis morio, mas, *foliis* X *Orchis morio*, masculino,
maculatis. C. B. P. 81. To- con hojas manchadas (ó sin
 urn. p. 432. Rudb. elys. 2. manchas).
 p. 192. f. 3. Vaill. par. 151.
 t. 31. f. 2.

Testiculus quartus. Cam. X Testiculo quarto.
 epit. 624.

Testiculus morionis, mas. X Testiculo de morio, mas-
 Dod. pempt. 236. culino.

Orchis foliis sessilibus, X *Orchis* con hojas sentadas
non maculatis. C. B. P. 82. y sin manchas.
 Tourn. p. 432.

Satyrium mas. Blackw. X Satyrion masculino.
 t. 53.

Cast. *Orchis* masculino.

Habita en los bosques de Europa: y en los mismos lugares
 de España que el antecedente. 24

Posee muchas flores y de color purpúreo: los *petalos* ex-
 teriores algo agudos y redoblados: el *labio* recortadito,
 hendido en tres lacinias, con la del medio hendida en
 otras dos y mas larga que las laterales; el *espolon* ob-
 tuso y algo escotado.

Ustul- 28. ORCHIS *bulbis indi-* X *Orchis* con bulbos indivi-
 lata, *visis*, *nectarii labio quadri-* sos; labio del nectario hen-
fido punctis scabro, *cornu* dido en quatro partes y con
obruso, *petalis distinctis*. puntitos ásperos; cuerne-
 Act. ups. 1741. p. 11. Flor. cillo obtuso; y petalos sepa-
 dan. t. 103. rados.

Orchis radicibus subro- X *Orchis* con las raices casi
tundis, *labello quadrifido*, redondas; labio hendido en
calcare brevissimo. Ha:l. quatro partes; y espolon cor-
 helv. n. 1273. t. 28. tisimo.

Orchis militaris, *pratens-* X *Orchis* militar ó con mor-
is, *humilior*. Tourn. p. rion, pratense y mas baxo.
 432. Vaill. paris. 149. t. 31.
 f. 35. 36. Segui. ver. t. 15.
 f. 4.

788 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Orchis Pannonica, quarta. Clus. hist. 1. p. 268. Orchís quarto, de Pannonia.
Cynosorchis militaris, Testiculo de perro, mili-
pratensis, humilior. C. B. tar ó con morrion, pratense
P. 81. y mas baxo,

Cast. Orchís como quemado.

Habita en los prados de la Europa templada. 24

Echa las flores con la espiga entre blanquecina y roxa, y que por su ápice tira á color purpúreo: los petalos distintos y arrimados entre sí: el labio hendido en tres lóbulos, con el del medio mas largo y mas ancho, y con puntitos ásperos: el espólen corto y algo obtuso.

Mili-
taris.

29. ORCHIS *bulbis indivi-* Orchís con bulbos indivi-
visis, *nectarii* labio quin- sos; labio del nectario hen-
quefido punctis scabro, cor- dido en cinco partes, y con
nu obtuso, *petalis confluen-* puntitos ásperos; cuerneci-
ribus. Act. ups. 1740. p. 11. llo obtuso; y petalos unidos
Dalib. paris. 271. en su base.

Orchis radicibus subro- Orchís con raíces casi re-
tundis, *labello quadrifido*, dondas; labio hendido en
laciniis anterioribus latius- quatro lacinias, las anterio-
culis, *posterioribus remotis*, res algo anchas; las de atrás
fere convergentibus. Gmel. apartadas y casi convergen-
sib. 1. p. 14. R. tes.

Orchis radicibus subro- Orchís con raíces casi re-
tundis, *spica conica*, *label-* dondas; espiga cónica; la-
lo quadrifido, *brachiolis* 3 bio hendido en quatro par-
pectore perangustis. Hall. tes; bracitos y pecho muy
helv. 1277. f. 28. angostos.

Orchis (Rivini) *bulbis* Orchís (de Rivino) con
subrotundis, *spica conica*, bulbos casi redondos; es-
petalis conniventibus, *nec-* piga cónica; petalos arri-
tarii labio trifido, *lacinia* mados entre sí; labio del nec-
media productiore bifida. tario hendido en tres laci-
Gov. illustr. 74. nias, con la del medio mas
alargada y hendida en otras
dos.

Orchis galea 3 *alis ci-* Orchís con el capacete y
nercis. Bauh. hist. 2. p. 755. alas cenicientos.

Or.

<i>Orchis mascula</i> , Riv. hexap. t. 15.	Orchis masculino.
<i>Orchis mas, latifolia</i> . Fusch. hist. 554.	Orchis masculino, con hoja ancha.
<i>Cynosorchis latifolia, hiantecucullo, major</i> . C. B. P. 80.	Cynosorchis ó Testiculo de perro, mayor, con hoja ancha y cucurucho abierto.
<i>Orchis latifolia, hiantecucullo, major</i> . Tourn. p. 432.	Orchis mayor, con hoja ancha y cucurucho abierto.
* <i>Orchis magna, latis foliis, galea fusca vel nigricante</i> . Rai. angl. 3. p. 378. t. 19. f. 2.	Orchis grande, con hojas anchas; y capacete de color pardo ó negruzco. α
<i>Orchis radicibus subrotundis, spica longa, labello quadrifido, brachiolis angustis, crusculis latis, serratis</i> . Hall. helv. 1276. t. 31.	Orchis con las raíces casi redondas; espiga larga; labio hendido en quatro partes; bracitos angostos; pierrecitas anchas y aserradas.
<i>Orchis fusca</i> . Jacq. austr. t. 176.	Orchis con la flor de color pardo.
β <i>Orchis latifolia, hiantecucullo, minor</i> . Tourn. p. 432. Vaill. paris. t. 31. f. 22. 23. 24.	Orchis menor, con hoja ancha y cucurucho abierto. β
<i>Cynosorchis latifolia, hiantecucullo, minor</i> . C. B. P. 81.	Testiculo de perro, menor, con hoja ancha y cucurucho abierto.
<i>Orchis militaris, major & minor</i> . Tourn. p. 432. Vaill. paris. 148. t. 31. f. 21. 27. 28. Segui. ver. 2. p. 122. t. 11. f. 2. Riv. hexap. t. 16.	Orchis militar, mayor y menor.
<i>Cynosorchis militaris, major & minor</i> . C. B. P. 81.	Testiculo de perro, militar, mayor y menor.
<i>Orchis latifolia, altera</i> . Clus. hist. 1. 267.	Otro Orchis con hoja ancha.
x <i>Orchis flore simiam referens</i> . C. B. P. 82. Tourn. p. 433.	Orchis con la flor que representa una mona. x
<i>Cynosorchis altera</i> . Dod. pempt. 234.	Otro Testiculo de perro.

790 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Orchis zoophora cercopi- X *Orchis* que lleva la flor
thecum exprimens, oreades. X parecida á un animal seme-
 Col. ecphr. 1. p. 320. X jante al Gato montés, y sin
 X cola.

Cast. *Orchis* militar.

Habita en los prados de la Europa templada: en los mon-
 tes de Burgos, de Leon y Asturias, en los de Aragon,
 Cataluña y otros de España. 24

Produce las flores espigadas, y de color entre purpúreo y
 blanquecino: los *petalos* unidos: el *labio* hendido en
 tres lóbulos, con el del medio mas largo y hendido en
 otros dos, con puntitos ásperos: el *espolon* corto y algo
 obtuso.

Papi-
 liona-
 cea.

30. ORCHIS *bulbis indivi-* X *Orchis* con bulbos indivi-
visis, nectarii labio indivi- X sos; labio del nectario indivi-
so crenato emarginato am- X viso, recortado, escotado y
pliato, cornu subulato, pe- X ensanchado; cuernecillo ales-
talis conniventibus. Scop. X nado; y petalos arrimados
 carn. ed. 2. n. 1103. X entre sí.

Orchis papilionem expan- X *Orchis* que representa una
sum herbacei coloris refe- X mariposa extendida, y de
rens. C. B. P. 83? Tourn. p. X color verde.
 434. X

Orchis ornithophora, flore X *Orchis* que lleva la flor
colore herbaceo. Bauh. hist. X semejante á un páxaro, de
 2. p. 761. X color verde.
 X

Cast. *Orchis* con flor de mariposa.

Habita en España: *Alstroem.* y en la Carniola mas ca-
 liente. *Scop.*

Su *estatura* y *flor* son muy semejantes á las del *Orchis*
militar; pero tiene el *labio* mas grande, de la magni-
 tud de la uña del dedo pulgar, mas ancho que largo,
 terminado en seno obtuso ó escotado, con dientecitos y
 de color purpúreo, como lo es el restante de la flor.

DE LAS MISMAS FLOR. CON II. ESTAMB. 791

Bur-
ma n-
niana. 31. ORCHIS *bulbis indivi-* Orchis con bulbos indivi-
visis, nectarii labio multi- visos; labio del nectario par-
partito-lineari, folio cordato tido en muchas lacinias li-
amplexicaule, scapo uniflo- neares; hoja de figura de co-
ro. Amoen. acad. 6. afr. 88. razon, amplexicaule; y es-
capo de una flor.

Cast. Orchis de Burman.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Pal-
lens. 32. ORCHIS *bulbis indivi-* Orchis con bulbos indivi-
visis, nectarii labio trifido visos; labio del nectario hen-
integerrimo, cornu obtuso dido en tres lacinias enteri-
mediocri, petalis patenti- simas; cuernecillo obtuso,
bus. Jacq. austr. 1. t. 45. mediocre; y petalos exten-
didos.

Orchis radicebus subro- Orchis con las raices casi
tundis, petalis galea linea- redondas; petalos del capa-
tis, labello trifido, integer- cete rayados; y labio hendi-
rimo. Hall. helv. n. 1281. do en tres lacinias enterisi-
mas.
t. 30.

Orchis bulbosa, floribus Orchis con la raiz bulbo-
flavescentibus. Segui. Suppl. sa; y flores de color que tira
p. 247. t. 8. f. 3. á amarillo-roxo.

Cast. Orchis palido.

Habita en selvas de Europa. 24

Tiene la flor amarilla; con el labio de color amarillo-roxo
mas subido, sin manchas, hendidido en tres lacinias en-
terisimas, con la del medio mas corta y escotada: el
cuernecillo mediocre, algo escotado y ascendente.

ESPECIES CON LOS BULBOS PALMEADOS.

Lati-
folia. 33. ORCHIS *bulbis sub-* Orchis con bulbos casi
palmatis rectis, nectarii cor- palmeados y rectos; cuerne-
nu conico, labio trilobo la- cillo del nectario cónico; la-
teribus reflexo, bracteis flo- bio hendidido en tres lóbulos,
re longioribus. Act. ups. redoblado por sus lados; y
1740. p. 15. Flor. dan. t. bractees mas largas que la
266. Knorr. del. hort. 2. flor.
t. O. 4. f. 1.

Or-

792 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Orchis radicibus palmatis, caule fistuloso, bracteis maximis, labello trifido serrato, medio segmento obtuso. Hall. helv. n. 1279. t. 32. Orchís con las raíces palmeadas; tallo fistuloso; bracteas muy grandes; labio aserrado y hendido en tres segmentos, con el del medio obtuso.

Orchis radicibus palmatis, bracteis flore longioribus, nectarii labio trifido, cornu germinibus brevioribus. Hort. cliff. 429. Orchís con las raíces palmeadas; bracteas mas largas que la flor; labio del nectario hendido en tres partes; y cuernecillo mas corto que los gérmenes.

Orchis palmata, pratensis, latifolia, longis calcariibus. C. B. P. 85. Tourn. p. 433. Vaill. paris. t. 31. f. 1. 2. 3. 4. 5. Orchís pratense, con la raíz palmeada; hojas anchas; y espolones largos.

Orchis palmata, palustris, tota rubra. C. B. P. 86. Tourn. p. 435. Orchís palustre, con la raíz palmeada; y la flor toda roxa.

Orchis palmata, palustris, latifolia. C. B. P. 86. Tourn. p. 435. Orchís palustre, con la raíz palmeada; y la hoja ancha. α

Orchis palmata, palustris, maculata. C. B. P. 86. Tourn. p. 435. Orchís palustre, con la raíz palmeada; y la hoja manchada. β

Cast. Orchis de hoja ancha.

Habita en los prados de Europa: en Aragon, Cataluña, Alcarria y en otras partes de España. 26

Posee las flores en espiga: los *petalos laterales* redoblados: el *labio* redoblado tambien por sus lados, aserrado y hendido en tres lóbulos: el *espolon* cónico: las *bracteas* mas largas que las flores: y el *tallo* fistuloso, con que se diferencia claramente del *Orchis manchado*.

Incar-
nata.

34. ORCHIS *bulbis pal-
matis, nectarii cornu conico, labio obsolete triloboserrato, petalis dorsalibus reflexis.* Flor. suec. 2. n. 802.

Orchis radicibus palmatis, bracteis coloratis, labio circum-serrato, trilobato lobo medio emarginato. Hall. helv. n. 1280.

Orchís con bulbos palmeados; cuernecillo del nectario cónico; labio aserrado y hendido en tres lóbulos desfigurados; y petalos del dorso redoblados.

Orchís con las raíces palmadas; bracteas de color; labio aserrado al rededor, hendido en tres lóbulos, con el del medio escotado.

Cast. Orchís encarnado.

Habita en Europa: en Moncayo, en Monseñ y otras partes de España. ¶

Acaso es variedad de la especie siguiente con la qual la une Haller.

Sam-
bucina

35. ORCHIS *bulbis sub-palmatis rectis, nectarii cornu conico, labio ovato subtrilobo, bracteis longitudine florum.* Flor. suec. 2. n. 803.

Orchis palmata, lutea, labio floris maculato. Segui. ver. p. 249. t. 8. f. 5.

Orchis palmata, Sambuci odore. C. B. P. 86. Tourn. p. 435. Rudb. elys. 2. p. 213. f. 9.

Orchis Pannonica, VIII. Clus. hist. 1. p. 269.

Orchís con bulbos casi palmeados y rectos; cuernecillo del nectario cónico; labio aovado, casi hendido en tres lóbulos; y bracteas del largo de las flores.

Orchís con la raíz palmeada; flor amarilla, y su labio manchado.

Orchís con la raíz palmeada; y olor de Saúco.

Orchís octava, de Pannonia.

Cast. Orchís con olor de Saúco.

Habita en la Europa. ¶

Echa las flores en espiga, muy claras y amarillas: los petalos laterales redoblados: el labio redoblado por sus lados, aserrado, hendido en tres lóbulos, el del medio escotado y con puntitos purpúreos: el espolon mediocre y escotado.

Macu-
lata.

36. *ORCHIS bulbis pal-* X *Orchis* con bulbos pal-
matis patentibus, nectarii X meados y extendidos: cuer-
cornu germinibus brevior, X necillo del nectario mas cor-
labio plano, petalis dorsa- X to que los gérmenes; labio
libus patulis. Act. ups. 1740. X plano; y petalos del dorso
 Dalib. paris. 274. X extendidos.

Orchis radicibus palma- X *Orchis* con las raices pal-
ris, caule solido, labello X meadas; tallo sólido; labio
trifido, serrato, medio seg- X aserrado, hendido en tres
mento acuminato. Hall. helv. X segmentos, y el del medio
 n. 1278. t. 32. X puntiagudo.

Orchis labio trifido, ma- X *Orchis* con el labio hendi-
culato, cornu conico, ger- X do en tres partes y mancha-
minibus brevior. Scop. carn. X do; cuernecillo cónico, y
 ed. 2. n. 1119. X mas corto que los gérmenes.

Orchis palmata, non ma- X *Orchis* con la raíz palmea-
culata, & angustifolia ma- X da, de hojas angostas, con
culata. Riv. hexap. t. 8. & X manchas y sin ellas.

ii.

Orchis palmata, praten- X *Orchis* pratense, con la
sis, maculata. C. B. P. 85. X raíz palmeada; y hojas man-
 Tourn. p. 435. X chadas.

Orchis palmata, monta- X *Orchis* montana, con la
na, maculata. C. B. P. 86. X raíz palmeada; y hojas man-
 Tourn. p. 436. Vaill. paris. X chadas.
 t. 31. f. 9. 10.

Satyrium basilicum, fæ- X *Satyrio* real, femenino.
 mina. Dod. pempt. 240. X

Cast. *Orchis* manchado.

Habita en prados humedos de Europa: en Aragon, Cata-
 luña y otras partes de España. X

Tiene los tres petalos exteriores derechos; y los dos inte-
 riores arrimados entre sí; el labio plano, recortado, y
 hendido en tres lóbulos, con el intermedio muy angos-
 to y enterísimo: las brácteas que no son mas largas que
 la flor: el tallo sólido: las hojas manchadas: y las flo-
 res que varían en el color.

Odora
tissima

37. ORCHIS *bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo brevior labio trilobo, foliis linearibus.* Jacq. austr. t. 264. Orchís con bulbos palmeados; cuernecillo del nectario encorvado acia atrás, mas corto que el labio hendido en tres lóbulos; y hojas lineares.

Orchis radicebus palmatis, labello obtuse trifido, concolore, calcare germinis brevior. Hall. helv. n. 1274. t. 29. Orchís con las raíces palmeadas; labio hendido en tres lacinias obtusas, de un mismo color; y espolon mas corto que el germen.

Orchis Conopseae varietas. Jacq. vind. 293. R. Orchís variedad del Orchís de Mosquito.

Orchis bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo, labio orato acuto, foliis linearibus. Spec. pl. ed. 3. p. 1335. Orchís con bulbos palmeados; cuernecillo del nectario encorvado ácia atrás; labio aovado, agudo; y hojas lineares.

Orchis palmata, angustifolia, minor, odoratissima. C. B. P. 86. prodr. 30. Tourn. p. 435. Rai. hist. 1225. Segui. ver. 3. p. 250. t. 8. f. 6. Orchís menor, muy oloroso, con la raíz palmeada; y hoja angosta.

Cast. Orchís muy oloroso.

Habita en Italia, Francia y Alemania; y es muy rara en Suecia.

Echa las flores purpúreas y fragantes: los petalos del dorso extendidos: el labio igual, hendido en tres partes, con la del medio mas ancha y aguda: y el espolon corto.

Conop
sae.

38. ORCHIS *bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longior, labio trifido, petalis duobus patentissimis.* Act. ups. 1740. p. 13. Flor. dan. t. 224. Orchís con bulbos palmeados; cuernecillo del nectario setáceo y mas largo que los gérmenes; el labio hendido en tres partes; y dos petalos muy extendidos.

Or-

796 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

*Orchis radicebus palma-
tis, calcare longissimo, la-
bello unicolore, obtuse tri-
fido.* Hall. helv. n. 1287. t. 29.

Orchís con las raíces palmeadas; espolon larguísimo; labio de un color, y hendido en tres lacinias obtusas.

Orchis angustifolia, non maculata. Riv. hexap. t. 11.

Orchís de hoja angosta y sin manchas.

*Orchis radicebus palma-
tis, bracteas longitudine
floris, nectarii labio trifido,
seta germinibus longiore.* Hort. cliff. 429.

Orchís con las raíces palmeadas; bracteas del largo de la flor; labio del nectario hendido en tres partes; y el cuernecillo como una cerda mas larga que los gérmenes.

Orchis palmata, minor, calcaribus oblongis. C. B. P. 85. Tourn. p. 435. Vaill. paris. t. 30. f. 8. 8. Rudb. elys. 2. p. 212. f. 5.

Orchís menor, con la raíz palmeada; y espolones oblongos.

Satyrium basilicum, mas. Fuchs. hist. 712.

Satyrio real, masculino.

Orchis palmata, pratensis, maxima. C. B. P. 85. Tourn. p. 435.

Orchís pratense, muy grande, con la raíz palmeada.

Cast. Orchís de Mosquito.

Habita en prados montuosos de Europa: y en Aragon cerca de los prados de Villarluego. 2.

Tiene el olor muy suave. *Synops. pl. Aragon. p. 130.*

Echa los petalos exteriores extendidos: el labio recortadito, igual y hendido en tres lacinias, con la intermedia enterisima: el espolon setáceo y larguísimo. Es muy semejante al *Orchís olorosisimo* y al *pyramidal*.

Flava. 39. *ORCHIS bulbis pal-
matis, nectarii cornu filifor-
mi longitudine germinis,
labio trifido integerrimo.* Gron. virg. 137.

Orchís con los bulbos palmeados; cuernecillo del nectario filiforme y de la longitud del germen; labio hendido en tres partes y enterisimo.

DE LAS MISMAS FLOR. CON II. ESTAMB. 797

Orchis palmata, elegans, X *Orchis hermosa, de Vir-*
lutea, Virginiana, cum lon- X *ginia, con raiz palmeada; y*
gis calcaribus, luteis. Mo- X *flor amarilla; espolones lar-*
 ris. hist. 3. p. 499. X *gos y tambien amarillos.*

Cast. Orchis amarillo-roxo.

Habita en la Virginia. ¶

Produce las *hojas inferiores* del largo de quatro dedos y lanceoladas: y la *espiga* angosta.

Fusces cens. 40. ORCHIS *bulbis fasci-* X *Orchis con bulbos en ha-*
culatis, nectarii cornu lon- X *cecillo; cuernecillo del nec-*
gitudine germinis, labio X *tario tan largo como el ger-*
ovato basi dentato. X *men; labio aovado y con*
 X *dientes en su base.*

Orchis radicibus multis, X *Orchis con muchas raices;*
labello quasi alato, calcare X *labio casi alado; y espolon*
germinis longitudine. Gmel. X *tan largo como el germen.*
 sib. 1. p. 20. t. 4. f. 2. X

Cast. Orchis de color que tira á obscuro.

Habita en la Siberia. ¶

Stratema- 41. ORCHIS *bulbis faci-* X *Orchis con bulbos en ha-*
 tica. *culatis, nectarii labio bilo-* X *cecillo; labio del nectario*
bo integerrimo, cornu lon- X *hendido en dos lóbulos en-*
gitudine germinis. Fl. zeyl. X *terisimos; y cuernecillo de*
 319. X *la longitud del germen.*

Cast. Orchis tuberculoso?

Habita en Zeylan. ¶

Hyper- 42. ORCHIS *bulbis fasci-* X *Orchis con bulbos en ha-*
 borea. *culatis, nectarii cornu lon-* X *cecillo; cuernecillo del nec-*
gitudine germinis, labio li- X *tario tan largo como el ger-*
neari integerrimo trunca- X *men; labio linear, enterisi-*
 to. X *mo y truncado.*

Orchis bulbis fibrosis, X *Orchis con bulbos fibro-*
calcare germine brevior, X *sos; espolon mas corto que*
labio tripartito, lacinis X *el germen; labio partido en*
equalibus integerrimis. Oed. X *tres lacinias iguales y ente-*
 dan. 333. X *disimas.*

Cast.

798 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Cast. Orchís del Septentrion.

Habita en Islandia. Koenig.

Produce el tallo del largo de un palmo junto con su espiga: las hojas alternas, lanceoladas y del largo del tallo: la espiga aovada; con bracteas entre lineares y lanceoladas, y de la longitud de las flores: las corolas de color entre verde y amarillo: el petalo mas alto mas ancho y aovado: los dos laterales superiores lanceolados y arrimados ácia el primero; y los dos laterales inferiores oblongos: y el labio apenas mas largo que los petalos.

Abortiva.

43. ORCHIS bulbis fasciculatis filiformibus, nectarii labio ovato integerrimo, caule aphylo. Act. ups. 1740. p. 17. Mill. dict. n. 9. Jacq. austr. t. 193.

Orchis radicibus cylindricis, bracteis flore brevioribus, labello trifido obtuso, seta germinibus brevioribus. Sauv. monsp. 23.

Epipactis aphylla, calcare longo, labello lobato, lanceolato. Hall. helv. n. 1288. t. 36.

Pseudo-Limodorum, Austriacum. Clus. hist. 1. p. 270.

Orchis abortiva, violacea. C. B. P. 86.

Limodorum. Hall. opusc. 212.

Orchís con bulbos en hacedillo, y filiformes; labio del nectario aovado, enterísimo; y tallos sin hojas.

Orchís con las raíces cilindricas; bracteas mas cortas que la flor; labio hendido en tres partes, obtuso; y cerda ó espolon mas corto que los gérmenes.

Epipactis ó Heleborina. sin hojas, con espolon largo; labio hendido en lóbulos y lanceolado.

Falso-Limodoro, de Austria.

Orchís abortiva, con la flor de color de violeta.

Limodoro.

Cast. Orchís abortivo.

Habita en selvas sombrías de Francia, Suiza, Inglaterra y de Alemania. 24

Posee el tallo sin hojas, y envaynado con escamas.

Psy-
codes.

44. ORCHIS *nectarii* *cornu setaceo longitudine germinis*, labio tripartito, ciliari. Gron. virg. 137. Orchís con el cuernecillo del nectario setáceo y del largo del germen; el labio dividido en tres partes y pestañoso.

Orchis Marilandica, spica brevi conferta, floribus parvis, calcaribus longissimis. Rai. Suppl. p. 582. Orchís de Marilandia, con flores pequeñas, amontonadas en espiga corta; y espolones larguissimos.

Orchis floribus aureis, spica habitiore congestis, bracteis longitudine floris, labio inferiore nectarii simbricato capillaceo. Gron. virg. 1. p. 184. Orchís con flores de color de oro, amontonadas en espiga gorda; bracteas del largo de la flor; y labio inferior del nectario hendido en flecos como cabellos.

Cast. Orchís Psychodes.

Habita en el Canadá. Kalm.

Tiene la traza como la del *Orchís manchado*: el tallo con hojas lineares, puntiagudas y esparcidas: la espiga larga y densa: las corolas de cinco petalos arrimados entre sí, de los cuales los tres exteriores son aovados, y los dos interiores oblongos y algo pestañosos; con el labio redoblado, partido en tres lacinias, muy angostas por su base, en forma de cuña y pestañosas en su ápice.

Spec.
tabilis.

45. ORCHIS *nectarii* *cornu longitudine germinis*, labio ovali emarginato, caule aphyllò, foliis ovalibus. Orchís con el cuernecillo del nectario de la longitud del germen; labio oval y escotado; tallo sin hojas; y hojas (*radicales*) ovales.

Orchis foliis radicalibus binis ovalibus, galea tripetala, nectarii labio ovato, integerrimo. Gron. virg. 136. Orchís con las hojas radicales de dos en dos y ovales; capacete de tres petalos; labio del nectario aovado y enterisimo.

800 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Orchis flore pulcherrimo X Orchís de flor muy hermosa y grande, con el capete del nectario de color cerúleo subido; espólon de color de nieve; hojas anchas, entre oblongas y aovadas, y de color verde muy subido.

magno, specioso nectarii gamma X
lea saturate cœrulea, calcaris niveo, foliis amplis oblongo-ovatis, saturate viridibus. Clayt. idem.

Cast. Orchís admirable.

Habita en la Virginia. Gron.

Posee las *hojas* radicales, de dos en dos, ovales, con peciolo, obtusas y casi de la longitud de la planta: el *tallo* desnudo: la *espiga* de cinco ó seis flores: las *bractéas* entre lanceoladas y ovales, y de la longitud del germen: los *dos petalos exteriores* extendidos y verdes; con los *tres* arrimados entre sí y mas tiernos: el *labio* oval, escotado y con sus ápices divergentes.

1202. Género SATYRIUM, *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espatas* vagas. *Espadice* sencillo.

Periantio ninguno.

COR. *Petalos* cinco, entre aovados y oblongos: los *tres* exteriores; los *dos* interiores, y arrimados por arriba entre sí en forma de capete.

Nectario de una pieza, pegado al receptaculo por el lado inferior entre la division de los petalos: con el *labio superior* derecho y cortísimo; y el *inferior* plano, y pendulo, con una bolsa en forma de escroto en su base y que sobresale por debaxo.

ESTAMB. *Filamentos* dos, muy delgados, muy cortos y sentados en el pistilo: con las *anteras* aovadas al revés, y cubiertas con un pliegue de dos celdillas del labio superior del nectario.

PIST. *Germen* oblongo, retorcido y debaxo del caliz: *estilo* cortísimo, y pegado al labio superior del nectario: con el *estigma* comprimido y obtuso.

PERIC. *Capsula* oblonga, de una celdilla, con tres quillas y tres ventallas, que se abre en tres partes por debaxo de las quillas; y unida en su ápice y base.

SEM.

DE LAS MISMAS FLOR. CON II. ESTAMB. 801
SEM. numerosas, muy pequeñas y en forma de serrin.

ESPECIES.

Hirci.
num.

1. SATYRIUM *bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido, intermedia lineari elongata obliqua præmorsa.* Act. ups. 1740. t. 18. Jacq. austr. t. 367. X
Satyrio con bulbos indivisos; hojas lanceoladas; labio del nectario hendido en tres lacinias, con la intermedia linear, alargada, oblonga, y como mordida en su extremo,

Orchis radicibus subrotundis, labello longissimo, tripartito, plicato. Hall. hely. n. 1268. t. 25. X
Orchis con las raices casi redondas; labio larguísimo, dividido en tres partes y plegado.

Orchis barbata, fætida. Bauh. hist. 2. p. 756. Vaill. paris. t. 30. f. 6. Segui. ver. t. 15. f. 1. Riv. hexap. t. 18. X
Orchis barbado y fetido.

Orchis barbata, odore hirci, brevior latioreque folio. C. B. P. 20. Moris. hist. 3. p. 491. sect. 12. t. 12. f. 9. X
Orchis barbado de flores con olor de macho cabrio; hoja mas corta y mas ancha.

Cast. Satyrio con olor de macho cabrio.

Habita en Francia y Alemania. 24

Tiene las flores blanquecinas y de olor de macho cabrio: el labio hendido en tres lacinias, con la intermedia larguísima, linear, obliqua y como mordida en su extremo; y las laterales cortísimas, alesnadas y enterísimas.

Viri-
de.

2. SATYRIUM *bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis, nectarii labio lineari trifido, intermedia obsoleta.* Act. ups. 1740. p. 18. Flor. dan. t. 73. X
Satyrio con bulbos palmados; hojas oblongas y obtusas; labio del nectario linear, y hendido en tres lacinias, con la intermedia desfigurada.

Orchis radicibus palmaris, galea connivente, labello trisulco, calcare brevissimo. Hall. helv. n. 1269. t. 26. Segui. ver. 2. t. 16. f. 18.

Orchís con raíces palmeadas; capacete casi cerrado; labio con tres sulcos; y espolon cortísimo.

Orchis palmata, flore viridi. C. B. P. 86. Prodr. 30. Tourn. p. 435.

Orchís con la raíz palmeada; y flor verde.

Orchis palmata, flore galericulato, dilute viridi. Loes. prus. 192. t. 59.

Orchís de raíz palmeada; flor con sombrerillo y de color verde claro.

Orchis palmata, batrachites. C. B. P. 86. Vaill. paris. 153. t. 31. f. 6. 7. 8. Tourn. p. 435.

Orchís con la raíz palmeada; y flor parecida á una rana.

Cast. Satyrio verde.

Habita en lugares ásperos de la Europa mas fria. 26

Las flores se hallan de color entre verde y palido: los petalos arrimados entre sí: el labio hendido en tres lacinias, con las laterales mas angostas, y la del medio mas pequeña.

Ni-grum. 3. SATYRIUM *bulbis palmatis, foliis linearibus, nectararii labio resupinato indiviso.*

Satyrio con bulbos palmeados; hojas lineares; labio del nectario resupinado é indiviso.

Satyrium bulbis palmatis, foliis linearibus, floribus resupinatis, nectararii labio indiviso ovato acuminato. Act. ups. 1740. p. 19. Spec. pl. 3. p. 1338. Jacq. vind. 293. austr. 368.

Satyrio con bulbos palmeados; hojas lineares; flores resupinadas; labio del nectario indiviso, aovado y puntiagudo.

Orchis radicibus palmaris, spica densissima, flore resupinato, calcare brevissimo. Hall. helv. n. 1271. t. 27.

Orchís con las raíces palmeadas; espiga muy densa; flor resupinada, y con el espolon muy corto.

Orchis palmata, angustifolia, alpina, nigro flore. X Orchis alpino, con la raíz palmeada; hoja angosta; y C. B. P. 86. Tourn. p. 436. X flor negra.

Segui. ver. 133. t. 15. f. 17.

Palma Christi, minor. X Palma de Christo, menor. Cam. epit. 627.

Palmata angustifolia, flore supinato, calcare brevissimo. X Planta con la raíz palmeada; hoja angosta; flor echada boca arriba; y con el espolon muy corto. Hall. opusc. 228.

Cast. Satyrio negro.

Habita en los alpes de Suiza y de Laponia. 26

Posee las flores de color entre negro y purpúreo, muy olorosas y resupinadas: los petalos extendidos: el labio indiviso, entre aovado y lanceolado, y recortado: y el espolon cortísimo. Varía con la flor de color de rosa.

Albidum. 4. SATYRIUM *bulbis fasciculatis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido acuto, lacinia intermedia obtusa.* X Satyrio con bulbos en fascículo; hojas lanceoladas; labio del nectario agudo, hendido en tres lacinias, y la intermedia obtusa. Act. ups. 1740. p. 19. Pall. it. 2. p. 124. Flor. dan. t. 115.

Orchis palmata, alpina, spica densa, albo-viridi. X Orchis alpino, con la raíz palmeada; espiga densa, y de color entre blanco y verde. Hall. opusc. 149.

Orchis radicebus confertis, teretibus, calcare brevissimo, labello trifido. X Orchis con raíces amontonadas y rollizas; espolon cortísimo; y labio hendido en tres partes. Hall. helv. n. 1270. t. 26.

Pseudo-Orchis alpina, flore herbaceo. X Pseudo-Orchis alpino, con la flor de color verde. Mich. gen. 30. t. 26.

Cast. Satyrio blanquecino.

Habita en los prados de las selvas de Escania, Alemania, Suiza y Aubernia.

Epi-
pogum

5. SATYRIUM *bulbis compressis dentatis, caule vaginato, nectarii labio resupinato indiviso.* Syst. veg. 676. Jacq. austr. t. 84.

Epipogum. Gmel. sib. 1. p. 12. t. 2. f. 2. Epipogo.

Cast. Satyrio Epipogo.

Habita en lugares muy esteriles y sombríos de Suiza y Alemania. 2

Tiene las flores resupinadas: el tallo sin hojas y envaynado: el labio indiviso, y entre aovado y lanceolado. Llámase *Epipogo* por tener la barba ó el labio ácia arriba con orden inverso.

Plan-
tagi-
neum.

6. SATYRIUM *bulbis subfibrosis, foliis caulinis ovatis petiolatis vaginantibus, nectarii labio integro.* Amoen. acad. 5. p. 408. Jacq. amer. 221.

Orchis elatior, latifolia, Asphodeli radice, spica strigosa. Sloan. jam. 119. hist. 1. p. 250. t. 147. f. 2.

Helleborine foliis Lilheceis, radice Asphodeli, minor. Plum. spec. 9. ic. 190.

Cast. Satyrio como Llantén.

Habita en America.

Re-
pens.

7. SATYRIUM *bulbis fibrosis, foliis ovatis radicalibus, floribus secundis.* Act. ups. 1740. p. 20. Gunn. noru. p. 321. t. 6. f. 1. Jacq. austr. t. 369.

Satyrio con bulbos fibrosos; hojas aovadas, radicalibus; y flores ladeadas ó que miran á un lado.

DE LAS MISMAS FLOR. CON II. ESTAMB. 805

Epipactis foliis petiolaris, ovato-lanceolatis, floribus tetrapetalis, hirsutis. X Epipactis ó Heleborine de
hojas con peciolo, entre aovadas y lanceoladas; flores
de quatro petalos y con pelo áspero.

Hall. helv. n. 1295. t. 22. X
Act. helv. 4. p. 114. X
Orchioides. Trew. comm. X Planta parecida al Orchís.
noric. 1736. t. 6. f. 7.

Orchis minor, flosculis albis, seu radice repente. X Orchís menor, con florecitas
blancas, ó con la raiz rastrera.

Cam. hort. 111. t. 35. X
Pseudo-Orchis. C. B. P. X Falso-Orchís.

84. X
Pyrola angustifolia, polyanthos, radice geniculata. X Pyrola de hoja angosta,
con muchas flores; y raiz con nudos.

Læs. prus. 210. t. 68. X
Orchis radice repente, foliis maculis nigris & albis adpersis. X Orchís con la raiz rastrea;
y hojas salpicadas de manchas negras y blancas. α
f. 4. 5. X

Cast. Satyrio rastrero.

Habita en las selvas de Suecia, de Inglaterra, Siberia y Suiza; y en los pinares de Alemania. R. 26

Posee las flores ladeadas: tres petalos vellosos y unidos: el labio lanceolado, ó entre aovado y oblongo: y en lugar del espolon una quilla en forma de navichuelo: la raiz rastrera: las hojas aovadas, pecioladas y con tablillas de color pardo.

Ca. pense. 8. SATYRIUM bulbis...., X Satyrio con bulbos.....;
nectarii labio longitudine petalorum latiore obtuso emarginato utrinque unidentato. X labio del nectario de la longitud de los petalos, mas angosto, obtuso, escotado, y con un diente en ambos lados.

Cast. Satyrio del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Hians. 9. SATYRIUM *corollae* X Satyrio con el capacete de
galea calcarata hians, nec- X la corola con espolon, y que
tario ovato, foliis lineari- X se abre; neetario aovado;
bus radicalibus. Suppl. p. X hojas lineares y radicales.
 401. X

Cast. Satyrio que se abre.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Echa la caña del largo de un pie, con algunas vaynas
 que terminan en punta rígida: todas las *hojas radicales*,
 lineares y del largo de la caña: la *espiga* oblonga; con
 diez y seis *flores* poco mas, ó menos y claras: el *petalo*
primero en forma de cucurucho abierto, muy ancho, y
 que remata por debaxo en un cuernecillo cortísimo; el
segundo y *tercero* aovados al revés; y los otros *dos*
 de los genitales puestos debaxo del primero, pequeños y
 encorvados: y el *labio* aovado y agudo.

Oro- 10. SATYRIUM *foliis bi-* X Satyrio con hojas puestas
 ban- *fariis, corollae galea post-* X en dos órdenes; capacete de
 choi- *ce biloba subbicornuta.* Sup- X la corola hendido por deba-
 des. pl. p. 402. X xo en dos lóbulos y casi con
 X dos cuernecillos.

Cast. Satyrio como Orobanca.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm.

Es *planta* que mas bien se parece á la *Orobanca* que al
Orchis: produce las *hojas* en el tallo, lineares y pues-
 tas en dos órdenes: la *espiga* mas larga que el tallo,
 con *flores* en dos órdenes y densamente apiñadas: el *ca-*
pacete de la corola de una pieza, obtuso, hendido por
 su dorso en dos lóbulos, y que saca por debaxo dos
 cuernecillos cortísimos y algo obtusos: el *labio* de figu-
 ra de corazon al revés, cóncavo y separado: una *peque-*
ña máquina de estambres oblonga, colocada debaxo del
 capacete con un labio pequeño en su remate, hendido
 en dos lóbulos, y dos dientes en su base, alesnados y á
 manera de neetario: las *anteras* de dos en dos: el *ger-*
men debaxo del caliz y retorcido.

Pe-
dicel-
latum. 11. SATYRIUM *scapo* X Satyrio con el escapo casi
subnudo, racemo pedicellis X desnudo; racimos con piece-
filiformibus laxis. Suppl. p. X citos filiformes y laxos.
402. X

Cast. Satyrio con piececitos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Sparrm.*

Tiene la *caña* del largo de un pie, con una hoja en medio entre lanceolada y alesnada, y que la envayna: la *espiga* oblonga: las *bracteas* pajosos y alesnadas: las *flores* con pedunculo: y la *corola* de cinco petalos casi iguales.

Tahu-
lare. 12. SATYRIUM *bulbis* X Satyrio con bulbos redon-
rotundis, caule folioso, la- X dos; tallo folioso; labio hen-
bello trifido, lacinia media X dido en tres lacinias y la del
emarginata. Suppl. p. 402. X medio escotada.

Cast. Satyrio del monte Tabular.

Habita en la cumbre del monte Tabular. *Thunb.*

Triste. 13. SATYRIUM *bulbis* X Satyrio de bulbos indivi-
indivisis, galea unicalcara- X sos; capacete con un espo-
ta, labello integro. Suppl. X lon; y labio entero.
p. 402. X

Cast. Satyrio triste.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Es planta grande, con flores en panoja.

Gigan-
teum. 14. SATYRIUM *bulbis* X Satyrio de bulbos redon-
rotundis, caule nudo, label- X dos; tallo desnudo; y labio
lo sagittato. Suppl. p. 402. X en forma de saeta.

Cast. Satyrio agigantado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Sube á la altura de un hombre, con las *flores* grandes y de color de naranja.

Acu-
leatum 15. SATYRIUM *bulbis* X Satyrio de bulbos redon-
rotundis, caule folioso, la- X dos; tallo folioso; labio en-
bello integro inermi-aculea- X tero y con agujones que no
to. Suppl. p. 402. X punzan.

Cast.

808 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Cast. Satyrio con agujones.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Tiene el *labio* erizado con puntitas blancas y purpúreas.

1203. Género OPHRYS. * *Ophris Tourn. t. 250.*

Nidus avis Tourn. t. 250.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espatas* vagas. *Espadice* sencillo.

Periantio ninguno.

COR. *Petalos* cinco, oblongos, arrimados entre sí por arriba, iguales; y *dos de ellos* exteriores.

Nectario mas largo que los *petalos*, que cuelga, y algo aquillado solamente por debaxo.

ESTAMB. *Filamentos* dos, cortísimos y sentados en el pistilo: con las *anteras* derechas, y cubiertas con la *margen interior del nectario*.

PIST. *Germen* oblongo, retorcido y puesto debaxo: *estilo* pegado á la *margen interior del nectario*: con el *estigma* desfigurado.

PERIC. *Capsula* casi aovada, de tres lados, obtusa, estriada, de tres ventallas, de una celdilla y que se abre por sus ángulos aquillados.

SEM. numerosas, y en forma de serrín.

RECEPT. linear, y pegado á cada ventalla del pericarpio.

OBS. *El Ophris* con raiz de coral *tiene quatro estambres, ó dos en cada celdilla. R.*

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

OPHRIS. p. 437.

La flor es de muchos petalos, anomala ó que consta de seis petalos desemejantes, de los quales los cinco superiores se hallan dispuestos de forma que en algun modo representan un capacete ó morrion, y el inferior con cabezuela y de figura de hombre. El caliz pasa á fruto, ú odrecillo que se abre por tres ventanas, á las quales se hallan arrimadas las ventallas llenas de simientes muy menudas y á manera de serrín.

NIDUS AVIS. p. 437.

La flor es de muchos petalos , anomala ó que consta de seis petalos desemejantes , de los quales los cinco superiores se hallan dispuestos de forma , que en algun modo representan un capacete ó morrion , y el inferior con cabezuela y hendido en dos partes. El caliz (*es el germen*) pasa á fruto , ú odrecillo lleno de simientes muy menudas y á manera de serrin. A estas notas se añaden las de las raices fibrosas, y puestas en forma de nido de ave.

ESPECIES CON LOS BULBOS RAMOSOS.

Nidus
avis.

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1. OPHRYS <i>bulbis fibro-</i> | X | Ophrys de bulbos con fi- |
| <i>so-fasciculatis, caule vagi-</i> | X | bras en hacecillo ; tallo en- |
| <i>nato aphylo, nectarii labio</i> | X | vaynado y sin hojas ; y la- |
| <i>bifido. Gmel. sib. 1. p. 25. n.</i> | X | bio del nectario hendido en |
| 24. Flor. dan. t. 181. | X | dos partes. |
| <i>Neottia bulbis fascicula-</i> | X | Neottia con bulbos en ha- |
| <i>tis, nectarii labio bifido.</i> | X | cecillo ; y labio del nectario |
| Act. ups. 1740. p. 33. Da- | X | hendido en dos partes. |
| lib. paris. 277. | X | |
| <i>Epipactis aphylla, flore</i> | X | Epipactis sin hojas , con |
| <i>inermi, labello bicorni. Hall.</i> | X | la flor inerme ; y labio de |
| helv. n. 1290. t. 37. | X | dos cuernecitos. |
| <i>Orchis abortiva, fusca. C.</i> | X | Orchis abortiva , con la |
| B. P. 86. | X | flor de color pardo. |
| <i>Nidus avis. Dalech. 1073.</i> | X | Nido de ave. |
| Lob. ic. 195. Riv. hexap. t. | X | |
| 7. Tourn. p. 438. | X | |

Cast. Ophrys Nido de ave.

Habita en bosques sombríos de Suecia , Alemania y Francia : en los Pirineos de Catalufia en los pies de los Abetos y otros árboles ; y en otros parages de España.

810 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Coral-
orhiza 2. *OPHRYs bulbis ramo-* X *Ophrys* con bulbos ramo-
mosis flexuosis, *caule vagi-* X sos y ondeados; tallo envay-
nato apophyllo, *nectarii labio* X nado sin hojuelas; y labio
trifido. Flor. dan. t. 451. X del nectario hendido en tres
partes.

Neottia bulbis reticula- X *Neottia* con bulbos en re-
tis, *nectarii labio trifido*. X decilla; y labio del nectario
Aët. ups. 1740. p. 34. X hendido en tres partes.

Corallorhiza. Gunn. noru. X Planta con la raíz como
pars. 2. t. 6. f. 3. Hall. helv. X coral.
n. 1301. t. 44.

Orobanche radice coral- X *Orobancha* con la raíz co-
loide. C. B. P. 88. X mo coral.

Orobanche spuria seu co- X *Orobancha* espuria ó plan-
rallorhiza. Rupp. jen. 284. X ta con raíz como coral.
t. 2.

Orobanche radice coral- X *Orobancha* con la raíz co-
loide ruberrima. Meniz. pug. X mo coral y muy roxa.
t. 9. f. 1. X

Cast. *Ophrys* con raíz como coral.

Habita en los desiertos de Europa. 26

Haller dice que tiene quatro *estambres*, esto es, dos en
cada celdilla.

Vease la *Orobancha de Virginia*. *Pluk. phyt. t. 211. f. 13.*
y 2.

Spi-
ralis. 3. *OPHRYs bulbis agre-* X *Ophrys* con bulbos agre-
gatis oblongis, *caule subfo-* X gados y oblongos; tallo algo
lios, *floribus spirali-se-* X folioso; flores espirales y la-
cundis, *nectarii labio indi-* X deadas; labio del nectario
viso crenulato. Aët. ups. X indiviso y recortadito.
1740. p. 32. Riv. hexap. t. 14.

Epipactis bulbis cylindri- X *Epipactis* con bulbos cilin-
cis, *spica spirali*, *labello* X dricos; espiga espiral; y la-
crenulato. Hall. helv. n. 1294. X bio recortadito.
t. 38.

Triorchis alba, *odorata*, X *Triorchis* menor, con la
minor. C. B. P. 84. X flor blanca y olorosa.

Testiculus odoratus. Lob. X Testiculo con la flor olo-
ic. 186. X resa.

DE LAS MISMAS FLOR. CON II. ESTAMB. 811

Orchis spiralis, odorata, *Orchis* con la espiga espi-
alba. Bauh. hist. 2. p. 269. ral; flor blanca y olorosa.

Tourn. p. 433.

Triorchis seu Tetrorchis, *Planta* de tres, ó quatro
alba, odorata, major. C. B. Testiculos, mayor, con la
P. 84. flor blanca y olorosa. α

Orchiastrum æstivum, *Falso-Orchis* palustre,
palustre, album, odoratum. que nace en el verano, con la
Mich. gen. 30. t. 26. flor blanca y olorosa. β

Epipactis foliis plerisque *Epipactis* con las mas ho-
ex lineari-lanceolatis. Gmel. jas entre lineares y lanceola-
sib. 2. p. 13. t. 3. f. 1. das. χ

Cast. *Ophrys* espiral.

Habita en la Siberia, Alemania, Francia, Austria y Sui-
za: en Cataluña entre los brezos del manso Rival: en
Bustarviejo y en otras partes de España.

Tiene las flores en espiga ladeada y espiral: los tres petá-
los exteriores unidos: el labio casi redondo, y con fes-
toncitos pestafiosos.

Cer-
nua. 4. OPHRYS *bulbis fasci-* *Ophrys* con los bulbos en
culatis, caule folioso, flori- hacecillo; tallo folioso; flo-
bus cernuis, nectarii labio res cabizbaxas; labio del
oblongo integro acuto. nectario oblongo, entero y
agudo.

Cast. *Ophrys* cabizbaxo.

Habita en la Virginia y en el Canadá.

Arroja la raíz con muchas fibras crasas: las hojas radica-
les, lineares y largas; las del tallo que envaynan y cor-
tisimas: la espiga densa y oblonga: las flores apretada-
mente encorvadas ácia atrás y cabizbaxas: las corolas
pequeñas, con los petalos superiores unidos, por su ba-
se ó confluentes: y el labio inferior oblongo, agudo y en-
tero.

Ovata. 5. OPHRYS *bulbo fibro-* *Ophrys* con bulbo fibroso;
so, caule bifolio, foliis ova- tallo de dos hojas, aovadas;
tis, nectarii labio bifido. y labio del nectario hendido
Gagneb. in act. helv. 2. p. en dos partes.
56. t. 6. Flor. dan. t. 137. χ

Ophrys

812 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Ophrys foliis ovatis. Hort. cliff. 429. Act. ups. 1740. p. 28. Ophris con hojas aovadas.

Epipactis foliis binis, ovatis, labello bifido. Hall. helv. n. 1291. t. 37. Epipactis con hojas de dos en dos, aovadas; y labio hendido en dos partes.

Ophrys bifolia. C. B. P. 87. Tourn. p. 437. Ophris con dos hojas.

Ophrys. Fuch. hist. 565. Ophris.

Bifolium. Riv. hexap. t. 7. Planta de dos hojas.

Pseudo-Orchis bifolium. Dod. pempt. 242. Falso-Orchis con dos hojas.

Ophrys trifolia. C. B. P. 87. Tabern. ic. 726. Tourn. p. 437. Ophris con tres hojas. α

Cast. Ophrys aovado.

Habita en los prados algo humedos de Europa: en los quarteles y prados del Real Sitio del Escorial: en los de la Cartuxa del Paular, Avila, Pirineos y en otros de España. 26

Tiene dos hojas opuestas y aovadas en el tallo: el labio linear y medio hendido en dos partes.

Cor- data. 6. OPHRYS *bulbo fibroso, caule bifolio, foliis cordatis.* Gunn. noru. vol. 2. t. 3. f. 6. Gagneb. act. helv. t. 2. p. 75. Ophrys con bulbo fibroso; tallo con dos hojas y de figura de corazon.

Ophrys foliis cordatis. Act. ups. 1740. p. 29. Gmel. sib. 1. p. 25. Ophris con hojas de figura de corazon.

Epipactis foliis binis, cordatis, labello bifido, postice bidentato. Hall. helv. 1297. t. 22. f. 4. Epipactis con hojas de dos en dos, de figura de corazon; labio hendido en dos partes y con dos dientes por debaxo.

Ophrys minima. C. B. P. 87. Prodr. 31. Tourn. p. 437. Ophris muy pequeño.

Bifolium minimum. Bauh. hist. 3. p. 534. Planta con dos hojas y muy pequeña.

Ophris

DE LAS MISMAS FLOR. CON II. ESTAMB. 813

- α *Ophris minima, floribus purpureo-croceis.* Mentz. pug. t. 9. f. 2. X *Ophris* muy pequeño, con flores de color entre purpúreo y azafranado. α

Cast. *Ophrys* de hechura de corazon.

Habita en selvas humedas de la Europa fria.

Posee dos *hojas* opuestas en el tallo y de figura de corazon: el *labio* hendido en dos partes, y señalado con un diente en ambos lados de su base.

ESPECIES CON LOS BULBOS REDONDOS.

- Lilifolia. 7. *OPHRYS bulbo subrotundo, scapo nudo, foliis lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dorsalibus linearibus.* Gron. virg. 138. ehret. act. angl. 1764. n. 53. p. 81. t. 4. X *Ophrys* con el bulbo casi redondo; escapo desnudo, y hojas lanceoladas; labio del nectario entero; y petalos del dorso lineares.

Ophris scapo nudo, foliis radicalibus ovato-oblongis, dimidii scapi longitudine. Gron. virg. 1. p. 185. X *Ophris* con el escapo desnudo; hojas radicales entre aovadas y oblongas, y del largo de la mitad del escapo.

- α *Epipactis foliis binis, ovatis, bulbis pyriformibus foliosa vagina cinctis.* Hall. act. 4. p. 120. X *Epipactis* con hojas de dos en dos, aovadas; bulbos de hechura de pera y cefidos con una vayna foliosa. α

Bifolium bulbosum. Dod. pempt. 292. X Planta con dos hojas; y raíz bulbosa.

Cast. *Ophrys* con hoja de Azucena.

Habita en lugares pantanosos de Virginia, del Canadá y de Suecia. 24

Echa el *escapo* desnudo, y de tres caras: las *hojas* radicales y nerviosas: las *flores* encarnadas; pero con tres petalos angostos, lineares y verdes.

- Lcse. lii. 8. *OPHRYS bulbo subrotundo, scapo nudo trigono, nectarii labello ovato.* X *Ophrys* con el bulbo casi redondo; escapo desnudo, de tres lados; y labio del nectario aovado.

Ophris

814 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Ophris diphyllus, bulbo-~~X~~ *Ophris* con dos hojas; y
sa. Loes. prus. 180. t. 58. ~~X~~ raiz bulbosa.

Cast. *Ophrys* de Loesel.

Habita en lugares pantanosos de Suecia y de Prusia.

Tiene las *hojas* lanceoladas, de dos en dos, y casi del largo del escapo: *éste* desnudo, y por arriba de tres caras: los *petalos* angostos y redoblados: el *labio del nectario* aovado y grande, respecto de los *petalos*: y cinco hasta ocho *flores* no mas en el escapo.

Palu- 9. OPHRYS *bulbo subro-* ~~X~~ *Ophrys* con el bulbo casi
dora. *tundo*, *scapo* subnudo *pen-* ~~X~~ redondo; escapo casi desnudo y de cinco ángulos; ho-
tagono, *foliis apice scabris*, ~~X~~ do y de cinco ángulos; ho-
nectarii labio integro. Pall. ~~X~~ jas ásperas por su ápice; y
it. 3. p. 265. Act. pal. 2. p. ~~X~~ labio del nectario entero.
460.

Orchis minima, bulbosa. ~~X~~ *Orchís* muy pequeño, con
Rai. Suppl. p. 587. ~~X~~ la raiz bulbosa.

Bifolium palustre. Rai. ~~X~~ Planta palustre, con dos
angl. 3. p. 385. ~~X~~ hojas.

Orchis bifolia, minor, ~~X~~ *Orchís* menor, palustre,
palustris. Pluk. alm. 270. t. ~~X~~ y con dos hojas.
247. f. 2. ~~X~~

Cast. *Ophrys* paludoso.

Habita en lugares humedos y turfosos de Suecia, Alemania y Rusia.

Arroja el *bulbo* aovado, encorvado y con muchas raíces por debaxo: el *escapo* de cinco lados, y la mayor parte desnudo: tres, ó quatro *hojas radicales* en forma de espátula y ásperas por su ápice: muchas *flores* en racimo verdes y de color amarillo-roxo: los dos *petalos laterales* entre aovados y oblongos, entre redoblados y derechos: los dos *interiores laterales* lineares y encorvados ácia atrás; y el *superior* recto, y que forma una bóveda donde se recogen los estambres: el *labio del nectario* entre lanceolado y aovado, redoblado y entero.

Los *bulbos* están arrimados entre sí ácia abaxo, como encadenados y separados por medio de un ramito.

Mono-
phyllos

10. OPHRYS *bulbo rotundo, scapo nudo, folio ovato, nectarii labio integro.* Ophrys con el bulbo redondo; escapo desnudo; hoja aovada; y labio del nectario entero.

Epipactis folio unico, amplexicaule, spica prolixa, multiflora. Hall. helv. n. 1293. t. 36. Epipactis con una sola hoja que abraza el tallo; espiga larga y de muchas flores.

Ophris monophyllos, bulbosa. Loes. prus. 180. t. 57. y la raíz bulbosa.

Monorchis Ophyoglossoides. Mentz. pug. t. 5. f. 1. 2. Monorchis ó planta de un solo testículo, y parecida al Ophiogloso ó lengua de sierpe.

Pseudo-Orchis monophyllos. Clus. hist. 1. p. 269. Falso-Orchis con una sola hoja.

Cast. Ophrys de una sola hoja.

Habita en lugares pantanosos de Prusia, de Madelpadia y de Suiza. 4

Tiene las flores menudas y verdes.

Monor-
chus.

11. OPHRYS *bulbo globoso, scapo nudo, nectarii labio trifido cruciato.* Mill. dict. n. 4. Fl. dan. t. 102. Ophrys con el bulbo globoso; escapo desnudo; labio del nectario hendido en tres partes y cruzado.

Herminium bulbo supra radiato, nectarii labio trifido. Act. ups. 1740. p. 29. Herminio con el bulbo radiado por arriba; y labio del nectario hendido en tres partes.

Orchis radice subrotunda, labello hastato. Gmel. sib. 1. p. 18. t. 4. f. 1. Orchis con la raíz casi redonda; y labio de figura de alabarda.

Orchis bulbo unico, subrotundo, labello cruciformi. Hall. helv. n. 1262. t. 22. Orchis con un solo bulbo, casi redondo; y labio en forma de cruz.

Orchis odorata, moschata, seu monorchis. C. B. P. 84. Orchis de olor de almizcle, ó con un solo testículo.

Orchis trifolia, floribus spicatis, herbaceis. Segui. ver. 2. p. 131. t. 16. Orchis con tres hojas; flores en espiga y de color verde.

Or-

316 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

- Orchis coleo unico seu monorchis, flosculis pallide viridibus.* Loes. prus. 184. t. 61. Orchis con un solo testiculo; y flosculos de color verde palido.
- Monorchis.* Mich. gen. 30. t. 26. Rupp. jen. 421. t. 2. Planta con un solo testiculo.
- Orchis lutea, hirsuto folio.* C. B. P. 84. Orchis de flor amarilla; y hoja con pelo áspero. α
- Triorchis lutea, folio glabro.* C. B. P. 84. Planta de tres testiculos, con flor amarilla; y hoja lampiña. β
- Triorchis lutea, altera.* C. B. P. 84. Otra planta con tres testiculos; y flor amarilla. χ
- Monorchis bifolia, flore pallide virente, Prussica.* Mentz. pug. t. 5. f. 5. Planta de Prusia, de un solo testiculo, con dos hojas; y flor de color verde palido, δ

Cast. Ophrys con un solo testiculo,

Habita en prados humedos de la Europa.

Tiene las flores de color entre amarillo y verde, y de olor suave: el labio hendido en tres lacinias, con las laterales transversales: la raiz globosa y solitaria.

Alpina.

12. OPHRYS *bulbis ovatis, scapo nudo, foliis subulatis, nectarii labio indiviso obtuso utrinque unidentato.* Jacq. vind. 295. t. 9. Ophrys con los bulbos aovados; escapo desnudo; hojas alesnadas; labio del nectario indiviso, obtuso, y con un diente en ambos lados, Flor. dan. t. 452.

Orchis radicebus subrotundis, labello ovato, utrinque denticulo notato. Hall. helv. n. 1263. t. 22. f. 1. Orchis con las raices casi redondas; labio aovado y señalado con un dientecito en ambos lados.

Chamae-Orchis alpina, folio gramineo. C. B. P. 81. Prodr. 29. Orchis pequeño, alpino, con hoja como la de la Grama.

Cast. Ophrys alpino.

Habita en los alpes de Laponia y de Suiza. 26

Produce la raiz de dos bulbos casi redondos, y que tienen raices por encima: las mas veces quatro hojas radi-

cales, filiformes, alesnadas y del largo de una pulgada: el *escapo* desnudo, y de la longitud de las hojas: la *espiga* con quatro, ó cinco flores y alternas: cinco *petalos* arrimados entre sí, con la barba ó labio entre aovado y oblongo, entero y apenas mas largo que ellos: dos *vaynas* que visten la base de la planta, y encierran por debaxo las hojas con el *escapo*.

Camts-
chatca.

13. OPHRYS *bulbis*....., X Ophrys con bulbos..... ;
scapo filiformi vaginato, ra- X escapo filiforme y envayna-
como laxo, nectarii labio li- X do; racimo laxo; labio del
neari bifido. X nectario linear, y hendido
en dos partes.

Neottia *nectarii* labio bi- X Neottia con el labio del
fido lineari. Amoen. acad. 2. X nectario hendido en dos par-
p. 361. t. 4. f. 24. X tes y linear.

Cast. Ophrys de Camtschatca.

Habita en la Siberia.

An-
tropo-
phora.

14. OPHRYS *bulbis sub-* X Ophrys con bulbos casi
rotundis, scapo folioso, nec- X redondos; escapo folioso;
tarii labio lineari tripartito, X labio del nectario linear,
medio elongato bifido. Mill. X partido en tres lacinias, con
dict. n. 5. Flor. dan. t. 103. X la del medio alargada y hen-
dida en dos partes.

Neottia *bulbis subrotun-* X Neottia con bulbos casi
dis, nectarii labio quadrifi- X redondos; y labio del necta-
do. Act. ups. 1740. p. 32. X rio hendido en quatro par-
Dalib. paris. 277. X tes.

Orchis *radicibus subro-* X Orchis con las raices casi
tundis, spica longa, flore X redondas; espiga larga; flor
inermi, labello perangusto X inerme; labio muy angosto
quadrifido. Hall. helv. n. X y hendido en quatro partes.
1264. t. 23.

Orchis *flore nudi hominis* X Orchis femenino, con la
effigiem representans, femi- X flor que representa á un hom-
na. C. B. P. 82. Tourn. p. X bre desnudo.
433. Vaill. paris. 147. t. 31. X
f. 19. 20.

Orchis antropophora oreades. Col. ecphr. 1. p. 320. *Orchis* con la flor que representa un hombre salvaje.

Cast. Ophrys con la flor de figura de hombre.

Habita en Italia, Francia, Suiza y Portugal: en Cataluña y otras partes de España.

Tiene las flores en espiga oblonga: los *petalos* arrimados entre sí: el *labio* linear, partido en tres lacinias, con la del medio mas larga y hendida en dos partes.

Insectifera.

15. *OPHRYS bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio subquinelobo.* *Ophrys* con bulbos casi redondos; escapo folioso; y labio del nectario casi hendido en cinco lóbulos.
Mill. dict. n. 6.

Cypripedium bulbis subrotundis, foliis oblongis caulinis. *Cypripedio* con bulbos casi redondos; y hojas del tallo oblongas.
Act. ups. 1740. p. 26. It. oel. 44. 121.

α Ophris (insectifera myodes). *Ophris (que lleva las flores como insectos como moscas).* *α*
Gunn. noru. t. 2. t. 5. f. 1.

Orchis radicibus subrotundis, labello sericeo, bisurco, brachiolis brevibus, subulatis. *Orchis* con las raices casi redondas; labio con vello como seda y de dos surcos; bracitos cortos y alesnados.
Hall. helv. n. 1265. t. 24.

Orchis vespam referens. *Orchis* que se asemeja á una abispa.
Riv. hexap. t. 13. 19.

Orchis muscæ corpus referens, minor, galea & alis herbidis. *Orchis* menor, que se asemeja al cuerpo de una mosca; con el capacete y alas de color verde.
C. B. P. 83. Tourn. p. 434. Vaill. paris. 147. t. 31. f. 17. 18.

β Orchis muscam referens, major. *Orchis* mayor, con la flor que se asemeja á una mosca. *β*
C. B. P. 83. Tourn. p. 434.

κ Orchis muscam referens lutea. *Orchis* con la flor amarilla y que se parece á una mosca. *κ*
C. B. P. 83. Tourn. p. 434.

- Orchis muscam cœruleam* X Orchis cuya flor represen-
majorem representans. Breyn ta una mosca mayor, de co-
Moris. hist. 3. p. 494. sect. lor cerúleo. *A*
12. t. 13. f. 11.
- Orchis myodes, lutea,* X Orchis de Portugal, con
Lusitanica. Breyn. cent. 75. la flor amarilla y que repre-
Moris. hist. 3. p. 495. sect. senta á una mosca. *+*
12. t. 13. f. 15.
- Orchis myodes fusca, Lu-* X Orchis de Portugal, con
sitanica. Breyn. cent. 41. la flor que se asemeja á una
mosca de color pardo. *ø*
- Ophris insectifera arach-* X Ophris cuyas flores repre-
nites. Mill. dict. n. 7. sentan una araña. *γ*
- Orchis radicibus subro-* X Orchis con las raíces casi
tundis, labello holosericeo, redondas; labio todo como
emarginato, appendiculato. seda, escotado y con apen-
Hail. helv. n. 1266. t. 24. dices.
- Orchis araneam referens.* X Orchis con la flor semejan-
C. B. P. 84. Tourn. p. 434. te á una araña.
t. 247. f. C. Vaill. paris. t.
30. f. 10. 11. 12. 13.
- Orchis adrachnitis.* Lob. X Orchis de flor como ara-
ic. 135. ña.
- Orchis fucum referens,* X Orchis con la flor pareci-
colore rubiginoso. C. B. P. da á un zangano, y de color
83. Tourn. p. 434. Vaill. pa- de orin ó rubiginoso. *υ*
ris. 146. t. 31. f. 15. 16.
- Orchis fucum referens,* X Orchis mayor, con la flor
major, foliolis superioribus que se asemeja á un zangano;
candidis & purpurascenti- hojuelas superiores candidas
bus. C. B. P. 83. Tourn. p. y de color que tira á purpú-
434. Vaill. paris. 146. t. 30. reo. *ι*
f. 10. 11. 12. 13.
- Orchis fucum referens,* X Orchis con la flor de color
flore subvirente. C. B. P. 83. casi verde, y que representa
Tourn. p. 434. á un zangano.
- Orchis scarabæum refe-* X Orchis con la flor que se
rens. Breyn. Moris. hist. 3. asemeja á un escarabajo. *κ*
P. 494. sect. 12. t. 13. f. 10. X

820 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

^λ *Orchis cercopithecum ex-* *Orchis* de Portugal, con
primens, Lusitanica. Breyn. *la flor semejante á un ga-*
 Moris. hist. 3. p. 494. sect. *to. λ*
 12. t. 13. f. 4. *X*

Cast. Ophrys insectifera.

Habita en la Europa mas templada: en prados de Casti-
lla la vieja, de Extremadura, Cataluña, Aragon y de
otras muchas partes de España. λ

Atrata. 16. *OPHRYS bulbis....., X* *Ophrys* con bulbos.....,
florum cucullo staminifero cucurucho de las flores que
bicorni. *X* lleva los estambres y con dos
X cuernecillos.

Cast. Ophrys negro.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Schreber. λ

Echa el tallo del largo de un palmo y sencillo: las *hojas*
 esparcidas, numerosas, mas anchas ácia su base, que
 abrazan la mitad del tallo, y ácia su extremidad muy
 alesnadas ó lineares: la *espiga* terminal: las *flores* sen-
 tadas, apartadas; con una *bractea* debaxo de cada una
 de ellas, setácea y de la longitud de la flor: la *corola*
 de cinco petalos, aovados, ó lanceolados y obtusos: el
arco ó bóveda de los estambres del largo de los petalos,
 y terminada en dos cuernecillos, derechos, lineares y
 paralelos. Toda la *planta* secandose se vuelve negra.

Catho- 17. *OPHRYS bulbis fi-* *Ophrys* con bulbos fibro-
lica. *brosis, scapo folioso, flori-* *sos; escapo folioso; y flores*
bus tripetalis, galea ventri- *de tres petalos, con el capa-*
cosa magna, labello crucia- *cete ventricosos y grande; y*
to. Amoen. acad. 6. afr. 94. *el labio cruzado.*
Orchidi affinis, flore lu- *Planta parecida al Orchis,*
teo. Buxb. cent. 3. p. 12. *con la flor amarilla.*
 t. 21. *X*

Cast. Ophrys católico.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

OPHRYS

Cir-
cumfle-
xa. 18. OPHRYS *bulbis in-* X Ophrys con bulbos indi-
divisis, floribus tripetalis, X visos; flores de tres petalos;
alis emarginatis, labio tri- X alas escotadas; y labio hen-
fido, lateralibus circumfle- X dido en tres lacinias, con las
xis. Amœn. acad. 6. afr. 95. X laterales dobladas al rededor.

Orchis barba carens, flo- X Orchis sin barba; y con
re luteo viridi. Buxb. cent. X flor entre amarilla y verde.

3. p. 8. t. 13. X

Cast. Ophrys doblado al rededor.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Caffra. 19. OPHRYS *bulbis.....,* X Ophrys con bulbos.....;
nectarii labio reniformi la- X labio del nectario en forma
tissimo emarginato. Amœn. X de rision, muy ancho y esco-
acad. 6. afr. 96. X tado.

Cast. Ophrys de Caffra.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Vo-
lucris. 20. OPHRYS *bulbis sub-* X Ophrys con bulbos casi
rotundis, labio triangulari X redondos; labio triangular y
sagittato. Suppl. p. 403. X en forma de saeta.

Cast. Ophris como ave.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm.

Tiene la caña del largo de un pie: las hojas del tallo que le abrazan, aovadas, oblongas, puntiagudas y nerviosas: la espiga oblonga, y con muchas flores apartadas: el petalo primero entre los siguientes, lanceolado y derecho; el segundo y tercero mas altos, exteriores, aovados al revés y derechos; el quarto y quinto aovados, cóncavos, redoblados y algo mas cortos que los primeros: el labio triangular y en forma de saeta.

Brac-
teata. 21. OPHRYS *bulbis sub-* X Ophrys de bulbos casi
rotundis, spica bracteis lon- X redondos; espiga entrevera-
gioribus mixta, labio trilo- X da con bracteas mas largas;
bo. Suppl. p. 403. X y labio hendido en tres ló-
bulos.

Cast. Ophrys con bracteas largas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm.

822 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Posee la *caña* del largo de un xeme: las *hojas radicales*, aovadas y nerviosas; muchas en el *tallo* entre aovadas y oblongas: la *espiga* densa, con muchas flores separadas por medio de bracteas mas largas que la flor, aovadas y extendidas: el *petalo superior* casi redondo y arqueado: y el *labio* mas corto y hendido en tres lóbulos.

Bival- 22. OPHRYS *bulbis*....., X Ophrys con bulbos..... ;
bata. *floribus fasciculatis, labio* X flores en hacecillo; y labio
lanceolato. Suppl. p. 403. X lanceolado.

Cast. Ophrys con dos ventallas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Sparrm.*

Arroja la *caña* del largo de un xeme, ó de un pie: muchas *hojas* (*diez y seis*) alternas, esparcidas por toda la *caña* entre lanceoladas y alesnadas, con su base mas ancha y que envaynan: la *espiga* corimbosa, y sin pedunculo separado: el *germen* señalado con estrias: los *tres petalos superiores* casi iguales y aovados; el *mas alto* arqueado, y los *dos de estos laterales* extendidos; los *otros dos laterales inferiores* insertos á la máquina genital, algo crasos, oblongos, obtusos, y mas pequeños que los petalos primeros: el *labio* gruesecito, semejante á los petalos laterales inferiores, y lanceolado.

Alata. 23. OPHRYS *bulbis ro-* X Ophrys con bulbos redon-
tundis, caule folioso, foliis X dos; tallo folioso; hojas lan-
lanceolatis, labello trifido, X ceoladas; labio hendido en
lacinia media brevissima. X tres lacinias, con la del me-
Suppl. p. 404. X dio cortísima.

Cast. Ophrys alado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Es *planta* pequeña.

Alaris. 24. OPHRYS *nectarii la-* X Ophrys con el labio del
bio integro undato. Suppl. X nectario entero y ondeado.
p. 404. X

Cast. Ophrys alar.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Sparrm.*

Tiene la *caña* del largo de un xeme y aun mas: *tres ho-*
jas

jas en ella ; la *primera* poco formada ; la *segunda* entre oval y lanceolada ; y la *tercera* en forma de espata : la *espiga* de pocas flores ; con *bracteas* aovadas y agudas : el *petalo primero* lanceolado y cóncavo ; el *segundo* y *tercero* muy anchos , casi redondos y de la longitud del primero ; el *quarto* y *quinto* de hechura de medio corazon , puntiagudos y de la misma longitud : el *labio* que sale de la máquina genital , mas pequeño , entre aovado y lanceolado , y ondeado.

Patens. 25. OPHRYS *pumila*, fo-~~X~~ Ophrys enano , con hojas
liis subulatis, *nectarii labio* ~~X~~ alesnadas ; labio del nectario
brevissimo capillari. Suppl. ~~X~~ cortísimo y capilar.
P. 404. ~~X~~

Cast. Ophrys extendido.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm.

Produce la *caña* casi del largo de un palmo , y apiñada longitudinalmente con hojas alesnadas , y puntiagudas , que le envaynan : las *hojas radicales* cortas y lineares : dos, hasta quatro *flores* mayorcitas : el *petalo primero* de figura de corazon y agudo ; el *segundo* y *tercero* menudos , oblongos y puestos debaxo del primero ; el *quarto* y *quinto* de hechura de medio corazon , casi lanceolados , de la longitud del primero y extendidos : el *labio* casi capilar , linear y cortísimo.

1204. Género SERAPIAS. * Helleborine

Tourn. t. 249.

CAR. GEN. NAT.

Cor. Espatas vagas : y Espadice sencillo.

Periantio ninguno.

Cor. Petalos cinco , entre aovados y oblongos , entre derechos y extendidos , y por arriba arrimados entre sí.

Nectario del largo de los petalos , excavado en su base , melífero , aovado , giboso por debaxo , agudo y hendido en tres lacinias , con la intermedia de figura de

co-

824 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

corazon, obtusa, con una cicatriz en su base, hendi-
da en dos partes y con tres dientes.

ESTAMB. *Filamentos* dos, cortísimos y sentados en el pistilo: con las *anteras* derechas, y colocadas debaxo del labio superior del nectario.

PIST. *Germen* oblongo, retorcido y debaxo de la flor: *estilo* pegado al labio superior del nectario: con el *estigma* desfigurado.

PERIC. *Capsula* aovada al revés, de tres lados poco manifestos, con tres quillas, que se abre por debaxo de ellas, con tres ventallas y una celdilla.

SEM. numerosas, y en forma de serrín. *Receptaculo* linear, y pegado á cada ventalla del pericarpio.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.

HELLEBORINE. p. 436.

La flor es de muchos petalos, anomala ó que consta de seis petalos desemejantes; de los quales cinco se hallan puestos en cerco; y el inferior apiñado: el caliz (*es el germen*) pasa á fruto, ú odrecillo que se abre por tres ventanas á las quales están arrimadas las ventallas, llenas de simientes muy menudas y á manera de serrín. A estas notas se añade la de las raices fibrosas.

ESPECIES.

Lati-
folia.

I. SERAPIAS *bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulis, floribus pendulis.* Gunn. noru. n. 970. t. 5. f. 3. 6.

Serapias bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso crenato petalis brevior. Act. ups. 1740. p. 21. Dalib. paris. 276.

Serapias con bulbos fibrosos; hojas aovadas, amplexicaules; y flores pendulas.

Serapias con bulbos fibrosos; labio del nectario obtuso, recortado y mas corto que los petalos.

Serapias bulbis fibrosis, *nectarii labio obtuso crenato*, *petalis aequali*, *fructibus pendulis*. Huds. angl. 341. Serapias con bulbos fibrosos; labio del nectario obtuso, recortado, igual á los petalos; y frutos pendulos.

Serapias bulbis fibrosis, *floribus secundis*, *labello planiusculo*, *petalis ovatis*. Scop. carn. 255. ed. 2. n. 1128. Serapias con bulbos fibrosos; flores que miran á un lado; labio algo plano; y petalos aovados.

Epipactis foliis amplexicaulibus, *ovato-lanceolatis*, *labello lanceolato*. Hall. helv. n. 1297. t. 40. Act. helv. 4. p. 108. Epipactis con hojas amplexicaules, entre aovadas y lanceoladas; y labio lanceolado.

Epipactis seu Helleborine. Cam. epit. 187. Epipactis ó Heleborine.

Helleborine latifolia, *montana*. C. B. P. 186. Tourn. p. 436. Heleborine montana, con hoja ancha.

Helleborine. Dod. pempt. Heleborine.

384. *Helleborine altera*, *flore atro-rubente*. C. B. P. 187. Otra Heleborine, con la flor entre negra y roxa.

Cast. Serapias de hojas anchas.

Habita en las selvas de Europa: en Aragon, Cataluña, Asturias, Alcarria y en otras partes de España. 24

Tiene las hojas que abrazan el tallo: la espiga de muchas flores y larga: los pecioloos tambien largos: las flores y frutos pendulos.

Longi-
folia. 2. SERAPIAS *bulbis fibrosis*, *foliis ensiformibus sessilibus*, *floribus pendulis*. Oed. dan. t. 267. Serapias con bulbos fibrosos; hojas en forma de espada, sentadas; y flores pendulas.

Serapias bulbis fibrosis, *nectarii labio obtuso*, *longitudine petalorum*. Ger. prov. 132. Serapias con bulbos fibrosos; labio del nectario obtuso y de la longitud de los petalos.

826 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Serapias (palustris) *bulbis fibrosis, floribus sparsis, patulis, labello concavo, petalis longiore.* Scop. carn. 1. p. 256. n. 3. ed. 2. n. 1129. *Serapias* (palustre) con bulbos fibrosos; flores esparcidas y extendidas; labio cóncavo y mas largo que los petalos.

Epipactis foliis ensiformibus, caulinis, floribus pendulis, labello obtuso, oris plicatis. Hall. helv. n. 1296. t. 39. Act. helv. 4. p. 111. *Epipactis* con hojas en el tallo, en forma de espada; flores pendulas; labio obtuso y plegado en sus orillas.

Helleborine angustifolia, palustris sive pratensis. C. B. P. 187. Tourn. p. 436. Riv. hexap. t. 3. *Helleborine* palustre ó praten-
tense, con hoja angosta.

Helleborine recentiorum, III. Clus. hist. 1. 273. *Helleborine* tercera, de los modernos.

Cast. *Serapias* de hoja larga.

Habita en lugares ásperos y en selvas de Europa: y en los mismos lugares de España que la antecedente. 24

Echa el tallo mas largo que la precedente: la *espiga* larga, con muchas flores pendulas y al doble mayores que los petalos mas anchos: los *frutos* tambien pendulos: el *nectario* unido con los demas petalos; y la *navecilla* señalada con lineas purpúreas. *Hall.*

Gran-
diflora. 3. *SERAPIAS bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis, nectarii labio obtuso, petalis brevior.* It. oel. 144. Oed. dan. t. 506. *Serapias* con bulbos fibrosos; hojas en forma de espada; flores derechas; labio del nectario obtuso y mas corto que los petalos.

Epipactis caule paucifloro, lineis obtusi labelli levibus. Hall. helv. n. 1298. t. 41. *Epipactis* con el tallo de pocas flores; y lineas del labio obtuso ligeras ó superficiales.

Helleborine alba, barba luteola. Riv. hexap. t. 4. *Helleborine* con la flor blanca, y la barba ó labio algo amarillo.

DE LAS MISMAS FLOR. CON II. ESTAMB. 827

Helleborine flore albo, X Heleborine con la flor blan-
Damasonium montanum, latifolium. C. B. P. 187. To- X ca, ó Damasonio montano,
 urn. p. 436. X de hoja ancha.

Damasonium alpinum, X Damasonio alpino, ó He-
sive Helleborine floribus al- X leborine con flores blancas.
bis. Bauh. hist. 3. p. 516.

ß *Helleborine montana, angustifolia, spicata*. C. B. P. X Heleborine montana, con
 187. X flores en espiga y hoja an-
 gusta. α

Cast. Serapias de flor grande.

Habita en las selvas de Europa. 24

Arroja las flores blancas y grandes: el fruto derecho: el labio corto, menos agudo y con líneas que sobresalen. Haller.

Rubra. 4. SERAPIAS *bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis, nectarii labio acuto*. Oed. dan. t. 345. X Serapias con bulbos fibro-
 sos; hojas en forma de espada; flores derechas; y labio del nectario agudo.

Epipactis caule paucifloro, lineis acuti labelli undulatis. Hall. helv. n. 1299. X Epipactis con tallo de pocas flores; y líneas del labio agudo ondeadas.
 t. 42.

Damasonium flore roseo. X Damasonio con la flor de
 Riv. hexap. t. 6. X color de rosa.

Helleborine montana, angustifolia, purpurascens. C. X Eleborine montana, con
 B. P. 187. Tourn. p. 436. X hoja angosta; y flor de color
 que tira á purpúreo.

Helleborine flore carneo. X Eleborine con la flor de
 C. B. P. 187. X color de carne.

Helleborines genus V. X Quinto género de Elebo-
 Clus. pann. 575. X rine.

Cast. Serapias con la flor roxa.

Habita en las selvas de Europa: y en los mismos parages de España que la del número primero. 24

Produce las flores de color purpúreo, y grandes: y los frutos derechos.

828 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Lingua 5. *SERAPIAS bulbis subrotundis, nectarii labio trifido acuminato glabro petalis longiore.* Ad. ups. 1740. p. 23. Serapias con bulbos casi redondos; labio del nectario hendido en tres partes, puntiagudo, lampiño, y mas largo que los petalos.

Orchis radicibus subrotundis, petalis galeæ conglutinatis, longissime rostratis, labello trilobo ovato-lanceolato. Hall. helv. n. 1267. Orchís de raíces casi redondas; petalos del capadete conglutinados, con picos larguissimos; labio hendido en tres lóbulos y entre aovado y lanceolado.

Satyrium radicibus subrotundis, cucullo clauso monopetalo: labello ovato-lanceolato. Sav. monsp. 24. Satyrio con raíces casi redondas; cucurucho cerrado, de un petalo; y labio entre aovado y lanceolado.

Orchis montana, Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga. C. B. P. 84. Prodr. 29. Tourn. p. 434. Orchís montano, de Italia, con la flor de color ferrugineo, y su lengua oblonga.

α *Orchis macrophylla.* Col. ecphr. 2. p. 321. t. 322. Orchís de hoja larga. α

Cast. Serapias con lengua.

Habita en Italia, Francia y Portugal: en Cataluña, Castilla la vieja, Alcarria y en otras partes de España. 26 Posee las brácteas muy largas y muy anchas.

Cor-algera. 6. *SERAPIAS bulbis subrotundis, nectarii labio trifido acuminato maximo, basi barbato.* Serapias con bulbos casi redondos; labio del nectario hendido en tres partes, puntiagudo, muy grande y barbado en su base.

Orchis montana, Italica, lingua trifida. Rudb. elys. 2. p. 204. f. 20. Orchís montana, de Italia, con la lengua hendida en tres partes.

Cast. Serapias cordigera, ó con el labio del nectario casi de figura de corazon.

Habita en España, Italia y Oriente.

Es semejante á la *Serapias lingua*; pero mayor. Tiene el labio del nectario casi de hechura de corazon, barbado en

en medio de su base , con una orejilla derecha y obtusa en ambos lados.

Ca-
pensis. 7. SERAPIAS *foliis con-* Serapias con hojas plega-
duplicato ensiformibus, cau- das, en forma de espada; ta-
le superne nudiusculo, va- llo algo desnudo por arriba;
ginis spathaceis. y vainas como espatas.

Cast. Serapias del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Arroja el tallo del largo de un pie , derecho , muy sencillo y liso : las *hojas radicales* en forma de espada , plegadas , lisas , del largo de un dedo y agudas ; las del *tallo* desfiguradas , alternas , apartadas , oblongas , agudas , del largo de una pulgada y que envaynan : el *racimo* terminal , muy sencillo y ladeado ; con *once ó doce flores* colocadas cada una en su pedunculo propio : las *bracteas* lanceoladas , membranosas y mas cortas que la flor : la *corola* de cinco petalos lanceolados , lisos y derechos ; con el *labio del nectario* hendido en dos partes

Xipho-
phyllum. 8. SERAPIAS *bulbis fi-* Serapias con bulbos fibro-
brosis, foliis ensiformibus sos; hojas en forma de espa-
distichis, bracteis minutis- da y que miran á ambos la-
simis, floribus erectis, nec- dos ; bracteas menudisimas ;
tarii labio obtuso petalis flores derechas, con el labio
breviore. Suppl. p. 404. del nectario obtuso y mas
corto que los petalos.

Serapias grandiflora (en- Serapias con la flor gran-
sifolia) Syst. veg. ed. 13. p. de (*hojas en forma de espa-*
679. da).

Xiphophyllum. Ehrh. phy- Planta con hoja en forma
toph. n. 67. de espada.

Cast. Serapias con hojas en forma de espada.

Habita en Alemania y Suiza. *Ehrhart.* 24

830 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Lon- 9. *SERAPIAS bulbis fi-* Serapias con bulbos fibro-
cho- *brosis, foliis ovato-lanceo-* sos; hojas entre aovadas y
phyl *latis, bracteis longitudine* lanceoladas; bracteas del
lum. *capsulæ, floribus erectis,* largo de la capsula; flores
nectarii labio obtuso, petalis derechas, con el labio del
breviore. Suppl. p. 405. nectario obtuso y mas corto
que los petalos.

Serapias grandiflora (lan- Serapias de flor grande
cifolia). Syst. veg. ed. 13. (con hoja de lanza).
p. 679.

Lonchophyllum. Ehrh. Planta con hoja de lanza,
phyt. n. 57.

Cast. Serapias con hoja de lanza.

Habita en Alemania y Suiza: *Ehrhart.* 2

1205. Género LIMODORUM. † *Gron. virg.* 110.

Roy. lugdb. 16.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espatas vagas. Espadice sencillo.*

Periantio ninguno.

COR. *Petalos cinco, entre aovados y oblongos, casi igua-*
les, extendidos, y los superiores arrimados entre sí.

Nectario de una pieza, cóncavo, con piececito, coloca-
do dentro del petalo infimo, y del largo de los pe-
talos.

ESTAMB. dos: un *filamento* que forma un cuerpo oblongo,
ascendente y del largo de la corola: con dos *anteras*
aovadas, y que miran ácia adelante.

PIST. *Germen* en forma de columna, del largo de la coro-
la y debaxo de la flor: *estilo* filiforme, y pegado al
cuerpo del filamento: con el *estigma* en forma de
embudo.

PERIC. *Capsula* como columna, de tres ventallas, de una
celdilla y que se abre por los ángulos.

SEM. numerosas y en forma de serrin.

ESPECIES.

- Tuber-
osum. 1. LIMODORUM *floribus sessilibus racemosis alternis*. Roy. lugdb. 16. Gron. nas. *Limodoro con flores sentadas, en racimo y alternas.*
virg. 138. Act. ups. 1740. p. 21. Mill. dict. & ic. t. 145.
Helleborine Americana, radice tuberosa, foliis longis angustis, caule nudo, floribus ex rubro pallide purpurascens. Mart. roxo tira á purpúreo palido.
cent. 50. t. 50.

Cast. Limodoro tuberoso.

Habita en la America septentrional. 24

- Altum. 2. LIMODORUM *floribus pedunculatis, sparsis*. *Limodoro de flores con pedunculo y esparcidas.*
Syst. veg. 680.
Helleborine radice arundinacea, foliis amplissimis lyratis. Plum. spec. 9. ic. 189. *Heleborine con la raiz como de caña; hojas muy anchas y en forma de lira.*

Cast. Limodoro alto.

Habita en la America. 24

No tiene barba en las flores, como la antecedente; pero son numerosisimas y esparcidas.

1206. Género ARETHUSA. † Gron. Orchidion

Mitch. 19.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Espata foliosa.

Periantio ninguno.

COR. boquiabierta, de cinco petalos oblongos, casi iguales, con dos exteriores, y todos arrimados entre sí en forma de capacete.

Neetario de una pieza, tubuloso por su base, colocado den-

832 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

dentro del fondo de la corola y partido en dos labios: el *inferior* redoblado, ancho, rugoso, del largo de los petalos y que cuelga; el *superior* linear, muy tierno, pegado al estilo y hendido en lóbulos por su ápice.

ESTAMB. *Filamentos* dos, cortísimos y sentados en el remate del pistilo: con las *anteras* aovadas, comprimidas, y cubiertas con el pliegue del labio interior del néctario.

PIST. *Germen* oblongo y debaxo de la flor: *estilo* oblongo, encorvado y vestido con el labio interior del néctario: y el *estigma* en forma de embudo.

PERIC. *Capsula* entre oblonga y aovada, de una celdilla, de tres ventallas y que se abre por los ángulos.

SEM. numerosas, lineares y rígidas.

OBS. El labio inferior del néctario *pegado al estilo*. Syst. veg. 630.

ESPECIES.

Bul-
bosa. **I. ARETHUSA** *radice* X Arethusa con la raiz glo-
globosa, scapo vaginato, X bosa; escapo envaynado; y
spatha diphylla. Amœnit. X espata de dos hojuelas.
acad. 3. p. 15.

Arethusa. Gron. virg. X Arethusa.
184.

Serapias bulbis subrotun- X Serapias con bulbos casi
dis, caule unifloro. Act. ups. X redondos; y tallo de una
1740. p. 24. X flor.

Orchidi affinis aquatica, X Planta aquatica, pequeña,
verna, exigua. Gron. virg. X que nace en la primavera, y
119. X semejante al Orchis.

Helleborine Mariana, X Heleborine de la Isla Ma-
monanthos, flore longo, pur- riana, con una flor, larga,
purascente, liliaceo. Pluk. X de color que tira á purpúreo
mant. 100. t. 348. f. 7. X y á manera de azucena.

Cast. Arethusa bulbosa.

Habita en lugares aguanosos de la Virginia y del Cana-
dá. ¶

ARE-

Onho-
glossa-
ides.

2. *ARETHUSA radice fibrosa, scapi folio ovali, foliolo spathaceo lanceolato.* Arethusa con la raíz fibrosa; hoja del escapo oval; y la hojuela como espata lanceolada. Gron. virg. 139.

Cypripedium folio caulino ovato-oblongo, terminali lanceolato plano. Hort. cliff. 430. Gron. virg. 1. p. 110. Cypripedio con la hoja del tallo entre aovada y oblonga; y la terminal lanceolada y plana.

Helleborine Virginiana, Ophyoglossi folio. Pluk. alm. 182. t. 93. f. 2. Heleborine de Virginia, con hoja como la del Ophiogloso ú lengua de serpiente.

Helleborine Virginiana, diphylla. Moris. hist. 3. p. 488. sect. 12. t. 11. f. 15. Heleborine de Virginia, con dos hojuelas. mala.

Cast. Arethusa como el Ophiogloso.

Habita en lugares aguanosos de la Virginia y del Canadá. 24

Diva-
ticata.

3. *ARETHUSA radice subpalmata, scapi folio folioloque spathaceo lanceolatis, petalis exterioribus ascendentibus.* Gron. virg. 139. Arethusa con la raíz algo palmeada; hoja y hojuela del escapo como espata, lanceoladas; y petalos exteriores ascendentes.

Serapias radicibus palmato-fibrosis, caule unifloro. Gron. virg. 1. p. 184. Serapias con las raíces entre palmeadas y fibrosas; y tallo de una flor.

Helleborine Lilii folio, caulem ambiente, flore unico hexapetalo, tribus petalis longis angustis obscure purpureis, ceteris brevioribus rosaceis. Catesb. car. 1. P. 58. t. 58. Heleborine con hoja como la de la Azucena, que abraza el tallo; y una sola flor de seis petalos, con los tres largos, angostos, de color purpúreo obscuro; y los restantes mas cortos y de color de rosa.

Cast. Arethusa desparramada.

Habita en lugares pantanosos de la America boreal. 24

834 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Villosa. 4. ARETHUSA *pubes-* Arethusa vellosa, con el
cens, *bulbo rotundo*, *foliis* bulbo redondo; hojas aova-
ovatis ciliatis. Suppl. p. 405. das y pestañosas.

Cast. Arethusa vellosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Se asemeja á la Comelina.

Ci- 5. ARETHUSA *radice* Arethusa con la raíz car-
 liaris. *carnosa*, *folio reniformi-or-* nosa; hoja entre de figura de
biculato, *labio ciliari*. Suppl. rison y redondeada; y el la-
 p. 405. bio pestañoso.

Orchis Burmanniana. Orchís de Burman.

Syst. veg. ed. 13. p. 674.

Cast. Arethusa pestañosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm.

Arroja el bulbo vellosos, mellizo y algo oblongo: el escapo del largo de un xeme, y un poco vellosos: una hoja casi radical, de figura de corazon, algo redonda, nerviosa, amplexicaule, casi sentada y algo vellosa: la espata aovada, amplexicaule, algo aguda, pequeña y vellosa: una sola flor y cabizbaxa: el germen debaxo de ella, peloso y del largo de los petalos: los tres petalos superiores derechos y lanceolados: otros dos interiores mas largos, y entre lanceolados y en forma de espada: el nectario por debaxo como un cuernecillo que termina en media luna, y mas corto que el germen: el labio grande, pestañoso, casi partido en tres lacinias, con la del medio hendida en dos partes, y pedacitos setáceos mas largos que el mismo labio: la columna de los estambres ascendente, y la mitad mas corta que los petalos: dos estilos filiformes, paralelos, que salen afuera y del largo de la columna: los estigmas oblongos, y algo mas angostos que los estilos.

Biplu- 6. ARETHUSA *scapo va-* Arethusa con el escapo
 mata. *ginato*, *spatha cucullata*, envaynado; espata á manera
petalis duobus inferioribus de cucurucho; y los dos pe-
elongatis superiore latere talos inferiores alargados, y
barbatis. Suppl. p. 405. barbados por el lado superior.

Bipinulla. Thouvin. lit. Bipinula.

Cast.

Cast. Arethusa dos veces cubierta de plumas.

Habita en el estrecho de Magallanes. Fue comunicada á Linneo por Monsieur Tovin.

Produce el tallo muy sencillo y del largo de un pie : las *hojas radicales* alesnadas: seis ó siete en el tallo, membranosas, y que le visten; y la de mas arriba mas ancha y que sirve en lugar de espata: la flor terminal, solitaria, vertical y con el pedunculo corto: el germen debaxo de la flor, en forma de pera y lampiño: la corola de cinco petalos, desiguales, y puestos en dos órdenes; los tres exteriores desiguales; el de mas arriba en forma de capacete, lanceolado, agudo y encorvado; los dos inferiores alesnados, vez y media mas largos que los restantes, ascendentes, barbados ácia su ápice con pelos á manera de maza, por el lado que se inclina ó mira arriba: y los dos interiores opuestos, aovados, apenas mayores que el capacete y obtusos. Dentro de estos petalos se hallan el nectario y genitales, que en una sola flor secada con hierro muy caliente, no pudieron examinarse. Es planta muy distinguida en esta familia.

Capensis I.

7. ARETHUSA radice X Arethusa con la raiz carnosa, scapo foliato, pedunculosa; escapo con muchas hojalas; petalos exteriores mas largos y con cola.

6. afr. 97.

Cast. Arethusa del Cabo de Buena-esperanza 1.^a

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Capensis II.

8. ARETHUSA bulbo rotundo, caule diphylo simplicifloro. Suppl. p. 405. Arethusa de bulbo redondo; tallo con dos hojuelas, sencillo y de una flor.

Cast. Arethusa del Cabo de Buena-esperanza 2.^a

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Tiene dos hojas alternas, alesnadas y que envaynan.

1207. Género CYPRIPEDIUM. * Calceolus

Tourn. t. 249.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espatas* vagas. *Espadice* sencillo.

Periantio ninguno.

COR. *Petalos* quatro ó cinco, entre lanceolados y lineares, larguissimos, extendidos y derechos.

Nectario dentro del petalo infimo, en forma de zapato, inflado, obtuso, hueco, mas corto y mas ancho que los petalos; con el *labio superior* aovado, plano, doblado y pequeño.

ESTAMB. *Filamentos* dos, cortísimos y sentados en el pistilo: con las *anteras* derechas, y cubiertas con el labio superior del nectario.

PIST. *Germen* largo, retorcido y debaxo de la flor: *estilo* cortísimo y pegado al lado superior del nectario: con el *estigma* desfigurado.

PERIC. *Capsula* aovada al revés, con tres lados obtusos, y tres suturas, por debaxo de cuyos ángulos se abre en tres ventallas y una celdilla.

SEM. numerosas y muy pequeñas. *Receptaculo* linear, y pegado longitudinalmente á cada ventalla del pericarpio.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

CALCEOLUS. p. 436.

La flor es de muchos petalos, anomala ó que consta de seis petalos desemejantes, quatro de los quales están puestos á manera de cruz, y los dos restantes ocupan el centro: el petalo que se halla dividido en dos partes está hechado sobre el petalo inflado, cóncavo y semejante á un zapato de madera. El caliz (*es el germen*) pasa á fruto ú odrecillo que se abre en tres ventanas, á las quales están arrimadas las ventallas llenas de semillas muy menudas y á manera de serrin.

E S P E C I E S.

- Cal-
ceolus
1. CYPRIPEDIUM radi-
cibus fibrosis, foliis ovato-
lanceolatis caulinis. Act. ups.
1740. p. 24. Mill. dict. n. 1.
ic. t. 242. Gmel. sib. 1. p. 2.
t. 1. Knorr. del. hort. 1. t.
M. 2.
- Calceolus foliis ovato-lan-
ceolatis. Gmel. sib. 1. p. 2.
t. 1.
- Calceolus Marianus. Dod.
pempt. 180. f. 1. 2. Tourn.
P. 437.
- Helleborine flore rotundo,
sive Calceolus. C. B. P. 187.
- α Helleborine Calceolus dic-
ta Mariana, caule folioso,
flore luteo, minore. Pluk.
mant. 101. t. 418. f. 2.
- Helleborine Virginiana,
seu Calceolus, flore luteo,
majore. Moris. hist. 3. p.
488. sect. 12. t. 11. f. 15.
- β Calceolus Marianus, Ca-
nadensis. Cor. canad. 204.
- Helleborine flore majore,
purpureo. Moris. hist. 3. p.
488. sect. 12. t. 11. f. 17.
- χ Calceolus minor, flore va-
rio. Amm. ruth. 133. t. 22.
- Calceolus foliis ovatis bi-
nis. Gmel. sib. 1. p. 5.

Cypripedio con las raíces
fibrosas; hojas entre aova-
das y lanceoladas, y puestas
en el tallo.

Zapatillo con hojas entre
aovadas y lanceoladas.

Zapatillo de Maria.

Heleborine con la flor re-
donda, ó Zapatillo.

Heleborine llamada Zapa-
tillo de Maria, con el tallo
folioso; flor amarilla y mas
pequeña. α

Heleborine de Virginia, ó
Zapatillo con la flor amarilla
y mas grande.

Zapatillo de Maria, del
Canadá. β

Heleborine con la flor mas
grande y de color purpúreo.

Zapatillo menor, con la
flor de varios colores. χ

Zapatillo con hojas aova-
das y de dos en dos.

Cast. Cypripedio Zapatillo.

Habita en la Europa, Asia y America septentrionales: en
la plana de Vich en Cataluña: en los montes de Avila
y Moncayo: en los Pirineos y otros parages de Espa-
ña. 24

La flor es de quatro petalos,

Ggg 2

CY-

338 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Bulbo- 2. CYPRIPEDIUM bul- X Cypripedio con el bulbo
sum. bo subrotundo, folio subro- X algo redondo; hoja radical
tundo radicali. Aët. ups. X y casi redonda,
1740. p. 25.

Cypripedium folio subro- X Cypripedio con hoja casi
tundo. Flor. Lapp. 319. t. 12. X redonda.
f. 5.

Serapias scapo uniflora. X Serapias con el escapo de
Gmel. sib. 1. p. 7. t. 2. f. 1. X una flor.

Orchis Lapponensis, mo- X Orchis de Lapponia, con
nofolia. Rudb. elys. 2. p. X una hoja sola.
209. f. 10.

Cast. Cypripedio bulboso.

Habita en Lapponia, Rusia y Siberia.

Posee la flor con cinco petalos.

1208. Género DISA. Berg. cap. Suppl. p. 59.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Espata de una ventalla, puntiaguda, oblonga, y que por una parte se abre longitudinalmente.

COR. tres petalos aovados, extendidos, grandes y casi iguales; el superior impar, que por detrás en su base tiene un cuernecillo muy corto y obtuso, y otro petalo en el dorso del estambre, mas corto que él, y partido en dos lacinias oblongas, obtusas y arrimadas entre sí.

ESTAMB. un filamento alesnado: con dos anteras unidas en forma lanceolada, poco mas cortas que la corola, alesnadas por su base, que se abren y están hechadas sobre el estilo.

PIST. Germen debaxo de la flor y del largo de la espata: estilo en forma de lengüeta, corto, excavado por su base, y con dos astitas ácia atrás.

PERIC. Capsula oblonga, y de tres ventallas.

SEM. numerosas y menudas.

ESPECIES.

Gran-
diflora. 1. *DISA cornu petalis* X Disa con el cuernecillo
breviore , caule subbifloro. X mas corto que los petalos ; y
Suppl. p. 406. X tallo casi de dos flores.

Disa uniflora. Berg. cap. X Disa con una flor.
448. t. 4. f. 7.

Orchis Africana , flore X *Orchis* de Africa, con una
singulari, herbaceo. Rai. hist. X flor, y de color verde.
vol. 3. p. 586. X

Cast. Disa con la flor grande.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Echa el tallo del largo de un pie, derecho, muy sencillo
y liso: las *hojas* mas cortas que el tallo; las *radicales*
entre lanceoladas y lineares; y tres en el tallo alternas,
puntiagudas y que envaynan, con su disco mas corto
que las vaynas: una ó dos *flores* terminales, con pedun-
culo, é inclinadas; y la posterior tambien con peduncu-
lo, que sale de la espata y mas largo que el de la pri-
mera.

Race-
mosa. 2. *DISA cornu petalis* X Disa con el cuernecillo
breviore, floribus racemosis. X mas corto que los petalos ; y
Suppl. p. 406. X flores en racimo.

Cast. Disa racimosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Longi-
cornu. 3. *DISA cornu petalis* X Disa con el cuernecillo
longiore , scapo unifloro. X mas largo que los petalos ; y
Suppl. p. 406. X escapo de una flor.

Cast. Disa con el cuernecillo largo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Tiene la flor cerúlea.

Macu-
lata. 4. *DISA cornu conico bre-* X Disa con el cuernecillo có-
vissimo, scapo unifloro. Sup- X nico, cortísimo; y el escapo
pl. p. 407. X de una flor.

Cast. Disa manchada.

Ha-

840 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Lleva las *hojas* radicales y oblongas: el *tallo* y la *vayna* manchados de color roxo: y la *flor* cerúlea.

1209. Género EPIDENDRUM. * H. P. B. 127.

Vanilla Plum. 28.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espatas* vagas. *Espadice* sencillo.

Periantio ninguno.

COR. *Petalos* cinco, oblongos, larguissimos y muy extendidos.

Nectario tubuloso en su base, de hechura de trompo, y colocado dentro de los *petalos* ácia abaxo, con su boca obliqua y hendida en dos labios; el *superior* cortísimo, hendido en tres lacinias; y el *inferior* alargado en punta.

ESTAMB. *Filamentos* dos, cortísimos y sentados en el pistilo: con las *anteras* cubiertas con el labio superior del nectario.

PIST. *Germen* delgado, largo, retorcido y debaxo de la flor: *estilo* cortísimo, y pegado al labio superior del nectario: con el *estigma* desfigurado.

PERIC. *Siliqua* larguissima, rolliza y carnosa.

SEM. numerosas, y muy menudas.

OBS. *Las mas especies son parasiticas ó que nacen sobre los árboles.*

ESPECIES TREPADORAS.

Va- 1. EPIDENDRUM *scandens*, *foliis ovato-oblongis*, *nervosis sessilibus caulinis*, *cirrhis spiralibus*. Act. ups. 1740. p. 13. Mat. med. 225. Blackw. t. 590. Epidendro trepador, con hojas entre aovadas y oblongas, nerviosas, sentadas, puestas en el tallo; y zarcillos espirales.

Vanilla flore viridi & *albo*, *fructu nigricanti*. Plum. gen. 25. ic. 188. Vaynilla con flor verde y blanca; y fruto negruzco.

Va-

Vanilla piperis arborea Vaynilla que nace sobre
Jamaicensis innascens. Pluk. el arbol de la pimienta de
 alm. 381. t. 320. f. 4. Jamaica.

Vanille. Merian. surin. 25. Vaynilla.
 t. 25.

Vanilla volubilis siliquosa, *Plantaginis folio.* Ca- Vaynilla voluble, siliquosa,
 tesb. car. 3. p. 7. t. 7. con hoja como la del Llan-
 tén.

Lobus aromaticus, *sub* Siliqua aromatica, de co-
fuscus, *Terebinthi cornicu-* lor casi pardo, y semejante
lis similis. á los cuernecillos del Tere-
 binto.

α *Epidendrum caule scan-* Epidendro con el tallo
dente tereti subramoso, fo- trepador, rollizo y algo ramo-
liis lanceolatis, *petalis lan-* moso; hojas lanceoladas; y
ceolatis. Aët. ups. 1740. p. petalos tambien lanceola-
 37. dos. α

Angurék Warna. Kœmpf. Angurék Warna.
 Amœn. 867. t. 869. f. 2. X

Cast. Epidendro vaynilla.

Habita en una y otra India sobre los árboles.

PROPIED. *La siliqua es pingue y ambrosiaca, diuretica, aphrodisiaca, corroborante, cephalica y caliente: se usa en la melancolia, y en la esterilidad: y algunos la admiten en la composicion del chocolate.*

Flos
 aëris.

2. EPIDENDRUM *caule* X Epidendro con el tallo tre-
scandente tereti subramoso, X pador, rollizo y algo ramo-
foliis lanceolatis aveniis, X so; hojas lanceoladas, sin
petalis linearibus obtusis. X venas; petalos lineares y ob-
 Aët. ups. 1740. p. 37. X tusos.

Kotong-ging. Kœmpf. Kotong-ging.
 Amœn. 868. t. 869. f. 1. X

Cast. Epidendro flor del ayre.

Habita en Java.

Es parasitica: y las flores se asemejan á la araña.

ESPECIES CON EL TALLO DERECHO Y FOLIOSO.

Tenui-
folium. 3. EPIDENDRUM *foliis* Epidendro con hojas del
caulinis subulatis canalicu- tallo alesnadas y acanala-
latis. das.

Tsierov--mau--maravara. Tsierov-mau-maravara.
Rheed. mal. 12. p. 11. t. 5.

Cast. Epidendro de hoja delgada.
Habita en la India.

Spathu-
latum. 4. EPIDENDRUM *foliis* Epidendro con hojas del
caulinis oblongis alternis tallo oblongas, alternas, ob-
obtusis aveniis, nectarii la- tusas, sin venas; y labio del
bio bifido divaricato. nectario hendido en dos par-
tes divergentes.

Helleborine amplissimo Heleborine con hoja muy
folio vario. Plum. spec. 9. ancha y vária.
ic. 180. f. 2.

Ponnampou--maravara. Ponnampou-maravara.
Rheed. mal. 12. p. 7. t. 3.

Rudb. elys. 2. p. 222. f. 7.
Angræcum album, minus. Angriego blanco, menor.

Rumph. amb. 6. p. 99. t. 44.
f. 1. Burm.

Cast. Epidendro de hojas en forma de espátula.

Habita en la India.

Vease el *Visco* como *clavellina*, con *hojas* largas cortadas
en su ápice; *labio de la flor* blanco, hendido en tres
partes; *petalos* amarillos, largos y muy angostos. *Ca-*
tesb. car. 2. p. 68. t. 68. bulboso.

Fur-
vum. 5. EPIDENDRUM *ciu-* Epidendro que arroja ta-
lescens, foliis imbricatis llos, con hojas apañadas,
lanceolatis, racemis axilla- lanceoladas; y racimos axi-
ribus. lares.

Angræcum octavum, seu Angriego octavo, ó negro.
furvum. Ruph. amb. 6. p.
104. t. 46. f. 1. A.

Thalia-maravara. Rheed. X *Thalia-maravara*.
mal 12. t. 4. Rudb. elys. 2. X
p. 122. f. 8. Rai. Suppl. p. X
590. X

Cast. Epidendro negro.
Habita en la India.

Cacci- 6. EPIDENDRUM *foliis* X Epidendro con hojas del
neum. *caulinis ensiformibus obtu-* tallo en forma de espada y
sis, pedunculis unifloris X obtusas; pedunculos de una
axillaribus confertis. Jacq. X flor, axilares y amontona-
amer. 222. t. 135. X dos.
Helleborine coccinea, X Heleborine con muchas
multiflora. Plum. spec. 9. ic. X flores y de color coccineo.
180. f. 1. X

Cast. Epidendro coccineo.
Habita en la America.

Secun- 7. EPIDENDRUM *foliis* X Epidendro con hojas del
dum. *caulinis oblongis, spicis se-* tallo oblongas; espigas la-
cundis, nectarii tubo longi- deadas; y tubo del nectario
tudine corollæ. Jacq. amer. X del largo de la corola.
224. t. 137. X
Helleborine purpurea, um- X Heleborine con flores en
bellata. Plum. spec. 9. ic. X umbela, y de color purpú-
184. f. 1. X reo.

Cast. Epidendro ladeado.
Habita en la America.

Li- 8. EPIDENDRUM *foliis* X Epidendro con hojas del
neare. *caulinis linearibus obtusis* X tallo lineares, obtusas, esco-
emarginatis, caule simplici. X tadas; y tallo sencillo.
Jacq. amer. 221. t. 131. f. 1. X
Helleborine tenuifolia, X Heleborine rastrera, y
repens. Plum. spec. 9. ic. X con hoja delgada.
182. f. 1. X

Cast. Epidendro linear.
Habita en la America.

844 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Puncta
tum. 9. EPIDENDRUM *foliis lanceolatis nervosis, vaginis imbricatis, scapo paniculato corollisque punctatis.* Epidendro con hojas lanceoladas y nerviosas; vaynas apañadas; escapo en panoja y punteado igualmente que las corolas.

Helleborine ramosissima, cauliculis & floribus maculatis. Plum. spec. 9. ic. 187. Heleborine muy ramosa, con los tallitos y flores manchados.

Cast. Epidendro punteado.

Habita en la America.

Tiene las vaynas de las hojas, las panojas y petalos punteados.

Caudatum. 10. EPIDENDRUM *foliis lanceolatis nervosis, scapo paniculato, petalis maculatis caudatis, duobus longissimis.* Epidendro con hojas lanceoladas y nerviosas; escapo en panoja; petalos manchados, con cola, y dos larguissimos.

Helleborine ramosissima, caulibus & floribus maculosis. Plum. spec. 9. ic. 177. Heleborine muy ramosa, con tallos y flores manchados.

Cast. Epidendro con cola.

Habita en la America.

Ovatum. 11. EPIDENDRUM *foliis caulinis ovatis acutis, amplexicaulibus nervosis, scapis paniculatis.* Epidendro con las hojas del tallo aovadas, agudas, amplexicaules, nerviosas; y escapos en panoja.

Herba supplex major, secunda. Rumph. amb. 6. p. 111. t. 51. f. 2. Planta baxa ó hechada, mayor, segunda.

Anantali—maravara. Anantali-maravara.

Rheed. mal. 12. p. 15. t. 7.

Rudb. elys. 2. p. 223. f. 4.

Rai. Suppl. p. 590.

Cast. Epidendro aovado.

Habita en la India.

Ciliare 12. EPIDENDRUM fo- Epidendro con hojas oblon-
liis oblongis aveniis, necta- gas y sin venas; labio del
rii labio tripartito ciliato, nectario partido en tres laci-
intermedia lineari, caule nias pestañosas, con la in-
bifolio. Jacq. amer. 214. t. termedia linear; y tallo de
179. f. 89. dos hojas.

Helleborine graminea, fo- Heleborine graminea, con
liis rigidis, carinatis. Plum. hojas rígidas y aquilladas.
ic. 179. f. 2.

Cast. Epidendro pestañoso.

Habita en la America.

Noctur num. 13. EPIDENDRUM fo- Epidendro con hojas oblon-
liis oblongis aveniis, necta- gas y sin venas; labio del
rii labio tripartito integer- nectario partido en tres laci-
rimo, intermedia lineari, nias enterisimas, con la in-
caule multifolio. Jacq. amer. termedia linear; y tallo de
225. t. 139. muchas hojuelas.

Viscum caryophylloides, Visco como clavellina,
foliis longis, in apice inci- con hojas largas, y cortadas
sis, floris labio albo trifido, en su ápice; labio de la flor
petalis luteis longis angus- blanco, hendido en tres par-
tis. Catesb. car. 2. p. 68. tes; petalos amarillos, lar-
t. 68. gos y angostos.

Cast. Epidendro nocturno.

Habita en la America.

Las especies de *Catesbi* y de *Jacquin* acaso son distintas.

Cucul- latum. 14. EPIDENDRUM fo- Epidendro con hojas ales-
liis subulatis, scapo unifloro, nadas; escapo de una flor;
nectarii labio ovato ciliato labio del nectario aovado,
acuminato, petalis elonga- pestañoso, puntiagudo; y
tis. petalos alargados.

Helleborine floribus al- Heleborine con flores blan-
bis, cucullatis. Plum. spec. cas y en figura de cucuru-
9. ic. 179. f. 1. cho.

Cast. Epidendro de cucurucho.

Habita en la America.

846 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

ESPECIES CON EL ESCAPO DESNUDO, Y LAS HOJAS RADICALES.

Nodo-
sum.

15. EPIDENDRUM fo-
lio unico subradicali, spadi-
ce subquadrifloro. Jacq.
amer. 226. t. 140. Epidendro con una sola
hoja, casi radical; y espadi-
ce de quatro flores, poco
mas ó menos.

Epidendrum foliis radi-
calibus subulatis acutis,
nodo radicatis. Act. ups.
1740. p. 36. Epidendro con las hojas
radicales alesnadas, agudas
y arraygadas en el nudo.

Epidendrum Curassavi-
cum, Orchidi affine, folio
crasso sulcato. Herm. parad.
187. t. 187. Epidendro de Curasao,
semejante al Orchis, con ho-
ja crasa y asurcada.

Viscum arboreum seu
Epidendrum flore albo, spe-
cioso, Americanum, folio
forma siliquarum Nerii. Pluk.
alm. 390. t. 117. f. 6. Adelfa.
Visco árboreo ó Epiden-
dro de America, con la flor
blanca, hermosa; y hoja de
figura de las siliquas de la

Viscum Delphinii flore,
minus, petalis angustiori-
bus, radice fibrosa. Sloan.
jam. 120. hist. 1. p. 251. t.
125. f. 3. Visco menor, con la flor
como la del Delfinio; petá-
los mas angostos; y raiz fi-
brosa.

Cast. Epidendro nudoso.

Habita en la America meridional.

Es planta parasitica.

Cari-
otum.

16. EPIDENDRUM fo-
liis oblongis obtusis compres-
sis articulatis. Act. ups.
1740. p. 36. Epidendro con hojas oblon-
gas, obtusas, comprimidas y
articuladas.

Bontia Luzonica, genicu-
lis inferioribus carinulatis. Pet.
gaz. 44. f. 10. Boncia Luzonica, con los
nudos ó articulos inferiores
aquilladitos.

Cast. Epidendro aquillado.

Habita en las islas de los Luzones.

Es planta parasitica.

Aloisolum.

17. EPIDENDRUM fo-
liis radicalibus oblongis obtusis superne latioribus. Act. ups. 1740. p. 36.

Orchis abortiva, flore majore, rubro, folio Aloes. Rudb. elys. 2. p. 224.

Kansüram---maravara. Rheed. mal. 12. p. 17. t. 8. Rai. Suppl. p. 572.

Cast. Epidendro con hoja de Aloe.
Habita sobre los árboles de Malabár.

Guttatum.

18. EPIDENDRUM fo-
liis radicalibus lanceolatis canaliculatis, petalis cuneiformibus retusis.

Epidendrum caule tereti erecto nudo, foliis lanceolatis, petalis cuneiformibus obtusis. Act. ups. 1740. p. 37.

Viscum Delphinii flore albo guttato, minus, radice fibrosa. Sloan. jam. 120. hist. 1. p. 251. t. 148. f. 2.

Helleborine foliis carnosis, carinatis, & sulcatis. Plum. spec. 9. ic. 182. f. 2?

Cast. Epidendro goteado.
Habita en la Jamaica.
Es planta parasitica.

Juncifolium.

19. EPIDENDRUM fo-
liis subulatis sulcatis, scapo petalisque punctatis, labio immaculato dilatato.

Hel.

848 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Helleborine maculosa, fo-~~X~~ Heleborine manchada, con
liis funceis & sulcatis .~~X~~ hojas como Junco y asurca-
 Plum. spec. 9. ic. 184. f. 2. ~~X~~ das.

Cast. Epidendro de hoja como Junco.

Habita en la America.

Scriptum. 20. EPIDENDRUM fo-~~X~~ Epidendro de hojas entre
liis ovato-oblongis triner- aovadas y oblongas, con tres
viis, floribus racemosis ma- nervios; flores en racimo y
culatis .~~X~~ manchadas.

Angræcum scriptum .~~X~~ Angriego pintado ó gotea-
 Rumph. amb. 6. p. 95. t. 42. ~~X~~ do.

Cast. Epidendro pintado.

Habita en la India.

Es planta parasitica.

Retusum. 21. EPIDENDRUM fo-~~X~~ Epidendro de hojas radi-
liis radicalibus linearibus ,~~X~~ cales, lineares, terminadas
apice bifariam retusis, flo- por su ápice en dos senos ob-
ribus racemosis maculatis .~~X~~ tusos; flores en racimo y
 manchadas.

Ansieli-maravara. Rheed. ~~X~~ Ansieli-maravara,
 mal. 12. p. 1. t. 1. Rudb. ~~X~~
 elys. 2. p. 220. t. 5. Rai. ~~X~~
 Suppl. p. 588. ~~X~~

Cast. Epidendro retuso.

Habita en la India.

Amabile. 22. EPIDENDRUM fo-~~X~~ Epidendro con hojas radi-
liis radicalibus lato-lanceo- cales, anchas y lanceoladas,
latis aveniis, petalis late- sin venas; y petalos latera-
ralibus orbiculatis .~~X~~ les redondos.

Angræcum album, majus .~~X~~ Angriego blanco, mayor.
 Rumph. amb. 6. p. 99. t. 43. ~~X~~

Cast. Epidendro amable.

Habita en la India. Osbeck.

Produce las raíces crásas, en forma de cordel y que tre-
 pan sobre los árboles: las hojas como las del Crino, ó
 como las de la Cebolla albarrana, anchas, lanceoladas,
 car-

carnosas y del largo de medio pie: la caña de la longitud de dos pies y desnuda; pero ceñida con algunas escamas agudas y cortísimas: las flores blancas como la nieve, parecidas á las del *Orchis de Susana*, ó de la magnitud de las del *Narciso*; con cinco pétalos de los quales los dos laterales se hallan redondos y los restantes aovados: un cucurucho de tres hojuelas; con las dos laterales oblongas, y la intermedia de figura de alabarda, hendida en dos partes y con dos cerdas alesnadas.

Co-
chlea-
tum.

23. EPIDENDRUM fo-
liis oblongis geminis gla-
bris striatis bulbo innatis,
scapo multifloro, nectario
cordato.

Epidendro con hojas oblon-
gas, mellizas, lampiñas, es-
triadas y que nacen sobre el
bulbo; escapo de muchas flo-
res; y nectario de hechura
de corazón.

Viscum radice bulbosa,
minus, *Delphinii flore*, ru-
bro, specioso. Sloan. jam. 119.
hist. 1. p. 250. t. 121. f. 2.

Visco menor, con la raíz
bulbosa; flor como la del
Delfinio, roxa y hermosa.

Viscum Caryophylloides,
Lilii albi foliis, floris la-
bello brevi purpureo, ceteris
petalis è luteo virescenti-
bus. Catesb. car. 2. p. 88.
t. 88.

Visco como Clavellina,
con hojas como las de la Azu-
cena blanca; labio de la flor
corto, de color purpúreo; y
los restantes pétalos de color
amarillo que tira á verde.

Helleborine cochleato flore.
Plum. spec. 9. ic. 185. f. 2.

Heleborine con la flor á
manera de caracol.

Cast. Epidendro á manera de caracol.
Habita en la America.

Tube-
rosom.

24. EPIDENDRUM fo-
liis lato-lanceolatis nervo-
sis membranaceis bulbo in-
natis, scapo vaginato, nec-
tario cymbiformi bifido.

Epidendro con hojas an-
chas, lanceoladas, nerviosas,
membranosas, y que nacen
sobre el bulbo; escapo en-
vaynado; nectario en forma
de navecilla y hendido en
dos partes.

Hel-

850 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Helleborine purpurea, tu-
berosa radice. Plum. spec. 9.
ic. 186. f. 2. color purpúreo; y raíz tube-
rosa.

Angræcum terrestre, pri-
mum. Rumph. amb. 6. p. 112.
t. 52. f. 1. Angriego terrestre, pri-
mero.

Cast. Epidendro tuberoso.

Habita en las Indias.

Pusil- 25. EPIDENDRUM fo-
lum. liis ensiformibus subcarno-
sis, scapo pauciflora. Epidendro con hojas en
forma de espada, algo car-
nosas; y escapo de pocas flo-
res.

Cast. Epidendro pequeñito.

Habita en Surinam. Dalberg.

Es planta del largo de una pulgada. Arroja la raíz fibro-
sa: las hojas todas radicales, en forma de espada, dis-
puestas al modo que las del *Lirio*, algo carnosas, lisas y
agudas: los escapos colocados entre cada una de las hojas,
del largo de ellas, solitarios y adornados de tres ó quatro
hojuelas menudas; con una ó dos flores terminales, que
salen de una gluma de tres ventallas: los tres petalos
de arriba extendidos y oblongos; el de mas arriba muy
pequeño; y los dos interiores dentados: el labio hendi-
do en tres lóbulos; con los laterales casi de figura de
corazon; y el intermedio mayor y hendidado en dos par-
tes.

Cinco petalos entre aovados y oblongos, y agudos:
el labio superior del néctario con ampollas, tubuloso y es-
cotado: el labio inferior muy grande, sinuoso, y con qua-
tro lóbulos en ambas partes, opuestos é iguales: la capsu-
la esférica y con seis quillas. *Allemand.*

Ensi- 26. EPIDENDRUM cau-
folium. le tereti lævi, foliis ensifor-
mibus striatis, petalis lan-
ceolatis glabris, labio recur-
vato latiore. Epidendro con el tallo ro-
llizo y liso; hojas en forma
de espada, estriadas; peta-
los lanceolados, lampiños,
con el labio encorvado ácia
atrás y mas ancho.

Cast. Epidendro en forma de espada.

Ha-



Habita en la China. Osbeck.

Es planta terrestre y no parasitica. Tiene muchas *hojas* angostas, estriadas, agudas y sin que sean carnosas: el *escapo* rollizo, de dos filos, del largo de dos pies, con algunas bracteas que le abrazan, alternas, membranosas y puntiagudas: las *flores* alternas, que salen de las axilas de las bracteas, solitarias y con pedunculos del largo de la misma flor: la *corola* con cinco petalos, lanceolados, extendidos, lisos, y el *sexto* mas ancho y encorvado ácia atrás. La *flor* es muy fragante.

Moniliforme

27. EPIDENDRUM cau-
le tereti articulato striato
moniliformi nudo simplicis-
simo, foliis linearibus acu-
tis. Act. ups. 1740. p. 37.

Fu-Ran. Koempf. Amœn. 864. t. 864.

Epidendro con el tallo rollizo, articulado, estriado en forma de collar, desnudo, muy sencillo; hojas lineares y agudas.

Cast. Epidendro en forma de collar.

Habita en el Japon, sobre peñas y árboles.

Ophyoglossoides.

28. EPIDENDRUM cau-
le unifolio, floribus racemosis secundis. Jacq. amer. 225. t. 133. f. 2.

Helleborine Ophyoglossosimilis. Plum. spec. 9. ic. 176. f. 3.

Epidendro de tallo con una hoja; flores racimosas y ladeadas ó que miran á un lado.

Heleborine semejante al Ophiogloso.

Cast. Epidendro como el Ophiogloso.

Habita en la America.

Ruscifolium.

29. EPIDENDRUM cau-
le unifolio, floribus è sinu folii aggregatis. Jacq. amer. 226. t. 133. f. 3.

Helleborine Ruscimajoris folio. Plum. spec. 9. ic. 176. f. 2.

Epidendro de tallo con una hoja; flores agregadas, y que salen del seno ó axila de la hoja.

Heleborine con hoja como la del Brusco mayor.

Cast. Epidendro con hoja de Brusco.

TOM. VI.

Ihhb

Ha-

852 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.
Habita en la America.

30. EPIDENDRUM *caule unifolio, floribus è sinu folii geminis.* Epidendro de tallo con una hoja; flores mellizas, y que salen del seno de ella.
Helieborine graminea, repens, biflora. Plum. spec. 9. trera y con dos flores.
 ic. 176. f. 1.

Cast. Epidendro con hoja de Grama.
Habita en la America.

31. EPIDENDRUM *scapo nudo, foliis imbricatis bifariis linearibus obtusis, floribus secundis, cornu longissimo.* Epidendro con el escapo desnudo; hojas apiñadas en dos órdenes, lineares y obtusas; flores ladeadas; y cuernecillo larguísimo.
 Suppl. p. 407.

Cast. Epidendro del Cabo de Buena-esperanza.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza, sobre los troncos de los árboles. Thunb.

Todo el carácter de este género, con sus diferencias y sinónimos, es obscuro; porque las *flores secas* apenas pueden desenvolverse, y las *plantas* no admiten su cultivo en los jardines; ni las descripciones de los autores son suficientes.

1210. Género FORSTERA. *Forst. act. ups. vol. 3. p. 184. Suppl. p. 59.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* doble: el *exterior* debaxo de la flor, lateral, de tres hojuelas oblongas y agudas: el *interior* encima del germen, hendido en seis hojuelas derechas, oblongas y cóncavas.

COR. de un *petalo*, entre tubulosa y en forma de campana: *tubo* del largo del cañiz: *borde* partido en seis laciniás oblongas, obtusas, extendidas, redobladas por su ápice é iguales.

Nectario: dos escamitas aovadas al revés, en forma de pe-

petalos, y fixadas al estilo en ambos lados debaxo del estigma.

ESTAMB. *Filamentos* dos, cortísimos, y cada uno fixado al estilo entre el estigma, y la escamita del nectario, debaxo del mismo estigma: con las *anteras* aovadas al revés.

PIST. *Germen* debaxo del caliz y oval: *estilo* cilindrico, derecho y de la longitud del tubo de la corola: con dos *estigmas* anchos, extendidos y algo barbados.

PERIC. *Capsula* oval, y de una celdilla.

SEM. numerosas, en forma de serrin, y prendidas en el receptaculo columnar.

ESPECIE.

Sedi-
folia.

1. FORSTERA. Suppl. X Forstera.
p. 407.

Forstera Sedifolia. Forst. X Forstera con hoja como
act. ups. vol. 3. p. 184. t. 9. X la del Sedo.

Cast. Forstera con hoja de Sedo.

Habita en las cumbres mas elevadas de los montes mas altos de la nueva Zeelandia, isla Austral.

Arroja el tallo herbáceo, postrado, ascendente, del largo de un palmo, poco mas ó menos, y algo ramoso: las *hojas* apañadas, sin peciolo, aovadas al revés, algo agudas, enterisimas, apretadas, pequeñas, sin venas, y por su ápice entre extendidas y redobladas: los *pedunculos* solitarios, de una flor, terminales, derechos, rubicundos y mas largos: las *flores* blancas, y que tiran á color rubio en la garganta y caliz interior.

1211. Género GUNNERA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *trama* ó *amento* verticilado, con escamas de una pieza, que llevan una flor, setáceas, del largo de ella y persistentes.

Periantio ninguno, sino que sea una costra de la semilla con dos dientes.

Cor. ninguna.

854 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

ESTAMB. *Filamentos* dos, cortisimos, opuestos, y sentados en los lados del germen fuera de los dientes: con las *anteras* oblongas.

PIST. *Germen* aovado, con dos dientes en su ápice: *estilos* dos, cortos, alesnados y puestos entre los dientes del germen: con los *estigmas* sencillos.

PERIC. ninguno.

SEM. una soia, aovada, y vestida con la costra del periantio.

ESPECIE.

Per-
pensa. **1. GUNNERA.** Amœn. X Gunnera.
acad. 7. p. 495.

Perpensum Blitisper- X Perpenso con la semilla
mum. Burm. prodr. 26. X como la del Bledo.

Petasites Africanus, Cal- X Petasite ó Sombrerera
thæ palustris folio. Herm. X Africana, con hoja como la
lugdb. 488. X de la *Caltha palustre*.

Blitum Africanum, Cal- X Bledo Africano, con hoja
thæ palustris folio, caule X como la de la *Caltha palus-*
nudo cubitali spicam peda- X tre; tallo desnudo, del lar-
lem sustinente. Pluk. alm. X go de un codo, y que sostiene
68. t. 18. f. 12. X una espiga de la longitud
X de un pie.

Cast. *Gunnera perpensa*, ó inclinada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Produce las *hojas* radicales, de hechura de corazón, obtusas, lisas, venosas, ondeadas por su margen, y entre dentadas y recortadas; con los *peciolos* algo vellosos: el *escapo* desnudo y del largo de dos pies: el *amento* terminal, largo y compuesto; con los *parciales* esparcidos, sencillos, separados, y adornados de bractéas lanceoladas y cortas: y las *florechitas* desnudas.

ORDEN II.

TRIANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON TRES ESTAMBRES.

1212. Género SISYRINCHIUM. * Bermudiana

Tourn. t. 208. Dill. elth. 41. f. 48. 49.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espata* universal, de dos filos y de dos ventallas comprimidas y aquilladas.

COR. *Petalos* seis, oblongos, aovados al revés, con puntita, entre derechos y extendidos, y planos.

ESTAMB. *Filamentos* tres, cortísimos, que salen de la tunica del estilo: con las *anteras* hendidas por debaxo en dos partes, y fixadas al estilo en la base del estigma.

PIST. *Germen* aovado al revés y debaxo de la flor: *estilo* alesnado, recto y mas corto que la corola: con el *estigma* heñdido en tres partes y redoblado.

PERIC. *Capsula* aovada al revés, de tres caras, de tres celdillas y tres ventallas.

SEM. muchas, y casi redondas.

OBS. *El carácter del género, despues de Adanzon, le corrigió Schreber. in nov. act. A. N. C. tom. 3. obs. 75. & tom. 4. p. 145. R.*

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

BERMUDIANA. p. 387.

La flor es liliacea, compuesta de seis petalos; cuyo caliz (*es el germen*) pasa á fruto de tres lados, que se abre en tres partes, y divide en tres celdillas; y lleno de simientes casi redondas.

ESPECIES.

Ber-
mudia-
na. 1. SISYRINCHIUM fo-X Sisyrrinchio con hojas en
liis ensiformibus enerviis. } forma de espada y sin ner-
Syst. veg. 682. } vios.

Si-

856 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Sisyrinchium caule foliis-que ancipitibus. Hort. cliff. *Sisyrinchio con el tallo y*
hojas de dos filos.

431. Spec. pl. 3. p. 1353.

Schreb. in nov. A. N. C. 3.

p. 341. t. 6. B. & tom. 4. p.

145. Mill. illustr.

Sisyrinchium (angustifolium) *foliis lineari-gladialis, pedunculis longioribus.* Mill. dict. n. 2. *Sisyrinchio (de hoja angosta)* con hojas entre lineares y de figura de pequeña espada; y pedunculos mas largos.

Sisyrinchium cœruleum, parvum, gladiato caule, Virginianum. Pluk. alm. 368. t. 61. f. 1. *Sisyrinchio pequeño, de*
Virginia, con la flor cerúlea; y tallo en forma de espada.

Bermudiana graminea, flore minore, cœruleo. Dill. elth. 49. t. 41. f. 49. *Bermudiana graminea,*
con la flor mas pequeña y cerúlea. α

Sisyrinchium Bermudense, floribus parvis ex cœruleo & aureo mixtis. Pluk. alm. 348. t. 61. f. 2. *Sisyrinchio de la Bermu-*
da, con flores pequeñas, y de color entre cerúleo y de oro. β

Sisyrinchium Bermudianum, foliis gladiolatis amplexicaulibus, pedunculis brevioribus. Mill. dict. n. 1. *Sisyrinchio de la Bermu-*
da, con hojas en forma de pequeña espada, amplexicaules; y pedunculos mas cortos.

Bermudiana Iridis folio, radice fibrosa. Tourn. p. 388. Dill. elth. 48. t. 41. f. 48. *Bermudiana con hoja co-*
mo la del Lirio; y raiz fibrosa.

Cast. *Sisyrinchio Bermudiana.*

Habita la variedad α en la Virginia, y la variedad β en la Bermuda. \mathcal{U}

La planta de la variedad α en su nativo suelo, lleva las mas veces las *hojas* y el *escapo* filiformes; pero si se exáminan bien, se hallarán de dos filos. En la variedad α se observa el *tallo* alado, y en la variedad β rollizo.

DE LAS MISMAS FLOR. CON III. ESTAMB. 857

Palini- folium.	2. SISYRINCHIUM fo-	Sisyrinchio con hojas en
	liis ensiformibus nervosis.	forma de espada y nerviosas.
	Sisyrinchium America-	Sisyrinchio de America,
	num, foliis plicatis & ner-	con hojas plegadas y nervio-
	vosis. Magn. hort. 185.	sas.
	Bermudiana Palmæ folio,	Bermudiana con hoja co-
	radice bulbosa. Plum. ic. 35.	mo la de la Palma; y raíz
	t. 46?	bulbosa.

Cast. Sisyrinchio con hoja de Palma.

Habita en el Brasil. Arduin.

Es muy semejante al *Sisyrinchio Bermudiana*. Tiene el tallo del largo de dos pies, y tambien de dos filos: las hojas dos veces mas anchas, con cinco, ó seis nervios que sobresalen y plegadas: las *espatas* y *flores* numerosas, en hacecillo terminal, y apenas mayores que las de la *Bermudiana*: y el *estilo* hendido mas de la mitad en tres lacinias.

1213. Género FERRARIA. † *Burm. in nov.*

act. A. N. C. tom. 1. p. 201.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espatas* de dos en dos, alternas, aquilladas, envueltas, y cada una con una flor.

COR. *Petalos* seis, oblongos, puntiagudos, revueltos, entre ondeados y rizados, y alternadamente menores.

ESTAMB. *Filamentos* tres, y sentados en el estilo: con las *anteras* casi redondas, mellizas y con pelo áspero.

PIST. *Germen* debaxo de la flor, casi redondo, de tres caras y obtuso: *estilo* sencillo y derecho: con tres *estigmas* hendidos en dos partes, á manera de cucurucho, y entre hendidos en flecos y rizados.

PERIC. *Capsula* oblonga, de tres caras, mas gruesa por arriba, de tres celdillas y tres ventallas.

SEM. numerosas, y casi redondas.

858 FLOR, CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

ESPECIES.

Undu-
lara.

1. FERRARIA. Mill. ic.

Ferraria.

280. Jacq. hort. t. 63.

Ferraria foliis nervosis

Ferraria con hojas nervio-

episiformibus vaginantibus,

sas, en forma de espada,

petalis fimbriatis. Burm. in

que envaynan; y petalos

nov. Act. A. N. C. II. 1761.

hendididos en flecos,

p. 109. t. 3. f. 1.

Iris stellata, Cyclaminis

Lirio estrellado, con la

radice, pullo flore, Barr. ic.

raiz como la de Panporci-

1216.

no; y flor de color que tira

á negro,

Narcissus Indicus, flore

Narciso de Indias, con la

saturate purpurea. Rudb.

flor de color purpúreo subi-

elys. 2. p. 49. f. 9.

do,

Flos Indicus, è violaceo

Flor de Indias, de color

fuscus, radice tuberosa.

de violeta obscuro; y raiz

Ferrar. cult. 168. t. 171.

tuberosa,

Moris. hist. 2. p. 344. sect.

4. t. 4. f. 7.

Cast. Ferraria ondeada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *✠*

Segun *Jacquin* en el lugar citado, debe trasladarse esta especie en la clase *Monadelphica*, y constituir un nuevo orden de tres estambres, R.

Payo-
nia.

2. FERRARIA *petalis in-*

Ferraria con los petalos

terioribus minoribus, basta-

interiores mas pequeños, y

ris, Suppl. p. 407.

en forma de alabarda,

Flos Tigris. Hern. mex.

Flor Tigre,

p. 276. Swert, Flor. vol. 2.

t. 31. f. 2.

Icon. Mutis. amer. vol. 1.

Figura que trae Mutis.

t. 15.

Cast. Ferraria payonia.

Habita en México. *Mutis.*

Arroja la raiz bulbosa: el *escapo* del largo de un xeme, y de una flor; una ú otra *hoja* que envayna; y las infe-
rio-

DE LAS MISMAS FLOR. CON III. ESTAMB. 859 1

riores mas largas y mas angostas: la *espata* de dos ho-
juelas y comprimida: la *corola* en forma de campana;
con los *tres petalos exteriores* mas grandes, aovados,
algo truncados por su ápice y con una puntita; y los
tres interiores tres veces mas pequeños, alternos, de fi-
gura de alabarda, casi sin uñas y manchados como el
tigre: los *filamentos* que envaynan al estilo; con tres
anteras lineales y casi del largo de los estigmas: el
germen debaxo de la flor y con piececito: el *estilo* ter-
minal, con tres estigmas, partidos en dos lacinijs fili-
formes: la *capsula* linear y de tres lados; con muchas
semillas.

1214. Género SALACIA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, cortísimo, extendido, y par-
tido en cinco lacinijs aovadas, agudas y persis-
tentes.

COR. *Petalos* cinco, casi redondos y sin uñuelas.

ESTAMB. *Filamentos* ninguno: *anteras* tres, mellizás, di-
vergentes por su base y sentadas en el ápice del
germen.

PIST. *Germen* casi redondo y mayor que el caliz: *estilo*
cortísimo y puesto entre las *anteras*: con el *estigma*
sencillo.

PERIC.

SEM.

OBS. No vió Linneo el fruto de este género, el qual acaso
es de tres capsulas. Por el caracter generico expre-
sado se conoce la afinidad que tiene con el siguiente;
aunque en su traza es diverso.

ESPECIE.

Chi-
nensis.

I. SALACIA.

X
X
X

Salacia.

Cast. Salacia de la China.

Habita en la China. 24

Es *arbusto* con ramas angulares, lisas, muy desparrama-
das

860 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

das y algo crasas por su base. Tiene las *hojas* peciola-
das , alternas , apartadas , ovales , parecidas á las del *Ci-
ruelo* , enterisimas , algo agudas y lisas : muchas *flores*
axilares que salen de cada yema ; con los *pedunculos* de
una flor y mas cortos que el peciolo.

1215. Género STILAGO.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , hemisférico , hendido en
tres lóbulos y casi enterisimos.

COR. ninguna.

ESTAMB. *Filamentos* tres , sentados en el germen , extendi-
dos y mas largos que el caliz.

PIST. *Germen* dentro de la flor , casi redondo : *estilo* cilin-
drico , mas corto que los estambres y persistente : con
el *estigma* verrugoso.

PERIC. *Baya* globosa.

SEM.

ESPECIE.

Bu-
nius.

1. STILAGO.

Bunius sativus. Rumph.
amb. 3. p. 204. t. 131. Burm.
ind. 16.

X
X
X
X
X
X
X

Estilago.

Bunio que se cultiva.

Cast. Estilago Bunio.

Habita en la India. 2

Es arbol que produce las *hojas* alternas , con peciolo , sen-
cillas , entre aovadas y oblongas , enterisimas y lampi-
ñas : las *espigas* alternas , desnudas y larguissimas : las
flores pequeñas , esparcidas y sentadas.

ORDEN III.

TETRANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CUATRO ESTAMBRES.

1216. Género NEPENTHES. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* partido en quatro lacinias casi redondas y persistentes.

COR. ninguna.

ESTAMB. *Filamentos* apenas ninguno : *anteras* quatro , y pegadas al ápice del estilo.

PIST. *Germen* delgadísimo : *estilo* alesnado y del largo del caliz : con el *estigma* algo obtuso.

PERIC. *Capsula* oblonga , columnar , truncada , de quatro ángulos desfigurados , de quatro celdillas , de quatro ventallas y que se abre longitudinalmente.

SEM. numerosas , lineares , rígidas y puntiagudas.

OBS. *Vió* Linneo *obscuramente* el pistilo , y asi duda si se halla separado en distintas flores del mismo género.

ESPECIE.

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| Des-
tillato-
ria. | 1. NEPENTHES. Hort. cliff. 431. Flor. zeyl. 321. | Nepenthes. |
| | <i>Utricularia vegetabilis</i> , Zeylanensium. Pluk. alm. 394. t. 237. f. 3. | Vegetable de los de Zeylan, que lleva odres ó jarritos. |
| | <i>Cantharifera</i> . Rumph. amb. 5. p. 121. t. 59. f. 2. | Planta que lleva jarros. |
| | <i>Vandura Zeylanica</i> , in extremo foliorum folliculum peniformem expansum habens. Burm. zeyl. 42. t. 17. | Vandura de Zeylan, que tiene en el extremo de las hojas un hollejo ó folículo abierto y peniforme. |
| | <i>Planta mirabilis</i> , destillatoria. Grim. E. N. C. an. 1. dec. 2. p. 363. f. 363. | Planta admirable, que destila agua. |
| | Cast. Nepenthes destillatoria. | |
| | Habita en Zeylan. | |

1217. Género POTHOS. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espata* globosa, de una pieza, y que se abre por un lado. *Espadice* corto, muy sencillo, encrasado y cubierto por todas partes con las frutificaciones sentadas.

Periantio ninguno; sino que sea la corola.

COR. *Petalos* quatro, en forma de cuña, oblongos y derechos.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, algo anchos, derechos, mas angostos que los petalos y de su misma longitud: con las *anteras* muy pequeñas y mellizas.

PIST. *Germen* paralelepípedo y truncado: *estilo* ninguno: y *estigma* sencillo.

PERIC. *Bayas* agregadas, casi redondas y de dos celdillas.

SEM. una sola, y casi redonda.

E S P E C I E S.

Scan-
dens.

1. POTHOS *petiolis latitudine foliorum, caule radicante.* Pothos con los peciolo del ancho de las hojas; y el tallo que echa raíces.

Potha. Burm. zeyl. 197. Potha.

Appendix duplo folio. Apendice con dos hojas ó

Rumph. amb. 5. p. 490. t. 184. f. 1. 2. 3. que la una sale del remate de la otra.

Ana-parua. Rheed. mal. Ana-parua.
7. t. 40.

Cast. Pothos trepador.

Habita en la India. *h*

En esta especie la *espiga* se halla globosa; pero en las siguientes oblonga.

Acau-
lis.

2. POTHOS *foliis lanceolatis integerrimis enerviis.* Pothos con hojas lanceoladas, enterisimas y sin nervios.
Jacq. amer. 240. t. 153.

Plan-

Planta innominata. Plum. X *Planta innominada.*
 amer. t. 57. X

Cast. Pothos sin tallo.

Habita en la America sobre árboles.

Lanceolata 3. *POTHOS foliis lanceo-* X *Pothos* de hojas lanceola-
latis integerrimis trinerviis, X *das*, enterisimas, con tres
scapo apice triquetro. X *nervios*; y escapo de tres ca-
 ras en su ápice.

Arum foliis rigidis, an- X *Yaro* con hojas rígidas,
gustis & acuminatis. Plum. X *angostas y puntiagudas.*
 amer. 47. t. 62. filic. t. 206. X

Cast. Pothos lanceolado.

Habita en la America. 24

Crenata. 4. *POTHOS foliis lanceo-* X *Pothos* con hojas lanceola-
latis crenatis. X *das y recortadas.*

Arum amplis foliis, acu- X *Pothos* con hojas anchas,
minatis & pergamaceis. X *puntiagudas y de consisten-*
 Plum. spec. 4. X *cia de pergamino.*

Cast. Pothos recortado.

Habita en la isla de Santo Thomé. 24

Cordata. 5. *POTHOS foliis corda-* X *Pothos* con hojas de he-
tis. X *chura de corazon.*

Arum acinis amethysti- X *Yaro* con granitos de co-
nis, flore parvo. Plum. spec. X *lor de amathiste ó violado;*
 4. ic. 38. filic. t. 205. X *y flor pequeña.*

Cast. Pothos de figura de corazon.

Habita en la America. 24

Vease el Dracontium amplis foliis cordatis, radice nodosa
rubra. Plum. amer. 48. t. 63. filic. 195.

Pinnata. 6. *POTHOS foliis pinn-* X *Pothos* con hojas hendidas
rifidis. X *al través.*

Appendix laciniata. X *Apendice* con hojas laci-
 Rumph. amb. 5. p. 489. t. X *niadas.*
 183. f. 2. X

Cast.

864 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Cast. Pothos pinnado.

Habita en la India. *h*

- Pal- 7. POTHOS *foliis palma-* X Pothos con hojas palmea-
mata. *tis.* X das.
 Dracontium Hederaceum, X Draconcio como Yedra y
 polyphyllum. Plum. amer. X de muchas hojas.
 49. t. 64. 65.
 Dracunculus scandens, X Dragoncillo trepador, con
 polyphyllus. Plum. filic. t. X muchas hojas.
 207. 208. X

Cast. Pothos palmeado.

Habita en la America. *u*

ORDEN IV.

PENTANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO ESTAMBRES.

1217. Género GLUTA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , de una membrana muy delgada , en forma de campana , obtuso , mas corto que el germen y que se cae quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* cinco , lanceolados , mas largos que el caliz , extendidos por arriba , y por debaxo aglutinados ó pegados hasta la mitad á la columna del germen.

ESTAMB. *Filamentos* cinco , setáceos , mediocres , é insertos al ápice de la columna : con las *anteras* versátiles ó rodaderas , y casi redondas.

PIST. *Germen* aovado al revés , y sentado en una columna oblonga : *estilo* filiforme y mediocre : con el *estigma* sencillo.

PERIC.

SEM.

OBS. *Separados los petalos de la columna del germen , la postura de los estambres se hallará como en la Pasiflora ó Pasionaria.*

E S P E C I E.

Beng-
has.

I. GLUTA.

X
X
X

Gluta.

Cast. Gluta benghas.*Habita* en Java. $\frac{1}{2}$

Es árbol con *ramas* foliosas en su remate. Echa las *hojas* alternas, sin peciolo, anchas, lanceoladas, casi del largo de un pie, venosas y desnudas; pero en las *ramas* que llevan la flor, del largo de quatro dedos solamente, mas obtusas y mas amontonadas: la *panoja* terminal y pedunculada; con las *flores* de la magnitud de las de la *Berza*.

1218. Género AYENIA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas extendidas, aovadas, agudas y que se marchitan.

COR. de cinco *petalos* unidos por su ápice con el nectario en forma de estrella plana: las *uñas* capilares, larguissimas y arqueadas ácia fuera: los *petalos* de figura de corazon al revés, resupinados, con una puntita por su ápice en forma de maza que mira ácia arriba.

Nectario de figura de campana: con el *borde* hendido en cinco lóbulos, deprimido, ribeteado, y sentado sobre una columna cilindrica, derecha y del largo del caliz.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, cortísimos, é insertos en la margen del nectario: con las *anteras* casi redondas y todas cubiertas con el borde de la corola.

PIST. *Germen* casi redondo, y colocado en el fondo del nectario: *estilo* cilindrico: con el *estigma* obtuso y de cinco lados.

PERIC. *Capsula* de cinco caxitas, casi redonda, con puntitas rígidas, de cinco celdillas y que se divide en cinco partes.

SEM. solitarias, algo oblongas, y cubiertas con la celdilla de la capsula.

OBS.

Obs. Si por medio de un alfiler los Petalos se separan con cuidado del Nectario, la flor que antes parecia para-
doxa se presentará mas natural.

Sacó Linneo este caracter generico de la primera especie de este género, y confiesa que no vió las demas.

ESPECIES.

- Pusilla 1. *AYENIA foliis cordatis glabris*. Linn. act. stock. 1756. p. 23. t. 2. Ayenia con hojas de figura de corazon y lampiñas.
- Ayenia foliis ovatis acutis serratis, germine pedicellato, nectario plano stellato*. Loeßl. it. 200. Ayenia con las hojas aovadas, agudas y aserradas; germen con piececito; nectario plano y estrellado.
- Dayenia inermis, foliis oblongo-cordatis marginibus dentatis, floribus axillari-bus*. Mill. dict. t. 118. Dayenia inerme, con hojas entre oblongas y de figura de corazon, dentadas por su margen; y flores axilares.
- Urticæ folio anomala, flore pentaphyllo purpureo, fructu pentacocco muricato*. Sloan. jam. 90. hist. 1. p. 209. t. 132. f. 2. Planta anomala, con hoja como la de la Ortiga; flor de cinco hojuelas ó petalos, purpúrea; fruto de cinco caxitas y con puntitas rígidas.

Cast. Ayenia pequeñita.

Habita en la Jamaica, en Cumaná y en el Perú. ☉

Posee varias flores que abortan, lo que acaso es efecto del sexo.

Produce la raíz fibrosa, anhua, ó perenne: los tallos ascendentes, del largo de un xeme hasta el de un pie y casi sencillos: las hojas entre oblongas y aovadas, agudas, aserradas, lampiñas, blanquecinas y algo rojas, con el peciolo poco mas corto que ellas: las estipulas setáceas y derechas: tres, hasta seis flores axilares, con los pedunculos capilares, cortos y horizontales. Loeßl. loco citato.

- To- 2. *AYENIA foliis ovato-subrotundis, tomentosis*. Loeßl. it. 257. Ayenia con hojas entre aovadas y casi redondas, y tomentosas.

Cast. Ayenia tomentosa.

Ha.

Habita en Cumaná.

Magna 3. *AYENIA foliis cordatis pubescentibus, florum germinibus sessilibus, nectario concavo.* Loeß. it. 199. Ayenia con hojas de figura de corazón, vellosas; germen de las flores sin piecitos; y nectario cóncavo.

Cast. Ayenia grande.

Habita en Cumaná. 26

Para conocer bien la flor de la Ayenia se deben separar los pétalos de la base del germen.

Echa la raíz fibrosa y perenne: los tallos derechos, del largo de dos, ó tres pies, sufruticosos por debaxo con vello blando, ramitas cortas y alternas: las hojas tambien alternas, de figura de corazón, con festones aserrados y vello blando: el peciolo filiforme y casi del largo de la hoja: las estipulas alesnadas y muy pequeñas: las flores de las axilas con pedunculos en panoja, y las de las ramas en panoja desigual: el pedunculo comun solitario, que sale de uno y otro lado de la axila: un rudimento de ramita que ocupa el medio de la axila, hendida en dos ó tres partes, terminadas en dos ó tres piecitos; con brácteas pequeñas y agudas en cada uno.

1219. Género PASSIFLORA. * Granadilla Tourn.

t. 124. Dill. elth. 137. 138. Murucua

Tourn. t. 125.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio partido en cinco lacinias, planas, de color y conformes á los pétalos.

COR. Pétalos cinco, medio lanceolados, planos, obtusos, de la magnitud y figura del caliz.

Nectario de tres coronas: la exterior mas larga, y que ciñe al estilo dentro de los pétalos y mas coartada por arriba.

ESTAMB. Filamentos cinco, alesnados, extendidos y pegados á la base de la columna del germen: con las anteras hechadas, oblongas y obtusas.

PIST. una columna cilindrica y recta, en cuyo ápice está

TOM. VI.

Iii

sen-

868 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

sentado el germen casi redondo : con tres *estilos* mas gruesos por arriba , extendidos : y con los *estigmas* en cabezuela.

PERIC. *Baya* carnosa , casi aovada , de una celdilla y con piececito.

SEM. muchas , aovadas , y cubiertas con su arilo ó tellilla.

RECEPT. *de las semillas*: tres , y pegados longitudinalmente á la corteza del pericarpio.

OBS. *La Granadilla de Tourn. tiene el nectario compuesto de fibras puestas en cerco.*

La Murucua del mismo Autor posee el nectario que consta de una membrana cónica y truncada.

La Pasionaria corchosa carece de petalos.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

GRANADILLA. p. 240.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco ; de cuyo caliz , hendido en muchas partes , sale el pistilo adornado por su base con la corola hendida en flecos , y en su ápice con el fruto tierno ó embrion , en el qual se hallan sentadas tres clavas ó macitas , y por debaxo de ellas están los estambres. El embrion pasa á fruto casi aovado ó globoso , carnoso , de una celdilla , y lleno de simientes fixadas á los lomos como á un receptaculo , y envueltas en una caliptra ó bolsilla.

MURUCUA. p. 241.

La *flor* (*segun Plumier*) es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco , y de un caliz hendido en muchas partes. El tubo semejante á un cono , ocupa el centro de la flor , del qual sale el pistilo guarnecido de un fruto tierno ó embrion , sobre el qual se hallan sentadas tres clavas y por debaxo de ellas están los estambres. El embrion pasa a fruto aovado , de una celdilla , carnoso , y lleno de simientes envueltas en una caliptra ó bolsilla.

ESPECIES CON HOJAS INDIVISAS.

- Serratifolia. 1. PASSIFLORA foliis *indivisis ovatis serratis*. Pasionaria con hojas indivisas, aovadas y aserradas.
 Amoen. acad. 1. p. 217. f. 1.
 Jacq. hort. t. 10.
Granadilla Americana, Granadilla Americana,
folio oblongo leviter serrato, con hoja oblonga, ligeramen-
petalis ex viridi rubescenti- te aserrada; y petalos de co-
bus. Mart. cent. 36. t. 36. lor que de verde tira al de
 rubio.
- Cast.* Pasionaria con hoja aserrada.
Habita en Surinam.
- Pallida 2. PASSIFLORA foliis *indivisis ovatis integerri-* Pasionaria de hojas indi-
mis, petiolis biglandulosis. visas, aovadas, enterisimas;
 Amoen. acad. 1. p. 218. f. 2. y peciolos con dos glandu-
Clematis Indica alia, flo- las.
re minore pallido. Plum. Otra Clematide de Indias,
 amer. 74. t. 89. con la flor mas pequeña y
 palida.
Clematis Murucuja, Py- Clematide Murucuia, me-
riformis, minor. Moris. hist. nor, con el fruto en forma
 3. p. 7. sect. 1. t. 2. f. 4. de Pera.
- Cast.* Pasionaria palida.
Habita en la isla de Santo Domingo y en el Brasil.
- Cutprea. 3. PASSIFLORA foliis *indivisis ovatis integerri-* Pasionaria de hojas indi-
mis, petiolis æqualibus. visas, aovadas y enterisimas,
 Amoen. acad. 1. p. 219. f. 3. con peciolos iguales.
 Mill. dict. n. 17.
Granadilla flore cupreo, Granadilla con la flor de
fructu oliviformi. Dill. elth. color de cobre; y fruto en
 165. t. 138. f. 165. forma de aceytuna.

870 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Granadilla Americana, X *Granadilla Americana*,
fructu subrotundo, *corolla* X con el fruto casi redondo;
floris erecta, *petalis amœne* X corola de la flor derecha;
fulvis, *foliis integris*. Mart. X petalos de color leonado ame-
 cent. 37. t. 37. X no; y hojas enteras.

Granadilla foliis Zarza- X *Granadilla* de hojas como
parille trinerviis, *flore pur-* X las de la Zarzaparrilla, con
pureo, *fructu olivæformi* X tres nervios; flor purpúrea;
cæruleo. Catesb. car. 2. p. 93. X fruto en forma de aceytuna
 t. 93. X y de color cerúleo.

Cast. Pasionaria de color de cobre.

Habita en la isla de la Providencia y en Bahamá.

Tiene las *hojas* aovadas, las mas crecidas casi de figura de
 corazon, y las tiernas algo aserradas: y los *peciolo*s
 con glandulas apenas manifestas.

Tiliæ- 4. *PASSIFLORA foliis* X Pasionaria con hojas indi-
 folia. *indivisis cordatis integerrimis*, *petiolis æqualibus*. X visas, de hechura de corazon,
 Amœn. acad. 1. p. 219. f. 4. X enterisimas; y petiolo*s* igua-
 les.

Granadilla pomifera, Ti- X *Granadilla* de fruto como
liæ folio. Fewil. peru. 1. p. X manzana; y hoja como la
 720. t. 12. X del Tilo.

Cast. Pasionaria con hoja de Tilo.

Habita en el Perú y en Lima.

Mali- 5. *PASSIFLORA foliis* X Pasionaria de hojas indi-
 formis. *indivisis cordato-oblongis* X visas, entre de figura de co-
integerrimis, *petiolis bi-* X razon y oblongas, enterisi-
glandulosis, *involucris in-* X mas; peciolo*s* con dos glan-
tegerrimis. Amœn. acad. 1. X dulas, é involucros enterisi-
 p. 220. f. 5. Mill. dict. n. 15. X mos.

Passiflora foliis cordato- X *Pasionaria* de hojas entre
oblongis integerrimis, *flori-* X de figura de corazon y oblon-
bus solitariis, *involucro tri-* X gas, enterisimas; flores soli-
partito integerrimo. Roy. X tarias; involucro dividido
 lugdb. 261. X en tres partes y enterisimo.

Clematis Indica, latifolia, X Clematide de Indias, con
flore clavato, fructu mali- X hoja ancha; flor á manera de
formi. Plum. amer. 67. t. 82. X maza; y fruto en forma de
 Rai. Suppl. p. 340. Tourn. X manzana.
 p. 241. X

Cast. Pasionaria de fruto en forma de manzana.

Habita en la isla de Santo Domingo.

Quadrangularis

6. *PASSIFLORA foliis* X Pasionaria con hojas indi-
indivisis subcordatis inte- X visas, casi de figura de cora-
gerrimis, petiolis sexglandu- X zon y enterisimas; peciolo
lulosis, caule membranaceo X con seis glandulas; tallo
tetragono. Mill. dict. n. 20. X membranoso y de quatro an-
 Jacq. amer. 231. t. 143. X gulos.

Cast. Pasionaria quadrangular.

Habita en la Jamaica.

Laurefolia.

7. *PASSIFLORA foliis* X Pasionaria de hojas indi-
indivisis ovatis integerrimis, X visas, aovadas y enterisimas;
petiolis biglandulosis, X peciolo con dos glandulas,
involucris dentatis. Amoen. X é involucros dentados.
 acad. 1. p. 220. f. 6. Jacq. X
 obs. 1. p. 35. hort. t. 162. X

Passiflora foliis solitariis X Pasionaria con hojas soli-
oblongis integerrimis, flori- X tarias, oblongas y enterisi-
bus solitariis, involucro tri- X mas; flores solitarias; invo-
partito dentato. Roy. lugdb. X lucro dividido en tres partes
 532. X y dentado.

Passiflora arborea, Laur- X Pasionaria arborea, Ame-
rinis foliis, Americana. X ricana, con hojas como las
 Pluk. alm. 282. t. 211. f. 3. X del Laurel.

Clematis Indica, fructu X Clematide de Indias, con
Citriformi, foliis oblongis. X fruto en forma de Cidro; y
 Plum. amer. 64. t. 80. Rai. X hojas oblongas.
 Suppl. p. 341. Tourn. p. 241. X

Marquiaas. Mer. Surin. X Marquiaas.
 21. t. 21. X

Cast. Pasionaria con hoja de Laurel.

Habita en Surinam. 26

372 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Tiene la *baya* aovada y muy sabrosa.

Multi-
flora.

8. *PASSIFLORA foliis indivisis oblongis integerrimis, floribus confertis.* Pasionaria con hojas indivisas, oblongas, enterisimas; y flores amontonadas.

Amoen. acad. 1. p. 221. f. 7.

Mill. dict. n. 19.

Granadilla flore minore, corymboso. Plum. spec. 7. Granadilla con la flor mas pequeña y puesta en corimbo.

Clematis Indica, polyanthos odoratissima. Plum. amer. 75. t. 90. Rai. Suppl. Clematide de Indias, con muchas flores y muy olorosas.

p. 343. Tourn. p. 241.

Cast. Pasionaria de muchas flores.

Habita en la isla de Santo Domingo.

Adul-
terina.

9. *PASSIFLORA foliis oblongo-ovalibus integris, floribus tubulosis.* Pasionaria con hojas entre oblongas y ovales, enteras; y flores tubulosas.

408.

Icon. Mutis. amer. vol. 1. t. 17. La figura que trahe Mutis.

Cast. Pasionaria adulterina.

Habita en la Nueva Granada. Mutis.

Arroja el tallo rollizo, con zarcillos en las axilas: las *hojas* entre aovadas y oblongas, enteras, enterisimas, casi pestañosas con dientecitos menudos, lampiñas por encima y tomentosas por debaxo: el *caliz* de tres hojuelas, entre aovadas y lanceoladas, lampiño, y cinco veces mas corto que el tubo de la corola: *ésta* en forma de embudo; con el *tubo* casi de la longitud y latitud de un dedo; *borde* de diez petalos (ó *lacinias*), con los cinco interiores mas delgados y terminados en punta rígida: la *garganta* con pestañas cortísimas: y la *baya* aovada y manchada.

ESPECIES CON LAS HOJAS HENDIDAS EN DOS LÓBULOS.

Perfo-
liata. 10. PASSIFLORA *foliis* X Pasionaria con hojas hen-
bilobis oblongis transversis X didas en dos lóbulos oblon-
amplexicaulibus petiolatis X gos , cortados transversal-
subtus punctatis. Amœnit. X mente , amplexicaules , pecio-
acad. 1. p. 222. f. 8. X ladas y por debaxo puntea-
das.

Flos Passionis , perfolia- X Flor de la Pasion , perfo-
tus seu Periclymeni perfo- X liada , ó con hoja como la
liati folio. Sloan. jam. 104. X del Periclymeno perfoliado.
hist. 1. p. 230. t. 142. f. 3. 4. X
Rai. Suppl. p. 342. X

Cast. Pasionaria perfoliada.

Habita en las selvas peñascosas de la Jamaica.

Rubra. 11. PASSIFLORA *foliis* X Pasionaria con hojas hen-
bilobis cordatis acuminatis X didas en dos lóbulos , de fi-
subtus subtomentosis. Amœ- X gura de corazon , puntiagu-
nit. acad. 1. p. 222. f. 9. X das y algo tomentosas por
debaxo.

Clematis Indica, flore cla- X Clematide de Indias , de
vato , suave rubente , fructu X flor con macitas , de color
exhagono , coccineo , folio bi- X roxo suave ; fruto de seis la-
corni. Plum. amer. 68. t. 83. X dos , coccineo ; y hoja con
Rai. Suppl. p. 341. Tourn. X dos astitas.
p. 241. X

Flos Passionis , folii me- X Flor de la Pasion , mas
dia lacinia quasi abscissa , X pequeña , y de color de car-
flore minore carneo. Sloan. X ne , con la lacinia media de
jam. 104. hist. 1. p. 229. X la hoja casi cortada.

Cast. Pasionaria roxa.

Habita en las islas de Santo Domingo, de la Jamaica, Mar-
tinica y Cayena.

Posee los peciolos sin glandulas.

874 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

- Nor- 12. PASSIFLORA foliis X Pasionaria con hojas esco-
malis. bilobis basi emarginatis lo- X tadas por su base, hendidas
bis linearibus obtusis diva- X en dos lóbulos, lineares, ob-
ricatis, intermedio obsoleto X tusos, divergentes, con uno
mucronato. Amoen. acad. 5. X intermedio desfigurado, y
p. 408. Mill. dict. n. 12. X terminado en punta rígida.
Coanepilli seu contraier- X Coanepili ó contra ve-
va. Hern. mex. 301. X neno.

Cast. Pasionaria como esquadra.

Habita en la America meridional.

Echa las *hojas* con sus lóbulos divergentes en ángulo rec-
to: y los *peciolos* sin glandulas.

- Muru- 13. PASSIFLORA foliis X Pasionaria con hojas hen-
cuia. bilobis obtusis basi indivi- X didas en dos lóbulos, obtu-
sis, nectariis monophyllis. X sas, indivisas por su base; y
Amoen. acad. 1. p. 223. f. 10. X nectarios de una pieza.
Clematis Indica, flore X Clematide de Indias, con
puniceo, folio lunato. Plum. X la flor de color como la del
amer. 72. t. 87. Rai. Suppl. X Granado; y hoja en forma
p. 342. X de media luna.
Murucuja folio lunato. X Murucuia con hoja en
Tourn. p. 241. X forma de media luna.

Cast. Pasionaria Murucuia.

Habita en la Isla de Santo Domingo.

Tiene las *hojas* punteadas por abaxo, con una cerdita entre
los lóbulos: y los *peciolos* sin glandulas.

- Ves- 14. PASSIFLORA foliis X Pasionaria de hojas redon-
petilio bilobis basi rotundatis glan- X deadas y glandulosas por su
dulosisque, lobis acutis di- X base, hendidas en dos lóbu-
vergentibus subtus puncta- X los, agudos, divergentes, y
tis. Amoen. acad. 1. p. 223. X punteados en su envés.
f. 11. Mill. dict. n. 11. X
Passiflora foliis obverse X Pasionaria de hojas en
lunatis, punctis duobus mel- X forma de media luna al re-
liferis sub basi. Virid. cliff. X vés, y con dos puntos meli-
91. Hort. cliff. 431. X feros baxo de su base.

DE LAS MISMAS FLOR. CON V. ESTAMB. 875

Granadilla bicornis, flore candido, filamentis intor-
vis. Dill. elth. 164. t. 137. f. 164. Granadilla de hojas con dos astas; flor cándida; y filamentos torcidos ácia adentro.

Granadilla folio lunato, flore parvo, albo, fructu succulento ovato. Mart. cent. 52. t. 52. Granadilla con hoja á manera de media luna; flor pequeña, blanca; fruto xugoso y aovado.

Cast. Pasionaria Murciegalo.

Habita en la America. *h*

Posee las *hojas* punteadas por debaxo, y con dos puntos en la base, mayores y excavados; sin cerda entre los lóbulos: y los *peciolos* sin glandulas.

Capsularis.

15. PASSIFLORA *foliis bilobis cordatis oblongis peciolatis*. Mill. dict. n. 10. Pasionaria con hojas hendidas en dos lóbulos, de figura de corazon, oblongas y pecioladas.

Granadilla fructu rubente, folio bicorni. Plum. spec. 6. ic. 138. f. 2. Barr. obs. præf. 1. titul. f. 1. Granadilla con el fruto de color que tira á roxo; y hoja con dos astas.

Cast. Pasionaria capsular.

Habita en la Francia equinoccial.

ESPECIES QUE TIENEN LAS HOJAS HENDIDAS EN TRES LOBULOS.

Mixta.

16. PASSIFLORA *foliis trifidis serratis, floribus tubulosis*. Suppl. p. 408. Pasionaria con hojas hendidas en tres partes, aserradas; y flores tubulosas.
Icon. Mutis. amer. vol. 1. t. 16. Figura que trahe Mutis.

Cast. Pasionaria mixta.

Habita en la Nueva Granada. *Mutis.*

El tallo y estatura de la planta son como de la *Pasiflora encarnada*; pero las *estipulas* en forma de media luna. Tiene el *caliz* tubuloso, con cinco dientes, tres veces mas corto que el tubo de la corola y blanquecino: la

876 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

la *corola* en forma de embudo ; con el *tubo* de la longitud y grueso casi de un dedo : el *borde* de diez *petalos* (ó *lacinias*) , con los *cinco* *exteriores* toscos ; y la *garganta* pestafiosa en las *glandulas*. Esta especie y la *Adulterina* se diferencian de las demas de su género, por el tubo de la *corola* colocado entre el *caliz* y los *petalos* , y por su longitud casi de un dedo. Proviene de la *Pasionaria encarnada* y de la *Adulterina*.

- Rotundi-
folia. 17. PASSIFLORA *foliis* X Pasionaria con hojas hen-
subtrilobis obtusis subro- X didas casi en tres lóbulos ,
tundis subtus punctatis . X obtusas , algo redondas , y
Jacq. obs 2. t. 46. f. 1. X por debaxo punteadas.
Granadilla folio Hedera- X Granadilla con hoja como
ceo, flore albo, fructu glo- X la de la Yedra ; flor blanca ;
boso villosa. Plum. spec. 6. X fruto globoso y vellosa.
ic. 138. f. 1. Tourn. p. 241. X
Barr. obs. præf. 1. titul. f. 2. X

Cast. Pasionaria de hoja redonda.

Habita en la America mas austral.

Posee las *hojas* punteadas longitudinalmente por debaxo entre los nervios : y los *peciolos* sin *glandulas*.

- Punctata. 18. PASSIFLORA *foliis* X Pasionaria de hojas pun-
subtrilobis oblongis subtus X teadas por debaxo, hendidas
punctatis, intermedio mino- X casi en tres lóbulos oblongos,
re. Amoen. acad. 1. p. 224. X con el intermedio mas pe-
f. 12. X queño.

Passiflora foliis bilobis X Pasionaria con hojas hen-
obtusis, nectario multifido. X didas en dos lóbulos obtusos ;
Roy. lugdb. 260. X y nectario hendido en mu-
X chas partes.

Granadilla folio tricuspi- X Granadilla con hoja de
di obtuso & oculato. Fewill. X tres puntas, obtusa y pun-
peru. 1. p. 718. t. 11. X teada ó con ojos.

Cast. Pasionaria punteada.

Habita en el Perú. 26

La *flor* es blanquecina. Tiene los *petalos* mas cortos que el *caliz* : el *cerco exterior del nectario* con treinta *radios* amarillos , casi del largo de los *petalos* y en forma de

de maza : el *orden intermedio* capilar y mas corto : y el *intimo* plegado , truncado y verde : el *receptaculo* cubierto con una cobertera cóncava , estriada y blanquecina : las *hojas* casi hendidas en dos lóbulos ; y los *peciolos* sin glandulas.

Lutea. 19. PASSIFLORA *foliis trilobis cordatis æqualibus obtusis glabris integerrimis*. Amœn. acad. 1. p. 224. f. 3. Gron. virg. 140. Pasionaria con hojas hendidas en tres lóbulos de hechura de corazon , iguales , obtrusos , lampiños y enterisimos.

Passiflora foliis cordatis trilobis integerrimis glabris , luteribus angularis. Hort. cliff. 431. Roy. lugdb. 261. Pasionaria con hojas de figura de corazon , hendidas en tres lóbulos , enterisimos , lampiños y angulados por sus lados.

Clematis Passionalis, triphyllor , flore luteo. Moris. hist. 1. p. 7. sect. 1. t. 2. f. Clematide Pasionaria , con hojas hendidas en tres lacinias ; y flor amarilla.

Flos Passionis , minor , folio in tres lacinias non serratas minus profundas diviso. Sloan. jam. 104. hist. 1. p. 231. Flor de la Pasion , menor , con hoja dividida en tres lacinias menos profundas y sin aserraduras.

Cast. Pasionaria amarilla.

Habita entre cascajales y peñascos de la Virginia y de la Jamaica. 26

Tiene el *tallo* annuo : y las *hojas* sin glandulas.

Mi- 20. PASSIFLORA *foliis trifidis integerrimis , lobis sublanceolatis , intermedio longiore*. Jacq. hort. t. 20. Amœn. acad. 1. p. 229. f. 18. Loeß. it. 247. Pasionaria con hojas hendidas en tres lóbulos , enterisimos , casi lanceolados ; y el intermedio mas largo.

878 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Passiflora seu flos Pas- Pasionaria ó flor de la Pa-
sionis, Curassavicus, folio sion, de Curasao, con hoja
glabro, trilobato & angusto, lampiña, hendida en tres ló-
flore flavescente, omnium mi- bulos y angosta; flor de co-
nimo. Pluk. alm. 282. t. 210. lor amarillo-roxo, y mas pe-
 f. 3. queña que todas.

Granadilla folio glabro & Granadilla con hoja lam-
angusto, flore virescente, piña y angosta; flor de color
minimo. Tourn. p. 240. R. que tira á verde y muy pe-
 queña.

Cast. Pasionaria minima.

Habita en Curasao.

Posee las *hojas* algo velloſas, y hendidas mas de la mitad
 en tres partes: los *peciolos* sin glandulas: las *flores* me-
 nudas: el *tallo* mas crecido, y que se vuelve corchoso.

Sube- 21. PASSIFLORA foliis Pasionaria con hojas hen-
 rosa. trilobis subpeltatis, cortice didas en tres lóbulos, casi
 suberoso. Amœn. acad. 1. p. abroqueladas; y corteza cor-
 226. f. 14. Jacq. hort. t. 163. chosa.

Clematis Indica, folio Clematide de Indias, ma-
Hederaceo, major, fructu yor, con hoja como la de la
olivæformi. Plum. amer. 70. Yedra; y fruto en forma de
 t. 85. Rai. Suppl. p. 339. aceytuna.

Passifloræ affinis, Hede- Planta Americana, pare-
ræ folio, Americana. Pluk. cida á la Pasionaria, con ho-
 alm. 202. t. 210. f. 4. ja como la de la Yedra.

α *Clematis Indica, folio an-* Clematide de Indias, con
gusto, trifido, fructu olivæ- hoja angosta, hendida en tres
formi. Plum. amer. 70. t. 85. partes; y fruto en forma de
 aceytuna. α

Flos Passionis, minor, Flor de la Pasion, menor,
foliis in tres lacinias non con hojas divididas mas pro-
serratas profundius divis, fundamente en tres lacinias
flore luteo. Sloan. jam. 104. sin aserraduras; y flor ama-
 hist. 1. p. 320. rilla. *Vease la especie* 19.

Cast. Pasionaria corchosa.

Habita en las Islas Antillas y en la de Santo Domingo. *h*
 Echa la *corteza* corchosa, resquebrada y blanca: las *flo-*
res axilares, mellizas, blancas y sin petalos: la baya de
 co-

color de violeta: las *hojas* en las plantas tiernas abroqueladas, pero en las mas crecidas no tanto, siempre lustrosas y muy lampiñas; con los *peciolos* sin glandulas.

Las figuras que trae *Plumier* son muy desemejantes de esta planta. *Jacq. loco citato.*

Holo-
sericea

22. *PASSIFLORA foliis trilobis tomentosis, basi utrinque denticulo reflexo.* Pasionaria de hojas hendidas en tres lóbulos, tomentosas, y por ambas partes de su base con un dientecito redoblado. Amoen. acad. 1. p. 226. f. 15. Mill. dict. n. 9.

Granadilla folio hastato, holosericeo, petalis candidibus, fimbriis ex purpureo & luteo variis. Mart. Granadilla con hoja de hechura de alabarda, toda como seda; petalos de color que tira á candido; y flecos de varios colores purpúreo y amarillo.

Cast. Pasionaria como seda.

Habita en Vera-cruz. *h*

Tiene los *peciolos* con dos glandulas opuestas: los *lóbulos laterales* de las hojas cortos: una *glandula* desfigurada, puesta por debaxo detrás del seno del *lóbulos*: las *hojas* aovadas y tomentosas en ambas superficies.

Hirsuta.

23. *PASSIFLORA foliis trilobis villosis, floribus oppositis.* Pasionaria con hojas hendidas en tres lóbulos, vello- Amoen. acad. 1. p. 227. f. 16. sas; y flores opuestas.

Passiflora non crenata, Americana, triphylla. Pluk. Pasionaria de America, con hojas divididas en tres hojuelas y sin festones. alm. 282. t. 212. f. 1.

Clematis Indica, flore minimo, pallido. Plum. amer. Clematide de Indias, con la flor muy pequeña y palida. 73. t. 88.

Flos Passionis, albus, folio Hibisci sericeo, trilobato. Herm. parad. 176. t. 176. Flor de la Pasion, blanca, con hoja como la del Hibisco, con vello como seda, y hendida en tres lóbulos.

Cast. Pasionaria con pelo áspero.

Habita en la Isla de Santo Domingo y de Curasao.

PAS-

880 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Fœti- 24. PASSIFLORA foliis Pasionaria con hojas de
da. trilobis cordatis pilosis, in- hechura de corazon, pelosas,
volucris multifido-capillari- hendidas en tres lóbulos; y
bus. Amœn. acad. 1. p. 228. con involucros hendidos en
f. 17. Giseck. ic. fasc. 1. t. 20. muchas lacinias capilares.
Flos Passionis, albus, re- Flor de la Pasion, blan-
ticulatus. Herm. par. 173. ca y en redecilla.
t. 173.

Clematis Indica, hirsuta Clematide de Indias, con
fœtida. Plum. amer. 71. t. 86. pelo áspero y fetida.

α Passiflora vesicaria, He- Pasionaria vexigosa, como
deracea, foliis lanuginosis, Yedra, con hojas lanugino-
odore tetro, filamentis flo- sas, de olor hediondo; y fi-
rum ex albo & purpureo va- lamentos de las flores mati-
riegatis. Pluk. alm. 382. t. zados de color blanco y pur-
104. f. 1. púreo. α

Cast. Pasionaria fetida.

Habita en las Islas de Santo Domingo, de la Martinica y
Curasao. ☉

Echa el lóbulo medio de las hojas mucho mayor que los
laterales: las estipulas pestañosas: los peciolo sin
glandulas, pero con pelos viscosos; y el involucre se-
mejante al de la *Nigela Damascena*, llamada vulgar-
mente *arañuela*.

Incar- 25. PASSIFLORA foliis Pasionaria con hojas hen-
nata. trilobis serratis. Amœnit. didas en tres lóbulos y aser-
acad. 1. p. 230. Gron. virg. radas.
140.

Passiflora foliis semitri- Pasionaria con hojas me-
fidis serratis, basi duabus dio hendidas en tres lóbulos
glandulis convexis, lobis aovados, aserradas; y en su
ovatis. Hort. cliff. 432. Roy. base con dos glandulas con-
lugdb. 260. vexás.

Granadilla Hispanis, flos Planta llamada Granadilla
Passionis Italis. Hern. mex. por los Españoles; y flor de
828. t. 888. Rai. hist. 649. la Pasion por los Italianos.
Tourn. p. 240.

DE LAS MISMAS FLOR. CON V. ESTAMB. 88r

Clematis trifolia, flore roseo, clavato. C. B. P. 301. Clematide de tres hojuelas; y flor como rosa, con macitas.

Clematis trifolia, seu *flos Passionis*, flore viridi. Moris. hist. 2. p. 6. sect. 1. t. 1. f. 9. Clematis con tres hojuelas, ó flor de la Pasion, de color verde.

Cast. Pasionaria encarnada.

Habita en la Virginia, en el Brasil y en el Perú. 2

Tiene los peciolo con dos glandulas en la base de la hoja.

ESPECIES CON LAS HOJAS HENDIDAS EN MUCHAS PARTES.

Corru-
lea. 26. *PASSIFLORA foliis palmatis integerrimis*. Amœnit. acad. 1. p. 231. f. 20. Pasionaria con hojas palmeadas y enterisimas.

Knorr. del. 1. t. P.

Passiflora foliis palmatis quinquepartitis integerrimis, involucris cordatis triphyllis. Hort. cliff. 432. Pasionaria con hojas palmeadas, y partidas en cinco lóbulos enterisimos; involucros de hechura de corazon y con tres hojuelas.

Granadilla polyphyllis, fructu ovato. Tourn. p. 241. Granadilla con muchas hojuelas; y fruto aovado.

Granadilla pentaphyllis, flore cœruleo magno. Boerh. lugdb. 1. p. 81. Duham. arb. 1. p. 272. t. 107. Granadilla con muchas hojuelas; flor cerúlea y grande.

Cast. Pasionaria de flor cerúlea.

Habita en el Brasil. h

Tiene las hojas hendidas en cinco lóbulos y obtusos: los peciolo con dos glandulas; y las estipulas en forma de media luna.

Las hojas las mas veces palmeadas, ó partidas en cinco, ó siete lacinias, entre lanceoladas y aovadas, y enterisimas: los peciolo mas cortos que las hojas: los pedunculos mas largos que los peciolo: las bracteas grandes, de hechura de corazon y foliaceas: las estipulas en forma de riñon y dentadas: el caliz que se equivoca con la corola, de hojuelas guarnecidas con un dientecito puesto debaxo de

882 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

su ápice; con cuya nota se distingue de la corola: el *nectario* que consta de fibras ó flecos puestos en cerco, de color violado ó purpúreo por su ápice, blancos en medio, y entre negros y purpúreos en la base; y algunos puntos glandulosos puestos en la base de los filamentos en medio del nectario. *Gov. hort.* 476.

- Serrata. 27. *PASSIFLORA foliis palmatis serratis.* Amoenit. acad. i. p. 231. f. 21. Pasionaria con hojas palmadas y aserradas.
- Clematis Indica, polyphylla major, flore clavato, fructu Colocynthis.* Plum. amer. 62. t. 79. Rai. Suppl. p. 340. Tourn. p. 241. Clematide de Indias, mayor, de muchas hojuelas; flor con macitas; y fruto como el de la Coloquintida.
- Granadilla polyphyllus, fructu Colocynthis.* Tourn. p. 241. Granadilla con muchas hojuelas, con fruto como el de la Coloquintida.

Cast. Pasionaria aserrada.
Habita en la Martinica.

- Pedata 28. *PASSIFLORA foliis pedatis serratis.* Amoenit. acad. i. p. 233. f. 22. Pasionaria con hojas ramosas y aserradas.
- Clematis Indica, polyphylla, flore crispato.* Plum. amer. 66. t. 81. Rai. Suppl. p. 341. Clematide de Indias, con muchas hojuelas; y flor rizada.
- Granadilla polyphyllus, flore crispato.* Tourn. p. 241. Granadilla con muchas hojuelas; y flor rizada.

Cast. Pasionaria de hojas ramosas.
Habita en la Isla de Santo Domingo.

ORDEN V.

HEXANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON SEIS ESTAMBRES.

1220. Género ARISTOLOCHIA. * *Tourn. t. 71.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.

COR. de un *petalo*, tubulosa é irregular: su *base* ventricosa, casi globosa y con eminencias: el *tubo* oblongo, entre de seis lados y cilindrico: y el *borde* ensanchado, y extendido por débaxo en una lengua larga.

ESTAMB. *Filamentos* ninguno: *anieras* seis, pegadas debaxo del estigma y de quatro celdillas.

PIST. *Germen* oblongo, baxo de la flor y angular: *estilo* apenas ninguno: *estigma* casi globoso, dividido en seis partes y cóncavo.

PERIC. *Capsula* grande, de seis ángulos y de seis celdillas.

SEM. muchas, deprimidas y hechadas unas encima de otras.

Obs. *La figura del fruto varía en diferentes especies: en unas es casi redonda y en otras larga.*

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 162.

La flor es de un petalo, anomala, tubulada, en forma de lengua, y las mas veces ganchosa; cuyo caliz (*es el germen*) pasa á fruto membranoso, globoso, aovado, ó cilindrico, dividido en seis celdillas, y lleno de simientes comprimidas y echadas unas encima de otras.

ESPECIES.

^{Bilobata.} 1. ARISTOLOCHIA fo-X Aristolochia con hojas hendidas en dos lóbulos; y tallo voluble.

884 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Aristolochia longa, scan-
dens, foliis ferri equini effi-
gie. Plum. spec. 5. amer. 91.
t. 106. Rai. Suppl. p. 395.
Tourn. p. 163.

Cast. Aristolochia de dos lóbulos.
Habita en la Isla de Santo Domingo.

Trilo-
bata.

2. ARISTOLOCHIA fo-
liis trilobis, caule volubili,
floribus maximis. Jacq. obs.
1. p. 8. t. 3.

*Aristolochia folio Hede-
raceo*, trifido, maximo flore,
radice repente. Plum. spec.
5. Tourn. p. 163.

Aristolochia scandens, fo-
liis sublobatis obtusis, flo-
ribus amplissimis. Brown.
jam. 328. Barr. æquin. 16.

Cast. Aristolochia de tres lóbulos.

Habita en la America meridional. 26

Arroja las flores muy grandes y ventricosas: las hojas en-
tre palmeadas y hendidas en tres lóbulos. El tallo es
aromático, y se usa contra la mordedura de las serpien-
tes.

Pen-
tandra.

3. ARISTOLOCHIA fo-
liis cordato-hastato subtri-
lobis, caule volubili, brac-
tea cordata amplexante.

*Aristolochia floribus pen-
tandris*. Jacq. amer. 232. t.
147.

Cast. Aristolochia con hojas en-
tre de hechura de corazon y
de alabarda, casi hendi-
das en tres lóbulos; tallo vo-
luble; y una bractea en for-
ma de corazon que abraza
(al pedunculo).

Aristolochia con flores de
cinco estambres.

Cast. Aristolochia de cinco estambres.

Habita en la America. 26

Posee las flores muy pequeñas.

ARIS-

DE LAS MISMAS FLOR. CON VI. ESTAMB. 88;

Pela- 4. ARISTOLOCHIA fo- Aristolochia con hojas en
tata. *liis reniformibus subpelta-* forma de riñon, casi abro-
ris, caule volubili. Jacq. obs. queladas; y tallo voluble.

1. p. 4. t. 4.

Aristolochia Asari folio, Aristolochia de hoja como
umbilicato, longissimo, ra- la del Asaro, con ombligo,
dice repente. Plum. spec. 5. muy larga; y raíz rastre-
ic. 32. f. 2. Tourn. p. 163. ra.

Cast. Aristolochia abroquelada.

Habita en la America meridional. 26

Tiene la corola con pelo áspero, y por defuera punteada,
con el labio larguísimo: y los pedunculos de una flor.

Ma- 5. ARISTOLOCHIA fo- Aristolochia con hojas
xima: *liis oblongis acuminatis,* oblongas y puntiagudas; ta-
caule volubili, pedunculis llo voluble; y pedunculos de
multifloris. Jacq. amer. 233. muchas flores.
t. 146.

Aristolochia foliis oblon- Aristolochia con hojas en-
go-ovatis obtusis integerri- tre oblongas y aovadas, ob-
mis, caule scandente, flori- tudas, enterisimas; tallo tre-
bus terminalibus, fructibus pador; flores terminales; fru-
sexangularibus maximis. tos de seis ángulos y muy
Mill. dict. n. 13. grandes.

Cast. Aristolochia muy grande.

Habita en la Nueva España. 7

Echa las flores encorvadas: el tallo corchoso ácia la raíz:
el fruto parecido á una bolsa, muy grande; de seis
ventallas arrimadas por su ápice, que se abre en la base
con el pedunculo, y todo entretegido de pelos transver-
sales.

Bila- 6. ARISTOLOCHIA fo- Aristolochia de hojas en-
biata. *liis ovato-oblongis triner-* tre aovadas y oblongas, con
viis, caule volubili, corollis tres nervios; tallo voluble;
bilabiatis. † y corolas hendidas en dos
labios.

886 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Aristolochia scandens, fo-
liis oblongis, radice repen-
 te. Plum. spec. 5. ic. 32. f. 1.
 Tourn. p. 163.

Cast. Aristolochia de dos labios.
 Habita en la America.

Erecta 7. ARISTOLOCHIA fo-
liis lanceolatis sessilibus,
subhirsutis, caule erecto,
pedunculis solitariis uniflo-
ris, floribus longissimis.
 Mill. dict. n. 12. †

Cast. Aristolochia levantada.
 Habita en Vera-cruz.

Ar- 8. ARISTOLOCHIA fo-
 bores- *liis cordato-lanceolatis*, cau-
 cens. *le erecto fruticoso*. Hort.
 cliff. 433. Mill. dict. n. 7.

Aristolochia polyrhiza,
auriculatis foliis, Virginia-
 na. Pluk. alm. 50. t. 78. f. 1.
 Tourn. p. 162.

Cast. Aristolochia arborescente.
 Habita en la America. *h*

Cau- 9. ARISTOLOCHIA fo-
 data. *liis cordatis acuminatis tri-*
plinerviis, caule volubili.
 Jacq. amer. 233. t. 145.

Aristolochia scandens, fo-
rum stabbellis maximis, va-
riegatis, in appendicem lon-
gam tenuem desinentibus.
 Brown. jam. 329.

Cast. Aristolochia de cola.

Ha-

Habita en la America. \hbar

Los lóbulos de la base de las hojas se hallan hechados unos encima de otros: y el labio de la corola es como un aventador y se alarga en una cola setácea.

Odo-
ratissi-
ma.

10. ARISTOLOCHIA fo- Aristolochia con hojas de
liis cordatis, caule volubili hechura de corazon; tallo
fruticoso, pedunculis solita- voluble, fruticoso; peduncu-
riis, labio corollis majore. los solitarios; y labio mayor
que las corolas.

*Aristolochia scandens, odo- Aristolochia trepadora,
ratissima, floris labello pur- muy olorosa, con el labio de
pureo, semine cordato.* Sloan. la flor purpúreo; y semilla de
jam. 60. hist. 1. p. 162. t. hechura de corazon.

104. f. 1.

*Aristolochia folio cordi- Aristolochia con hoja en
formi, flore longissimo, atro forma de corazon; flor lar-
purpureo, radice repente.* guisima, de color entre ne-
Plum. spec. 5. ic. 34? Tourn. gro y purpúreo; y raiz ras-
p. 163. trera.

Cast. Aristolochia muy olorosa.

Habita en la America. \hbar

Angui-
cida.

11. ARISTOLOCHIA fo- Aristolochia con hojas de
liis cordatis acuminatis, hechura de corazon y pu-
caule volubili fruticoso, pe- tiagudas; tallo voluble, fru-
dunculis solitariis, stipulis ticoso; pedunculos solitarios;
cordatis. Jacq. amer. 232. y estipulas de figura de co-
t. 144. razon.

*Aristolochia Mexicana, Aristolochia de México,
flore acutiore.* Moris. hist. 3. con la flor mas aguda.
p. 509. sect. 12. t. 17. f. 7.

Cast. Aristolochia mata culebras.

Habita en las Indias. \hbar

Tiene las corolas rectas, y casi truncadas, con el labio lanceolado. El xugo de la raiz de esta especie mezclado con saliva, y hechado en la boca de la serpiente llamada *Gtigiti* la entorpece de manera que se puede tratar sin peligro; pero vuelve en sí al cabo de algunas horas. Jacq.

838 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Mau- 12. ARISTOLOCHIA fo- Aristolochia con hojas en
 forum. *liis hastatis integerrimis*, forma de alabarda, enterisi-
caule infirmo simplici, flo- mas; tallo debil y sencillo;
ribus solitariis recurvatis. flores solitarias y encorvadas
 Gron. orient. 280. ácia atrás.

Aristolochia Orientalis, Aristolochia Oriental, con
foliis lanceolatis. Tourn. hojas lanceoladas.
 cor. 162.

Aristolochia Maurorum. Aristolochia de los Mo-
 C. B. P. 307. ros.

Aristolochia longa, *foliis* Aristolochia larga, con
angustis acuminatis. Moris. hojas angostas y puntiagu-
 hist. 3. p. 510. sect. 12. t. 17. das.
 f. 11.

Aristolochia peregrina, Aristolochia peregrina, de
Rauwolfii. Clus. hist. 2. Rauwolfio.
 p. 71.

Cast. Aristolochia de los Moros.
 Habita en Alepo. 24

Indica. 13. ARISTOLOCHIA fo- Aristolochia con hojas de
liis cordatis acutiusculis, hechura de corazon y algo
caule volubili, *pedunculis* agudas; tallo voluble; y pe-
multifloris. Flor. zeyl. 323. dunculos de muchas flores.
 Mill. dict. 8.

Catele-Vegon. Rheed. mal. Catele-Vegon.
 8. p. 48. t. 25. Rai. Suppl.
 p. 394.

Aristolochia Clematis, In- Aristolochia Clematite, de
dica, *flore albicante*. Tourn. Indias, con la flor blanque-
 p. 162, cina.

Cast. Aristolochia de Indias.
 Habita en la India. 24

Bætica 14. ARISTOLOCHIA fo- Aristolochia con hojas de
liis cordatis acutiusculis, hechura de corazon y algo
caule volubili, *pedunculis* agudas; tallo voluble; pe-
subterpnis petiolo longiori- dunculos casi de tres en tres
bus. y mas largos que el peciolo.

Aristolochia Clematidis, *Aristolochia Clematite*,
serpens. C. B. P. 307. Mo- que serpea.

ris. hist. 3. p. 509. sect. 12.

t. 17. f. 6. Tourn. p. 162.

Aristolochia Clematidis, *Aristolochia Clematite*, de
Betica. Clus. hist. 2. p. 71. Andalucia.

Cast. *Aristolochia* de Andalucia.

Habita en Creta: y cerca de Sevilla camino de Lisboa: y
 en otras partes de Andalucia, trepando sobre los árboles.

Tiene las *estipulas* entre aovadas y de figura de rombo, y
 terminadas en punta rígida.

Sem-
 per vi-
 rens.

15. *ARISTOLOCHIA fo-* *Aristolochia* con hojas de
liis cordato-oblongis acumi- figura entre de corazon y
natis undatis, caule infirmo, oblongas, puntiagudas y on-
floribus solitariis. Sabb. deadas; tallo debil; y flores
 hort. 2. t. 82. solitarias.

Pistolochia Cretica. C. B. *Pistolochia* de Creta.

P. 307. Moris. hist. 3. p. 510.

sect. 12. t. 17. f. 16.

Pistolochia altera semper Otra *Pistolochia* siempre
virans. Clus. hist. 2. append. verde.

1. p. 260.

Aristolochia Pistolochia, Otra *Aristolochia* *Pistolo-*
altera. Bauh. hist. 3. p. 563. *chia*.

Tourn. p. 162.

Cast. *Aristolochia* siempreverde.

Habita en Creta. *h*

Posee las *flores* encorvadas y mas largas que las hojas;
 con los *tallos* angulares.

Ser-
 penta-
 ria.

16. *ARISTOLOCHIA fo-* *Aristolochia* con hojas en-
liis cordato-oblongis planis, tre de figura de corazon y
caulibus infirmis flexuosis oblongas, planas; tallos de-
teretibus, floribus solitariis. biles, ondeados, rollizos; y
 Mat. med. 225. Gron. virg. flores solitarias.

140.

890 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Aristolochia Pistorochia, *Aristolochia Pistorochia* 6
seu Serpentaria Virginia- *Serpentaria de Virginia*, con
na, caule nodoso. Pluk. alm. el tallo nudoso.

50. t. 148. f. 5. Catesb. car.

7. p. 29. t. 29. Tourn. p. 162.

Kai. Suppl. p. 394.

Aristolochia polyrhizos, *Aristolochia de Virginia*,
Virginiana, fructu parvo de muchas raices; fruto pe-
pentangulari. Moris. hist. 3. queño y con cinco ángulos.

p. 510. sect. 12. t. 17. f. 14.

Aristolochia polyrhizos, *Aristolochia de Virginia*,
auriculatis foliis, Virginia- de muchas raices; y hojas
na. Pluk. alm. 50. t. 78. f. 1. con orejillas. α

Aristolochia Violæ fruti- *Aristolochia de Virginia*,
cosæ foliis, Virginiana. Pluk. con hojas como las de la Vio-
alm. 50. t. 15. f. 2. leta fruticosa. β

Cast. *Aristolochia Serpentaria. Farm. Serpentaria Virgi-*
niana.

Habita en la Virginia. 2.

Tiene el tallo muy nudoso; y las flores en la raiz.

PROPIED. La raiz es acre con el olor como el de la Valeria-
na: expelente, diaforetica, exantematica, alexiteria,
diuretica y antelmintica: se usa en las calenturas in-
termittentes, exantematicas y en las mordeduras vene-
nosas.

Pisto- 17. ARISTOLOCHIA fo- *Aristolochia de hojas de*
lochia. liis cordatis crenulatis sub- figura de corazon, recortadi-
tus reticulatis petiolatis, tas, con venas en redequilla
floribus solitariis. Hall. helv. por debaxo, pecioladas; y
 n. 1029. flores solitarias.

Aristolochia caule infir- *Aristolochia con el tallo*
mo ramoso, foliis cordatis debil y ramoso; hojas de fi-
obsolete dentatis, floribus gura de corazon, con dien-
solitariis erectis. Hort. cliff. tes poco manifestos; flores
 433. Sauv. monsp. 111. solitarias y derechas.

Aristolochia Pistorochia *Aristolochia llamada Pis-*
dicta. C. B. P. 307. Tourn. tolochia.
 p. 162.

DE LAS MISMAS FLOR. CON VI. ESTAMB. 891

Pistolochia. Clus. hist. 2. *Pistolochia*.
p. 72. Dod. pempt. 525.

Cast. Aristolochia Pistolochia. Farm. Aristolochia tenuis.
Habita en la Francia Narbonense y en Suiza: en Ara-
gon, Cataluña, Andalucía, Extremadura y en otras
muchas partes de España. 2

Arroja el labio de la corola encorvado ácia dentro: y una
bractea de hechura de corazon, sin piececito, pequeña
y puesta en la base del pedunculo.

PROPIED. Son con poca diferencia las mismas que las de
la Serpentaria Virginiana.

Ro- 18. ARISTOLOCHIA fo- Aristolochia con hojas de
tunda. liis cordatis subsessilibus hechura de corazon, casi
obtusis, caule infirmo, flori- sentadas y obtusas; tallo de-
bus solitariis. Mat. med. bil; y flores solitarias.

225. Sabb. hort. 2. t. 80.

*Aristolochia caule infirmo ramoso, foliis cordatis debil y ramoso; hojas de fi-
integerrimis, floribus soli- gura de corazon, enterisi-
tariis erectis. Hort. cliff. mas; flores solitarias y dere-
432. chas.*

*Aristolochia rotunda, flo- Aristolochia con la raiz
re expurpura nigro. C. B. P. redonda; y flor entre purpú-
307. Tourn. p. 162. rea y negra.*

*Aristolochia rotunda, pri- Aristolochia redonda, pri-
ma. Clus. hist. 2. p. 70. mera.*

*Aristolochia rotunda. Aristolochia con la raiz
Bauh. hist. 3. p. 559. Dod. redonda.
pempt. 324.*

Cast. Aristolochia redonda.

Habita en Italia y en la Francia Narbonense: en la Car-
tuxa del Paular de Segovia, en el Real Sitio de S. Lo-
renzo, en Aragon, Cataluña y otras muchisimas partes
de España. 2

Posee el labio de la corola encorvado ácia dentro: y el ta-
llo angular.

PROPIED. La raiz es aromatica, amarga y acre, vomiti-
va, expelente, diuretica, emenagoga, vulneraria, y se
usa

892 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

usa con admirables efectos en la caquexia, en la sarna, fistula, sarcoma y cacoetes.

- Longa. 19. ARISTOLOCHIA fo-X Aristolochia con hojas de
liis cordatis petiolatis inte- figura de corazon, peciola-
gerrimis obtusiusculis, cau- das, enterisimas, algo obtu-
le infirmo, floribus solitariis. sas; tallo debil; y flores so-
Mat. med. 226. Mill. dict. n. litarias.
2. ic. t. 51. f. 2. Sabb. hort.
1. t. 81.

Aristolochia caule infirmo Aristolochia de tallo debil
ramoso, foliis cordatis in- y ramoso; hojas de figura de
tegerrimis longe petiolatis, corazon, enterisimas, con
floribus solitariis. Sauv. peciolo largo; y flores soli-
monsp. 111. tarias.

Aristolochia longa, vera. Aristolochia larga, verda-
C. B. P. 307. Tourn. p. 162. dera.

Aristolochia longa. Clus. Aristolochia con la raiz
hist. 2. p. 70. Bauh. hist. 3. larga.
p. 560. Dod. pempt. 324.

^a *Aristolochia longa, His-* Aristolochia de España,
panica. C. B. P. 307. Tourn. con la raiz larga. ^a
p. 162.

Aristolochia longa, alte- Otra Aristolochia larga.
ra. Clus. hist. 2. p. 71.

Cast. Aristolochia larga.

Habita en Italia, Francia y en la Carniola: en los circui-
tos de Madrid y en los demas lugares que la antecede-
dente. 26

Es muy parecida á la *Aristolochia redonda*; y tiene el ta-
llo quadrangular.

PROPIED. Son las mismas que las de la antecedente; aun-
que mas remisas.

- Hirta. 20. ARISTOLOCHIA fo-X Aristolochia de hojas en
liis cordatis obtusiusculis forma de corazon, algo ob-
hirtis, floribus solitariis tusas y con pelo áspero; flo-
pendulis recurvatis subtrun- res solitarias, pendulas, en-
catis. Mill. dict. n. 9. corvadas ácia atrás y casi
truncadas.

Aris-

DE LAS MISMAS FLOR. CON VI. ESTAMB. 893

Aristolochia longa, sub-
hirsuta, folio oblongo, flore
maximo. Tourn. it. 1. p. 147.
 t. 147.

Aristolochia larga, con al-
 gun pelo áspero; hoja oblon-
 ga; y flor muy grande.

Cast. Aristolochia con pelo áspero.

Habita en Chio. 24

Posee el tallo estriado y con pelo áspero: las hojas de he-
 chura de corazon y obtusas con puntita: la corola en-
 corvada ácia dentro y ácia atrás, sin el labio alargado.

Cle-
 matis.

21. ARISTOLOCHIA fo-
liis cordatis, caule erecto,
floribus axillaribus confer-
tis. Mat. med. p. 226. Hall.
 helv. n. 1029. Pallas. it. 1.
 p. 31. Kniph. cent. 1. t. 8.
 Knorr. del. hort. 2. t. A. 15.

Aristolochia con hojas de
 figura de corazon; tallo de-
 recho; flores axilares y amon-
 tonadas.

Aristolochia caule erecto
simplicissimo, foliis corda-
tis petiolatis, floribus late-
ralibus confertis. Hort. cliff.
 432.

Aristolochia con el tallo
 derecho y muy sencillo; ho-
 jas de figura de corazon, con
 peciolo; flores laterales y
 amontonadas.

Aristolochia Clematidis,
recta. C. B. P. 307. Tourn.
 p. 162.

Aristolochia Clematite,
 recta.

Aristolochia Clematidis,
vulgaris. Clus. hist. 2. p. 71.
 Bauh. hist. 3. p. 560.

Aristolochia Clematite,
 vulgar.

Aristolochia Sarracena.
 Dod. pempt. 326.

Aristolochia Sarracena.

Cast. Aristolochia Clematite.

Habita en Austria, Francia y Tartaria: en las orillas del
 mar de Cataluña, en Andalucia y otras partes de Es-
 paña.

La Tipula con cuernecillos en forma de plumas fecunda
 las flores. Schreber.

PROPIED. La raíz es acre, amarga y de olor pesado: se
 usa en la caquexia, en la sarcoma y cacoetes.

894 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

1221. Género PISTIA. † Kodda-pail Plum. 39.

Jacq. amer. 234.

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.

COR. de un *petalo*, tubulosa, desigual y en medio cohartada: con el *borde* en forma de oreja, derecho, puntiagudo y doblado por dentro en ambas partes con un pliegue.

ESTAMB. un *filamento* que sale de la pared de la corola, opuesto á la parte de la rendija de mas abaxo, derecho, ceñido por su base con el disco membranoso, y desde alli alargado en forma de cintilla, en cuyo ápice se hallan sentadas seis ú ocho *anteras*, casi redondas y extendidas.

PIST. *Germen* oblongo, y pegado al fondo de la corola: *estilo* craso y derecho: con el *estigma* obtuso y casi abroquelado.

PERIC. *Capsula* aovada, comprimida y de una celdilla.

SEM. muchas, oblongas y fixadas en el dorso de la capsula.

ESPECIE.

Stratiotes. 1. PISTIA *foliis obcordatis*. Flor. zeyl. 322. Loeß. Pistia con hojas de figura de corazon al revés.
it. 281. Jacq. amer. 234. t. 148.

Pistia aquatica, villosa, foliis obovatis, ab imo venosis, floribus sparsis foliis insidentibus. Brow. jam. 329. Pistia aquatica, vellosa, de hojas aovadas al revés, venosas desde abaxo; flores esparcidas y sentadas sobre las hojas.

Kodda-pail palustris, folio oblongo specioso. Plum. gen. 30. Kodda-pail palustre, con hoja oblonga y hermosa.

Plantago aquatica. Rumph. amb. 6. t. 74. Llantén aquatico.

“ <i>Stratiotes Ægyptia</i> . Bauh. hist. 3. p. 787. Moris. hist. 3. p. 619. sect. 15. t. 4. f. inter. Rai. hist. 1324.	“ Estratiote de Egipto. “
<i>Stratiotes Hai-alem maovi</i> . Alp. ægypt. 106. t. 108.	Estratiote Hai-alem maovi.
<i>Lenticula palustris</i> VI. seu <i>Ægyptia</i> , seu <i>Stratiotes aquatica</i> , foliis <i>Sedi majoris latioribus</i> . C. B. P. 362. Sloan. jam. 11. hist. 1. p. 15. t. 2. f. 2.	Lentejuela palustre, sexta ó de Egipto; ó Estratiote aquatica, con hojas mas anchas que las del Sedo mayor.
<i>Kodda-pail</i> . Rheed. mal. 11. p. 63. t. 32.	Kodda-pail.

Cast. Pistia Estratiote.

Habita en Asia, Africa y en la America meridional, nadando sobre las aguas.

No bastaron á Linneo las flores secas para quedar satisfecho de los caracteres de este género; y así encarga que los exâminen con mas exâctitud aquellos que tengan la ocasion de ver la planta viva. Es semejante á la *Lemna*.

ORDEN VI.

OCTANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON OCHO ESTAMBRES.

1222. Género SCOPOLIA. *Suppl.* p. 60.

CAR. GEN. NAT.

Muchas flores pequeñas, vellosas y sentadas.

CAL. *Periantio comun* con muchas flores, de dos hojuelas iguales, oblongas, obtusas, cóncavas, nerviosas y lampiñas.

Periantio propio ninguno.

COR. en forma de embudo, hendida en quatro partes, vellosa y baxo del germen; con *dientes* casi iguales y algo obtusos.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, puestos en cerco en el ápice del germen, derechos, cortos y filiformes: con quatro

896 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

antras arrimadas entre sí en forma de columna, á la qual se halla puesta otra columna con quatro *antras* angulares y que carecen de filamentos.

PIST. *Germen* dentro de la flor, derecho, lampiño, y terminado en cerdas entreveradas con filamentos: *estilo* ninguno: *estigma* corto y agudo.

PERIC. : : : : :

SEM. : : : : :

ESPECIE.

Com-posita. I. SCOPOLIA. Suppl. p. $\frac{X}{X}$ Scopolia.
409. $\frac{X}{X}$

Cast. Scopolia compuesta.

Habita en Java. *Thunb.* $\frac{f}{f}$

Es *arbol* con ramas rollizas, lampiñas, con muchas hojas por su remate, y que llevan las flores debaxo de ellas. Tiene las *hojas* alternas, con el peciolo corto, oblongas, aguzadas en ambas partes, enteras, venosas, muy lampiñas y del largo de un dedo: *estipula* ninguna: los *pedunculos* en las axilas de las hojas, despues que estas se han caido, solitarios, inclinados, filiformes y de una flor.

ORDEN VII.

DECANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DIEZ ESTAMBRES.

1223. Género KLEINHOVIA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas oblongas, casi iguales; con la *inferior* poco mas corta, y que se cae quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* cinco, lanceolados, sin uñuelas, poco mas largos que el caliz; con el *de mas arriba* mas corto, mas ancho y arqueado.

Nectario central, sentado en una columna, del largo del caliz, ascendente por su remate, en forma de campana, muy pequeño, y medio hendido en cinco lacinias encorvadas ácia atrás.

Es

DE LAS MISMAS FLOR. CON X. ESTAMB. 897

ESTAMB. *Filamentos* diez, colocados dentro del nectario, alessnados, de la longitud del mismo nectario y alternadamente mas cortos: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* colocado en la cavidad del nectario y aovado: *estilo* filiforme, de la longitud de los estambres: con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Capsula* dividida en cinco lóbulos, de cinco celdillas, con cinco ángulos é inflada.

SEM. solitarias, y casi redondas.

OBS. *Tiene afinidad con el género Ayenia.*

ESPECIE.

Hos-
pita.

I. KLEINHOVIA.

X

Kleinhovia.

Cati-marus. Rumph. amb.

X

Cati-maró.

3. P. 177. t. 113.

X

Cast. Kleinhovia hospita. A esta planta se le puso el nombre de *Kleinbo*, Jardinero Botánico en Java.

Habita en la India oriental. \hbar

Es *arbol* que echa las *hojas* alternas, pecioladas, de figura de corazon, puntiagudas, apenas aserradas y desnudas: las *flores* en algun modo parecidas á las de la *Ayenia*: el *fruto* como el del *Cardiospermo*, con una columna que sale del receptaculo de la flor, declinada, y ascendente por su ápice mas allá del extremo del petalo supremo: el *nectario* en forma de campana, muy pequeño, dentro del qual se hallan los estambres y pistilo.

1224. Género HELICTERES. *Jacq. amer.* 235.

Isora Plum. 37.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, medio aovado, extendido obliquamente, hendido en cinco partes desiguales y correoso.

COR. *Petalos* cinco, oblongos, iguales en su latitud, fixados al receptaculo y mas largos que el caliz: con las *uñas* largas, y un dientecito lateral por su base en ambas partes.

Nec-

898 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Nectario de cinco hojuelas , en forma de petalos , lanceoladas , muy pequeñas y que cubren al germen.

ESTAMB. *Filamentos* cinco , diez ó mas , y cortísimos : con las *anteras* oblongas y laterales.

PIST. un *receptaculo* filiforme , larguísimo , encorvado ácia atrás , y que lleva en su ápice al germen aovado : *estilo* alesnado , mas largo que el germen : con el *estigma* casi hendido en cinco partes.

PERIC. *Capsulas* cinco , las mas veces torcidas espiralmente y de una celdilla.

SEM. muchas , y angulares.

OBS. En algunas especies, Jacquin y otros Botánicos, advirtieron las flores con doce y aun mas estambres ; y las capsulas rectas. Se hallan tambien especies sin petalos.

ESPECIES.

- Bar-
vensis. 1. **HELICTERES decandra**, *foliis cordatis serratis, fructu contorto apicibus rectis.* Jacq. amer. 236. t. 149. Helicteres con diez estambres ; hojas de figura de corazón , aserradas ; fruto retorcido , con sus ápices rectos.
- Helicteres arbor Indiae orientalis, siliqua varicosa & funiculi in modum contortuplicata.* Pluk. alm. 181. t. 245. f. 2. Helicteres arbol de la India oriental , con la siliqua varicosa , y retorcida al modo que un cordelito.

Cast. Helicteres Barvense.

Habita en las Indias. *h*

- Isora. 2. **HELICTERES decandra**, *foliis cordatis serratis, fructu toto contorto.* Hort. cliff. 433. Helicteres con diez estambres ; hojas de figura de corazón , aserradas ; y fruto todo retorcido.
- Helicteres Jamaicensis.* Jacq. amer. 235. t. 179. f. 99. Hort. t. 143. Helicteres de la Jamaica.
- Isora Murri.* Rheed mal. 6. p. 55. t. 30. Isora Murri.
- * *Helicteres arbor Indiae occidentalis, fructu majore.* Pluk. alm. 182. t. 245. f. 3. Helicteres arbol de la India occidental , con el fruto mas grande. *

Cast.

Cast. Helicteres Isora.

Habita en Malabár y en la Jamaica. *h*

Angus-
tifolia. 3. HELICTERES *foliis lanceolatis integerrimis, fructu ovato recto.* Osb. it. 232. t. 5. Helicteres con hojas lanceoladas y enterisimas; fruto aovado y recto.

Cast. Helicteres de hoja angosta.

Habita en la China. Osbeck. *h*

Es arbol que produce las *hojas* lanceoladas, desnudas por encima, tomentosas por debaxo, con peciolo, enterisimas y puntiagudas: las *flores* con pedunculo y esparcidas: el *caliz* tomentoso: cinco *petalos* con un diente en ambas partes de la base de sus laminas: el *receptaculo* del largo de la flor, filiforme, en cuyo ápice se hallan diez *estambres* pequeños y un solo *estilo*: la *capsula* aovada, tomentosa, sin que sea retorcida, sino compuesta de cinco caxitas, paralelas, rectas y acercadas.

Pen-
tandra. 4. HELICTERES *pen-
tandra, foliis ovatis, floralibus coloratis.* Helicteres con flores de cinco estambres; hojas aovadas; y las florales de color. *Spiriploco.* Allemand. *Spiriploco.* miss.

Cast. Helicteres de cinco estambres.

Habita en Surinam. *h*

Lleva las *hojas* alternas, aovadas, puntiagudas y aserradas: las *florales* de color purpúreo obscuro: los *calices* erizados con cerdas ramosas: los *petalos* del largo del *caliz*: cinco *estambres*; y las *capsulas* retorcidas y pelosas.

Car-
thagi-
nensis. 5. HELICTERES *polyan-
dra, foliis cordatis serratis, fructu oblongo recto.* Helicteres con mas de veinte estambres; hojas de figura de corazon, aserradas; Jacq. amer. 237. t. 150. fruto oblongo y recto.

Cast. Helicteres de Cartagena.

Habita en Cartagena de Indias. *h*

900 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Ape-
tala.

6. HELICTERES *dode-* Helicteres con doce ó has-
candra, apetala, foliis quin- ta diez y nueve estambres, y
que lobis, siliquis divarica- sin petalos; hojas hendidas
tis. Jacq. amer. 238. t. 181. en cinco lóbulos; y siliquas
f. 98. divergentes.

Macpalxochi. Hern. Mex. Macpalxochi: Llamado
383. 459. asi por los de México.

Cast. Helicteres sin petalos.

Habita en la America austral. *h*

ORDEN VIII.

DODECANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOCE HASTA
DIEZ Y NUEVE ESTAMBRES.

1225. Género CYTINUS. † Hypocistis Tourn. t. 477.

Thyrsine. Gleditsch. Verm. Abbandl.

T. 1. 226 Tab. 2.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, entre tubuloso y en forma
de campana, y persistente: con el *tubo* cilindrico; y
el *borde* extendido, dividido en quatro partes, algo
obtusos y de color.

COR. ninguna.

ESTAMB. diez y seis: *filamento* ninguno: *anteras* oblon-
gas, de dos ventallas y pegadas al ápice del estilo
debaxo del estigma.

PIST. *Germen* debaxo de la flor, redondeado: *estilo* cilin-
drico, casi de la magnitud del caliz: con el *estigma*
hendido en ocho partes, giboso y obtuso.

PERIC. *Baya* coronada, casi redonda, correosa y de ocho
celdillas.

SEM. numerosas, menudas y casi redondas.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.

HYPOCISTIS. corol. p. 46.

La flor es de un petalo, en forma de campana y hendido en muchas partes; cuya parte posterior (*es el germen*) pasa á fruto blando, como dividido en radios por dentro y lleno de simientes.

E S P E C I E.

Hypo-
cistis.

1. CYTINUS.

Cytinus hypocistis. Syst.
nat. 12. p. 612. Mat. med.
227.

Asarum (*hypocistis*) *fo-
liis sessilibus imbricatis*,
floribus quadrifidis. Spec.
pl. 3. p. 653.

Hypocistis omnino lutea,
seu ochræ colore. Clus. hisp.
143. Tourn. corol. 46.

Hypocistis. C. B. P. 465.
Cam. epit. 96. 97.

X Cytino.

X Cytino hypocisto.

X Asaro (*hypocisto*) con ho-
jas sentadas, apinadas; y flo-
res hendidas en quatro par-
tes.

X Hypocisto del todo ama-
rillo, ó de color de ocre.

X Hypocisto.

Cast. Cytino hypocisto.

Habita sobre las raices de la Xara, en Portugal y Mauri-
tania: en Cataluña, Aragon, Valencia, Extremadura y
en las mas provincias de España.

PROPIED. El xugo de esta planta *es acido y astringente*;
y se usa en los fluxos.

ORDEN IX.

POLYANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE VEINTE ESTAMBRES.

1226. Género XYLOPIA. † *Xylopricon Brown.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, en forma de campana, casi hendido en quatro partes y algo obtuso.

COR. *Petalos* seis, sin uñas, entre lineares y lanceolados, correosos; y los tres *exteriores* mas crasos.

ESTAMB. *Filamento* ninguno: *anteras* numerosas, sentadas en el germen y algo oblongas.

PIST. *Germen* sin piececito, aovado y cubierto con las anteras: *estilo* entre cónico y alesnado, y de la longitud de la corola: con el *stigma* sencillo.

PERIC. *Drupa* seca, casi redonda, de una celdilla y con pico.

SEM. *Nuez* casi redonda.

ESPECIES.

Muricaca. 1. XYLOPIA *pedunculis* X *Xylopi* con pedunculos
multifloris, fructibus muricatis. X de muchas flores; y frutos
X con puntitas rígidas.

Xylopricum fruticosum, X *Xyloprico* fruticoso, con
foliis ovatis acuminatis pro- X hojas aovadas, puntiagudas;
ductis alternis, capsulis X alargadas y alternas; capsu-
punctatis, floribus confertis X las punteadas; y flores amon-
ad alas. Brown. jam. 250. t. X tonadas en las axilas.

5. f. 2.

Cast. *Xylopi* con puntitas rígidas.

Habita en la America. *h*

Glabra 2. XYLOPIA *pedunculis* X *Xylopi* con pedunculos
sub-unifloris, fructibus glabris. X de una ó dos flores; y frutos
X lampiños.

Xy-

Xylopricum foliis amplioribus nitidis ovatis, petiolis brevibus, fructibus glabris. Brown. jam. 251. Xyloprico de hojas mas anchas, lustrosas y aovadas, con los peciolo cortos; y frutos lampiños.

Xylopricum arbor, Barbadosibus Lignum amarum nominata. Pluk. alm. 395. t. 238. f. 4. Xyloprico arbol, llamado por los de la Barbada. Leño amargo.

Cast. Xylophia lampiña.

Habita en la America. *h*

1227. Género GREWIA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, lanceoladas, derechas, correosas, de color por dentro, extendidas, y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* cinco, de la figura del caliz, comunmente mas pequeños y escotados por su base.

Neetario: una escamita inserta en la base de cada petalo, algo crasa, encorvada ácia dentro, inclinada ácia la margen y que ciñe al estilo.

ESTAMB. *Filamentos* numerosisimos, setáceos, del largo de los petalos, é insertos en la base del germen: con las *antras* casi redondas.

PIST. *Germen* con piececito, casi redondo, puesto en su receptaculo columnar, derecho y ceñido con un ribete de cinco lados: *estilo* filiforme, y de la longitud de los estambres: con el *estigma* obtuso y hendido en quatro partes.

PERIC. *Baya* dividida en quatro lóbulos, y de quatro celdillas.

SEM. solitarias, globosas y de dos celdillas.

ESPECIES.

Occi-
denta-
lis. 1. GREWIA *foliis subovatis, floribus solitariis.* Grewia con hojas casi aovadas; y flores solitarias.
Kniph. cent. 9. n. 43.

Grewia

904 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Grewia corollis acutis. X *Grewia* con las corolas
Hort. cliff. 433. Duham. arb. agudas.
1. p. 276. t. 108.

Ulmifolia arbor Africana, baccifera, floribus purpureis. Pluk. alm. 393. t. 237. f. 1. X Arbol de Africa, que lleva bayas, con hoja como la del Olmo; y flores purpúreas.

Ulmi facie arbuscula Æthiopica, ramulis alatis, floribus purpurascens. Comm. hort. 1. p. 165. t. 85. X Arbustito de Etiopia, con traza de Olmo; ramitas aladas; y flores de color que tira á purpúreo.

Seb. thes. 1. p. 46. t. 26. f. 3. Rai. dendr. 13.

Cast. *Grewia* occidental.

Habita en Etiopia y en Curasao. *h*

Orien- 2. GREWIA *foliis sub-* X *Grewia* con hojas casi lan-
talis. *lanceolatis, floribus solitariis.* Flor. zeyl. 324. X ceoladas; y flores solitarias.

Grewia corollis obtusis. Hort. cliff. 433. X *Grewia* con las corolas obtusas.

Pai-paræa seu Covradi. Rheed. mal. 5. p. 91. t. 46. X *Pai-parea* ó *Covradi*.

Rai. hist. 1624.

Frutex baccifer, Malabaricus, fructu plano, rotundo, piloso, tetragono. Pluk. alm. 275. t. 50. f. 4. X Arbusto de Malabár, que lleva bayas ó fruto plano, redondo, peloso y de quatro lados.

α *Frutex Ceramicus.* Rumph. amb. 4. p. 124. t. 60. Burm. X Arbusto Ceramico. α

Cast. *Grewia* oriental.

Habita en la India. *h*

Es semejante á la precedente.

Asia- 3. GREWIA *foliis corda-* X *Grewia* con hojas de he-
tica. *tis.* X chura de corazon.

Microcos (lateri-flora) pedunculis axillaribus confertis dichotomis. Spec. pl. ed. 2. p. 734. Flor. zeyl. 208. X *Microcos* (de flores laterales) con pedunculos axilares, amontonados y ahorquillados.

Ham-

Hamdamanias. Herm. \times *Hamdamanias*.
z eyl. 3. \times

Cast. *Grewia* de Asia.

Habita en Surate. *Brand.* \hbar

Es arbol que lleva las ramas algo tomentosas: las *estipulas* lanceoladas: las *hojas* alternas, con peciolo, de figura de corazon, casi redondas, algo agudas, de cinco nervios, algo hendidas en lóbulos, tomentosas por debaxo, y de la magnitud de las del *Manzano*: los *peciolos* rollizos, tomentosos, y cinco veces mas cortos que las hojas: los *pedunculos* axilares, comunmente de quatro en quatro, hendidos en tres partes, con tres flores y la mitad mas cortos que las hojas: los *petalos* sin ser mayores que el caliz; y las *bayas* pequeñas, toxas y acidas.

Mi- 4. GREWIA *foliis ovato-oblongis, floribus paniculatis*. Syst. veg. 689. \times *Grewia* con hojas entre aovadas y oblongas; y flores en panoja.

Microcos (*paniculata*) *panicula terminali*. Spec. pl. 2. \times *Microcos* (*en panoja*) con la panoja terminal.
P. 773. Flor. z eyl. 207.

Microcos foliis alternis oblongis acuminatis. Burm. \times *Microcos* con hojas alternas, oblongas y puntiagudas.
z eyl. 159. t. 74.

Schageri-Cottam. Rheed. \times *Schageri-Cottam*.
mal. 1. p. 105. t. 56.

Cast. *Grewia* *Microcos*.

Habita en la India. \hbar

Malo- 5. GREWIA *foliis cordatis ovato-oblongis crenatis scabris, pedicellis axillari- bus trifloris, fructu tetracocco*. Suppl. p. 409. \times *Grewia* con hojas de figura de corazon, entre aovadas y oblongas, recortadas y ásperas; piececitos axilares, con tres flores; y fruto de quatro caxitas.

Malococca crenata. Forst. \times *Malococca* recortada.
gen. 39. Forst. act. ups. vol. 3. p. 179. \times

Cast. *Grewia* *Malococca*.

Ha-

906 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Habita en los bosques de la Isla Tongatabu, y en lugares montuosos de la Isla Huaheine. *Forster*.

Con dificultad se saca la diferencia, por la qual se distingue esta especie de las demas.

Salvi-
folia.

6. GREWIA *foliis oblongis integerrimis, floribus axillaribus pluribus pedicellatis, petalis recurvis linearibus*. Suppl. p. 409. Grewia con hojas oblongas y enterisimas; flores axilares y las mas con piececillo; petalos encorvados ácia atrás y lineares.

Cast. Grewia con hoja de Salvia.

Habita en Zeylan. *Koenig*. *h*

Produce las *hojas* oblongas, con peciolo, adelgazadas en ambas partes, obtusas, por encima lampiñas, por debajo canas, venosas y enterisimas: tres ó mas *pedunculos* axilares, tomentosos y cortos: las *flores* derechas; el *caliz* con cinco dientes y tomentoso: los *petalos* tomentosos por defuera, amarillos, encorvados ácia atrás, lineares y hendidos por su ápice en dos partes: los *filamentos* muy barbados en su base y desde ella lampiños: las *anteras* largas y amarillas: y el *estigma* en cabezuela y escotado.

Parece que este género estaria mas bien colocado en la clase *polyandria*.

1228. Género AMBROSINIA. *Bastii*.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espata* de una pieza, en forma de cucurucho, envuelta por la base y casi cerrada en su ápice.

COR. ninguna.

ESTAMB. un *filamento* ó *diseipimento* membranoso, que divide la espata en dos celdillas que se comunican por arriba: *anteras* muchas, distribuidas en distinto orden, y pegadas á una linea del filamento de la celdilla ó bóveda interior.

Nectarios dos, casi redondos, cóncavos y colocados en la base de las anteras.

PIST. puesto en la celdilla anterior de la espata: *germen*

casi redondo: *estilo* cilindrico y mas corto que la espata: con el *estigma* obtuso.

PERIC. *Capsula* ? casi redonda y de una celdilla.

SEM. muchas, aovadas y anidadas.

ESPECIE.

- Bassii. 1. AMBROSINIA. X Ambrosinia.
Arisarum Potamogeti fo- X Arisaro con hoja como la
 lio. Bocc. sicul. 50. t. 26 X del Potamogeton.
 Moris. hist. 3. p. 544. sect. X
 13. t. 6. f. 19. Rai. hist. 1097. X
 Cast. Ambrosinia de Bassio.
 Habita en Palermo y en Berbería. 24

1229. Género ARUM. * Tourn. t. 69. *Arisarum*

Tourn. t. 70. *Colocasia Boerb.* 2. p. 73.

Dracunculus Tourn. t. 70.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Espata de una pieza, muy grande, oblonga, envuelta por la base, casi cerrada en el ápice, comprimida en su vientre y de color por dentro.

Espadice á manera de maza, muy sencillo, poco más corto que la espata, de color, rodeado por debaxo con los gérmenes, y que se marchita por encima de ellos.

COR. ninguna.

ESTAMB. Filamento ninguno, sino *nectarios* gruesos por su base, que rematan en zarcillos filiformes, puestos en dos órdenes, y que salen del medio del espadice: muchas *antheras* sentadas, de quatro lados, interpuestas en los dos órdenes de los zarcillos y pegadas al espadice.

PIST. Gérmenes muchos, que cubren la base del espadice, colocados debaxo de los estambres ó *nectarios*, y aovados al revés: *estilos* ninguno: *estigmas* barbados.

PERIC. Bayas otras tantas, globosas y de una celdilla.

SEM. muchas, y casi redondas.

OBS.

908 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

OBS. *La estructura de la flor es maravillosa y sin igual ; pues ofrece materia á los grandes Botánicos para disputar. Vease á Tournefort , á Malpighio , á Dillenio , Rivino &c.*

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT.

ARUM. p. 158.

La flor es de un petalo , anomala , en forma de una oreja de asno ó de liebre, como dice *Cordo*: del fondo de la flor sale el pistilo acompañado por su base de muchos embriones , cada uno de los cuales pasa á baya casi globosa , y llena de una ú otra simiente algo redonda. A estas notas se añaden las de las hojas indivisas ó ligeramente cortadas.

ARISARUM. p. 161.

Se diferencia del Aro y del Dracunculo por la flor en forma de cucurucho.

DRACUNCULUS. p. 160.

Tiene las flores y frutos como los del Yaro ; pero las hojas cortadas en varias y profundas lacinias.

ESPECIES SIN TALLO , Y CON LAS HOJAS COMPUESTAS.

Dracunculus.

1. ARUM *foliis pedatis*, Yaro de hojas ramosas ,
foliolis lanceolatis integer- con las hojuelas lanceoladas ,
rimis æquantibus spatam enterisimas y que igualan á
spadice longiorem . Roy. la espata mas larga que el es-
lugdb. 7. Sabb. hort. 2. t. padice.
76. 77.

Arum *foliis palmatis*, Yaro de hojas palmeadas ,
foliolis undecim lanceolatis con once hojuelas lanceola-
integerrimis , intermediis das , enterisimas , las inter-
majoribus , spadice clavato. medias mayores ; y el espa-
Hort. cliff. 344. dice en forma de maza.

Dra-

Dracunculus polyphyllus. X Dragoncillo con muchas
C. B. P. 195. Moris. hist. 3. X hojuelas.
p. 548. sect. 13. t. 5. f. 46. X
Tourn. p. 160. X

Dracontium. Dod. pempt. X Draconcio.
329. X

Cast. Yaro Dragoncillo. *vulgo*: Serpentina, llamada así porque tiene el tallo con manchas, como la Serpiente.

Habita en la Europa austral. 26

Al paso que la yerba se vá secando arroja el olor hediondo y cadaverico.

PROPIED. Son las mismas con corta diferencia que las del Yaro manchado.

Dra- 2. ARUM *foliis pedatis,* X Yaro de hojas ramosas,
con- *foliolis lanceolatis integer-* X con hojuelas lanceoladas, en-
tium. *rimis superantibus spatham* X terisimas y que superan á la
spadice brevior. Mill. X espata mas corta que el es-
dict. n. 9. Blackw. t. 269. X padice.

Arum polyphyllum minus X Yaro menor y mas baxo,
3 *humilius.* Herm. lugdb. X con muchas hojuelas.
60. X

α *Arum seu Arisarum Vir-* X Yaro ó Arisaro de Virgi-
ginianum, Dracontii folio, X nia, con hoja como la del
pene viridi, longo, acumina- X Draconcio; espadice verde,
to. Pluk. alm. 52. t. 271. X largo y puntiagudo. α
f. 2. X

Cast. Yaro Draconcio.

Habita en la America.

Pen- 3. ARUM *acaule, foliis* X Yaro sin tallo, con hojas
taphyl- *quinatis.* X de cinco en rama.
lum. X

Arum pentaphyllum, In- X Yaro de Indias, con cin-
dicum. Moris. hist. 3. p. 540. X co hojuelas.
sect. 13. t. 5. f. 27. Mala. X

Cast. Yaro de cinco hojuelas.

Habita en la India.

910 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Tri- 4. ARUM *acaule, foliis ternatis, floribus monoicis.* Yaro sin tallo; hojas de
phyl- tres en rama; y flores con
lum. solo un sexô.

Gron. virg. 142.

Dracunculus seu Serpentaria triphylla, Brasiliana. Dragoncillo ó Serpentaria
del Brasil, con tres hojue-
C. B. P. 195. Prodr. 101. las.

Dodar. mem. 81. f. 273.

* *Arum minus, triphyllum seu Arisarum, pene viridi, Virginianum.* Moris. Yaro menor, de Virginia,
con tres hojuelas, ó Arisaro
con el espadice de color ver-
hist. 3. p. 547. sect. 13. t. de. α
15. f. 43.

Arum seu Arisarum triphyllum, minus, pene atrobente, Virginianum. Pluk. Yaro ó Arisaro menor, de
Virginia, con tres hojuelas;
y el espadice entre negro
alm. 52. t. 77. f. 5. y ROJO. β

Arum seu Arisarum minus, Marianum, flore pene ex pallido virescente. Pluk. Yaro ó Arisaro menor, de
la Isla Mariana, de flor con
el espadice entre palido y
amalth. 39. t. 376. f. 3. X que tira á verde.

Cast. Yaro de tres hojuelas.

Habita en la Virginia y en el Brasil. 2/

La planta del Brasil α tiene las *hojuelas laterales* hendi-
das en lóbulos ácia fuera: la de Virginia β las tiene
solamente gibosas; y la estructura de un solo sexô de la
flor persuade que son una misma especie.

Es *planta* que arroja algun tallo, y con el escapo
que sale del peciolo. Tiene unos *escapos* con las flores
masculinas, y otros con las femeninas; saliendo todos de
una misma raiz: la *espata* de la flor masculina derecha; y
la de la femenina con el labio doblado ácia dentro.

ESPECIES SIN TALLO, Y CON HOJAS SENCILLAS.

Colo- 5. ARUM *acaule, foliis peltatis ovatis repandis, basi emarginatis.* Hort. cliff. Yaro sin tallo, con hojas
casia. abroqueladas, aovadas, on-
deadas por su margen y es-
434. Hasselq. it. 485. Catesb. cotadas en la base.
car. 2. p. 45. t. 45. X

Arum

DE LAS MISM. FL. CON MAS DE XX. EST. 911

Arum maximum, *Ægyptiacum*, quod vulgo Colocasias. C. B. P. 195. Tourn. p. 159. Yaro muy grande, de Egipto, llamado vulgarmente Colocasia.

Arum Ægypticum. Col. ecphr. 2. p. 1. t. 1. Rumph. amb. 5. p. 313. t. 109. Yaro de Egipto.

Colocasia. Clus. hist. 2. p. 75. Colocasia.

Culcas Faba Ægyptia. Alp. exot. Culcas Haba de Egipto.

Cast. Yaro Colocasia.

Habita en lugares aguanosos de Creta, de Chipre, Siria y Egipto. 26

Esculentum 6. ARUM *foliis peltatis ovatis integerrimis, basi emarginatis*. Hort. cliff. 435. Yaro con hojas abroqueladas, aovadas, enterisimas, y por su base escotadas.

Arum minus, *Nymphæa folio*, *esculentum*. Sloan. jam. 62. hist. 1. p. 167. t. 106. f. 1. Yaro menor, comestible, con hoja como la de la Ninfea.

Brassica Brasiliana, *foliis Nymphææ*. C. B. P. 111. Berza del Brasil, con hojas como las de la Ninfea.

Caladium aquatile. Rumph. amb. 5. p. 318. t. 110. f. 1. Caladio aquatico.

Cast. Yaro comestible.

Habita en la America. 27

Macrochrysum 7. ARUM *acaule, foliis peltatis cordatis repandis, basi bipartitis*. Flor. zeyl. 327. Roy. lugdb. 7. Yaro sin tallo, con hojas abroqueladas, de hechura de corazon, ondeadas por su margen, y divididas en dos partes por su base.

Arum maximum, *macrochryzon*, *Zeylanicum*. Herman. par. 73. t. 73. Rai. Suppl. p. 574. Yaro de Zeylan, muy grande, con la raiz larga.

Cast. Yaro de raiz larga.

Habita en Zeylan. 28

ARUM

912 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Pe- 8. ARUM *acaule*, *foliis* X Yaro sin tallo, con hojas
regri- *cordatis obtusis mucronatis*, X de figura de corazon, obtu-
num. *angulis rotundis*. Hort. cliff. X sas y terminadas en punta
435. Mill. dict. n. 14. X rigida; y sus angulos redon-
X dos.

Cast. Yaro peregrino.
Habita en America. 26

Divari 9. ARUM *acaule*, *foliis* X Yaro sin tallo, con hojas
catum. *cordato-hastatis divarica-* X entre de figura de corazon y
tis. Mill. dict. n. 13. X alabarda, y divergentes.
Arum acaule, *foliis sub* X Yaro sin tallo, con hojas
hastatis. Flor. zeyl. 325. X casi de figura de alabarda.
Nienschena major. Rheed. X Nienschena mayor.
mal. 11. p. 39. t. 20. X

Cast. Yaro desparramado.
Habita en la India. 26
Tiene la espata revuelta: y el *espadice* alesnado.

Trilo- 10. ARUM *acaule*, *foliis* X Yaro sin tallo, con hojas
batum. *sagittato-trilobis*, *flore ses-* X entre de figura de saeta y
sili. Flor. zeyl. 326. X hendidas en tres lóbulos; y
X flor sentada.

Arum trilobato folio, *hu-* X Yaro de Zeylan, mas ba-
milius & *minus*, *Zeylani-* X xo y menor, con hoja hen-
cum. Herm. par. 79. t. 78. X dida en tres lóbulos.
Rai. Suppl. p. 575.

Arum humile, *Zeylani-* X Yaro de Zeylan, baxo,
cum, *latifolium*, *pistilo coc-* X con hoja ancha; y pistilo ó
cineo. Comm. hort. 1. p. 97. X espadice de color coccineo.
t. 51. Mill. dict. t. 52. f. 2.

Arisarum Amboinicum. X Arisaro de Amboina.
Rumph. amb. 5. p. 320. t. X
110. f. 2. X

Cast. Yaro de tres lóbulos.
Habita en Zeylan. 26
Es muy parecido al *Asaro divergente*, y acaso variedad
suya.

ARUM

DE LAS MISM. FL. CON MAS DE XX. EST. 913

Sagitti-
folium.

11. ARUM *acaule, foliis sagittatis triangulis, angulis divaricatis acutis.* Hort. cliff. 345. Jacq. hort. t. 157. Yaro sin tallo, con hojas en forma de saeta, de tres ángulos, divergentes y agudos.
- Arum amplis foliis, esculentum.* Plum. spec. 4. ic. 35. Yaro comestible, con hojas anchas.
- Arum minus, esculentum, Sagittariae foliis viridi-nigris.* Sloan. jam. 63. hist. 1. p. 167. t. 106. f. 2. Yaro menor, comestible, con hojas como las de la Sagitaria, de color entre verde y negruzco.
- Arum minus, Sagittariae foliis.* Pluk. phyt. t. 149. f. 2. Yaro menor, con hojas como las de la Sagitaria.

Cast. Yaro con hoja de saeta.

Habita en el Brasil, en la Jamaica y en la Barbada. 26

Posee los *escapos* largos; pero mas cortos que los peciolos. *Burman.*

Macu-
latum.

12. ARUM *acaule, foliis hastatis integerrimis, spathe clavato.* Mat. med. 227. Hort. cliff. 8. Flor. dan. t. 505. Knorr. del. 2. t. A. 11. Yaro sin tallo, con hojas de hechura de alabarda, enterisimas; y espadice en forma de maza.
- Arum foliis sagittatis, spatha recta, clava cylindrica.* Hall. helv. n. 1302. Yaro con hojas en forma de saeta; espata recta; y maza ó espadice cilindrico.
- Arum vulgare, non maculatum.* C. B. P. 195. Tourn. p. 148. Yaro vulgar, sin manchas.
- Arum.* Fuchs. hist. 69. Lob. ic. 597. Yaro.
- Arum venis albis.* C. B. P. 195. Tourn. p. 158. Yaro con venas blancas. α
- Arum maculatum, maculis candidis seu nigris.* C. B. P. 195. Tourn. p. 158. Yaro con manchas candidas ó negras.

Cast. Yaro manchado.

Habita en la Europa mas austral: en los alrededores de Madrid y es frecuente en las mas provincias de España. 26

914 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

PROPIED. La raíz seca y su fecula son acres, incindentes, saponaceas, expectorantes y cosmeticas. La raíz y hojas verdes son corrosivas y vexigatorias.

Virgini- 13. ARUM *acaule, foliis* X Yaro sin tallo, con hojas
nicum. *hastato-cordatis acutis, an-* X entre de hechura de alabar-
gulis obtusis. Hort. cliff. X da y de corazon, agudas; y
434. Gron. virg. 142. X sus ángulos obtusos.

Cast. Yaro de Virginia.

Habita en lugares humedos de la Virginia. 24

Pro- 14. ARUM *acaule, foliis* X Yaro sin tallo, con hojas
bosci- *hastatis, spatha declinata* X de hechura de alabarda; es-
deum. *filiformi-subulata.* † Mill. X pata declinada, entre filifor-
dict. n.3. Sabb. hort. 2. t. 79. X me y alesnada.

Arisarum flore in tenuem X Arisaro con la flor que re-
caudam abeunte. Tourn. p. X mata en una cola delgada.
161.

Arisarum minus, probos- X Arisaro menor, con trom-
cideum. Bocc. mus. 2. p. 61. X pa.
t. 50.

Arisarum latifolium, mi- X Arisaro menor, con hoja
nus, repens, cespitosum. X ancha, rastrero y que forma
Barr. rar. 182. t. 1150. X cespied.

α *Arisarum rotundifolium* X Arisaro con hoja redonda
seu Potamogeiti folio. Bocc. X ó como la del Potamoge-
sic. Moris. hist. 3. p. 544. X ton. α
sect. 13. t. 6. f. 19. X

Cast. Yaro con trompa.

Habita en los montes Apeninos: en Andalucia, en Aya-
monte, en Galicia y otras partes de España.

Arisa- 15. ARUM *acaule, foliis* X Yaro sin tallo, con hojas
tum. *cordatis oblongis, spathæ* X de figura de corazon, oblon-
apertura ovata. Syst. veg. X gas; y la abertura de la es-
690. X pata aovada.

DE LAS MISM. FL. CON MAS DE XX. EST. 915

Arum acaule, foliis cor- X Yaro sin tallo, con hojas
dato-oblongis, spatha bifi- X entre de figura de corazon y
da, spadice incurvo. Spec. X oblongas; espata hendida en
pl. 3. p. 1370. Hort. cliff. X dos partes; y espadice en-
435. Sabb. hort. 2. t. 79. X corvado.

Arisarum latifolium, ma- X Arisaro mayor, de hoja
jus. C. B. P. 196. Tourn. p. X ancha.
161.

Arisarum latifolium, al- X Otro Arisaro de hoja an-
terum. C. B. P. 196. Tourn. X cha.
p. 161.

Arisarum latifolium. Clus. X Arisaro de hoja ancha.
hist. 2. p. 73. Lob. ic. 598. X

Arisarum serpentinum. X Arisaro serpentino.
Barr. ic. t. 573. X

Cast. Yaro Arisaro.

Habita en Mauritania, Italia, Provenza y Portugal: en
Cataluña, Extremadura, Castilla la vieja y en otras par-
tes de España. 24

Posee la espata entera y algo doblada por arriba, sin que
esté envuelta por debaxo.

Ova- 16. ARUM *acaule*, foliis X Yaro sin tallo, con hojas
tum. ovato-oblongis, spatha sca- X entre aovadas y oblongas; y
bra. X espata áspera.

Arum aquaticum. Rumph. X Yaro aquatico.
amb. 5. p. 312. t. 108. X

Karimpola. Rheed. mal. X Karimpola.
11. p. 45. t. 23. X

Cast. Yaro aovado.

Habita en la India.

Tenui- 17. ARUM *acaule*, foliis X Yaro sin tallo, con hojas
folium. lanceolatis, spadice setaceo X lanceoladas; espadice setá-
declinato. Hort. cliff. 345. X ceo y declinado.
Gron. orient. 286. Sauv. X
monsp. 16. X

916 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Arum angustifolium. C. X Yaro de hoja angosta.
 B. P. 196. Clus. hist. 2. p. X
 74. Moris. hist. 3. p. 545. X
 sect. 13. t. 6. f. 21. X

Arum Scorzoneræ folio. X Yaro con hoja como la de
 Tourn. p. 160. X la Escorzonera.

Arum angustifolium. Dod. X Yaro de hoja angosta.
 pempt. 332. X

Cast. Yaro con hoja delgada.

Habita en Dalmacia , en Roma , Mompeller y Oriente. 24

Pic- 18. ARUM *acaule, foliis* X Yaro sin tallo , con hojas
 tum. *cordatis venis coloratis pic-* X de hechura de corazon y pint-
tis. Suppl. p. 410. X tadas con venas de color.

Arum pictum. Act. holm. X Yaro pintado.

Cast. Yaro pintado.

Habita : : : : A. S. Gallia Rege Ludovico XVI.

Produce tres ó quatro hojas radicales, con peciolo , de fi-
 gura de corazon, y pintadas por encima con venas blan-
 cas: la *espata* sentada , radical ó sin escapo , inflada
 por su base , de figura de zangano , verde , y por enci-
 ma de color que tira á purpúreo : el *espadice* en forma
 de maza , entre aovada y oblonga , y de color que de
 negro tira á purpúreo: muchos *gérmes* en la base del
 espadice , casi globosos y verdes : ningun *estilo* : el *es-*
tigma de un puntito : muchas *anteras* cerca y por enci-
 ma de los gérmes , dispuestas en un globo verticilar ,
 sentadas , casi redondas y amarillas: los *filamentos su-*
periores apartados á trechos , alesnados , en verticilo y
 de color que tira á amarillo-roxo.

Can- 19. ARUM *acaule, foliis* X Yaro sin tallo , con hojas
 nae fo- *lanceolatis aveniis*. Suppl. X lanceoladas y sin venas.
 lium. p. 410. X

Cast. Yaro con hoja de Caña de Indias.

Habita en Surinam sobre los árboles.

Echa algunas hojas radicales , lanceoladas , sin venas , con
 peciolo , del largo de dos pies y muy semejantes á las de
 la Caña de Indias : el *escapo* mas corto : la *espata* algo
 ob-

DE LAS MISM. FL. CON MAS DE XX. EST. 917

obtusa, roxa por defuera y blanca por dentro, como tambien en su margen: y el *espadice* con los estambres y pistilos continuados sin que medie trecho alguno.

Musci-
vorum. 20. ARUM *foliis hastato-
pedatifidis, spatha intus spa-
diceque pilosa*. Suppl. p. 410. Yaro con hojas entre de
hechura de alabarda y hendidas en ramas; y espata pilosa por dentro, igualmente que el espadice.

Arum Dracunculus. Buchholz. Yaro Dragoncillo.

Cast. Yaro tragamoscas.

Habita: : : : :

Tiene las *hojas* radicales, de figura de alabarda, entre ramosas y hendidas en siete lancinias lanceoladas y nerviosas, con la del medio grande, y las próximas gradualmente mas pequeñas: las *primeras* en forma de saeta, ó hendidas en cinco partes y varias: los *peciolos* rollizos y que envaynan por debaxo: el *escapo* cortísimo y rollizo: la *espata* casi del largo de las hojas, de color verde subido, con manchas, envuelta por su base, doblada por arriba ácia fuera casi horizontalmente, palida por dentro, pero roxa ácia su base, salpicada de pelos roxos vueltos ácia atrás, mas amontonados ácia la base y que cierran la garganta: el *espadice* casi cilindrico y poco mas corto que la espata: numerosos *gérmenes* sentados al rededor de la base del espadice y palidos: el *estigma* terminado en seno muy obtuso y de color gris: ocho *filamentos* alesnados, puestos en verticilo arriba de los gérmenes, de la longitud de los globulillos de los estambres, ascendentes y de color de violeta: numerosas *anteras* amarillas y sentadas: otros cinco *filamentos* alesnados, ascendentes, puestos en verticilo, de la longitud de los primeros y de color tambien violado: la *maza* muchas veces mas larga que las restantes partes, salpicada de cerdas apartadas, de color de violeta y mas tiernas que las precedentes.

La *flor* despidе el olor fetido de cadáver, con el qual se atrahen las moscas dentro de ella, y queriendo salir se lo estorvan los pelos que se hallan vueltos ácia atrás; y asi

918 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

perecen en la misma flor. Veanse sobre estas observaciones las *Añas de Holmia de Linneo*.

ESPECIES QUE ARROJAN TALLOS.

Arborescens. 21. *ARUM caulescens* X Yaro que arroja tallos, rectum, foliis sagittatis. Xto, con hojas en forma de Mill. dict. n. 17. X saeta.

Arum arborescens, Sagittariae foliis. Plum. amer. 44. X Yaro arborescente, con hojas como las de la Sagittaria. t. 51. Gen. 60. X

Cast. Yaro arborescente.

Habita en la America meridional. *h*

Seguinum. 22. *ARUM caulescens* X Yaro que arroja tallos, sub-erectum, foliis lanceolato-ovatis. Jacq. amer. 239. X si derecho, con hojas entre lanceoladas y aovadas. t. 151. Mill. ic. t. 295.

Arum caulescens, Cannae Indicae foliis. Plum. amer. 44. t. 60. 51. h. filic. 195. h. X Yaro que arroja tallos, con hojas como las de la Caña de Indias.

Arum caule geniculato, Cannae Indicae foliis, summis labris degustantes multos reddens. Sloan, jam. 63. X Yaro de tallo con nudos; hojas como las de la Caña de Indias; y que quita el hist. 1. p. 168. X habla á los que le gustan con la punta de los labios.

Canna Indica, venenata. Pluk. alm. 79. X Caña de Indias, venenosa. X

Cast. Yaro Seguinum: llamado asi por los Franceses.

Habita en la America. *h*

Tiene las hojas, alguna vez, horadadas con puntitos.

Hedysacum. 22. *ARUM caulescens radicans, foliis cordatis oblongis acuminatis, petiolis teretibus.* Jacq. amer. 240. t. 152. X Yaro que arroja tallos con raíces; hojas de hechura de corazon, oblongas, puntiagudas; y peciolo rollizos. X

DE LAS MISM. FL. CON MAS DE XX. EST. 919

Colocasia Hederacea, sterilis, minor, folio cordato. Colocacia menor, como Yedra, esteril, con hoja de Plum. amer. 39. t. 55. filic. figura de corazon.
t. 195.

Cast. Yaro como Yedra.

Habita en la America. 24

Lingu- 23. ARUM caulescens re- Yaro que arroja tallos,
latum. pens, foliis cordato-lanceo- rastrero, con hojas entre de
latis, petiolis marginato- figura de corazon y lanceo-
membranaceis. ladas; y peciolo con ribetes
membranosos.

Arum tenue scandens, foliis oblongis, petiolis alatis Yaro delgado, trepador,
amplexantibus. Brown. jam. con hojas oblongas; peciolo
alados y que abrazan el ta-
llo.
333.

*Phyllitidi scandenti mi- Planta mayor y menor, pa-
nor & major, graminifolia,* recida á la Phyllitide trepa-
folio oblongo acuminato, fo- dora, con hojas como las de
liorum pediculis alis extan- la Grama, oblongas, puntia-
tibus acutis. Sloan. jam. 15. gudas; y sus piecitos con
hist. 1. p. 75. t. 27. f. 2. 1. alas agudas, tiesas y que so-
bresalen.

Arum scandens, maxi- Yaro trepador, muy gran-
imum, flore florescente (an de, con la flor de color que
flavescente?) Plum. spec. 4. tira á amarillo-roxo.
ic. 37.

Cast. Yaro de lengueta.

Habita en la America. 24

Auri- 24. ARUM caulescens ra- Yaro que arroja tallos con
tum. dicans, foliis ternatis, la- raices; hojas de tres en ra-
teralibus uni-lobatis. Mill. ma; y las hojuelas laterales
dict. n. 18. con un lóbulo.

Arum Hederaceum, tri- Yaro como Yedra, de tres
phyllum & auritum. Plum. hojuelas y con orejillas.
amer. 41. t. 58.

920 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Arum scandens, triphyl-
lum, foliis exterioribus au-
ritis, petiolis vaginantibus.
Brown. jam. 331.

Yaro trepader, con hojas
de tres en rama; hojuelas
exteriores con orejillas; y
sus pecioloos que envaynan.

Arum maximum, scan-
dens, geniculatum, trifo-
liatum, foliis ad basim au-
ritis. Sloan. jam. 63. hist. 1.
p. 169.

Yaro muy grande, trepa-
dor, con nudos; hojas de
tres en rama; y las hojuelas
con orejillas en su base.

Cast. Yaro con orejillas.

Habita en la America. 24

1230. Género DRACONTIUM. •

CAR. GEN. NAT.

CAL. Espata en forma de navecilla, correosa, de una
ventalla y muy grande.

Espadice muy sencillo, cilindrico, cortísimo, y cubierto
por todas partes de frutificaciones dispuestas en cabe-
zuela.

Periantio propio ninguno, sino que sea la corola.

COR. propia de cinco petalos, cóncavos, aovados, obtu-
sos, casi iguales y de color.

ESTAMB. en cada frutificacion: siete filamentos lineares,
deprimidos, derechos, iguales y mas largos que la
corolilla: con las anteras quadrangulares, mellizas,
oblongas, obtusas y derechas.

PIST. Germen casi aovado: estilo rollizo, recto y del largo
de los estambres: con el estigma desfigurado y de
quatro lados.

PERIC. en cada frutificacion: baya casi redonda.

SEM. muchas.

E S P E C I E S.

Poly-
phyl-
lum.

1. DRACONTIUM sca-
po brevissimo, petiolo radi-
cato lacero, foliolis tripar-
titis, laciniis pinnatifidis.
Hort. cliff. 434. Roy. lugdb. 6.

Draconcio con el escapo
cortísimo; peciolo arraygado;
lacerado; con hojuelas divi-
didas en tres partes, y sus la-
cinias hendidas al través.

Arum

DE LAS MISM. FL. CON MAS DE XX. EST. 927

Arum polyphyllum, caule scabro, punicante. Herm. par. 93. t. 93. Yaro con muchas hojuelas; tallo áspero y de color que tira al de la flor de Granado.

Arum polyphyllum, Surinamense, caule atro-rubente, glabro & eleganter variegato. Pluk. alm. 52. t. 149. f. 1. Yaro de Surinam, con muchas hojuelas; tallo lampiño, hermosamente matizado de varios colores entre negro y roxo.

Cast. Draconcio de muchas hojuelas.

Habita en Surinam. ¶

Spin. sum. 2. DRACONTIUM foliis sagittatis, pedunculis petiolisque aculeatis. Flor. zeyl. 328. Mill. dict. n. 3. Draconcio de hojas en forma de saeta; pedunculos y peciolos con aguijones.

Arum Zeylanicum, spinosum, sagittæ foliis. Herm. parad. 75. Yaro de Zeylan, espinoso, con hojas de figura de saeta.

Arum minus, Zeylanicum, Sagittariæ foliis. Rai. Suppl. p. 575. Yaro menor, de Zeylan, con hojas como las de la Sagitaria.

Cast. Draconcio espinoso.

Habita en Zeylan.

Pet. dum. 3. DRACONTIUM foliis subrotundis concavis. Kalm. it. 3. p. 47. Gron. virg. 141. Draconcio con hojas casi redondas y cóncavas.

Calla aquatilis, odore Allii vehemente prædita. Gron. virg. 1. p. 186. Calla aquatica, con olor fuerte de Ajo.

Arum Americanum, Betæ folio. Catesb. car. 2. p. 71. t. 71. Yaro de America, con hoja como la de la Azelga.

Cast. Draconcio fetido.

Habita en aguas de la Virginia y de la Carolina. ¶

Acaso es especie de *Pothos*?

912 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Camt-
ehat-
cense. 4. *DRACONTIUM foliis* X Draconcio con hojas lan-
lanceolatis. Amœn. acad. 2. X ceoladas.
p. 360. Mill. dict. n. 4. X

Cast. Draconcio de Camschatcka.
Habita en la Siberia.

Per-
tusum. 5. *DRACONTIUM foliis* X Draconcio de hojas con
pertusis, caule scandente. X agujeros pequeños; y tallo
Mill. dict. n. 1. ic. t. 296. X trepador.
Arum Hederaceum, am- X Yaro como Yedra, con
plis foliis, perforatis. Plum. X hojas anchas y horadadas.
amer. 40. t. 56. 57. X

Cast. Draconcio horadado.
Habita en la America meridional. *h*

1231. Género *CALLA*. * *Provenzialia* Petit. gen.
p. 45. *Anguina* Trew.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espata* de una pieza, entre aovada y de figura de corazon, puntiaguda, de color por encima, muy grande, extendida y persistente.

Espadice en forma de un dedo, muy sencillo, derecho y cubierto con las frutificaciones.

COR. ninguna.

ESTAMB. *Filamentos* algunos, entremezclados con los gérmenes, del largo de los pistilos, persistentes, comprimidos y truncados: con las *anteras* sencillas, truncadas y sentadas.

PIST. en cada frutificacion: *germen* casi redondo y obtuso: *estilo* sencillo y cortísimo: con el *estigma* agudo.

PERIC. *Bayas* entre de quatro lados y globosas, con pulpa y de una celdilla.

SEM. muchas (*de seis á doce*), oblongas, cilindricas y obtusas en ambas partes.

OBS. Como en cada baya se hallen muchas semillas, se sigue, que cada uno de los pistilos pertenece á otros tantos flosculos, sin que sea parte de una misma y

sola flor; y como por falta del periantio y corola no se distinguen los estambres, es dificultoso señalar á cada flosculo el número cierto de ellos: y congeturando Linneo por la analogía que tiene la frutificación con la de las Palmas, cree que el número de los estambres propio á cada flosculo es el de seis.

En la Calla palustre el espadice se halla todo cubierto de estambres y pistilos mezclados entre sí; pero en la Calla Etiopica se halla solamente de este modo por debaxo, y por arriba cubierto de estambres solos.

ESPECIES.

Æthyopica.

1. CALLA foliis sagittato-cordatis, spatha cucullata, spadice superne masculo. Hort. cliff. 435. Lederm. y espadice con flores masculinas por arriba.

Arum Æthyopicum, flore albo, odorato, moschum olens. Yaro de Etiopia, con la flor blanca y que huele á almizcle.

t. 50.

Arum Americanum, Arum vulgaris facie, foliis carnosiss. Yaro de America, con traza del Yaro vulgar; y hojas carnosas.

Cast. Calla de Etiopia.

Habita en Etiopia.

Palustris.

2. CALLA foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermafrodito. Hort. cliff. 436. Flor. dan. t. 422. Calla con hojas de figura de corazon; espata plana; y espadice cubierto por todas partes con flores hermafroditas.

Dracunculus palustris, seu radice arundinacea. Dragoncillo palustre, ó con raiz como la de la caña.

Dracunculus aquatilis. Dragoncillo aquatico.

Provenzialia palustris. Provenzal palustre.

Petit. gen. 45.

Cast.

924 FLOR. CON LOS ESTAMB. EN EL PIST.

Cast. Calla palustre.

Habita en lugares pantanosos de la Europa boreal.

Orien-
talis.

3. CALLA *foliis ovatis.* X

Calla con hojas aovadas.

Gron. orient. 282. † Mill.
dict. n. 3.

Arum minus, *orientale*,
rotundioribus foliis. Moris.
hist. 3. p. 544.

Yaro menor, oriental,
con hojas mas redondas.

Arum Carsaami. Rauw.
it. 115.

Yaro Carsaami.

Cast. Calla oriental.

Habita en lugares montuosos de Alepo.

1233. Género ZOSTERA. * Alga Rai. angl. 3. p. 52.

Ruppia Aët. angl. 1741. p. 217.

CAR. GEN. NAT.

CAL. La base de la hoja que envayna y que se cierra longitudinalmente, escotada por arriba en ambas partes, y que encierra al espadice.

Espadice linear, plano, y adornado por un lado de arriba con estambres, y por debaxo con pistilos.

Periantio ninguno.

COR. ninguna.

ESTAMB. Filamentos muchos, alternos, cortísimos, é insertos mas arriba de los gérmes del espadice: con las anteras entre aovadas y oblongas, inclinadas, obtusas, y por arriba alesnadas y encorvadas ácia dentro.

PIST. Gérmes mas pocos, aovados, comprimidos, de dos filos, con algun piececito, fixados por su ápice, inclinados y alternos: estilo ninguno: estigmas capilares y sencillos.

PERIC. membranoso, sin mudarse, y que se abre longitudinalmente por un ángulo lateral.

SEM. una sola, y aovada.

ESPECIES.

- Marina 1. *ZOSTERA pericarpiis* X Zostera con los pericar-
sessilibus. It. Westr. goth. X pios sentados.
 166. t. 4. f. 1. Gron. virg.
 142. Oeder. t. 15.
Ruppia foliis linearibus, X Ruppia con hojas lineares
obtusis. Moerh. act. angl. X y obtusas.
 1741. p. 217.
Fucus seu Alga marina, X Fuco ó Alga marina, mas
graminea, angustifolia, se- X ramosa, graminea, de hoja
minifera, ramosior. Rai. X angosta y que lleva semi-
 angl. 3. p. 52. X llas.

Cast. Zostera marina.


Habita en el mar Báltico y en el Oceano.

- Oceana. 2. *ZOSTERA pericarpiis* X Zostera de pericarpios con
pedicellatis Oliviformibus. X piececito y en forma de acey-
 Ger. prov. 121. † X tuna.
Alga angustifolia, Vi- X Alga con hoja angosta de
triariorum. C. B. P. 364. X que usan los Vidrieros.
 Tourn. p. 569.
Alga marina. Lob. ic. X Alga marina.
 251. X

Cast. Zostera del Oceano.

Habita en el mar Oceano y Mediterráneo. 2

Se diferencia de la precedente por los *frutos* con pedun-
 culo; y por las *raices* plegadas ó reunidas en forma de
 un pelo.





214

LINNEO
DE
BOTANICA

VI

31